



08  
644

9/60

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF VERMONT.

L.B. Holthuis  
Oct. 1952



BIBLIOTHECA  
CARCINOLOGICA  
L.B. Holthuis









CAROLI A LINNÉ  
S Y S T E M A  
N A T U R Æ.

---

*TOM. I. PARS IV.*



## CLASSIS V.

## INSECTA.

*In his tam parvis, atque tam nullis*

*Quæ ratio! quanta vis!*

*Quam inextricabilis perfectio!*

PLIN. XI. 2.

ANIMALCULA polypoda, spiraculis lateralibus respirantia, cutē cataphracta aut pilis hirta; antennis mobilibus sentientibus instruuntur,

CORPUS horum dividitur in caput, truncum, abdomen, artus.

CAPUT plerisque distinguendum instruitur cerebro minuto, oculis; antennis, sæpius ore; destituitur naribus, auribus, etsi nonnullis certe evidenter competat olfactus & auditus.

Oculi plerisque bini, absque palpebris, simplices parvi, aut compositi magni hemispharici vel polyedri, rarius mobiles aut stipitati; his vident colores.

Antennæ binæ, articulatae, sensu tactus, ut videtur, instructæ, sunt setaceæ, filiformes, moniliformes, clavatae, capitatae, fissiles, pectinatae, barbatae, corpore breviores, longiores, mediocres.

Palpi articulati, ori affixi, plerisque quatuor s. sex: articulis 2, 4, 3.

Os paucioribus nullum, plurimis sub capite, quibusdam in pectore; rostro, labio, maxillis transversis ad latera mobilibus, dentibus, lingua, palato.

Stemmata verticis puncta tria elevata nitida.

TRUNCUS, inter caput & abdomen, pedatus, thorace supra dorso, posterius scutello, subtus pectore ærnoque.

ABDOMEN ventriculo, intestinis, visceribusque foetum, incisuris 5, annulatum, spiraculis porolis lateribus pertusum, supra tergo, subtus ventre, posterius ano terminatum.

ARTUS sunt cauda, pedes, plurimisque alæ.

Cauda abdomen terminans, est vel solitaria, vel bicornis; simplex vel armata forcipe, furca, seta vel aculeo simplici vel composito, lævi vel serrato.

*Pedes trunci femoribus, tibiis, plantæ tarsis, digitorum unguibus; manus (chela) nonnullis, simplex pollice mobili; posteriores pro usu saltatorii, cursorii, natorii.*

*Alæ duæ vel quatuor sunt vel planæ, plicatiles, erectæ, patentes, incumbentes, deflexæ vel reversæ, dentatæ, cundatæ, reticulatæ, maculis, fasciis, strigis, lineis, punctis pictæ, vel stigmatibus notatæ, ocellis ornata; idque vel in primoribus vel in secundariis, tam in pagina superiore, quam inferiore.*

*Elytra (alæ superiores) crustacea bina, sæpius mobilia, truncata, fistulosa, serrata, scabra, striata, porcata, sulcata, punctata, tegentia alas inferiores. Hemelytra media quasi alas inter & elytra.*

*Halteres sub alis dipterorum ex petiolo capitati.*

**SEXUS** *Mas & Femina* generant perfectæ.

*Neutra nonnullis (formicæ, vespæ, api) societate fœderatis.*

**METAMORPHOSIS** plurimis triplex, mutanda structura, exutis ovi tunicis, una post alteram.

**OVUM** sub minima mole vesicaria excluditur.

**LARVA** (Eruca) succosa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, interdum apus, sæpeque polypus, vorax alimento proprio.

**PUPA** (Nympha, Chrysalis) sicciior, coarctata, durior, nuda vel folliculata, sæpe sine ore, vel pedata, 1. 2. 3. vel apus 4. 5.

1. *completa*, omnibus partibus agilis (aranea, acarus, oniscus.)

2. *semicompleta* folis alarum rudimentis (gryllus, cicada, cimex, libellula, ephemera.)

3. *incompleta*, alis pedibusque immobilis (apis, formica, tipula.)

4. *obtectæ*, thorace abdomineque distincto corticata (lepidoptera, eaque vel nuda, vel folliculata.)

5. *coarctata* intra globum (musca, œstrus.)

**IMAGO** revelata, declarata, perfecta generans, agilis, antennis instructa.

triplex itaque structura & cognitio ejusdem animalis.

**HÆC** *muta*, nisi alio proprio instrumento, tympano thoracico, alifve sonora; *sorda*, ( pleraque, ) stridorem ætheris licet percipiant; *plura* ubique plantarum speciebus, sed ob regionem sibi magis patentem in orbe pauciora, *tropica*, *arctica* & *antarctica*; singula demum *minima*, annua, exceptis aquaricis aliisque paucioribus, sed u. iverfa maximæ molis animantia, effectuque pariter maxima, & magis occulto magisque disperso, ideoque minus coercendo; totidem enim sunt naturæ annui ministri, propriis negotiis peragendis præfixi, quot muniis sufficiant, proportionem inter plantas servando, erronea, superflua, mortua, putrida, consumendo, aliis demum, imprimis avibus in alimentum cedendo.

**HABITANT** insecta in iis tantum plantis, e quibus ( non in quibus, ) victitant, unde sæpius nomina *trivialia* optima, ut ars cum *politia naturæ* combinatur; aliis alia muneribus præfixa præparant, purgant, destruunt necessaria.

**ENTOMOLOGI** præstantiores delineando figuras, designando attributa & characteres, disponendo ordines inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandi*, *Jonston*, *Rai*.

Metamorphosi *Goedart*, *Meriana*, *Albin*, *Frisch*, *Roefel*, *Wilkes*, *Kleemann*, *Ammiral*, *Harris*.

Philosophi *Swammerdam*, *Lesser*, *Reaumur*, *de Geer*, *Bonnet*, *Lyonnet*, *Goeze*, *Koch*.

Iconographi *Clerck*, \*) *Sepp*, *Roefel*, *Hæffnagel*, *Bradley*, *Robert*, *Petiver*, *Schæffer*, *Voet*, *Fuesli*, *Hollar*, *Amiral*, *Drury*, *Cramer*, *Esper*, *Knoch*, *Jablonsky*, *Bergstræffer*, *Herbst*, *Capieux*.

Descriptores *Rai*, *Fauna suecica* ( edit. 2. *Holm*. 1761. 8. ) *Museum* *Reginæ Holm*. 1764. *Kålreuter*, *Pallas*, *Thunberg*, *Schranck*, *a Laicharting*, *Schreber*, *J. R. Forster*, *Pollich*, *Lang*, *Harrer*, *Bjercander*, *Knoch*, *Schaller*, *Scriba*, *Schroeter*, *Mayer*.

Monographi *Lister*, *Schæffer*, *Clerck*, *v. Gleichen*, *O. Fr. Müller*, *Herbst*, *Kob*, *Loefche*, *Panzer*.

Systematici *Systema naturæ*, *Poda*, *Sulzer*, *Geoffroi*, *Scopoli*, *Gronovius*, *T. Bergmann*, *de Geer*, *Schluga*, *Brünnich*, *Schiefermüller*, *Fabricius*.

---

\*) Clerckii icones insectorum pulcherrimum opus, quod *Academia Regia scientiarum Holmænsis* ab interitu vindicavit.



ORDINES insectorum ab alis desumpti.

Alæ 4.	{ Superiores	{ crustaceæ futura recta -	<i>Coleoptera</i>	1.
		{ femicrustaceæ incumbentes	<i>Hemiptera</i>	2.
	{ Omnes	{ imbricatæ squamis -	<i>Lepidoptera</i>	3.
		{ membranaceæ		
		ano { inermi	<i>Neuroptera</i>	4.
		{ aculeato	<i>Hymenoptera</i>	5.
Alæ 2, halteres loco posteriorum	-	-	<i>Diptera</i>	6.
Alæ 0 s. absque alis & elytris	-	-	<i>Aptera</i>	7.

---

Quæso ne hæc legentes,  
 quoniam in his spernunt multa,  
 etiam relata fastidio damnent,  
 cum in contemplatione naturæ  
 nil possit videri supervacaneum.

PLIN.

---

## CHARACTERES INSECTORUM.

## I. COLEOPTERA.

\* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*a) *clava lamellata.*

189. SCARABÆUS. *Tibiæ anteriores dentatæ.*  
 190. LUCANUS. *Penicilli duo sub labio palpigeri.*

b) *clava perfoliata.*

191. DERMESTES. *Caput inflexum sub thorace vix marginatæ.*  
       MELYRIS. *Labium clavatum, emarginatum.*  
 195. BYRRHUS. *Labium porrectum, bifidum.*  
 196. SILPHA. *Thorax & elytra marginatæ.*  
       TRITOMA. *Palpi anteriores securiformes.*  
       HYDROPHILUS. *Maxilla bifida.*

c) *clava solida.*

193. HISTER. *Caput retractile intra thoracem.*  
       PAUSUS. *Antennæ biarticulatæ: clava uncinata.*  
       BOSTRICHUS. *Caput inflexum sub thorace vix marginatæ.*  
       ANTHRENUS. *Maxilla bifida.*  
       NITIDULA. *Thorax & elytra marginatæ.*  
 198. COCCINELLA. *Palpi anteriores securiformes, posteriores*  
                     *filiformes.*  
 202. CURCULIO. *Rostrum elongatum corneum.*

\*\* *Antennis moniliformibus.*

- BRENTUS. *Rostrum elongatum, corneum, rectum.*  
 203. ATTELABUS. *Rostrum elongatum, incurvum.*  
       ERODIUS. *Labium corneum, emarginatum.*  
 217. STAPHYLINUS. *Elytra dimidiata, alas tegentia. Vesiculæ 2*  
                     *supra caudam exferendæ.*  
       SCAURUS. *Labium truncatum, integrum.*  
       ZYGIA. *Labium elongatum, membranaceum.*  
 215. MFLOE. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.*  
 214. TENEBRIO. *Thorax marginatus. Caput exsertum. Corpus*  
                     *oblongum.*  
 197. CASSIDA. *Corpus ovatum. Elytra marginatæ. Caput*  
                     *tectum clypeo.*  
       OPATRUM. *Thorax & elytra marginatæ.*

216. MORDELLA. *Laminae ad basin abdominis. Caput inflexum.*  
 199. CHRYSOMELA. *Corpus ovatum, immarginatum.*  
 HORIA. *Palpi inæquales. Maxilla bifida. Labium rotundatum.*

\*\*\* *Antennis filiformibus.*

- APALUS. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.*  
 MANTICORA. *Maxillæ exsertæ, dentatæ. Oculi prominuli.*  
 PIMELIA. *Thorax marginatus. Caput exsertum. Corpus oblongum.*  
 194. GYRINUS. *Antennæ rigidulæ. Oculi 4.*  
 CUCUJUS. *Labium breve, bifidum : laciniis distantibus.*  
 CRYPTOCEPHALUS. *Corpus ovatum, immarginatum.*  
 201. BRUCHUS. *Antennæ extrorsum crassiores.*  
 192. PTINUS. *Thorax caput recipiens. Antennæ articulis ultimis longioribus.*  
 200. HISPA. *Antennæ porrectæ, approximatae, filiformes.*  
 211. BUPRESTIS. *Caput dimidium intra thoracem rectum.*  
 206. NECYDALIS. *Elytra dimidiata : alis nudis.*  
 207. LAMPYRIS. *Elytra flexilia : Thoracis clypeus caput obumbrans recipiensque.*  
 208. CANTHARIS. *Elytra flexilia. Abdomen lateribus plicato-papillosum.*  
 NOTOXUS. *Labium bifidum : laciniis conniventibus obtusis.*  
 209. ELATER. *Pectoris mucro e poro abdominis resiliens.*  
 CALOPUS. *Thorax ad latera mucronato-callosus.*  
 ALURNUS. *Maxilla fornicata.*  
 213. CARABUS. *Thorax obcordatus, posterius truncatus.*  
 LYTTA. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.*

\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

- SERROPALPUS. *Palpi anteriores profunde ferrati.*  
 204. CERAMBYX. *Thorax ad latera mucronato-callosus.*  
 205. LEPTURA. *Elytra apice attenuata. Thorax teretiusculus.*  
 RHINOMACER. *Antennæ rostro insidentes.*  
 ZONITIS. *Labium emarginatum.*  
 210. CICINDELA. *Maxilla exsertæ dentatæ. Oculi prominuli.*

Genera naturalia auctorum, metamorphosis demonstranda, vitam scientiæ largiuntur.

Genera falsa titulum, ex ludicro principio deducta totidem foetidissimis ulceribus artem pulcherrimam commaculant.

412. DYTICUS. *Pedes posteriores ciliati, natatorii.*  
 218. FORFICULA. *Elytra dimidiata: alis tectis. Cauda forcipata.*

II. HEMIPTERA.

219. BLATTA. *Os maxillosum. Alæ coriaceæ, planæ. Pedes cursorii.*  
 PNEUMORA. *Os maxillosum. Alæ membranaceæ, deflexæ. Pedes cursorii. Corpus cavum inflatum, diaphanum.*  
 220. MANTIS. *Os maxillosum. Pedes anteriores ferrati: ungue unico.*  
 221. GRYLLUS. *Os maxillosum. Pedes posteriores saltatorii.*  
 222. FULGORA. *Rostrum inflexum. Frons producta, inermis. Antennæ capitatæ.*  
 223. CICADA. *Rostrum inflexum. Pedes posteriores saltatorii.*  
 224. NOTONECTA. *Rostrum inflexum. Pedes posteriores natatorii (ciliati.)*  
 225. NEPA. *Rostrum inflexum. Pedes anteriores cheliferi.*  
 226. CIMEX. *Rostrum inflexum. Pedes cursorii. Antennæ thorace longiores.*  
 MACROCEPHALUS. *Rostrum inflexum. Antennæ brevissimæ.*  
 227. APHIS. *Rostrum inflexum. Abdomen bicornæ.*  
 228. CHERMES. *Rostrum pectorale. Pedes posteriores saltatorii.*  
 229. COCCUS. *Rostrum pectorale. Abdomen (maribus) posterius setosum.*  
 230. THRIPS. *Rostrum obsoletum. Alæ incumbentes abdomini reflexili.*

III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO. *Antennæ extrorsum crassiores. Alæ erectæ.*  
 232. SPHINX. *Antennæ medio crassiores.*  
 233. PHALÆNA. *Antennæ introrsum crassiores.*

IV. NEUROPTERA.

234. LIBELLULA. *Cauda forcipata. Os multi-maxillosum. Alæ extensæ.*  
 235. EPHEMERA. *Cauda seris 2-3. Os edentulum. Alæ erectæ.*  
 236. MYRMELEON. *Cauda forcipata. Os bidentatum. Alæ deflexæ.*  
 237. PHRYGANEÆ. *Cauda simplex. Os edentulum. Alæ deflexæ.*  
 238. HEMEROBIUS. *Cauda simplex. Os bidentatum. Alæ deflexæ.*  
 239. PANORPÆ. *Cauda chelata. Os rostratum. Alæ incumbentes.*  
 240. RAPHIDIA. *Cauda filo 1. Os bidentatum. Alæ deflexæ.*

## V. HYMENOPTERA.

241. CYNIPS. *Aculeus spiralis!*  
 242. TENTREDO. *Aculeus ferratus! bivalvis.*  
 243. SIREX. *Aculeus ferratus sub abdominis spina terminali.*  
 244. ICHNEUMON. *Aculeus exsertus! triplex.*  
 245. SPHEX. *Aculeus punctorius. Alæ planæ. Lingua inflexa trifida.*  
 SCOLIA. *Lingua inflexa, trifida. Labium apice membranaceum.*  
 THYNNUS. *Lingua brevissima, involuta. Labium trifidum.*  
 LEUCOPSIS. *Labium maxilla longius emarginatum. Antennæ clavatæ.*  
 TIPHIA. *Labium breve, corneum, tridentatum.*  
 CHALCIS. *Antennæ breves, cylindricæ, fusiformes.*  
 246. CHRYSIS. *Aculeus punctorius. Abdomen subtus fornicatum.*  
 247. VESPA. *Aculeus punctorius. Alæ superiores plicatæ.*  
 248. APIS. *Aculeus punctorius. Lingua inflexa.*  
 249. FORMICA. *Aculeus obsoletus. Alæ neutris nullæ.*  
 250. MUTILLA. *Aculeus punctorius. Alæ neutris nullæ.*

## VI. DIPTERA.

\* *proboscide & haustello.*

- DIOPSIS. *Caput bicornè : oculis terminalibus.*  
 252. TIPULA. *Hauſtellum sine vagina. Palpi 2. porrecti, filiformes.*  
 253. MUSCA. *Hauſtellum sine vagina, setis instructum.*  
 254. TABANUS. *Hauſtellum vagina univalvi setisque instructum.*  
 256. EMPIS. *Proboscis inflexa.*  
 257. CONOPS. *Proboscis porrecta, geniculata.*

\*\* *haustello sine proboscide.*

251. OESTRUS. *Hauſtellum retractum intra labia connata, poro pertusa.*  
 258. ASILUS. *Hauſtellum rectum, bivalve, basi gibbum.*  
 STOMOXYS. *Hauſtellum vagina univalvi convoluta, basi geniculata.*  
 255. CULEX. *Vagina exserta, univalvis, flexilis : setis 5.*  
 259. BOMBYLIUS. *Hauſtellum longissimum, rectum, setaceum, bivalve.*  
 260. HIPPOBOSCA. *Hauſtellum breve, cylindricum, rectum, bivalve.*

VII. APTERA.

\* *Pedibus sex, capite a thorace discreto.*

261. LEPISMA. *Cauda fetis exsertis.*  
 262. PODURA. *Cauda bifurca, inflexa, saltatrix.*  
 263. TERMES. *Os maxillis duabus. Labium corneum, quadrifidum.*  
 264. PEDICULUS. *Os aculeo exserendo.*  
 265. PULEX. *Os rostro inflexo cum aculeo. Pedes saltatorii.*

\*\* *Pedibus 8-14, capite thoraceque unitis.*

266. ACARUS. *Oculi 2. Pedes 8. Palpi compressi.*  
 HYDRACHNA. *Oculi 2-8. Pedes 8 in anteriore corporis parte. Papillæ textoriæ.*  
 268. ARANEA. *Oculi 8. Pedes 8. Papillæ textoriæ. Palpi clavati.*  
 267. PHALANGIUM. *Oculi 4. Pedes 8. Palpi chelati.*  
 269. SCORPIO. *Oculi 8. Pedes 8. Palpi chelati.*  
 270. CANCER. *Oculi 2. Pedes 10: primo chelato.*  
 271. MONOCULUS. *Oculi 2. Pedes 12: decem chelatis.*  
 272. ONISCUS. *Oculi 2. Pedes 14.*

\*\*\* *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

273. SCOLOPENDRA. *Corpus lineare.*  
 274. JULUS. *Corpus subcylindricum.*

---

*In nova fert animus mutatas dicere formas  
 corpora.*

---



## I. COLEOPTERA.

*Elytra alas tegentia.*189. SCARABÆUS. *Antennæ clavatæ : clava lamellata.**Palpi 4.**Mandibula cornea subedentula.**Tibiæ anteriores sæpius dentatæ.*\* *palpis filiformibus.*† *mandibula arcuata.*a) *plane edentula*, Scarabæi Fabricii.x) *thorace cornuto.*a) *scutellati.*

Hercules I. Sc. thoracis cornu incurvo maximo : subtus barbato unidentato, capitis recurvato : supra multidentato. *Mus. Lud. Ulr. 3. Gronov. zooph. 412. Jablonsk. Kæf. I. t. 1. f. 1. 2. Voet. coleopt. t. 12. f. 98. Drury inf. I. t. 30. f. 1. 2. Aubent. misc. t. 41. f. 2. Fabric. spec. inf. I. p. 4. n. 1. mant. inf. I. p. 3. n. 1.*

*Marcgr. bras. 247. f. 3. Taurus volans f. Eruma.**Jonst. inf. t. 16. f. 1.**Olear. mus. t. 16. f. 1.**Petiv. gazoph. t. 70. f. 1. Rhinoceros americanus cinereus, rostro nigro nitente.**Edw. glean. t. 334.**Grew. mus. 162.**Roef. inf. 11. Koef. I. t. A. f. 1. inf. IV. p. 45. t. 5. f. 3.**Degeer inf. 4. p. 304. n. 2. t. 18. f. 9. Scarabæus scutellatus niger, &c.**Habitat in America, varians elytris piceis et glaucis nigropunctatis.**Femina mutica.*

Alcides. 91. Sc. thoracis cornu incurvo subtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. *Fabr. spec. inf. I. p. 4. n. 2. mant. inf. I. p. 3. n. 2.*

*Habitat in India, Hercule duplo minor, an ejus varietas?*



- Gideon. 2. Sc. thoracis cornu incurvo maximo subtus lævi apice bifido, capitis recurvato supra unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 4. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 3. n. 3. *Gron. zooph.* 413. *Voet. coleopt. t.* 12. f. 100. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 1. f. 3. *Edw. av. t.* 40. *Roef. inf.* 2. *Kæf.* 1. t. A. f. 5. *Swammerdam bibl. nat. t.* 30. f. 2. *Aubent. misc. t.* 40. f. 3. *Habitat in America australi & India, an vere a præcedentibus diversus?*
- Centaurus. 92. Sc. thoracis cornu incurvo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. *Fabric. sp. inf.* 1. p. 5. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 3. n. 4. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 2. f. 1. *Drury inf.* 1. t. 36. f. 1. Scarabæus Gideon. *Habitat in India & Africa.*
- Oromedon. 93. Sc. thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 5. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 5. *Drury inf.* 1. t. 36. f. 5. *Aubent. misc.* 1. t. 40. f. 4. *Voet coleopt. t.* 13. f. 102. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 2. f. 2. *Habitat in America australi & India.*
- Ægeon. 94. Sc. rufus, thoracis cornu brevi incurvo subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 5. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 6. *Drury inf.* 2. t. 30. f. 5. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 1. f. 4. *Habitat in America australi & India.*
- dispar. 95. Sc. cornu (in mare) thoracis subulato protenso, capitis subulato subrecurvo, scutello cordato. *Fabric. sp. inf.* 1. p. 5. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 7. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 2. f. 3. 4. *Pall. it.* 1. p. 461. Scarabæus polyceros. *Pall. it.* 3. p. 707. *ic. inf. Russ. indig.* 1. t. A. f. 8. A. B. *Habitat in regionibus Russici imperii magis australibus, ater, stercorarii magnitudine. Feminae nec thorax, nec caput cornutum, sed utrumque antrorsum bidentatum.*
- Chorinæus. 96. Sc. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 6. n. 8. *mant.* 1. p. 4. n. 8. *Voet coleopt. t.* 13. f. 104. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 2. f. 5. *Habitat in Brasilia, pani affinis.*

- dichotomus. 89. *Sc. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis.* *Mant.* 1. 529. *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 9. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 2. f. 6.  
*Aubent. misc. t.* 40. f. 5.  
*Voet coleopt. t.* 14. f. 107.  
*Sulz. hist. inf. t.* 1. f. 1.  
*Habitat in America australi & India.*
- claviger. 90. *Sc. rufus, thoracis cornu elevato, capitis subulato recurvo.* *Mant.* 1. 529. *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 10.  
*Aubent. misc. t.* 40. f. 1.  
*Drury inf.* 3. t. 48. f. 3.  
*Voet coleoptr. t.* 14. f. 108.  
*Habitat in America australi & India.*
- hastatus. 97. *Sc. thoracis cornu brevi fornicato hastato subtus hirtio, capitis recurvo.* *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 11.  
*Habitat in America meridionali.*
- Enema. 98. *Sc. thoracis cornu incurvo simplici basi crassissimo, capitis recurvo bifido.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 6. n. 12.  
*Habitat in India, pani affinis.*
- Pan. 99. *Sc. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis recurvo unidentato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 6. n. 12. *mant.* 1. p. 4. n. 13.  
*Habitat in America australi & India.*
- Jafon. 100. *Sc. thoracis cornu crassissimo apice emarginato, capitis unidentato trifido.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 15. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 3. f. 3.  
*Swammerd. bibl. nat. t.* 30. f. 5.  
*Voet coleoptr. t.* 13. f. 103.  
*Aubent. misc. t.* 15. f. 4.  
*Habitat in Sina, Chorinæo affinis.*
- validus. 101. *Sc. thorace antierius retuso: cornu conico brevissimo, capite bituberculato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 16.  
*Habitat in Brasilia, rhinocerotis magnitudine.*
- truncatus. 102. *Sc. thorace retuso, cornu brevi truncato, capite mutico.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 17.  
*Habitat in nova Seelandia, nascicornis magnitudine,*

- Eurytus. 103.** Sc. thorace antèrius retuso : cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 18.  
*Habitat in America, niger.*
- Actæon. 3.** Sc. glaber, thorace bicorni, capitis cornu unidentato apice bifido, elytris lævibus. *Mus. Lud. Ulr.* 4. \*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 18. *mant. inf.* p. 5. n. 19.  
*Jablonsk. Kæf.* 1. t. 3. f. 4.  
*Marcgr. bras.* 246. *Enema.*  
*Roes. inf.* 2. *Scar.* 1. t. A. f. 2.  
*Swammerd. bibl. nat.* t. A. f. 2.  
*Petiv. gazoph.* t. 15. f. 12.  
*Seb. mus.* 4. t. 90. f. 3. 4.  
                                     91. f. 3.  
*Aubent. misc.* t. 5. f. *inf.*  
*Voet coleopt.* t. 16. f. III. 112.  
*Merian. sur.* t. 72.  
*Huffn. pict.* 1. t. 1.  
*Habitat in America, omnium hætenus cognitorum, in-*  
*sectorum, cancris monoculisque exceptis, maximum.*  
*Thoracis cornua antrorsum versa, conica.*
- Simpson. 4.** Sc. thorace bicorni, capitis cornu apice bifido clypeo denticulato. *Mus. Lud. Ulr.* 5. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 20.  
*Habitat in America australi & India, actæoni affinis ;*  
*at quadruplo minor, supra lævis, piceus.*  
*Caput antèrius bidentatum ; thoracis cornua lanceolata,*  
*porrecta, non capite, sed cornu capitis longiora.*
- Elephas. 104.** Sc. villosus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 20. *mant. inf.* p. 5. n. 21.  
*Olear. mus.* t. 16. f. 2.  
*Habitat in Guinea, actæni affinis, at villosus.*
- Boas. 105.** Sc. thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 22.  
*Habitat ad Sierra Leona.*
- Coryphæus. 106.** Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 23.  
*Habitat ad Caput bonæ Spei, vernalis magnitudine & statura.*

bicornis. 107. Sc. thorace bicorni, capitis cornu recurvo unidentato, elytris rufis. *Lesk. Ans. der Naturg.* 1. t. 9. f. 1. *Jablonsk. Käf.* 1. t. 4. f. 1. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 5. n. 24. *Aubent. misc. t.* 15. f. 2.

*Habitat in America meridionali, nasicornis magnitudine.*

Tityus. 5. Sc. thoracis cornu intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Anoen. ac.* 6. p. 39. n. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 26. *Jablonsk. Käf.* 1. t. 4. f. 2. Scarabæus scutellatus glaucus, thorace tricorni: lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Gron. zooph. t.* 14. f. 8. Scarabæus thorace tricorni lævi: intermedio maximo incurvo subtus barbato, capitis cornu maximo recurvo.

*Aubent. misc. t.* 1. t. 14. f. 8.

*Voet Käf. t.* 12. f. 99.

*Degeer inf.* 4. t. 18. f. 10.

*Habitat in America, herculi similis, at parvus.*

*Elytra nunc nigra glauco-maculata, nunc glauca, nigro-maculata.*

Atlas. 6. Sc. thorace tricorni: anteriore brevissimo, capitis cornu adscendente. *Mus. Lud. Ulr.* 6.

*Fabr. spec. inf.* 1. p. 9. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 27.

*Jablonsk. Käf.* 1. t. 4. f. 5.

*Marcgr. bras.* 247. f. 1.

*Edw. av. t.* 105. f. 1.

*Olear. mus. t.* 16. f. 3.

*Merian. surin. in tit.* F. G.

*Swammerd. bibl. t.* 30. f. 3.

*Voet coleoptr. t.* 15. f. 109. 110.

*Sulz-inf. t.* 1. f. 1.

*Habitat in America magis australi.*

Geryon. 108. Sc. thorace excavato tricorni, lateralibus compressis unidentatis, capitis recurvo simplici. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 9.

n. 25. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 28. *Jablonsk. Käf.* 1. t. 4. f. 5.

*Drury inf.* 2. t. 30. f. 6.

*Habitat in America australi & India.*

Scarabæorum larvæ hexapodes annulatæ, pilosæ, abdominis apice vesiculoso, capite corneo istruatæ, vivunt tranquillæ, sub terra, plurimæ fimo delectantur & pascuntur, cetoniarum ligno putrescente, melolontharum radicibus plantarum; pupæ intra glebam quiescentes.

- Aloëus. 7. Sc. thorace tricorni : intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris unistriatis. *Mus. Lud. Ulr.* 7. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 9. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 29. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 4. f. 3.  
*Degeer inf.* 4. p. 302. n. 1. Scarabæus Scutellatus niger, thorace tricorni : intermedio longiori truncato.  
*Kæf. inf.* 2. *Scarab.* 1. t. A. f. 6.  
*Petiv. gazoph.* t. 24. f. 10.  
*Aubert. misc.* t. 5. f. 1.  
*Voet Kæf.* t. 18. f. 122. (mas) & t. 19. f. 122. (femina.)  
*Habitat in America, nasicorni simillimus, at triplo major, tibiis anterioribus quinquedentatis.*
- Antæus. 109. Sc. thorace tricorni : intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 9. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 30. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 4. f. 4.  
*Drury inf.* 1. t. 34. f. 3.  
*Habitat in insulis Americæ oppositis.*  
*Femina mutica.*
- Syphax. 110. Sc. thorace tricorni : intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 10. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 31.  
*Habitat in America, antæo perquam affinis.*
- Maimon. 111. Sc. thorace tricorni : cornubus æqualibus brevissimis, elytris lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 10. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 32.  
*Habitat in America.*
- Typhæus. 9. Sc. thorace tricorni : intermedio minore ; lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Mus. Lud. Ulr.* 8. \* *Gronov. zooph.* 123.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 10. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 33.  
*Bergstr. Nomencl.* 1. p. 26. n. 6. t. 4. f. 6. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 6. f. 1. 2.  
*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 72. t. 1. f. 3.  
*Raj. inf.* 103. Scarabæus ovinus 2.  
*Frisch inf.* 4. t. 8. Scarabæus thorace cornuto.  
*Mouff. inf.* 152. f. 2. Taurocerus.  
*Petiv. gaz.* t. 23. f. 3.  
*Schæff. icon.* t. 5. f. 1. ♀. t. 26. f. 4. ♂.  
*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 5.  
*Voet coleopt.* t. 19. f. 124. 125.



*Habitat in Europa, sub stercore bovino sub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans, stercorearii magnitudine, ater.*

*Caput depresso, ad latera villosum, angustum; antennarum capitulum subgriseum; thorax glaber, cornubus nunc capituli æqualibus, nunc duplo longioribus, in semina exoletis; elytra striata; tibiæ admodum pilosæ.*

**Titanus. II2.** Sc. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido; lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico. *Fabr. sp. inf. I. p. 10. n. 31. mant. inf. 16. n. 34. Sloane jam. 2. p. 205. t. 237. f. 4. 5. Scarabæus major. niger tricornis.*

*Drury inf. I. t. 36. f. 3. 4. Scarabæus Simson.*

*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*

**Enobarbus. II3.** Sc. thorace tricorni; medio longiori emarginato; lateralibus obtulis, capite bituberculato. *Fabr. sp. inf. I. p. 10. n. 32. mant. inf. I. p. 6. n. 35.*

*Habitat in America, titani statura, sed minor.*

**quadrifidus. II4.** Sc. thorace retuso: prominentia quadridentata, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf. I. p. 11. n. 36. mant. inf. I. p. 6. n. 38.*

*Habitat in Cayenna, magnus.*

**quadridentatus. II5.** Sc. thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *Fabr. sp. inf. I. p. 11. n. 37. mant. inf. I. p. 6. n. 39.*

*Habitat in India, parvus, gibbus.*

**obliquicornis. II6.** Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. *Fabr. spec. inf. I. p. 12. n. 38. mant. inf. I. p. 6. n. 40. Laichart. inf. t. I. f. 11. Jablonsk. Käf. I. t. 8. f. 6. 7.*

*Habitat in Anglia & Germania, niger.*

*Femina plane mutica; elytra striata.*

**cylindricus. II.** Sc. thorace anterieus truncato quinquedentato, capite anterieus cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn. suec. 380.*

*Laichart inf. tyr. p. 4. n. 4. Lucanus cylindricus.*

*Scopol. introd. hist. nat. 5. 75. Lucanus tenebrioides.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 2.*

*Faet coleopt. t. 20. f. 131.*

*Habitat in Europæ magis borealis pruno ceraso,*

- Candidæ. 409. Sc. thorace excavato antroersum cornuto tibiis anterioribus tridentatis. *Petagn. spec. inf. Calabr. p. 3. n. 9. f. VI. a. 6.*  
*Habitat in Calabriae ulterioris promontorio Lacinio.*  
*β) exscutellati.*
- violaceus. 117. Sc. totus violaceus, maxillis prominentibus, frontē declivi, thorace sexspinosa. *Lepech. it. 2. p. 208. t. 10. f. 13.*  
*Habitat in Sibiria, sub lapidibus, parvus.*  
*Elytrā punctis excavatis insignita.*
- nemestri- 118. Sc. thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis  
 nus. erecto subulato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 96. mant. inf. 1. p. 11. n. 106.*  
*Degeer inf. 7. p. 637. t. 47. f. 16. Scarabæus tricornutus.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, jaccho affinis, subtus hirtus.*
- Œdipus. 119. Sc. thoracis cornu plano subtus dentato, capitis truncato tridentato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 98. mant. inf. 1. p. 11. n. 108.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- splendi- 120. Sc. thoracis ænei cornubus duobus compressis nigris,  
 dulus. capitis erecto apice compresso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 23. n. 100. mant. inf. 1. p. 12. n. 110.*  
*Habitat in America australi, carnificis magnitudinē.*
- festivus. 52. Sc. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-æneis *Linn. sp. inf. 1. p. 23. n. 101. mant. inf. 1. p. 12. n. 111.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 552. n. 52. Gron. zooph. 452. Scarabæus exscutellatus muticus, thorace nigro-maculato, elytris rubro-æneis, sterno porrecto.*  
*Roesf. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 8. (mas).*  
*Voet coleoptr. t. 23. f. 5. 7.*  
*Degeer inf. 4. t. 8. f. 15.*  
*Drury inf. 3. t. 48. f. 5. (fem.)*  
*Habitat in America, melolonthæ magnitudinē, at brevior, niger.*
- Pactolus. 121. Sc. thorace bidente, capitis cornu elongato recurvo medio bidentato. *Fabr. mant. 1. p. 12. n. 112.*  
*Habitat in Brasilia, mediæ magnitudinis, viridi-æneus*



- Pithecius** 122. Sc. thorace bicorni : cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 23. n. 102. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 113.  
*Habitat in America australi & India.*
- feniculus.** 123. Sc. thorace antierius, clypeo posterius bicorni. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 23. n. 103. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 114.  
β) Scarabæus brevipes. *Herbst apud Fuesl. Arch. Inf.* 4. p. 10. n. 35. t. 19. f. 16.  
*Habitat in Coromandel, bonasi statura.*
- Carla.** 124. Sc. thorace antierius bidentato, capitis clypeo lineis duabus elevatis transversis carinatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 12. n. 115.  
*Habitat in Coromandel, nuchicornis magnitudine & statura, an femina alius speciei?*
- Moleffus.** 8. Sc. thorace retuso bidentato utrinque impresso, clypeo unicorni lunato integro, elytris lævibus. *Mus. Lud. Ulr.* 11. \* *Amæn. ac.* 6. p. 391. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 26. n. 118. *mant. inf.* 1. p. 14. n. 134.  
*Drury inf.* 1. t. 32. f. 2.  
*Schræt. Abh.* 1. t. 3. f. 3.  
*Degeer inf.* 4. t. 18. f. 11.  
*Habitat in Sina, ibi officinalis, cornu dentibusque nunc longioribus nunc brevioribus, femina nullis.*  
*Femora ovata.*
- Rosalius.** 125. Sc. thorace antierius bicorni, posterius elevato tricorni, capitis cornu compresso ferrato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 24. n. 104. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 116.  
*Habitat in America meridionali.*
- Ammon.** 126. Sc. thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris striatis. *Linn. sp. inf.* 1. p. 24. n. 105. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 117.  
*Fabr. syst. entom.* p. 21. n. 83. Scarabæus Silenus.  
*Habitat in America.*
- Midas.** 127. Sc. thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 24. n. 106. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 118.  
*Habitat in America.*
- Alama-dryas.** 128. Sc. thorace tricorni : intermedio plano acuto tridentato, clypeo reflexo bicorni. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 24. n. 107. *mant. inf.* 1. p. 12. n. 119.  
*Voet coleoptr.* t. 27. f. 38?  
*Habitat ad Caput bonæ spei, niger.*

- lunaris. 10. Sc. thorace bicorni; intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fr. succ.* 379.\*  
*Scop. ent. carn.* 22. *Gron. zooph.* 453.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 24. n. 108. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 120.  
*Fn. succ.* 1. p. 341. Scarabæus thorace submutico, capite lunato, clypeo emarginato.  
*Raj. inf.* 103. Scarabæus ovinus tertius.  
*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 88. n. 1. Copris capitis clypeo lunulato, &c.  
*Frisch inf.* 4. p. 25. t. 7.  
*Ræf. inf.* 2. scar. 1. t. B. f. 2.  
*Pet. gar.* t. 138. f. 4.  
*Schæff. ic.* t. 63. f. 2. 3. ♂. ♀.  
*Bergstr. nomencl.* t. 1. f. 9. & t. 4. f. 7.  
*Poda mus.* t. 1. f. 1.  
*Voet coleoptr.* t. 25. f. 24. 25. & t. 26. f. 26.  
*Habitat in Europæ stercoratis, aliquando minor, cornubus minoribus, feminae in thorace constanter nullis.*
- Rhadamif-129. Sc. thorace late foveolato; antè cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis; futura punctisque duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 109. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 121.  
*Habitat Tranquebariæ.*
- Lar. 130. Sc. thorace tridentato, capitis cornu erecto, clypeo bifido. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 13. n. 124.  
*Habitat in India parvus niger.*
- Faunus. 131. Sc. thorace quadricorni; intermediis brevissimis, capitis cornu recurvo serrato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 112. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 125.  
*Voet coleoptr.* t. 24. f. 15.  
*Drury inf.* 3. t. 48. f. 6.  
*Habitat in Cayenna.*  
*Feminae cornua minora: Lateralia acuta.*
- capucinus. 132. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 113. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 126.  
*Habitat in India, carolini magnitudine & statura.*
- Lemur. 133. Sc. thorace quadridentato cupreo, clypeo postè transverso carinato, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 495. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 127.

*Schaller aḡ. soc. Hal. nat. cur. 1. p. 237.* Scarabæus 10-punctatus.

*Habitat in Germaniæ inferioris stercore animali, niger, statura nuchicornis.*

Camelus. 134. Sc. thorace quadridentato, clypeo posterius subbicorni, corpore atro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 13. n. 128.*

*Habitat in Germania.*

*Femina non mutica.*

Daldorfii. 135. Sc. thorace sexdentato, clypeo rhombeo: centro prominulo, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 14. n. 129.*

*Habitat in India, vernalis magnitudine.*

Bison. 27. Sc. thorace antèrius mucronato, capite cornubus duobus lunaribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 115. mant. inf. 1. p. 14. n. 131.*

*Habitat in Hispania, & australi Gallia, ater, stercoraria minor.*

*Femina thoracis margine anteriore carinato elevato, mucroneque capitis parvo distincta.*

Sagittarius. 136. Sc. thorace antèrius mucronato, capitis cornu solitario erecto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 116. mant. inf. 1. p. 14. n. 132.*

*Habitat ad caput bonæ spei.*

Bucephalus. 137. Sc. thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 117. mant. inf. 1. p. 14. n. 133.*

*Habitat in America australi & India.*

Lancifer. 13. Sc. violaceus, thorace dentato, capitis cornu angulato, elytris fulcatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 119. mant. inf. 1. p. 14. n. 135.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 544. n. 13.* Scarabæus exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inæquali, elytris fulcatis.

*Voet coleoptr. 2. 23. f. 1. 2.* Scarabæus violaceus.

*Marcgr. bras. 247.* Taurus.

*Schroet. Abh. 1. 2. 3. f. 4.*

*Habitat in America australi, & India, mimæ minor.*

**Vitulus.** 138. Sc. thorace quadridentato, occipite cornubus duobus erectis brevibus, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 29. n. 127. *mant. inf.* 1. p. 15. n. 145.

*Habitat in Austria.*

*Femina mutica.*

**Gazella.** 407. Sc. thorace subinermiæneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 377. *Habitat . . . . statura et magnitudine Sc. Tauri.*

b) thorace inermi, capite cornuto.

a) scutellati.

**bilobus.** 12. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 6. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 14. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 3. f. 2.

*Edw. av. t.* 105. f. 2.

*Gron. zooph. p.* 414. t. 14. f. 1. 2.

*Aubent. misc. t.* 15. f. 3.

*Schæff. ic. t.* 63. f. 2. 3.

*Voet coleoptr. t.* 14. f. 106.

*Habitat in Europa australi, nasicorni similis, piceus.*

**Rhinoce-** 14. Sc. thorace retuso subtuberculato, capitis cornu sim-  
**ros.** plici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 12. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 42.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 544. n. 14. *Mus. Lud. Ulr.* 10. \*

Scarabæus scutellatus, thorace inermi, capite cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis.

*Petiv. gaz. t.* 44. f. 9. & t. 100. f. 3. *Rhinoceros Iaconensis, &c.*

*Roef. inf.* 2. *Scar.* 1. t. A. f. 7.

*Barrel. ic. t.* 163.

*Voet coleoptr. t.* 18. f. 117. 118.

*Habitat in Asia, piceus, subtus hirsutus, nasicorni similis, sed duplo major.*

*Femina thorax excavatus.*

**nasicorn-** 15. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo,  
**nis.** elytris lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 11. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 36. *Jablonsk. Kæf.* 1. t. 6. f. 4. 5.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 544. n. 15. *Fn. suec.* 378. *Scop. ent. carn.* 14. Scarabæus scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis.

*Mouff. inf.* 53.

*Imperat. nat.* 924. f. 1. 2. & 925. f. 3. 4.

*Hæffn. pict. t.* 13. f. antepenult.

*Olear. mus.* 27. t. 16. f. 4.

*Jacob. mus.* 1. S. 5.

*Jonst. inf. t.* 15. f. 2.

*Swammerd. dilbl. nat. t.* 27. f. 1. a.

*Frisch inf.* 3. t. 3. f. 4.

*Roes. inf.* 2. Scar. 1. t. 7. f. 8. 10.

*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 68. n. 1.

*Drury inf.* 1. t. 34. f. 7. 8.

*Voet coleoptr. t.* 18. f. 120. 121.

*Habitat in Europæ fimetis & vaporariis.*

Larva grisea, capite, pedibus spiraculisque rufis, a  
Swammerdamio pro cossio veterum habita. Feminae tho-  
rax rotundatus vix retusus.

Sylvanus. 139. Sc. thorace retuso : prominentia triplici, intermedia  
obsoleta, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 11.  
n. 34. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 37.  
*Habitat in Brasilia.*

Lazarus. 140. Sc. thorace bituberculato, capitis cornu brevi emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 11. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 25.  
*Habitat in Novæboraco.*

Barba- 141. Sc. thorace antèrius scabro, capitis cornu recurvo  
rossa. brevi. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 12. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 43.  
*Habitat in nova Hollandia.*

Satyrus. 142. Sc. thorace antèrius truncato, capitis cornu recurvo,  
capite longiore. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 12. n. 42. *mant.*  
*inf.* 1. p. 7. n. 44.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Feminae clypeus tuberculatus, thorax planus.*

jamai- 143. Sc. thorace antèrius retuso, capitis cornu recurvo,  
censis. elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 13. n. 43. *mant. inf.* 1.  
p. 7. n. 45.  
*Drury inf.* 1. t. 34. f. 1. 2.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Femina mutica.*

Silenus. 144. Sc. thorace antèrius excavato, capitis cornu recurvo,  
elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 13. n. 44. *mant.*  
*inf.* 1. p. 7. n. 46.

*Forster cent. inf. 1. 1. 1. Scarabæus excavatus.*

*Voet coleopt. t. 18. f. 119.*

*Barrel. plant. Hisp. t. 163.*

*Scopol. delic. insubr. 1. p. 50. t. 21. f. e.*

*Habitat in Galloprovincia.*

- Syrich- 145. Sc. thorace rotundato, capitis cornu recurvo. *Fabr.*  
tus. *sp. inf. 1. p. 13. n. 45. mant. inf. 1. p. 7. n. 47.*  
*Habitat in America.*
- Apelles. 146. Sc. capitis cornu brevissimo, elytris cinereis: punctis  
elevatis atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 13. n. 46. mant. inf.*  
*1. p. 7. n. 48.*  
*Habitat ad caput bonæ spei, parvus, pedibus flavis ni-*  
*gro-maculatis.*
- Aries. 147. Sc. thorace rotundato, capitis cornu brevissimo fu-  
bulato. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 495. mant. inf. 1. p.*  
*7. n. 49.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- corona- 148. Sc. capitis clypeo elevato posteriorius emarginato. *Fabr.*  
tus. *sp. inf. 1. p. 13. n. 47. mant. inf. 1. p. 7. n. 50.*  
*Habitat in Java, piccus.*
- Hylax. 149. Sc. capitis cornu emarginato, tibiis posterioribus bre-  
vissimis apice spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 13. n. 48.*  
*mant. inf. 1. p. 7. n. 51.*  
*Habitat in Africa.*
- didymus. 19. Sc. thorace fossula exarato, capite tricuspidi, elytris  
striatis. *Mus. Lud. Ulr. 14. Fabr. sp. inf. 1. p. 13.*  
*n. 49. mant. inf. 1. p. 7. n. 52.*  
*Gron. zooph. 420.*  
*Petiv. gaz. t. 27. f. 7.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 3.*  
*Voet coleopt. t. 19. f. 126.*  
*Habitat in America.*  
*Feminae thorax antrorsum mucrone parvo elevato ar-*  
*matus.*
- Polyphe- 150. Sc. capite tricorni: anteriore porrecto bifido. *Fabr.*  
mus. *sp. inf. 1. p. 14. n. 50. mant. inf. 1. p. 7. n. 53.*  
*Habitat in Africa, goliatho affinis, sed minor, elytris*  
*viridibus macularum albarum serie triplici ornatis.*



Golia- 151. Sc. clypeo bifurco. *Mant. p. 530. Fabr. sp. inf. I. p.*  
thus. 14. n. 51. *mant. inf. I. p. 7. n. 54.*

*Sulz. inf. t. I. f. 2.*

*Voet. coleopt. t. 22. f. 51.*

*Drury inf. I. t. 31. & 3. t. 40. f. 1.*

*Habitat in Africa, præsertim Guinea.*

Hircus. 152. Sc. thorace scabro, capite linea transversa carinata :  
clypeo bidentato. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 52. mant.*  
*inf. I. p. 7. n. 55.*

*Habitat Tranquebariæ.*

farctus. 153. Sc. brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-  
striatis apice nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 53.*  
*mant. inf. I. p. 7. n. 56.*

*Habitat in Pensilvania.*

retusus. 154. Sc. thorace retuso, capitis cornu brevi plano, femoribus  
posterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 54.*  
*mant. inf. I. p. 7. n. 57.*

*Habitat ad caput bonæ spei, nasci corni minor, niger,*  
*subtus ferrugineus hirtus, pedibus rufis.*

piceus. 155. Sc. piceus, thorace glabro, capite bicorni, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 15. n. 55. mant. inf. I. p. 7. n.*  
*58. Herbst apud Fuesl. Arch. Inf. 4. p. 4. n. 6. t. 19. f. 1.*

*Habitat in America australi & India, fossoris magnitudine.*

maurus. 30. Sc. capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine  
testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 16. n. 62. mant. inf. I. p.*  
*9. n. 68.*

*Habitat in Mauritania, oblongus, thorace convexo.*

*β) exscutellati.*

Jacchus. 156. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo  
simplici. *Fabr. sp. inf. I. p. 22. n. 97. mant. inf. I.*  
*p. 11. n. 107.*

*Habitat ad caput bonæ spei.*

*Feminae cornu capitis brevissimum truncatum.*

Sabæus. 157. Sc. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto  
simplici. *Fabr. sp. inf. I. p. 23. n. 99. mant. inf. I.*  
*p. 12. n. 109.*

*Habitat in Coromandel, Jacchi statura & magnitudine.*

*Feminae cornu capitis, & thoracis tubercula minora.*



- Belzebul. 158. Sc. thorace prominentia triplici, capite tricorni : intermedio majore. *Fabr. sp. inf. I. p. 25. n. 110. mant. inf. I. p. 13. n. 122.*  
*Habitat in America.*
- bifascia- 159. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu erecto,  
tus. elytris nigris : fasciis duabus rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 25. n. 111. mant. inf. I. p. 13. n. 123.*  
*Habitat in Coromandel, niger, nuchicornis magnitudine.*
- Bonafus. 160. Sc. thorace prominentia duplici, capite tricorni : lateralibus majoribus arcuatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 26. n. 114. mant. inf. I. p. 14. n. 130.*  
*Pallas ic. inf. Russ. p. 5. t. A. f. 5.*  
*Schrøter Abh. I. t. 3. f. 5. Scarabæus Vacca.*  
*Habitat in India.*
- valgus. 20. Sc. femoribus secundi paris remotis. *Mus. Lud. Ulr. 15. Fabr. sp. inf. I. p. 27. n. 120. mant. inf. p. 14. n. 136.*  
*Scarabæus (Paniscus) thorace retuso elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fisso.*  
*Petiv. gaz. t. 27. f. 8.*  
*Roef. inf. 2. Scarab. I. t. B. f. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Elytra brevia; digiti magis hirsuti, quam congeneribus.*
- carolinus. 16. Sc. thorace retuso, capite ovali integro unicorni, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 27. n. 121. mant. inf. I. p. 14. n. 137.*  
*Scarabæus capitis cornu erecto brevissimo, clypeo integro, elytris fulcatis.*  
*Drury inf. I. t. 35. f. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 24. f. 14.*  
*Habitat in America boreali, ater, obtusus, gibbus, pollicem crassus, statura molossi.*
- Sphinx. 161. Sc. thorace punctis quatuor impressis, capite subcornuto, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf. I. p. 27. n. 122. mant. inf. p. 24. n. 138.*  
*Pall. it. I. p. 462. n. 25. Scarabæus humerosus.*  
*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 4. t. A. f. 4. Scarabæus Menalcas.*  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 10. & apud Fuesl. Arch. Inf. 4. p. 11. n. 37. t. 19. f. 17.*  
*Drury inf. I. t. 35. f. 8. Scarabæus spinipes.*  
 β). *Scarabæus fronte ruga, elytris striis lævissimis. Mus. Lesk. p. 1. n. 12.*

*Habitat in America meridionali, & deserto acidissimo mari caspio boream versus finitimo, sericeus ex viridi cæruleus.*

Nicanor. 162. Sc. thorace punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 27. n. 123. mant. inf. 1. p. 14. n. 139.*

*Drury inf. 1. t. 35. f. 1. Scarabæus fulcatus.*

*Habitat in America.*

Fricator. 163. Sc. thorace anterieus elevato acuto, capitis cornu truncato subemarginato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 140.*

*Habitat in India, totus ater, nitidus, nicanoris magnitudine.*

Mimas. 17. Sc. thorace retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. *Mus. Lud. Ulr. 9.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 124. mant. inf. 1. p. 15. n. 141.*

*Sulz. inf. t. 1. f. 4. Voet coleopt. t. 23. f. 4. Copris viridis splendens.*

*Rosc. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 1.*

*Habitat in America meridionali, clypeo integro.*

hispanus. 21. Sc. clypeo cornuto emarginato, elytris striatis, femoribus secundis remotissimis. *Mus. Lud. Ulr. 12. Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 130. mant. inf. 1. p. 15. n. 148.*

*Pet. gazoph. t. 8. f. 4.*

*Voet coleopt. t. 24. f. 13.*

*Habitat in Barbaria & australiore Europa, lunari similis, sed major, clypei incisura a molosso distinctus.*

tridens. 164. Sc. thorace cupreo, capite basi tridentato, elytris nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 129. mant. inf. 1. p. 15. n. 147.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, niger, carnificis magnitudine.*

carnifex. 22. Sc. thorace plano angulato scabro, capitis cornu inflexo, corpore æneo. *Gron. zooph. 450.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 129. n. 28. mant. inf. 1. p. 15. n. 146.*

Scarabæus exscutellatus, thorace inermi angulato, capitis cornu reflexo, corpore æneo.

*Catesb. Car. 3. t. 11. f. ult.*

*Drury inf. 1. t. 35. f. 3-5.*

*Voet coleopt. t. 26. f. 31. 32.*

*Habitat in America, stercorario brevior, latus, depressus; formatam e stercore pilulam conjunctis gregatim viribus*

*per totam æstatem volvens volutansque, etiam non suam usque in foveam determinatam, uti pilularis.*  
Cornu retrorsum positum nigrum, læve, feminae obsoletum.

*Spinifex.* 165. Sc. thorace rotundato, occipite spina recurva. *Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 131. mant. inf. 1. p. 15. n. 145.*  
*Habitat in Coromandel, niger viridi-nitens, nuchicornis statura & magnitudine.*

*nuchicornis.* 24. Sc. thorace rotundato, occipite spina erecta armato. *Fn. suec. 381. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 132. mant. inf. 1. p. 15. n. 150.*  
*It. golt. 41. Scarabæus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebulosis.*  
*Raj. inf. p. 103. n. 2. Scarabæus ovinus tertius.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 89. n. 3. (mas) & (fem.) 4.*  
*Voet coleopt. t. 25. f. 18.*  
*Gronov. zooph. 454.*  
*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. A. f. 4.*  
β) *Scarabæus coenobita. Herbst apud Fuesl. Arch. Inf. 4. p. 11. n. 40. Voet coleopt. t. 25. f. 18.*  
*Habitat in Europæ stercore.*  
*Femina mutica.*

*Capra.* 166. Sc. occipite spina erecta gemina, corpore nigro obscuro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 144.*  
*Habitat Halæ Saxonum, vaccæ statura & magnitudine.*

*Vacca.* 25. Sc. thorace acuminato, occipite spina erecta gemina. *Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 126. mant. inf. 1. p. 15. n. 143.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 90. n. 5.*  
*Schæff. inf. t. 73. f. 4. 5. ♂. ♀.*  
*Schroet. Abh. 1. t. 3. f. 5.*  
*Habitat in Europa temperata, nuchicorni thorace æneo, elytrisque fuscis, capræ spina occipitis gemina similis.*

*Taurus.* 26. Sc. occipite cornubus binis reclinatis arcuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 126. mant. inf. 1. p. 15. n. 142.*  
*Schreber inf. t. 1. f. 6. 7.*  
*Scop. ent. carn. 25. Scarabæus illyricus.*  
*Raj. inf. p. 103. n. 2. Scarabæus ovinus alter.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 92. Copris niger, capite pone bicorni, &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 5.*

*Schæff. inf. t. 73. f. 2. 3. ♂. ♀.*

*Voet coleopt. t. 24. f. 16.*

*Habitat in Germania & Europa magis australi, nuchicorni similis, at cornubus distantibus arcuatis diversus.*

*nutans.* 167. Sc. thorace antè impresse, occipite spina erecta, apice nutante, corpore nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 151.*

*Habitat Halæ Saxonum, nuchicornis statura & magnitudine.*

*scabrosus.* 168. Sc. thorace rugoso, capitis cornu erecto brevissimo, elytris testaceis nigro-scabris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 133. mant. inf. 1. p. 16. n. 152.*

*Voet coleopt. t. 25. f. 23.*

*Habitat in America meridionali, nuchicorni paulo major.*

*furcatus.* 169. Sc. thorace rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breviori. *Fab. sp. inf. 1. p. 30. n. 134. mant. inf. 1. p. 16. n. 153.*

*Laichart. inf. tyr. p. 26. n. 20. t. 1. f. 20. Scarabæus Vitulus.*

*Habitat in Gallia meridionali.*

*Feminae cornuum loco linea transversa elevata.*

*vertici-cornis.* 170. Sc. thorace griseo nigro-punctato, capitis cornu erecto brevissimo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 135. mant. inf. 1. p. 16. n. 154.*

*Habitat in Anglia, nuchicorni valde affinis, an varietas?*

*truncati-cornis.* 171. Sc. æneo-niger, thorace rotundato, occipite spina apice truncata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 238. Habitat in — — statura nuchicornis, at minor.*

*Femina mutica.*

*spiniger.* 415. Sc. occipite spina erecta brevi, elytris lividis: maculis confluentibus nigris. *Mus. Lesk. p. 3. n. 47.*

*Habitat in Europa.*

*novem-maculatus.* 416. Sc. testaceo fuscus, clypeo rugis duabus, elytris fuscis: maculis novem rufo testaceis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 48.*

*Habitat extra Europam, antennis, thoracis margine exteriori pedibusque lividis.*

*recticornis.* 427. Sc. ater, thorace subinermi, capite cornubus duobus erectis, clypeo rotundato. *Lesk. it. p. 45. t. A. f. 8. 9.*

*Habitat in Lusitaniæ valle, a fluvio Pelsonis irrigata, 5 lineas longus.*

c) thorace &amp; capite inermi: Mutici:

a) scutellati.

Aygulus. 172. Sc. thorace quadripunctato, capite tuberculato, elytris testaceis, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 15. n. 57. mant. inf. 1. p. 8. n. 60.*

*Habitat in India, Inuo affinis, at duplo major, & tibiis antèrius quoque dentatis distinctus.*

finetarius. 32. Sc. ater, capite tuberculato, elytris rubris. *Fn. suec. 385. Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 64. mant. inf. 1. p. 9. n. 70. Scop. ent. carn. p. 20. 21. Geoffr. inf. par. 1. p. 81. n. 18.*

*Fn. suec. 1. p. 355. Scarabæus capite thoraceque nigro, antennis elytrisq. rubris.*

*Raj. inf. p. 106. n. 9. Scarabæus pilularius nonus.*

*Frisch inf. 4. t. 19. f. 3.*

*Roef. inf. 2. scar. 1. t. A. f. 3.*

*Schæff. ic. t. 144. f. 6.*

*Deger inf. 4. t. 10. f. 8.*

β) Scarabæus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *It. æl. 41.*

*Uddm. diff. nr. 2.*

λ) Scarabæus (rufus) rufus totus, folis oculis nigris, capite tuberculis tribus, elytris striatis. v. *Moll apud Fuesl. naturh. Mag. 1. 372.*

*Habitat frequens in Europæ stercore.*

*Capitis tubercula ut plurimum tria.*

hæmorrhoidalis. 33. Sc. capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. suec. 386. Fn. suec. 1. p. 158. Scarabæus ater, elytris postice ferrugineis, pedibus rufis.*

*Habitat in Europæ fungis & putridis; an mera granarii varietas?*

conspurcatus. 34. Sc. thoracis marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro-maculatis. *Fn. suec. 387. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 67. mant. inf. 1. p. 9. n. 73.*

*Raj. inf. p. 108. Scarabæus pilularius decimus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 82. n. 19.*

*Schæff. ic. t. 26. f. 8.*

*Pontopp. Atl. dan. t. 1. f. 82.*

*Voet coleopt. t. 21. f. 144.*

β) Scarabæus tessulatus. v. *Moll naturh. Br. 1. p. 162. n. 9. Habitat in Europæ stercore, vere præsertim frequens, sordido affinis, sed minor; β) dimidio minor.*



- fordidus.** 173. Sc. capite tuberculato, thorace nigro: margine pallido; puncto nigro, elytris griseis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 17. n. 68. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 75. *Herbst apud Fuesl. Arch. Inf.* 4. p. 6. n. 13. t. 19. f. 3.  
*Habitat in Angliæ stercore.*
- luridus.** 174. Sc. ater, capite tuberculato, elytris griseis nigro-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 17. n. 69. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 76. *Müll. prodr. zool. dan.* Scarabæus testullatus.
- marianus.** 35. Sc. capite tuberculato, elytris lævibus glaucis fusco-punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 18. n. 71. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 78.  
*Habitat in America, magnitudine aloëi; an forsan femina murica Herculis?*
- fordens.** 413. Sc. niger, capite tuberculato: intermedio prominulo, elytris fordide testaceis: futura marginibusque fordide brunneis. *Mus. Lesk. p.* 2. n. 21.  
*Habitat in Europa.*
- nebulosus.** 414. Sc. fuscus, thorace lævi: marginibus externis lividis, capite obsolete tuberculato, elytris striatis, fusco nebulosis, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p.* 2. n. 22.  
*Habitat in Europa.*
- Inuus.** 175. Sc. thorace quadripunctato, capite quadrituberculato, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 56. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 59.  
*Fabr. syst. entom. p.* 14. n. 45. Scarabæus Sphinx.  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, supra ex viridi æneus obscurus.*
- subterraneus.** 28. Sc. thorace glabro, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Fn. suec.* 382. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 58. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 61.  
*Gadol satag.* 76. Scarabæus niger, capitis clypeolunato tribus tuberculis notato.  
*Sulz. inf. t.* 1. f. 2.  
*Habitat in Europæ stercore, fossori affinis, at multo minor.*
- Fossor.** 31. Sc. thorace retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fn. suec.* 384. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 59. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 62.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 82. n. 20.

*Gunner. ad: Nidr. 4. p. 266. n. 2. t. 16. f. 1.*

*Fn. suec. 352. Scarabæus ovatus ater glaber.*

*Schaef. ic. t. 144. f. 78.*

*Deger. inf. 4. t. 10. f. 7.*

*Voet coleopt. t. 21. f. 141.*

*Habitat in Europæ sabulosi stercoretis.*

*æstens.* 176. *Sc. capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo. Fabr. mant. inf. 1. p. 8. n. 63.*

*Habitat Halæ Saxonum ater, ano rufo, thoracis macula marginali ferruginea.*

*analis.* 177. *Sc. niger, capite tuberculis tribus æqualibus, elytris apice ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 8. n. 64.*

*Habitat in India, fossoris statura & magnitudine.*

*icyba-* 178. *Sc. capite tuberculis tribus: intermedio acuto, elytris striatis testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 60. mant. inf. 1. p. 8. n. 65.*

*Herbst. apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 7. n. 17. t. 19. f. 6. Scarabæus fœtidus.*

*Habitat in Germania, fossore minor.*

*terref-* 179. *Sc. capite tuberculis tribus æqualibus, elytris striatis tris. Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 61. mant. inf. 1. p. 8. n. 66.*

*Habitat in Anglia, fossore triplo minor.*

*confla-* 180. *Sc. capite tuberculis tribus, clypeo scutelloque nitide gratus. nigris. Herbst. apud. Fuesli Arch. Inf. 4. p. 5. n. 11.*

*Habitat in Germaniæ stercore vaccino, erratico affinis.*

*Elytra punctis excavatis sulcata.*

*inqui-* 181. *Sc. capite tubertulis tribus, elytris luteis nigro striatis: natus. Herbst. apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 6. t. 19. f. 5. Fabr. mant. inf. 1. p. 9. n. 74.*

*Habitat in Germania, fimetario tertia parte, ad conspurcatum accedens.*

*Scutellum nitide nigrum.*

*unifas-* 182. *Sc. thorace piceo: prominentia triplici; intermedia ciatus. trituberculata, elytris testaceis: fascia sinuata fusca.*

*Schaller Abh. der hall. Naturf. 1. p. 240.*

*Habitat in Malabar.*

*sangu-* 183. *Sc. niger, capite tuberculis tribus obsoletis, elytris nolentus, punctatim striatis apice rubris. Herbst. apud Fuesli Arch. 4. p. 6. n. 15. t. 19. f. 4.*

H h h



*Habitat in Germania, fimetarium simulans, at tertie parte minor.*

bimaculatus. 184. Sc. capite subtrituberculato, elytris striatis : macula basæ rubra. *Fabr. mant. inf. I. 8. n. 67.*

*Habitat in Germania, ater, terrestris statura & magnitudine.*

testaceus. 185. Sc. testaceus, capite bituberculato, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 16. n. 63. mant. inf. I. p. 9. n. 69.*

*Habitat in Angliæ stercoretis.*

æygmæus. 186. Sc. clypeo marginato, thorace viridi : prominentia biida, elytris testaceis nigro-maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. I. p. 239.*

*Habitat in Malabar, ovati magnitudine, nuchicornis statura.*

erraticus. 29. Sc. thorace lævi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Fn. suec. 385. Fabr. sp. inf. I. p. 17. n. 66. mant. inf. I. p. 9. n. 72. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 5. n. 10. t. 19. f. 2.*

*Schæff. ic. t. 26. f. 9.*

*Voet coleopt. f. 146?*

*Habitat in Europæ stercore, viis.*

bicolor. 187. Sc. thorace subinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *Fabr. sp. inf. I. p. 17. n. 65. mant. inf. I. p. 9. n. 71.*

*Habitat in Germania.*

granarius. 23. Sc. niger, clypeo tuberculo solitario, elytris posterius testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 17. n. 70. mant. inf. I. p. 9. n. 77. Lesk. it. p. 45. t. A. f. 10.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 547. n. 23. Scarabæus scutellatus niger, thorace inermi : clypeo tuberculato, elytris substriatis margine postico testaceis.*

*Habitat in Europæ locis suffocatis, seminis tritici magnitudine.*

*Elytra interdum ultra dimidium testacea.*

futuralis. 183. Sc. niger nitidus, capitis tuberculo solitario minuto, elytris fordide flavis striatis minuto punctatis, scutello margine exteriori ad basin futuraque nigris. *v. Moll naturh. Br. I. p. 162. n. 10.*

*Habitat in vallis Salzburgeris Zillerthal stercore equino, fordido affinis.*

- Veter. 408. Sc. rufus, capite thoraceque linea carinata elevata;  
*Fabr. mant. inf. 2. app. p. 377.*  
*Habitat in India, cephi magnitudine.*
- Gigas: 36. Sc. thorace reterso, capite supra margineque angulato;  
*Mus. Lud. Ulr. 16.\**  
*Habitat in Aegypto, ater, primæ magnitudinis.*
- Scaber: 37. Sc. thorace elytrisque anterieus scabris. *Mus. Lud. Ulr. 17.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n. 72. mant. inf. 1. p. 9. n. 79.*  
*Scarabæus scutellatus, clypei centro prominulo, ely-*  
*tris antice scabris.*  
*Habitat in America, nasicorni duplo major, Herculis*  
*feminae affinis.*
- longima- 39. Sc. pedibus anterioribus arcuatis longissimis. *Mus. Lud.*  
*mus. Ulr. 18.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n. 73. mant. inf. 1.*  
*p. 9. n. 80.*  
*Aubent. misc. t. 41. f. 1.*  
*Voet. coleopt. t. 11. f. 97.*  
*Habitat in India.*  
*Femora anteriora dente valido armata.*
- stercora- 42. Sc. ater glaber, elytris sulcatis, capite rhombico: vertice  
*rius. prominulo. Fn. suec. 388.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 75.*  
*n. 9. Scop. ent. carn. 26. Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n.*  
*74. mant. inf. 1. p. 10. n. 81.*  
*Mouff. inf. 151.*  
*Rij. inf. p. 74. n. 1.*  
*Bauh. halluc. 212. f. ult.*  
*List. mut. 17. f. 4.*  
*scar. angl. p. 380. n. 4.*  
*Frisch inf. 4. p. 13. t. 6.*  
*Schaeff. is. t. 23. f. 9.*  
*Degeer inf. 4. t. 9. f. 10. 11.*  
*Voet coleopt. t. 20. f. 134.*  
*Habitat in Europa sub stercore, acaris & ichneumone*  
*infectatus, vespere ingenti cum susurro circumvolitando*  
*serenum diem prænuncians, ab Aegyptiis soli consecratus;*  
*colore interdum in caeruleum aut virescentem vergente;*  
*aut subtus anco, elytrisque obscure rufis varians.*
- vernalis. 43. Sc. elytris glabris laevissimis, clypeo rhombico: vertice  
*prominulo. Fn. suec. 389. Geoffr. inf. par. 1. p. 77.*  
*n. 10. Scop. ent. carn. p. 27. Fabr. sp. inf. 1. p. 19. n.*  
*75. mant. inf. 1. p. 10. n. 82.*

*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 6.*

*Voet coleopt. t. 20. f. 135.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 4.*

*Habitat sub Europæ stercore, stercorario simillimus, æ minor, glaber, nitidus, antennis rubris, colore cærulescente, virescente & obscuro varius.*

juvencus. 189. *Sc. thorace anterieus impresso mucronato. Fabr. sp. inf. I. p. 19. n. 76. mant. inf. I. p. 10. n. 83.*  
*Habitat in America.*

splendi- 190. *Sc. viridi-nitens, elytris striatis. Fabr. sp. inf. I. p. 19. n. 77. mant. inf. I. p. 10. n. 84.*  
dus. *Habitat in insulis Americæ australi oppositis.*

Cephus. 191. *Sc. rufus, elytrorum futura apicibusque nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 19. n. 78. mant. inf. I. p. 10. n. 85.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

laborator. 192. *Sc. ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato. Fabr. sp. inf. I. p. 20. n. 79. mant. inf. I. p. 10. n. 86.*  
*Habitat in Brasiliæ stercore.*

globator. 193. *Sc. thorace elytrisque obscure nigris punctatis. Fabr. sp. inf. I. p. 20. n. 80. mant. inf. I. p. 10. n. 87.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, fossoris magnitudine, subtus hirtus piceus.*

septem- 194. *Sc. elytris striatis pallidis nigro-maculatis. Fabr. sp. inf. maculatus. I. p. 20. n. 81. mant. inf. I. p. 10. n. 88.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, piceus, conspurcati statura, at paulo major.*

bipuncta- 195. *Sc. thorace nigro rubro-marginato, elytris rubris puncto us. nigro. Lepech. it. 2. p. 324. t. 10. f. 7. Fabr. mant. inf. I. p. 10. n. 89.*

*Laxmann nov. comm. Petr. 14. p. 593. t. 24. f. 1.*  
*Scarabæus bimaculatus.*

*Pallas ic. inf. Russ. 1. p. 12. t. A. f. 12. Scarabæus coccionelloides.*

*Habitat sub fimo equino Russiæ australis & ad Volgam, Thoracis margo rufus, puncto nigro.*

arator. 196. *Sc. niger, thorace lævi, elytris punctato-striatis. Fabr. sp. inf. I. p. 20. n. 102. mant. inf. I. p. 10. n. 90.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei,*

barbatus. 197. *Sc. muticus lævis niger*, ano barbato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 20. n. 83. *mant. inf.* I. p. 10. n. 91.  
*Habitat in India.*

quisqui- 83. *Sc. ater glaber*, elytris livido-testaceis. *Fn. suec.* 297.\*  
 lius. *Fabr. sp. inf.* I. p. 21. n. 91. *mant. inf.* I. p. 11. n. 100.  
*Scop. ent. carn.* 29.

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 7. n. 23. t. 19. f. 8.

β) *Scarabæus merdarius. Fabr. sp. inf.* I. p. 21. n. 90. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 7. n. 22.

γ) *Scarabæus cotericus. v. Moll naturh. Br. I.* p. 168. n. 13.  
*Scarabæus Copris. Schrank enum. inf. Austr. p.* 5. n. 6.  
*Habitat in Europæ stercore & quisquiliis, seminis milii magnitudinæ, β) dimidio major.*

arcuatus. 198. *Sc. niger nridus*, capitis clypeo anterieus rufo, elytris striato-punctatis, futura, puncto marginali baseos vitæque abbreviata futuram versus inflexa rubescentibus, pectore obscuro, abdomine flavescente, palpis, antennis pedibusque ferrugineis. *v. Moll naturh. Br. I.* p. 160. n. 7.

*Habitat in alpibus Salzburgicis.*

Scrofa. 199. *Sc. oblongus niger*, elytris fuscis substriatis. *Fabr. mant.* I. p. 11. n. 99.

*Habitat Halæ Saxonum, statura testudinarii, at minor.*

testudina- 200. *Sc. niger*, elytris fulcatis piceis ferrugineo-punctatis.  
 rius. *Fabr. sp. inf.* I. p. 21. n. 89. *mant. inf.* I. p. 11. n. 98.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 7. n. 21. t. 19. f. 7. a. b.

*Habitat in Anglia & Germania, vere in agris, stercoretis frequens.*

marginel- 201. *Sc. niger*, thoracis elytrorumque margine testaceo.  
 lus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 21. n. 88. *mant. inf.* I. p. 11. n. 97.

β). *Melolontha nigro-marginata. Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 7. p. 155. n. 20. t. 43. f. 7.

*Habitat in Coromandel, parvus, pedibus piceis.*

quadrima- 84. *Sc. niger oblongus*, elytris maculis duabus nigris. *Fn.*  
 culatus. *suec.* 398.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 21. n. 86. *mant. inf.* I. p. 10. n. 94.

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 10. n. 31. t. 19. f. 15.

*Scarabæus quadriguttatus.*

*Habitat in Europæ stercore.*

202. *Sc. oblongus* obscure rufus, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. mant. 1. p. 11. n. 95. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 29. t. 19. f. 10.*  
*Habitat in Germaniæ stercore humano, fimetario dimidio minor, statura quadrimaculati.*
203. *Sc. niger*, elytris plaga rufescente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 87. mant. inf. 1. p. 11. n. 96.*  
*Habitat in Europâ, an varietas subterranei?*
203. *Sc. thorace nigro æneo*, elytris striatis atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 85. mant. inf. 1. p. 10. n. 93.*  
*Habitat in America boreali, rufipede paulo major.*
204. *Sc. antennis pallidis*, elytris lævibus. *Fn. suec. 403.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 84. mant. inf. 1. p. 10. n. 92.*  
*Scarabæus thorace glabro nitido, elytris striatis.*  
*Degeer inf. 4. t. 10. f. 6.*  
 β). *Scarabæus arator. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 30.*  
*Scarabæus gagates. v. Moll naturh. Br. 1. p. 172. n. 17.*  
*Habitat in Europâ, potissimum borealis stercoretis, β).*  
*fimetarium magnitudine vix superans.*
205. *Sc. thorace scabro lateribus tridentato*, elytris griseis. *Mus. Ind. Utr. 31.\**  
*Hasselq. it. 409. n. 99. Scarabæus ceratonix.*  
*Habitat in Catri ceratonix.*
206. *Sc. fuscus*, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 92. mant. inf. 1. p. 11. n. 101. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 24. t. 19. f. 9. a. b. c.*  
 β). *Scarabæus foveolatus. v. Moll. naturh. Br. 1. p. 173. n. 19.*  
*Habitat in Germaniæ stercore.*
207. *Sc. ater lævis*, elytris striato-crenatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 93. mant. inf. 1. p. 11. n. 102.*  
*Habitat in Brasilia.*
208. *Sc. capite thoraceque transversim sulcatis*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 94. mant. inf. 1. p. 11. n. 103. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 25. t. 19. f. 10. a. b.*  
*Habitat in Europæ plantis putridis.*



- unipunc- 207. *Sc. ater*, coleoptris flavescentibus : puncto communi  
tatus. nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 95. mant. inf. 1. p. 11. n. 104.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 579. n. 6. Fn. suec. 470.\** *Coc-*  
*cinella coleoptris flavescentibus : puncto communi nigro.*
- interpunc- 208. *Sc. niger*, elytris fordide flavis fulcis nigris : area in-  
tatus. termedia maculis oblongis alternis nigris varia. *Herbst*  
*apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 26. t. 19. f. 11.*  
*Habitat in stercore vaccino Berolini.*
- varius. 209. *Sc. niger*, elytris dimidiato flavis. *Herbst apud Fuesli*  
*Arch. Inf. 4. p. 9. A. 27. t. 19. f. 12.*  
*v. Moll naturh. Br. 1. p. 172. n. 18.* *Scarabæus variegatus?*  
*Habitat in stercore vaccino pratorum Berolinensium, ad*  
*interpunctatum proxime accedens, an varietas?*
- contami- 210. *Sc. niger*, clypei furtellique margine luteo, elytris punc-  
natus. tato-striatis hirtis pedibusque fordide flavis. *Herbst apud*  
*Fuesli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 28. t. 19. f. 13.*  
*Habitat in Pomerania, interpunctato similis sed minor.*
- minutus. 211. *Sc. niger*, elytris striatis pedibusque spadiceis. *Herbst*  
*apud Fuesli Arch. Inf. 1. p. 10. n. 32.*  
*Habitat Berolini, quisquilio aequalis, & magis oblongus.*
- oblongus. 212. *Sc. clypeo foveolato*, elytris fulcatis, corpore oblongo.  
*v. Moll naturh. Br. 1. p. 171. n. 16. & apud Fuesli n.*  
*Mag. Entom. 1. p. 371.*  
*Habitat in Germaniæ stercore, fossori affinis.*
- arenarius. 213. *Sc. ater*, elytris striatis, tibiis piceis. *Fabr. mant. 1.*  
*p. 11. n. 105.*  
*Habitat in Sueciæ arena mobili, parvus.*
- lævis. 417. *Sc. ater*, thorace lævi, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 2.*  
*n. 34.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 418. *Sc. ater glaber*, thoracis margine externo elytris pedi-  
busque fordide testaceis. *Mus. Lesk. p. 2. n. 35.*  
*Habitat in Europa.*
- β) *exscutellari.*
- decem- 214. *Sc. thorace antierius tuberculis tribus*, elytris testaceis fas-  
punctatus. cia transversa oblongo-punctatis. *Schaller Abh. der hall.*  
*Naturf. 1. p. 237.*



*v. Moll naturh. Br. 1. p. 175. n. 21. Scarabæus quadrituberculatus.*

*Habitat in Germaniæ stercore humano & vaccino.*

reflexus. 215. *Sc. niger, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato. Fabr. mant. inf. 1. p. 16. n. 157.*

*Habitat in Sina, oblongus, fossoris magnitudinis.*

quadripus. 216. *Sc. ater, capite bituberculato, elytris maculis duabus tulatus, rubris. Fabr. sp. inf. 1. p. 31. n. 137. mant. inf. 1. p. 16. n. 156.*

*Habitat in nova Hollandia.*

fulcator. 217. *Sc. ater, capitis tuberculo unico, elytris striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 31. n. 136. mant. inf. 1. p. 16. n. 155.*

*Habitat in Cayenna.*

eristatus. 218. *Sc. niger, thorace cristato, clypeo tuberculato quadridentato. Fabr. sp. inf. 1. p. 31. n. 138. mant. inf. 1. p. 16. n. 158.*

*Habitat in Ægypto.*

facer. 18. *Sc. clypeo sexdentato, thorace crenulato, tibiis posterioribus ciliatis, vertice subbidentato. Mus. Lud. Ulr. 13.\* Amæn. Acad. 6. t. 3. f. 170. Fabr. sp. inf. 1. p. 31. n. 139. mant. inf. 1. p. 16. n. 159.*

*Degeer inf. 7. p. 638. n. 36. t. 47. f. 18. Scarabæus cornutus.*

*Osb. it. 51. Scarabæus lævis thorace inermi, capite antice sexdentato.*

*Loefl. it. 20. Scarabæus pilularius niger, clypeo antice serrato, elytris nebulose macularis submollibus planiusculis.*

*Petiv. gazoph. t. 42. f. 2.*

*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 3.*

*Voet coleopt. t. 27. f. 39. 40.*

*Habitat in partibus Orbis antiqui australioribus, in Russiæ australis aridis frequens, cylindrum e stercore bovino volvens, in columnis antiquis Romæ exsculpius ab Ægyptiis,*

laucollis. 38. *Sc. niger, clypeo sexdentato, elytris fulcatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 31. n. 140. mant. inf. 1. p. 16. n. 160.*

*Geoffr. inf. 1. p. 89. n. 2. Copris niger, capite clypeato: margine serrato, thorace lato lævi, elytris striatis.*

*Raj. inf. p. 105. n. 4.*

*Vest coleoptr. t. 27. f. 41.*

*Habitat in Sina, & australi Europa, sacro valde affinis.*

- variolo- 219. Sc. clypeo sexdendato, thorace elytrisq[ue] nigris ;  
sus. punctis impressis variolosis. *Fabr. mant. I. p. 16. n. 161.*  
*Habitat in Istria, laticollis statura, sed paulo minor.*
- miliaris. 220. Sc. clypeo sexdendato, thorace elytrisq[ue] nigris ;  
maculis elongatis atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 141.*  
*mant. inf. I. p. 17. n. 162.*  
*Habitat in India.*
- Bacchus. 221. Sc. clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisq[ue]  
glabris. *Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 142. mant. I. p. 17.*  
*n. 163.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus, gibbus.*
- gibbosus. 222. Sc. clypeo quadridentato, elytris basi gibbo notatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 143. mant. p. 17. n. 164.*  
*Habitat in America.*
- Hollan- 223. Sc. clypeo quadridentato, elytris sulcatis. *Fabr. sp*  
diæ. *inf. I. p. 32, n. 144. mant. inf. I. p. 17. n. 165.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Koenigii. 224. Sc. clypeo bidentato, thorace scabro, elytris vario-  
lous. *Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 145. mant. inf. I. p. 17.*  
*n. 166.*  
*Pall. icon. inf. Ross. I. p. 7. t. A. f. 7. Scarabæus scriptus.*  
*Habitat Tranquebariæ.*
- cupreus. 225. Sc. ex nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace  
gibbo. *Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 146. mant. inf. I. p. 17.*  
*n. 167.*  
*Habitat in Africa.*
- flagella- 226. Sc. niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris.  
tus. *Fabr. sp. inf. I. p. 32, n. 147. mant. inf. I. p. 17. n. 168.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in australi Europa.*
- pilularius. 40. Sc. niger opacus lævis subtus æneus, thorace posterius  
rotundato. *Mus. Lud. Utr. 19.\* Fabr. sp. inf. I. p. 33,*  
*n. 151. mant. inf. I. p. 17. n. 170.*  
*Geoffr. inf. I. p. 91. n. 7. Copris niger nitidus, &c.*  
*Arist. Anim. l. 5. c. 18.*  
*Plin. hist. mund. II. 34. Pilularius.*  
*Raj. inf. p. 105. n. 1.*  
*Catesb. Car. 3. t. 11. fig. sinistr.*  
*Schæff. ic. t. 73. f. 6.*  
*Voet coleopt. t. 28. f. 49.*
- β) Scarabæus Mopsus. *Pall. ic. inf. Ross. I. t. A. f. 3.*  
Scarabæus Geoffræ. *Sulz. ic. inf. t. I. f. 7.*  
*Habitat in Europa magis australi, stercorarii magnitudine*  
*& statura ; bini quotidie sisyphi instar volvunt globum &*

*stercore imprimis humano confectum se sæpe septies majorem Loeßl. it. 20.*

- Schaeffe- 41. Sc. thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris  
xi. triangulis, femoribus posterioribus elongatis dentatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 148. mant. inf. I. p. 17. n. 169.*  
*Scop. ent. carn. p. 84. Scarabæus longipes.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 92. n. 9. Copris niger, pedibus longis, &c.*  
*Schaeff. ic. t. 3. f. 8.*  
*Voet coleoptr. t. 25. f. 17.*  
*Habitat in Calabria, Germaniæ & Sibiria collibus apertis, globulos e stercore bovino factos volvens & sepe- liens, niger, horticola magnitudine.*
- brasil- 227. Sc. ater, clypeo emarginato, elytris striatis. *Fabr.*  
nus. *sp. inf. I. p. 33. n. 150. mant. inf. I. p. 17. n. 171.*  
*Habitat in Brasiliæ stercore bovino.*
- calcar- 44. Sc. capite clypeato emarginato, femoribus posteriori-  
tus. bus dentatis.  
*Habitat in Ægypto.*
- Schreberi. 45. Sc. ater glaber, elytrorum maculis duabus femoribus-  
que rubris. *Fabr. sp. inf. I. p. 33. n. 151. mant. inf. I. p. 17. n. 172.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 91. n. 7. Copris niger nitidus, &c.*  
*Schaeff. ic. t. 73. f. 6.*  
*Voet coleoptr. t. 28. f. 49.*  
*Habitat in Europa temperata, nuchicornis fere statura.*
- bipustu- 228. Sc. ater, elytris basi macula rufa. *Fabr. sp. inf. I. p.*  
latus. *33. n. 152. mant. inf. I. p. 17. n. 173.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- pallipes. 229. Sc. capite thoraceque pallido viridique variegatis,  
pedibus antennisque pallidis. *Fabr. sp. inf. I. p. 33. n. 153. mant. inf. I. p. 17. n. 174.*  
*Habitat in Coromandel, parvus.*
- triangu- 230. Sc. niger, thoracis margine femoribusque pallidis,  
laris. clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. I. p. 33. n. 154. mant. inf. I. p. 18. n. 175.*  
*Drury inf. I. t. 36. n. 175.*  
*Habitat in America australi, nuchicornis statura.*

cinctus. 231. *Sc. niger*, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 155. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 176.

*Habitat in Sina.*

flavipes. 232. *Sc. nigricans*, thoracis marginibus, elytris pedibusque flavescens. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 495. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 177.

*Laichart. inf. tir.* 1. p. 24. n. 17. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 12. n. 46. t. 19. f. 19. *Scarabæus thoracocircularis.*

*Schæff. ic. t.* 74. f. 6.

*Habitat in Germania, cincti statura.*

æneus. 233. *Sc. viridi-æneus*, thorace bituberculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 156. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 178.

*Habitat in Coromandel, parvus, subtus niger.*

smaragdulus. 234. *Sc. æneus nitidus*, clypeo bidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 157. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 179.

*Habitat in America australi, parvus, glaberrimus.*

ovatus. 46. *Sc. niger*, clypeo emarginato, thorace subæneo, elytris abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 158. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 180.

*Habitat in Calabria, Germaniæ, Angliæ stercore bovinæ, nuchicorni similis, ac quadruplo minor.*

amazonus. 47. *Sc. testaceus* thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriore callo fusco.

*Habitat Surinami, lavis, stercorario dimidio minor.*

crucifer. 319. *Sc. thorace subvillosa viridescens*, elytris luteis corpore brevioribus: cruce nigra, trabe duplici. *Lepech. it.* 1. p. 240. t. 16. f. 14.

*Habitat in Sibiria quercetis, pulpa foliorum visitans, subtus niger villosus, an hujus generis?*

cæruleus. 320. *Sc. totus cyaneus oblongus.* *Lepech. it.* 1. p. 313. t. 19. f. 2.

*Habitat in Sibiria deserto uralensi, 5. lineas longus, subtus in atrum colorem vergens.*

uralensis. 321. *Sc. viridis*, elytris flavis corpore brevioribus, apice acuminatis. *Lepech. it.* 1. p. 313.

*Habitat in deserto Sibiria uralensis arenosis, subtus albo tectus.*

*Elytra lineis villosis albicantibus signatis a medio ad apicem distincta.*

1558 INSECTA COLEOPTERA. Scarabæus. *Melolontha*.

stictopterus. 419. Sc. niger elytris strictis punctatis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 32.*

*Habitat in Europa.*

guttatus. 420. Sc. niger, thorace rotundato: guttis eminentibus glabris, capitis clypeo impresso apice bifido, elytris profunde striatis crenatis: maculis oblongis e pilis luteis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 53.*

b) *mandibula arcuata subdentata, abdomine apice nudo, oblique truncato. Melolonthæ.*

Fullo. 57. Sc. testaceus albo-maculatus, scutello macula duplici antennis heptaphyllis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 35. n. 1. mant. inf. 1. p. 19. n. 1.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 553. n. 57. Fn. suec. p. 394. \* Scop. ent. carn. p. 123.* Scarabæus scutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro, pilis albis, scutello macula duplici alba.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 69. n. 2.* Scarabæus antennarum lamellis maximis.

*Raj. inf. p. 93. n. 9.* Scarabæus Fullo.

*Frisch inf. 11. t. 1. f. 1.*

*Mouff. inf. 160. f. 4.*

*Hoeffn. inf. 2. t. 7.*

*Eph. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 6. abs. 239.*

*Aubent. misc. t. 16. f. med.*

*Schaef. ic. t. 23. f. 2.*

*Petiv. gar. t. 138. f. 1.*

*Sulz. hist. inf. 1. 1.*

*Voet coleopt. t. 6. f. 48. 49.*

β) Scarabæus albus. *Pall. it. 2. p. 718. n. 4.*

*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 19. t. B. f. 21.* Scarabæus hololeucos.

*Habitat in Europæ et Barbariæ arenosis, quercu, elymo & arundine arenariis vicatans, subtus hirsutus, unguiculis basi ramo uncinato.*

ruricola. 235. Sc. ater sericeus, elytris rufis: margine nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 45. mant. inf. 1. p. 23. n. 58.*

*Geoff. inf. par. 1. p. 80. n. 15.* Scarabæus niger elytris cruceis, &c.

*Habitat in Angliæ graminosis.*

fruticola. 236. Sc. capite thoraceque cæruleo-pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 23. n. 56.*

*Scop. ent. carn. 6.* Scarabæus cyathiger.



*Poda inf.* 21. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 43. n. 44. Scarabæus agricola.

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 15. n. 6. t. 19. f. 24. *Schæff. ic.* t. 65. f. 1.

*Voet coleoptr.* t. 8. f. 67.

β) Scarabæus campestris. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 15. n. c. t. 19. f. 25.

*Habitat in Germaniæ spicis secalinis, in Calabria etiam inquilinus, horticolæ statura, sed minor.*

praticola. 237. Sc. thorace nigro flavoque vario subpilofo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 43. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 55.

*Habitat in Sibiria, agricolæ affinis, at clypeo non reflexo.*

arvicola. 238. Sc. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 42. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 54.

*Habitat in Russia magis australi, horticolæ affinis.*

agricola. 58. Sc. thorace villoso, elytris lividis: limbo fasciaque nigris, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant.* 1. p. 23. n. 57.

*Habitat in Germaniæ graminibus.*

floricola. 239. Sc. cyaneo-nigra glabra, elytris rufis: futura nigra, abdomine punctis fasciculatis albis, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. p. 22. n. 53.

*Habitat in Africa, horticolæ proxime affinis.*

abdomi- 240. Sc. capite thoraceque cæruleo-pilosis, elytris testaceis, nalis. abdomine albo villoso. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 496. *mant. inf.* 1. p. 22. n. 52.

*Habitat in Italia, horticolæ nimium affinis.*

horticola. 59. Sc. capite thoraceque cæruleo-pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 391. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 22. n. 50.

*Geoffr. inf. parif.* 1. p. 75. n. 8.

*It. scan.* 116. 321. Scarabæus friscus.

*List. scar.* 380. n. 3. Scarabæus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis.

*Degeer inf.* 4. p. 278. n. 24. t. 10. f. 18. Scarabæus viridicollis.

*Raj. inf.* p. 380. n. 3.

*Frisch inf.* 4. t. 14.

*Pet. gaz.* t. 22. f. 9.

*Schæff. ic.* t. 23. f. 4.



*Habitat in Europæ hortis; larva radices brassicæ lotrydis;  
& capitata destruit, intacta viridi & sabauda; imago  
pomorum devastat, intacta pyro communi.*

regius. 241. *Sc. cupreo-nitidus, clypeo emarginato: Fabr. sp. inf.*  
*I. p. 42. n. 40. mant. inf. I. p. 22. n. 49.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, splendentis statura.*

splen- 242. *Sc. ater, elytris viita abbreviata aurea. Fabr. sp. inf.*  
dens. *I. p. 41. n. 39. mant. inf. I. p. 22. n. 48.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

ferrugi- 243. *Sc. rufus thoracè elytrisq; vage punctatis. Fabr. sp.*  
neus. *inf. I. p. 22. n. 47. mant. inf. I. p. 41. n. 38.*  
*Habitat in Coromandel, raucis affinis, at duplo minor.*

caucus. 244. *Sc. clypeo reflexo; thorace elytrisq; punctatis nigro-*  
*æneis. Fabr. sp. inf. I. p. 41. n. 37. mant. inf. I. p.*  
*22. n. 46.*  
*Habitat in Coromandel, subtus niger.*

rupicola. 245. *Sc. villosus virescens, capite nigro. Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 41. n. 36. mant. inf. I. p. 22. n. 44.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

innubus. 246. *Sc. glaber niger; thoracis margine; abdomine femo-*  
*ribusq; testaceis. Fabr. mant. I. p. 22. n. 45.*  
*Habitat in - - - parvus, nitidus, thorace punctato,*  
*elytris substriatis.*

erians. 247. *Sc. testaceus, thorace maculis duabus nigris, pedibus*  
*rufis. Fabr. sp. inf. I. p. 41. n. 35. mant. inf. I. p. 22. n. 43.*  
*Habitat in - - -*

Cardui. 248. *Sc. glaber viridi-æneus, abdomine rufo-cinereo villosa.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 21. n. 42.*  
*Habitat in Africæ carduo pyenocephalo, Sc. Frischii sta-*  
*tura, at paulo minor.*

Vitis. 249. *Sc. viridis, thoracis lateribus flavis. Fabr. sp. inf. I. p.*  
*41. n. 34. mant. inf. I. p. 21. n. 41.*  
*Scop. ent. carn. Scarabæus dubius.*  
*Voet coleoptr. t. 6. f. 56. 57.*  
*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 11.*  
*Habitat in Europæ & Americæ vite, Sc. Frischii valde*  
*affinis, varians elytris testaceis.*

Frischii. 250. Sc. nigro-æneus, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 41. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 21. n. 40.

*Frish inf.* 4. p. 29. t. 14.

*Voet coleoptr.* t. 6. f. 55. & t. 7. f. 58.

*Habitat in Germaniæ vite & rosa, in Brasilia, rarius elytris thoraci concoloribus.*

janthi- 421. Sc. obsolete violaceus, thoracis margine externo, ely-  
nus. tris, abdomine pedibusque testaceis, ano fusco violaceo  
femoribus anterieus violaceis. *Mus. Lesk. p.* 3. n. 62.

*Habitat in Europa, statura & magnitudine Sc. Fischii.*

coriarius. 422. Sc. fusco-violaceus, thorace fusco-luteo piloso, capitis  
clypeo apice reflexo, elytris testaceis. *Mus. Lesk. p.*  
4. n. 72.

*Habitat in Europa.*

holose- 251. Sc. supra viridis holosericeus subtus cupreus, elytris  
riceus. lineis elevatis quatuor. *Fabr. mant.* 1. p. 21. n. 39. †

*Habitat in Russia magis australi, Sc. Frischii statura & magnitudine.*

austria- 252. Sc. glaber, elytris fuscis: marginis exterioris plica  
eus. elevata, scutelli macula quadrata. *Schrank enum.*  
*inf. Austr. p.* 11. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4.  
p. 16. n. 12. t. 16. f. 26.

*Habitat in Australi, an varietas agricolæ?*

lætus. 253. Sc. supra glaber aureus, thoracis linea dorsali scutelloque  
sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 32. *mant. inf.*  
1. p. 21. n. 58.

*Habitat in nova Seelandia.*

festus. 254. Sc. supra glaber viridis, thorace linea dorsali, elytris  
futura nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 31. *mant.*  
*inf.* 1. p. 21. n. 37.

*Habitat in nova Seelandia.*

rufes- 255. Sc. glaber rufescens, elytris testaceis, clypeo quin-  
cens. quedentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 30. *mant. inf.*  
1. p. 21. n. 36.

*Voet coleoptr.* t. 19. f. 76.

*Habitat ad Caput bonæ spæ.*

obscurus. 256. Sc. obscure piceus immaculatus, pilis brevissimis erectis albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 40. n. 29. mant. inf. I. p. 21. n. 35.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, rufescentis magnitudine.*

erythro- 257. Sc. glaber pallidus, capite rubro basi nigro. *Fabr. sp. cephalus. inf. I. p. 40. n. 28. mant. inf. I. p. 21. n. 34.*

*Petagn. sp. inf. Calabr. p. 5. n. 18. f. XXXV.*

*Habitat in Calabria & Coromandel, melanocephalo affinis, at duplo minor.*

melano- 258. Sc. glaber rufescens, capite nigro, elytris pallidis. *Fabr. cephalus. sp. inf. I. p. 40. n. 27. mant. inf. I. p. 21. n. 33.*

*Voet coleopt. t. 9. f. 80.*

*Habitat in Brasilia.*

ferratus. 259. Sc. obscure testaceus, clypeo emarginato, thoracis margine ferrato. *Fabr. sp. inf. I. p. 35. n. 2. mant. inf. I. p. 19. n. 2.*

β) *Melolontha sibirica. Fabr. sp. inf. I. p. 35.*

*Habitat in Coromandel, melolonthæ magnitudine, β) triplo minor in Sibiria.*

Melolon- 68. Sc. scutellatus muticus testaceus, thorace villosa, cauda  
tha inflexa, incisuris abdominis albis. *Fn. succ. 392. \* Geoffr. inf. par. I. p. 70. n. 1. Scop. ent. carn. 16.*

*Fabr. sp. inf. I. p. 35. n. 3. mant. inf. p. 19. n. 3.*

*Melolontha ( vulgaris ) testacea, thorace villosa, incisuris abdominis albis.*

*Mouff. inf. 160. f. 2.*

*Lister scar. Angl. 379.*

*Aldrov. inf. 454. t. sup. f. 2.*

*Hoefn. inf. t. I. f. 11.*

*Godt. inf. I. t. 78.*

*Merian. europ. I. p. 2. f. 4.*

*Frisch inf. 4. t. 14.*

*Raj. inf. p. 104. n. 1.*

*Pet. gaz. t. 9. f. 2.*

*Alb. inf. 60.*

*Roef. inf. 2. scar. I. t. 1.*

*Leeuwenh. epist. I. p. 18.*

*Sulz. inf. t. I. f. 3.*

*Schaeff. elem. t. 8. f. 3. & t. 109. f. 5.*

*icon. t. 93. f. 1. 2.*

*Voet coleopt. t. 6. f. 45. 46.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 14.*

*Habitat*

*Habitat in Europæ parte magis boreali vulgatissimus, in Calabria quoque frequens, unguibus prope basin bidentatis, dente inferiori brevior, vespere circumvolitans, arborum foliis, illa tamen intacta, visitans, autumno copiosior morbos prænuncians, oleum insusum cimicifugum reddens, meleagridum gallinarum, vespertilionum gratus cibus, varians annuatim thoracæ rufo & nigro.*

*Mas cauda acuta inflexa distinctus; larva grisea, capite pedibusque testaceis, plantarum, segetis præsertim radicibus exedit, sexto demum anno exeunte scarabæo.*

solstitialis. 61. Sc. scutellatus muticus testaceus thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fn. suec. 393. \* Geoffr. inf. par. 1. p. 74. n. 7. Scop. ent. carn. 3. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 7. mant. inf. 1. p. 19. n. 9. Melolontha testacea, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus.*

*Mouff. inf. 160. f. 3.*

*Lister scar. angl. 301. n. 2.*

*Raj. inf. p. 105. n. 2.*

*Petiv. gaz. p. 36. t. 22. f. 9.*

*Frisch inf. 9. t. 15. f. 3.*

*Schæff. ic. t. 93. f. 3.*

*Voet coleopt. t. 6. f. 51. 52.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 15.*

*Habitat in Europæ arboretis, unguibus, ad basin unidentatis, melolontha serior, solstitio æstivo frequentissimus, an germinibus frumentaceorum, quorum radicibus larva rodit, inhaerendo, morbi epidemici Kriebelkrankheit causa?*

Tau ni- 411. Sc. nigricans subtus lunatus canescens, elytris pilis  
gram. albis brevissimis, scutello villoso albido T nigro inscripto.  
*Schranck Schr. eintr. Fr. 1. Wien II. 2. p. 6:*

*Habitat in Hungaria, unguibus medio unidentatis.*

lanugi- 412. Sc. unguibus bifidis, posterioribus minoribus poste-  
thorax. riorum unico. *Schranck Schr. eintr. Fr. 1. Wien II. 2. p. 7. n. 9.*

*Voet coleopt. t. 4. f. 31.*

*Habitat in Baviaræ montibus, ab hirtello distinctus.*

reflexus. 260. Sc. glaber testaceus, clypeo reflexo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 6. mant. inf. 1. p. 19. n. 7.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, fervido affinis, at paulo minor.*

- Alopex. 261. Sc. fulvo-hirtus, clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 19. n. 8.*  
*Habitat ad. Caput bonæ spei, reflexi statura.*
- fervidus. 262. Sc. testaceus glaber, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 36. n. 5. mant. inf. 1. p. 19. n. 6.*  
*Habitat in America septentrionali, quasi rere cærulefcente testus.*
- villosus. 263. Sc. testaceus, clypeo marginato reflexo, corpore subtus lanato, scutello albo. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 496. mant. inf. 1. p. 19. n. 4.*  
*Habitat in Italia, melolonthæ statura & magnitudine.*
- atomarius. 264. Sc. albo-farinosus, thorace canaliculato atro, elytris fuscis, abdomine albo: punctis lateralibus atris. *Fabric. sp. inf. 1. p. 43. n. 46. mant. inf. 1. p. 23. n. 59.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, farinosi statura & magnitudine.*
- farinosus. 64. Sc. scutellatus muticus niger, polline virescente, elytris abbreviatis. *Fn. succ. 399.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 43. n. 47. mant. inf. 1. p. 23. n. 60.* *Melolontha supra cæruleo-subtus argenteo-squamosa nitens, clypeo integro.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 79. n. 13.* Scarabæus violaceus.  
*Degeer inf. 4. p. 302. n. 30. t. 10. f. 23.* Scarabæus scutellatus niger, squamulis griseo-viridibus, &c.  
*Drury inf. 2. t. 32. f. 4.* Scarabæus cæruleus.  
*Voet coleoptr. 2. 9. f. 71.*  
*Habitat in Europa magis australi, unguibus posterioribus brevissimis.*
- argenteus. 265. Sc. niger, subtus argenteo-nitens, clypeo marginato, elytris testaceis. *Fabr. spec. inf. 1. p. 44. n. 48. mant. inf. 1. p. 23. n. 61.*  
*Scop. ent. carn. 9. Poda inf. 20.* Scarabæus argenteus.  
*Voet coleoptr. t. 8. f. 68.*  
*Habitat in Austria interiori, Calabria & frequens in Angliæ floribus.*

---

*Melolonthæ arborum foliis, cetonix etiam floribus visitant; nichil delectantur floribus, præsertim umbellatarum; melolontharum larva radicibus, cetoniarum ligno putrescente subacidulo visitat.*



probosci-266. Sc. niger hirtus, clypeo porrecto subreflexo, elytris  
deus. testaceis: margine nigro. *Fabr. sp. inf.* I. p. 44. n.  
49. *mant. inf.* I. p. 23. n. 62.

*Habitat in India; & Africæ floribus.*

spinipes. 267. Sc. niger immaculatus, pedibus posterioribus elongatis;  
femoribus basi unispinosis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 44. n.  
50. *mant. inf.* I. p. 23. n. 63.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura crassipedis.*

dentipes. 268. Sc. niger, elytris testaceis, clypeo quadridentato;  
femoribus tibiisque posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 44. n. 51. *mant. inf.* I. p. 23. n. 64.

*Habitat ad Caput bonæ spei; spinipedi affinis.*

podagri-269. Sc. niger, clypeo tridentato, femoribus tibiisque  
cus. posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 44. n. 52.  
*mant. inf.* I. p. 23. n. 65.

*Habitat in Coromandel, dentipedis statura.*

arthriti-270. Sc. niger, elytris griseis, clypeo tridentato, femoribus  
cus. tibiisque posterioribus incrassatis subinermibus. *Fabr.*  
*sp. inf.* I. p. 44. n. 53. *mant. inf.* I. p. 22. 23. n. 66.

*Habitat ad Caput bonæ spei, podagricæ minor.*

gonagri-271. Sc. griseus, pedibus rufis, femoribus posterioribus  
cus. incrassatis muticis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 45. n. 54.  
*mant. inf.* I. p. 24. n. 67.

*Habitat ad Caput bonæ spei; arthritico minor.*

crassipes. 272. Sc. ater albo-maculatus, pedibus posterioribus elon-  
gatis crassissimis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 45. n. 55. *mant.*  
*inf.* I. p. 24. n. 68.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

pulveru-273. Sc. corpore polline virescenti argenteo; elytris pedibus-  
lentus. que testaceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 45. n. 56. *mant. inf.*  
I. p. 24. n. 69.

*Sulz. hist. inf. t. I. f. 8.*

*Habitat in Asia & Russia; argenteo duplo minor.*

sylvicola. 274. Sc. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Fabr.*  
*sp. inf.* I. p. 45. n. 57. *mant. inf.* I. p. 24. n. 70.

*Habitat in nova Hollandia; elytris fuscis varians.*



subspino- 275. Sc. flavescens, pedibus rufis, thorace subspinoso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 45. n. 58. mant. inf. 1. p. 24. n. 71.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*

Bankii. 276. Sc. capite thoraceque atris, elytris villosis pedibusque testaceis, abdomine brevi retuso. *Fabr. mant. 1. p. 24. n. 72.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks, pulverulenti statura.*

aulicus. 65. Sc. scutellatus muticus pilosus luteus, capite nigro, pedibus posterioribus elongatis uniungiculatis.  
*Fabr. mant. 1. p. 22. n. 51. Melolontha (regia) villosa supra lutea, capite nigro, subtus cinerea.*  
*Habitat in Africa, horticolæ magnitudine & statura.*

abbreviatus. 277. Sc. villosus niger, clypeo tridentato, elytris abbreviatis testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 45. n. 59. mant. inf. 1. p. 24. n. 73.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, pilis aliquot albis hirtus.*

mutabilis. 278. Sc. ater, tomento cinereo villosus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 45. n. 60. mant. inf. 1. p. 24. n. 74.*  
*Vet. coleoptr. t. 9. f. 75.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

chryso- 279. Sc. ater, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque melinus. testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 61. mant. inf. 1. p. 24. n. 75. Schranck inf. austr. 16. n. 25.*  
*Habitat in Americæ borealis, Germaniæ ligno putrescente.*

versicolor. 280. Sc. obscure æneus, elytris tomento cinereo nitidulis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 62. mant. inf. 1. p. 24. n. 76.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*

capicola. 281. Sc. niger hirtus, scutello abdomineque albidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 63. mant. inf. 1. p. 24. n. 77.*  
*Vet. coleoptr. t. 9. f. 75.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parvus.*

picatus. 282. Sc. glaber ferrugineus, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 64. mant. inf. 1. p. 24. n. 78.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura capicolæ.*

lineatus. 283. Sc. obscure virefcens, elytris lineis duabus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 65. mant. inf. 1. p. 24. n. 79.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, parvus, gibbus.*

- gibbus. 284. *Sc. gibbus testaceus, tomento cinerasciente nitidulus. Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 66. mant. inf. 1. p. 24. n. 80. Habitat ad caput bonæ spei, lineato magis gibbus.*
- monti- 285. *Sc. testaceus glaber, capite atro, clypeo integro reflexo. Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 67. mant. inf. 1. p. 24. n. 81. Habitat in nova Hollandia.*
- cola. 286. *Sc. ater, elytris basi punctoque medio pallidis. Fabr. sp. inf. 1. p. 46. n. 68. mant. inf. p. 24. n. 82. Habitat in Europæ graminosis.*
- hume- 287. *Sc. ater hirsutissimus, pedibus quatuor anterioribus ralis. testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 69. mant. inf. 1. p. 24. n. 83. Habitat ad Caput bonæ spei, pedibus aliquando omnibus nigris.*
- Ursus. 288. *Sc. niger hirtus, elytrorum margine aureo. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 70. mant. inf. 1. p. 24. n. 84. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Lynx. 66. *Sc. scutellatus muticus atro-cyaneus, pedibus nigris, posterioribus elongatis uniunguiculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 71. mant. inf. 1. p. 24. n. 85. Melolontha (crinita) hirta, supra viridis, subtus nigra. Pall. ic. inf. Ross. t. A. f. 17. Scarabæus bombyliiformis. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- longipes. 289. *Sc. hirtus, capite thoraceque viridibus, elytris fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 72. mant. inf. 1. p. 25. n. 86. Pall. ic. inf. Ross. t. A. f. 15. Scarabæus Alopecias. Habitat in Sibiria.*
- hirtus. 290. *Sc. aureus fulvo hirtus, abdomine ferrugineo. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 73. mant. inf. 1. p. 25. n. 87. Habitat in Sibiria.*
- Vulpes. 291. *Sc. niger cinereo hirtus, elytris testaceis: lineis tribus apicis albidis. Fabr. mant. inf. 1. p. 25. n. 88. Habitat in Africæ plantis, vulpis magnitudine & statura.*
- bomby- 292. *Sc. cyaneus pilosus, elytris testaceis: lineis tribus lius. albicantibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 47. n. 74. mant. inf. 1. p. 25. n. 89. Lepechin it, 1. p. 508. t. 16. f. 9. Scarabæus acuminatus.*
- vittatus.

*Pall. it. 1. p. 462. n. 26. icon. inf. Ross. 1. p. 14. t. A. f. 14.*

*Scarabæus oxypetris.*

*Petr. garoph. t. 11. f. 12.*

*Poet coleopt. t. 5. f. 35.*

*Habitat in America australi & India.*

*pinaculus.* 293. *Sc. oblongus glaber testaceus, thorace utrinque macula abdomineque flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 19. n. 10.*  
*Habitat in Sina, solstitiali maxime affinis.*

*atriplex.* 294. *Sc. oblongus villosus pallidus, elytris sutura apiceque nigris, clypeo reflexo. Fabr. mant. 1. p. 19. n. 11.*  
*Habitat in Barbariæ atriplex halimifolia, ruficornis statura & magnitudine.*

*ruscor-nis.* 295. *Sc. villosus testaceus, abdomine albicante. Fabr. sp. inf. 1. p. 37. n. 8. mant. pl. 1. p. 20. n. 12.*  
*Habitat in Germania, an varietas solstitialis?*

*terre.* 296. *Sc. oblongus glaber niger, elytris obsolete striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 37. n. 9. mant. inf. 1. p. 20. n. 13.*  
*Scop. ent. carn. 19. Scarabæus oblongus.*  
*Habitat in Germania superiore, an ab oblongo diversus?*

*lanigerus.* 67. *Sc. scutellatus muticus, subtus lanatus, capite thoraceque lanatis, elytris luteis. Mus. Lud. Ulr. 20.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 37. n. 10. mant. inf. 1. p. 20. n. 14.*  
*Melolontha (lanigera) subrus lanata, capite thoraceque aureis, elytris luteis.*

*brunneus.* 72. *Sc. scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 26. mant. inf. 1. p. 21. n. 32.*  
*Melolontha (brunnea) glabra testacea, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.*  
*Goeffr. inf. par. 1. p. 83. n. 22. Degeer inf. 4. p. 277. n. 23. t. 10. f. 17. Scarabæus fulvus.*  
*Poet. coleopt. t. 7. f. 53. 54.*  
*Habitat in Europæ arboreis.*

*signatus.* 297. *Sc. glaber pallidus thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 25.*  
*mant. inf. 1. p. 21. n. 31.*  
*Habitat in Jamaica, ruficollis magnitudine.*

- ruficollis. 298. Sc. glaber punctatus ferrugineus, elytris testaceis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 24. mant. inf. 1. p. 21. n. 30.*  
*Habitat in Coromandel, brunneo major.*
- pallens. 299. Sc. glaber testaceus, capite elytrorumque futura nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 23. mant. inf. 1. p. 21. n. 29.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 13. n. 4. t. 19. f.*  
 21. a. b. *Melolontha spinipes.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in India, solstitiali similis.*
- hirticollis. 300. Sc. hirtus niger, elytris punctatis glabris rufis. *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 21. n. 28.*  
*Habitat in Africa, fusci magnitudine.*
- fuscus. 301. Sc. glaber testaceus, capite obscuriore, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 22. mant. inf. 1. p. 20. n. 27.*  
*Habitat in Terra del fuego.*
- tristis. 302. Sc. thorace villosa obscuro, elytris lævibus testaceis,  
 scutello albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 21. mant. inf.*  
*1. p. 20. n. 26.*  
*Habitat in America boreali, fusco affinis.*
- striatus. 303. Sc. glaber æneus, elytris striatis: futura lineisque  
 quatuor cupreis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 20. mant.*  
*inf. 1. p. 20. n. 26.*  
*Habitat in Terra del fuego.*
- luridus. 304. Sc. thorace nigro: margine pallido, elytris griseis  
 nigro-punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 19. mant.*  
*inf. 1. p. 20. n. 24.*  
*Habitat . . .*
- Glacialis. 305. Sc. glaber piceus, antennis pedibusque testaceis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 18. mant. inf. 1. p. 20. n. 23.*  
*Habitat in Terra del fuego.*
- dorsalis. 306. Sc. glaber testaceus, capite, thoracis elytrorumque  
 dorso nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 17. mant. inf. 1.*  
*p. 20. n. 22.*  
*Habitat Tranquebariæ.*
- bicolor-  
 ratus. 307. Sc. glaber viridis, subtus testaceus, pedibus apice  
 aureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 16. mant. inf. 1. p.*  
*20. n. 21.*  
*Voet. coleoptr. t. 8. f. 66.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- futura- 308. Sc. viridis, elytrorum futura flavescente. *Fabr. sp.*  
 rus. *inf. 1. p. 38. n. 15. mant. inf. 1. p. 20. n. 20.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- æratuſ, 309. Sc. glaber æneus, abdominis lateribus albis, elytris  
 acuminatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 14. mant. inf.*  
*1. p. 20. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- viridis. 310. Sc. glaber, supra viridis, subtus aureus. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 38. n. 13. mant. inf. 1. p. 20. n. 18.*  
*Habitat ad Caput bonæ ſpei.*
- glabra- 311. Sc. testaceus nitidus, ſterno anterieus porrecto obtuſo.  
 tus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 12. mant. inf. 1. p. 20. n. 17.*  
*Habitat in America aſtrali & India.*
- puncta- 76. Sc. ſcutellatus muticus testaceus, elytris punctis tribus  
 tus. ſubſuſcis obſoletis diſtantibus. *Muf. Lud. Ulr. 23. \**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 11. mant. inf. 1. p. 20. n. 16.*  
*Melolontha testacea, elytris punctis tribus ſuſcis diſ-*  
*tantibus.*  
*Gron. zooph. 438.*  
*Drury inf. 1. t. 34. f. 5.*  
*Voet coleoptr. t. 8. f. 65.*  
*Habitat in America, lævis, aurati magnitudine, un-*  
*guibus arcuatis acutiſſimis.*
- longicor- 312. Sc. ſupra glaber niger, elytris ferrugineis, antenna-  
 nis. rum clava elongata. *Fabr. mant. inf. 1. p. 20. n. 15.*  
*Habitat ad Caput bonæ ſpei, lanigeri ſtatura & magni-*  
*tudine.*
- unicolor. 313. Sc. totus ſpadiceus lævis, elytris punctis impreſſis.  
*Herbſt apud Fueſſi Arch. Inf. 7. p. 154. n. 18. t. 43.*  
*f. 5.*  
*Habitat in India, brunno ſimilis, at quadruplo major.*
- ciliatus. 314. Sc. niger ſubtus piloſus, elytris villoſis & thorace  
 poſterius pilis longis albis ciliato punctatis. *Herbſt apud*  
*Fueſſi Arch. Inf. 7. p. 155. n. 19. t. 43. f. 6.*  
*Habitat in India, antennis ad fullonem accedens, his*  
*pedibusque ſuſcis.*
- pelluci- 315. Sc. holocericeus obſcurus albo-obumbratus, elytris  
 dus. coſtatis. *Sulz. hiſt. inf. t. 1. f. 9.*  
*Herbſt apud Fueſſi Arch. Inf. 7. p. 155. n. 21. Melon-*  
*lontha Berolinenſis.*  
*Voet coleoptr. t. 21. f. 150.*



*Habitat in Germania & Helvetia, brunno similis, at brevior, magisque rotundatus & convexus.*

cerealis. 316. *Sc. scutellatus, subtus hirsutus, abdominis latere utroque albo-maculato. Scop. delic. insubr. I. p. 49. t. 21. f. B. a. b. c.*

*Habitat in Insubria, sub initium æstatis vespere frequens in cæli australi aliisque arboribus, melolonthæ valde affinis.*

sinuatus. 317. *Sc. exscutellatus niger, tibiis toto margine exteriori denticulatis. Scop. delic. insubr. I. p. 52. t. 21. f. E.*

*Habitat in agro Ticinensi, glaber, totus niger, supra punctulatus.*

fuscescens. 318. *Sc. scutellatus fuscescens, scutello lineola transversa duplicata, tibiis posterioribus quadridentatis. Scop. delic. insubr. I. p. 53. t. 21. f. F.*

*Habitat in Insubria, frequens inter segetes, æstate in arboribus, statura solstitialis, supra badius, subtus villis longioribus & rufescentibus hirsutus.*

deserti. 322. *Sc. supra nigricans, subtus lanugine alba obsitus, elytris corpore brevioribus, scutello triangulari viloso albo. Lepech. it. I. p. 313. t. 19. f. 7.*

*Habitat in deserto Sibiricæ uralensi, 9 lineas longus, an hujus tribus?*

sepicola. 55. *Sc. scutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque pilosis. Mus. Lud. Ulr. 24.\**

*Habitat in India, habitu horticola, at triplo major.*

lyriacus. 56. *Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. Mus. Lud. Ulr. 25.\**

*Habitat in India, horticola statura.*

Leei. 427. *Sc. scutellatus muticus cæruleus nitidissimus, capitis disco, thoracis fascia interrupta, elytrorumque vittis quatuor aureis. Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 4.*

*Habitat in India, facie sc. vitis, at duplo fere major.*

bivittatus. 428. *Sc. flavus nitidissimus, capite thoraceque vittis duabus communibus, elytris striis plurimis abbreviatis viridibus. Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 5.*

*Habitat in Brasilia, servida facie, at paulo minor.*



++ *mandibula recta.*a) *acuta*, *Cetoniæ*.

- Chrysis*. 49. *Sc. scutellatus muticus*, sterno porrecto, scutello elytris dimidio brevior. *Mus. Lud. Ulr.* 21.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 52. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 15.  
*Cetonia* scutello elytris dimidio brevior, sterno porrecto, corpore viridi.  
*Degeer inf.* 4. p. 319, n. 12. t. 19. f. 4. *Scarabæus*, scutello longissimo, &c.  
*Gron. zooph.* p. 428. t. 15. f. 8.  
*Sulz. hist. inf.* t. 1. f. 10.  
*Voet coleopt.* t. 8. f. 63.  
*Habitat in America magis australi, aurati colore & magnitudine.*
- furina-* 50. *Sc. scutellatus muticus niger*, thoracis incisurarumque  
*mus.* marginibus flavis, sterno porrecto. *Amæn. ac.* 6. p. 391.\*  
*Habitat Surinami.*  
*Caput linea flava, abdominis segmentum ultimum maculis 3-4 flavis pictum.*
- nitidus.* 51. *Sc. scutellatus muticus* thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto. *Mus. Lud. Ulr.* 26.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 52. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 13. *Cetonia* thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno cornuto.  
*Degeer inf.* 4. p. 321. n. 16. t. 19. f. 8. 9. *Scarabæus* scutello minimo, &c.  
*Gron. zooph.* 455.  
*Drury inf.* 1. t. 33. f. 5. 6.  
*Roes. inf.* 2. *Scar.* 1. t. B. f. 4.  
*Voet coleopt.* t. 3. f. 23.  
*Habitat in America, præsertim Carolina.*
- Carmeli-* 323. *Sc. nigro-viridis*, thorace elytrisque testaceis, ano  
*ta.* albo bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 28. n. 14.  
*Habitat in Africa, statura nitidi, capite nigro.*
- quadri-* 324. *Sc. niger*, ano bipunctato, pedibus rufis: tibiis posterioribus spinis annulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 27. n. 12.  
*punctatus.* *Habitat in India, antennis pedibusque ferrugineis.*
- areatus.* 325. *Sc. niger pubescens*, elytris disco rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 31. n. 59.  
*Habitat in Virginia.*

- fruenta- 326. *Sc. niger*, elytris viridibus nitidis, thoracis margine  
 tus. anoque rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 59. n. 48. mant. inf.*  
*I. p. 31. n. 58.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- acumina- 327. *Sc. obscure æneus pallido-maculatus*, elytris acumi-  
 tus. natis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 47. mant. inf. I. p.*  
*31. n. 57.*  
*Voet coleoptr. t. 4. f. 37.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- macula- 328. *Sc. æneus nitidus*, thorace utrinque macula, elytris  
 rus. plurimum albis, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf. I. p. 58.*  
*n. 46. mant. inf. I. p. 31. n. 36.*  
*Voet coleoptr. t. 1. f. 8. Antheus.*  
*Habitat in Coromandel, acuminati statura.*
- holatus. 329. *Sc. viridi-fuscus*, thorace margine punctisque, elytris  
 fascia media maculisque niveis potterius acuminatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 45. mant. inf. I. p. 31. n. 55.*  
*Habitat in nova Holandia.*
- philip- 330. *Sc. æneus nitidus*, thorace margine punctisque duobus  
 penfis. albis, elytris maculatis acuminatis. *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 58. n. 44. mant. inf. I. p. 30. n. 54.*  
*Habitat in insulis Philippinis.*
- aurichal- 331. *Sc. æneus opacus*, elytris acuminatis albo-maculatis  
 ceus. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 43. mant. inf. I. p. 30. n. 53*  
*Habitat prope Surate Indiæ.*
- fordens. 332. *Sc. nigro-æneus*, elytris lineis duabus elevatis albo-  
 que maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 42. mant. inf.*  
*I. p. 30. n. 52.*  
*Habitat in Brasilia.*
- tetradac- 333. *Sc. scutellatus muticus niger*, pedibus triunguicu-  
 tylus. latis, pollice fixo. *Mont. pl. p. 530.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 41. mant. inf. I. p. 30. n. 51.*  
*Cetonia atra*, scutello elytris dimidio brevior, pedi-  
 bus triunguiculatis: pollice fixo.  
*Drury inf. I. t. 33. f. 7.*  
*Sloan. jam. 2. 237. f. 2.*  
*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.*

- orichal- 88. *Sc. scutellatus muticus æneus glaber, subtus ferrugineus.*  
*varius. Syst. nat. T. III. app. p. 224.*  
*Habitat in India.*
- gagates. 334. *Sc. ater nitidus, clypeo truncato reflexo, sterno obtuso. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 40. mant. inf. 1. p. 30. n. 50. Forster cent. inf. 6. 6.*  
*Habitat in Sierra Leona Africæ.*
- Iris. 335. *Sc. viridis nitidissimus fusco-micans immaculatus. Fabr. spec. inf. 1. p. 57. n. 39. mant. inf. 1. p. 30. n. 40.*  
*Habitat Surinami, fulgidi magnitudine, sterno porrecto.*
- fulgidus. 336. *Sc. æneus nitidissimus, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 38. mant. inf. 1. p. 30. n. 48.*  
*Voet. coleoptr. t. 3. f. 24 ?*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*
- tricolor. 337. *Sc. viridi-æneus hirtus, elytris testaceis : vitta media nigra futuraque ænea. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 39. mant. inf. 1. p. 30. n. 47.*  
*Voet. coleoptr. t. 7. f. 60.*  
*Habitat in America.*
- quadrico- 338. *Sc. thorace nigro : margine rufo, elytris æneis nitidis : futura nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 38. mant. inf. 1. p. 30. n. 46.*  
*Habitat in Africa.*
- africanus. 339. *Sc. æneus nitens, capitis spina incumbente, sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 35. mant. inf. 1. p. 30. n. 45.*  
*Drury inf. 2. t. 30. f. 4.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*
- venereus. 340. *Sc. cupreus nitidus, thorace scutello elytrisque viridibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 34. mant. inf. 1. p. 30. n. 44.*  
*Herbst Arch. Inf. 7. p. 156. n. 10. Cetonia æruginea.*  
*Voet. coleoptr. t. 4. f. 26.*  
*Habitat in Jamaica.*
- æthiopi- 341. *Sc. viridis fulvo micans, elytris maculis duabus nigris, sterno obtuso. Fabr. sp. inf. 1. p. 56. n. 37. mant. inf. 1. p. 30. n. 43.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali.*

- elegans. 342. *Sc. viridis nitidissimus*, elytrorum futura punctoque apicis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 42.  
*Habitat in Coromandel, aurati magnitudine.*
- speciosissimus. 343. *Sc. scutellatus aurato-viridis*, punctulatus lævis, tibiis interno latere rufo-ciliatis : posterioribus edentatis bispinosis. *Scop. delic. insubr.* p. 48. t. 21. f. A. a. b.  
*Habitat . . . Eremita major, aurato affinis, at corpore utrinque splendidissimo, thoracis foveis nullis, abdomine posterius non punctato, ejusque segmento primo absque lateribus unidentatis distinctus.*
- coruscans. 344. *Sc. cyaneus*, thoracis margine elytrisque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 41.  
*Voet. coleoptr.* t. 8. f. 62.  
*Habitat in India.*
- limbatus. 345. *Sc. niger*, thoracis margine ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 40.  
*Habitat in Ægypto.*
- fuliginosus. 346. *Sc. scutellatus niger*, supra opacus, subtus nitens, segmento femorali in dentem exeunte. *Scop. delic. insubr.* 1. p. 51. t. 21. f. D. b.  
*Habitat Paviæ in hortis, campis, frequens in floribus onopordi acanthii, statura nobilem simulans.*
- quinque-lineatus. 347. *Sc. niger* thorace quinquelineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo spinaque incumbente. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 39.  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*
- femipunctatus. 348. *Sc. viridis nitidus*, thorace quadrilineato, elytris basi lineatis, apice punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 29. n. 38.  
*Habitat . . . mediæ magnitudinis, subtus albo villosus.*
- trilineatus. 349. *Sc. niger*, thorace lineis tribus, elytris fascia flexuosa scutelloque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 37.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- siclus. 350. *Sc. niger*, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 36.  
*Habitat in Oriente.*

olivaceus. 351. Sc. testaceus, thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transversis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 35.  
*Habitat in Sierra Leona Africa.*

thoraci- 352. Sc. niger, thorace ferrugineo, elytris nigris subpur-  
 cus. purascentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 34.  
*Habitat Alexandria in Ægypto.*

alexan- 353. Sc. niger, thoracis margine elytrisque testaceis, elytris  
 drinus. futura fasciaque dentata nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 33.  
*Habitat Alexandria in Ægypto.*

sinuosus. 354. Sc. fusco-viridis, thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 32.  
*Degeer inf.* 7. p. 639. n. 38. t. 47. f. 20. Scarabæus punctato-marginatus.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

Ephip- 355. Sc. niger, thoracis margine lineaque dorsali, elytris  
 pium. macula difformi ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 29. n. 31.  
*Voet coleoptr.* t. 9. f. 81.  
*Habitat in India, lineolæ statura & magnitudine.*

lineola. 53. Sc. muticus niger, lineola flava a capite ad scutellum ducta. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 30.  
*Degeer inf.* 4. p. 320. n. 13. t. 13. f. 5. Scarabæus scutellatus niger nitidus flavo-maculatus, &c.  
*Roef. inf.* 2. *Scar.* 1. t. B. f. 7.  
*Voet coleoptr.* t. 9. f. 81.  
*Habitat in America, stercorario minor.*

fisticus. 54. Sc. scutellatus muticus niger glaber, punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quatuor albis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 18. n. 5. t. 19. f. 27.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 31. n. 61.  
 Cetonia clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 79. n. 14. Scarabæus nigro-carnilescens, &c.  
*Raj. inf.* p. 104. n. 8.  
*Habitat in Gallia & Cylabria carduis;*



- funestus*. 356. Sc. glaber niger, thorace elytrisq[ue] albo-punctatis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 31. n. 62. Scop. ent. carn. 7.*  
*Habitat in Carniola & Italia, mediæ magnitudinis.*
- thebanus*. 357. Sc. niger, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris  
albo punctatis, dorso rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 59. n. 52. mant. inf. 1. p. 31. n. 64. Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 1. f. 8. & apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 18. n. 6. t. 19. f. 28.*  
*Habitat in Ægypto.*
- floralis*. 358. Sc. glaber niger, thoracis, elytrorum abdominisq[ue]  
margine albo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 31. n. 63.*  
*Habitat in Africæ floribus compositis, satis magnus.*
- lugubris*. 359. Sc. glaber ater, elytris macula laterali anoque albis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 53. mant. inf. 1. p. 31. n. 65.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- histrio*. 360. Sc. testaceus, capite, thoracis lineis duabus, elytrorum  
futura maculisq[ue] tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 54. mant. inf. 1. p. 31. n. 66.*  
*Habitat in Ægypto.*
- albellus*. 361. Sc. ater, thorace, margine elytrisq[ue] maculis sparsis  
albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 55. mant. inf. 1. p. 31. n. 67. Pall. it. 1. p. 462. n. 17. ic. inf. Ross. 1. p. 17. t. A. f. 18.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 18. n. 7. t. 19. f. 29.*  
*Habitat Tranquebariæ.*
- hottentottus*. 362. Sc. ater glaber, elytris posterius punctis duobus albis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 56. mant. inf. 1. p. 31. n. 68.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- cruentus*. 363. Sc. ater glaber, thorace posterius maculis duabus  
elytrisq[ue] vitta sanguineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 32. n. 69.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks, statura hottentotti.*
- equalidus*. 68. Sc. scutellatus muticus niger hirtus, thorace subca-  
rinato. *Scop. ent. carn. 13.*  
*Voet coleopt. t. 4. f. 33.*  
*Habitat in Germania, hirtello semillimus, an varietas?*
- hiatellus*. 69. Sc. scutellatus muticus hirtus testaceo-nigricans, elytris  
pallido-maculatis.



*Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 31. n. 60. *Cetonia* (*hirta*) *nigricans hirta* elytris pallido maculatis, thorace carinato.

*Scop. ent. carn.* 8. *Poda inf.* 21. *Scarabæus hirtus*.

*Voet coleoptr. t.* 4. f. 34.

*Habitat in Europa magis australi, vere etiam frequens in omnibus desertis Volgæ finitimis ad Terék usque, vitis ibi gemmas foliiferas & floriferas exedens, fasciato dimidio minor.*

afer. 364. *Sc. viridis*, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 29. *Habitat in Sierra Leon Africa.*

marginatus. 365. *Sc. glaber ater*, thoracis elytrorumque marginibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 28.

*Drury inf.* 2. t. 32. f. 1.

*Voet coleoptr. t.* 1. f. 4.

insignitus. 366. *Sc. thorace nigro*: margine albo, elytris testaceis: futura margineque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 27.

*Voet coleoptr. t.* 2. f. 13.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

capensis. 73. *Sc. scutellatus muticus rufus hirtus*, adspersus punctis albis. *Mus. Lud. Ulr.* 30. \*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 26. *Cetonia hirta rufa albo-punctata.*

*Degeer inf.* 7. p. 640. n. 40. t. 48. f. 2. *Scarabæus albo-punctatus.*

*Petiv. gaz. t.* 8. f. 6.

*Roef. inf.* 2. scar. 1. t. B. f. 6.

*Drury inf.* 1. t. 33. f. 3.

*Voet coleoptr. t.* 2. f. 11.

*Habitat in Africa.*

cafer. 367. *Sc. viridis nitidus*, thoracis margine elytrorumque maculis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 25.

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus, punctis inter oculos 2. albis.*

Eremita. 74. *Sc. scutellatus æneo-ater*, thorace inæquali, thorace sulco longitudinali. *Scop. ent. carn.* 15. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 23.

*Degeer*

*Degeer inf.* 4. p. 300. n. 28. t. 10. f. 22. Scarabæus coriarius, &c.

*Voet coleoptr.* t. 3. f. 21. Scarabæus lugubris.

*Roef. inf.* 2. Scar. 1. t. 3. f. 8.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 1.

*Schæff. ic.* t. 26. f. 1.

*Habitat in pyri, salicis truncis-putridis, recens corium rufum olens.*

fascicula- 75. Sc. scutellatus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *Mus. Lud. Ulr.* 26.\*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 16. mant. inf. 1. p. 28. n. 24.

*Drury inf.* 1. t. 33. f. 2.

*Voet coleoptr.* t. 3. f. 17.

*Habitat ad Caput bonæ spei, subtus lana helvola infuscatus digesta vestitus.*

Imarag- 368. Sc. ferrugineo-flavescens, elytris virescentibus, sterno dinus. cornuto. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 14. mant. inf. 1. p. 28. n. 22.

*Habitat in America.*

mœstus. 369. Sc. piceus, abdominis segmentis margine albis; clypeo emarginato, sterno cornuto. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 13. mant. inf. 1. p. 28. n. 21.

*Habitat in America boreali.*

aterri- 370. Sc. niger obscurus, elytris obsolete rufo-maculatis. *Fabr. mus. sp. inf.* 2. app. p. 496. mant. inf. 1. p. 28. n. 19.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura lanii.*

corniger. 371. Sc. niger obscure immaculatus, thoracis margine anteriori subcornuto. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 496. mant. inf. 1. p. 28. n. 20.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura aurati.*

ruberr. 372. Sc. scutellatus ruber, elytris nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 12. mant. inf. 1. p. 28. n. 18.

*Roef. inf.* 2. Scar. 1. t. B. f. 3.

*Voet coleoptr.* t. 2. f. 16.

*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

Lanius. 77. Sc. exscutellatus muticus ruber, adspersus punctis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 52. n. 11. mant. inf. 1. p. 28. n. 17.

*Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 7. 8.

*Drury inf.* 1. t. 33. f. 8.

*Voet coleoptr.* t. 5. f. 44.

*Habitat in america meridionali.*

S. Fran- 373. *Sc. piceus*, thoracis margine flavescente, sterno porrecto. cisci.

*Fabr. mant. inf.* 1. p. 28. n. 16.

*Habitat in India, statura chrysis.*

micans. 374. *Sc. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anterioribus ferratis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 50. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 1.

*Drury inf.* 1. t. 32. f. 3.

*Habitat in Sierra Leona Africae.*

finensis. 375. *Sc. æneus*, clypeo emarginato subspinoso, thorace posterius lobato, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 50. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 2.

*Forster cent. inf.* 2. 2.

*Voet coleoptr.* t. 5. f. 40.

*Habitat in Sina.*

nigrita. 376. *Sc. glaber ater*, clypeo emarginato subspinoso, thorace posterius lobato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 50. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 3.

*Hermann. mus.* p. 17. n. 257.

*Petiv. garoph.* t. 28. f. 3.

*Habitat in Zeylon.*

auratus. 28. *Sc. scutellatus auratus*, segmento abdominis primo lateribus unidentato, clypeo planiusculo. *Fn. suec.* 400. *Scop. ent. carn.* 17.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 50. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 4.

*Cetonia aurata*, segmento abdominis primo lateribus unidentato, elytris albo maculatis.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 73. n. 5.

*Hoeffn. pict.* t. 6. f. prior.

*Frisch inf.* 12. 25. t. 3. f. 1.

*Raj. inf.* p. 76. n. 7.

*Roes. inf.* 2. scar. 1. t. 2. f. 8. 9.

*Degeer inf.* 4. p. 279. n. 25. t. II. f. 1. *Scarabæus Smaragdus.*

*Bergstr. nomencl.* 1. 14. n. 5. 6. 7. t. 2. f. 5. 6. 7.

*Schaeff. icon.* t. 26. f. 2. 3. 7. & t. 50. f. 8. 9.

*Voet coleoptr.* t. 1. f. 1. 2. 3.

*Drury inf.* 1. t. 33. f. 1.

*Pet. gaz. t. 23. f. 12.*

*Worm musf. 342.*

*Ammir. inf. t. 12.*

*Habitat, magnitudine et colore varius, in Europa, larvâ in lignis putrescentibus, & formicarum acervis, imago in floribus, præsertim pæoniæ, sorbi aucupariæ, tacta per anum ejicit liquorem fauidissimum.*

*Sternum porrectum; pectoris latera posterius in dentem terminata.*

**Morio.** 377. *Sc. niger obscurus, corpore subtus nitidiorè. Fabr. sp. inf. 1. p. 51. n. 5. mant. inf. 1. p. 27. n. 6.*

*Voet coleoptr. t. 2. f. 14.*

*Habitat in Europa australi, aurato proxime affinis.*

**opacus.** 378. *Sc. obscure viridis opacus, capitis clypeo reflexo. Fabr. mant. inf. 1. p. 27. n. 5.*

*Habitat in Africæ floribus compositis, aurati magnitudine & statura.*

**erythro-**  
**pus.** 379. *Sc. niger, capitis clypeo porrecto basi utrinque sinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. Fabr. mant. 1. p. 27. n. 7.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, morionis statura & magnitudine.*

**variabi-**  
**lis.** 79. *Sc. scutellatus lævis opacus ater, elytris albo-punctatis. Fn. succ. 402. \**

*Fabr. mant. 1. p. 27. n. 11. Cetonía (octopunctata) nigra, thorace punctis quatuor albis.*

*Degeer inf. 4. p. 301. n. 29. t. 10. f. 22. Scarabæus albo-punctatus.*

*Schæff. ic. t. 198. f. 8.*

*Voet coleoptr. t. 5. f. 41.*

*Habitat in Germaniæ & Sibiricæ quercubus, colore rubro & aurco varians; mas quintuplo minor.*

**ærugino-**  
**fus.** 80. *Scutellatus auratus supra viridis. Gron. musf. 424. t. 15. f. 7.*

*Habitat in regno Tunetano & Calabriæ lentisco, statura aurati.*

**cordatus.** 380. *Sc. niger, thorace utrinque puncto bafeos elytrisque duobus flavis. Fabr. mant. 1. p. 27. n. 10.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 51. n. 7. Cetonía octopunctata.*

*Habitat...*

Lundii. 381. Sc. ater nitidus, capitis clypeo cordato. *Fabr. mant. I. p. 27. n. 9.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

nobilis. 81. Sc. scutellatus lævis auratus, abdomine posteriorius albo-punctato. *Fn. suec. 401. \* Scop. ent. carn. 18.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 51. n. 6.* Cetonia aurata, abdomine postice albo-punctato, elytris rugosis.  
*Fabr. mant. I. p. 27. n. 8.* Cetonia cuspidata.  
*Udm. diff. I.* Scarabæus viridi æneus, thorace fulcato, elytris rugosis.  
*Degeer inf. 4. p. 297. n. 26.* Scarabæus viridulus, &c.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 73. n. 6.*  
*Roes. inf. 2. scar. I. t. 3. f. 1-5.*  
*Schaeff. icon. t. 66. f. 5.*  
*Voet coleopt. t. 4. f. 28.*  
*Habitat in Europa, larva (grisea, capite sanguineo, pedibus flavescentibus,) in ligno putrescente, imago in floribus præsertim umbellatarum.*

æneus. 82. Sc. scutellatus oblongus cyaneus glaber, abdomine testaceo, capitis apice tridentato. *Mus. Lud. Ulr. 29. \**  
*Habitat - - - brunni magnitudine, subtus pubescens.*

cæruleus. 382. Sc. glaberrimus glaucus, elytris chalybeis punctato-striatis, maculis quinque albis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 19. n. 8. t. 19. f. 30.*  
*Habitat in India.*

metall- 383. Sc. viridis auratus, subtus violaceus, annulis abdominis  
 cus. quatuor macula alba notatis. *Herbst apud Fuesli n. ent. Mag. I. p. 314.*  
*Habitat in Europa.*

bimucro- 384. Sc. testaceus, tibiis anterioribus majoribus barbatis,  
 natus. clypeo utrinque mucronato, villis fimbriato. *Pall. ic. inf. Ross. I. p. 13. n. 13. t. A. f. 13.*  
*Habitat in Amboina, habitu longimanus, eremita duplo major.*

aureolus. 385. Sc. depresso-subangulatus, polline aureolus, thorace elytrisque nigro-punctatis. *Pall. ic. inf. Ross. I. p. 18. t. A. f. 20.*  
*Habitat in Dauria, Junio in rheo compado florente frequens, farinoso affinis, an hujus tribus?*

glaucus. 386. Sc. cylindraceus, totus testaceus glaber, commissura thoracis pallido-villosa, abdomine glauco. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 19. t. B. f. A. 22.*

*Habitat in fabuletis Anketeri inter Cumam & Caucasum, vere frequens fullonis magnitudine.*

sanguino- 387. Sc. depresso-angulatus niger, thorace supra elytrisque  
lentus. disco rubris, punctis elytrorum abdominisque crebris  
albis. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 21. t. B. f. A. 24.*

*Habitat in America boreali, stitici forma & magnitudine.*

pulcher. 429. Sc. thorace elytrisque pulchre variegatis lævibus, capite nigro : spina incumbente. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 6.*

*Habitat in insula Tobago, marginati facie & magnitudine, subius totus, antennis pedibusque ater.*

trivitta- 430. Sc. thorace vittis tribus albidis, elytris flavo-testaceis :  
tus. futura limboque nigro, hoc albo maculato. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 7.*

*Habitat in Sierra Leon Africae, aurato paulo minor, & magis depressus.*

subfascia- 431. Sc. scutellatus muticus niger opacus, elytris fasciis  
tus. quatuor lateralibus abbreviatis fulvis : posteriori maxima. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 8.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, aurato paulo minor & magis depressus.*

scabrius- 432. Sc. aureo-niger, elytris anterieus glabris posterius sca-  
culus. briusculis : linea elevata glabra abdomine utrinque albo-  
maculato. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 9.*

*Habitat - - - aurati facie, at paulo major.*

b) *mandibula obtusa, Trichii.*

fasciatus. 70. Sc. scutellatus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis dua-  
bus luteis coadunatis. *Fn. succ. 395. \* Scap. ent. carn. 5. Fabr. sp. inf. 1. p. 48. n. 1. mant. inf. 1. p. 25. n. 1. Trichius niger tomentoso flavus, elytris fasciis tribus nigris abbreviatis.*

*Mouff. inf. 161. f. 6.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 80. n. 16.*

*Gunner act. Nidros. 4. t. 17. f. 2.*

*Schaeff. ic. t. 1. f. 4.*



*Degeer inf. 4. t. 10. f. 19.*

*Drury inf. 1. t. 36. f. 2.*

*Voet coleoptr. t. 5. f. 43.*

*Habitat in Europæ borealis, etiam Calabriae ulterioris  
floribus syringæ, filipendulæ, umbellatarum.*

*succine-* 388. *Sc. niger tomentoso cinereus; elytris nigris: fasciis dua-*  
*tus, bus flavis. Fabr. mant. 1. p. 25. n. 2. Pall. ic. inf. Ross.*  
*1. t. A. f. 19.*

*Habitat in Germania, statura fasciati, at duplo minor.*

*indus.* 71. *Sc. scutellatus thorace hirsuto, elytris lividis fusco-punc-*  
*tatis. Mus. Lud. Ulr. 27.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 48. n. 2.*  
*mant. inf. 1. p. 25. n. 3.*

*Habitat in India, statura fasciati, cetoniis affinis.*

*punctula-* 389. *Sc. capite thoraceque viridi-æneis glabris, elytris testa-*  
*tus, ceis, abdominis ultimo segmento prominente bipunc-*  
*tato. Fabr. mant. 1. p. 25. n. 4.*

*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

*hibens.* 390. *Sc. capite & thorace viridi-æneis pilosis, elytris testa-*  
*ceis viridi nitentibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 48. n. 3. mant.*  
*inf. 1. p. 26. n. 5.*

*Habitat in America.*

*hemipte-* 63. *Sc. scutellatus thorace tomentoso rugis duabus longitu-*  
*tus, dinalibus marginato, elytris abbreviatis. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 48. n. 4. mant. inf. 1. p. 26. n. 6.*

*Scop. ent. carn. 28. Scarabæus variegatus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 78. n. 17.*

*Bergstr. nomencl. 1. t. 11. f. 7.*

*Voet coleoptr. t. 10. f. 88-90.*

*Habitat in Europa, larva in ligno, imago in floribus, fe-*  
*mina aculeo ani rigido brevi unita.*

*lunula-* 391. *Sc. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. Fabr.*  
*tus, sp. inf. 1. p. 49. n. 5. mant. inf. 1. p. 26. n. 7.*

*Habitat in Carolina.*

*virens.* 392. *Sc. viridis pubescens, ano albo bimaculato. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 49. n. 6. mant. inf. 1. p. 26. n. 8.*

*Habitat in India.*

- piger. 393. Sc. capite thoraceque æneis villosis, elytris testaceis albo maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 49. n. 7. mant. inf. 1. p. 26. n. 9.*  
*Habitat in America boreali.*
- Delta. 394. Sc. thorace nigro : triangulo albo, elytris testaceis : puncto fusco. *Fabr. sp. inf. 1. p. 49. n. 8. mant. inf. 1. p. 26. n. 10.*  
*Forster cent. inf. 1. p. 7. n. 7. Scarabæus scutellatus muticus flavus thorace atro : triangulo flavo, elytris testaceo-flavis nigro-maculatis.*  
*Drury inf. 2. t. 30. f. 1. 2.*  
*Habitat in America floribus.*
- fulvus. 395. Sc. pubescens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris testaceis : futura fulva. *Fabr. sp. inf. 1. p. 49. n. 9. mant. inf. 1. p. 26. n. 11.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- nigripes. 396. Sc. hirtus fuscus, elytris subtestaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 49. n. 10. mant. inf. 1. p. 26. n. 12.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura fulvi.*
- nævus. 397. Sc. supra glaber cinereo-maculatus, capite thoraceque nigris, elytris piceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 49. n. 11. mant. inf. 1. p. 26. n. 13.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura nigripedis.*
- carbonarius. 423. Sc. hirsutus totus niger, clypeo angusto apice bifido. *Mus. Lesk. p. 4. n. 75.*  
*Habitat extra Europam.*
- unguiculatus. 424. Sc. griseus tomentosus, thorace fusco, clypeo apice angusto fulcato bifido, elytris rufis margine nigris pilosis, pedibus posterioribus elongatis unguiculatis. *Mus. Lesk. p. 4. n. 76.*  
*Habitat extra Europam.*
- \*\* *palpis capitatis*, *Trox*.
- fabulosus. 48. Sc. scutellatus niger opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Fn. suec. 390.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 34. n. 1. mant. inf. 1. p. 18. n. 1. Trox thorace elytrisque rugosis, thorace integerimo.*  
 Kkkkk 4

*Scop. ent. carn.* 23. Scarabæus rugosus.

*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 12.

*Habitat in Europæ collibus sabulosis apricis.*

arenosus. 398. Sc. thorace subcanaliculato, elytris striatis, corpore obscuro. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 18. n. 2.

*Habitat Halæ Saxonum, statura sabulosi, at duplo minor fuscus.*

suberosus. 399. Sc. griseus, thorace marginato: margine posteriori dentato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 2. *inf.* 1. p. 18. n. 3.

*Habitat in Brasilia.*

horridus. 400. Sc. ater, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 4.

*Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 10. t. A. f. 10. Scarabæus pectinatus. *Habitat in India.*

filphoides. 401. Sc. niger, thorace marginato inæquali, elytris striatis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 496. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 5.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura horridi.*

spinicosus. 402. Sc. nigricans, thorace posterius utrinque emarginato, antennis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 35. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 6.

*Habitat - - -*

cenebrioides. 403. Sc. ovatus piceus glaber, punctato-scaber, clypeo margine ciliato. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 9. A. 8. t. A. f. 9.

*Habitat in Dauriæ campis glareosis aridis, inter Ononem & Argunum positus, Maio primo veris calore obvius, interdiu humi immobilis.*

morticinus. 404. Sc. filphoides, clypeo inæquali ciliato, elytris striatis convexæ punctatis hispidulis. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 11. t. A. f. 11.

*Habitat in Tatarixæ desertis aridissimis, ad fluvios Ural & Irtyñ, sub cadaveribus æstivo calore exsiccatis frequens, ani ad elytra attritu stridens, ut sabulosus, niger, opacus, fossoris magnitudine.*

quadriguttatus. 410. Sc. testaceus, capite thoraceque æneo nitidulis, abdominis ultimo segmento prominulo bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 377.

*Habitat in Sina, statura melolonthæ.*

miliarius. 425. Sc. elevato punctatus niger, thoracis dorso fulcato, elytris abdomen superantibus decussato striatis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 54.*

*Habitat extra Europam, elytris striarum punctatarum ordinibus novem capitis punctis elevatis sex.*

coraci-426. Sc. niger, frontis tuberculis duobus, thorace tuberculato, nus. elytris abdomen superantibus punctorum elevatorum ordinibus novem. *Mus. Lesk. p. 3. n. 55.*

*Habitat extra Europam.*

longipes. 433. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque nigro, elytris pallide testaceis: lunula communi nigra, pedibus posterioribus longissimis. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 10.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine horticola, at supra magis depressus.*

\*\*\* *palpis cylindricis, antennarum clava tunicata, Lathrus.*

cephalo-405. Sc. clypeo emarginato-bilobo. *Pall. it. 1. app. p. 461. tes. n. 23.*

*Lazmann. nov. comm. Petrop. 14. p. 59. n. 4. t. 24. f. 1.*

*Pall. ic. inf. Ross. 1. t. A. f. 1. Lucanus apterus.*

*Acharius nov. act. Stockh. 1781. p. 246. t. 5. f. 3-12.*

*Bulbocerus cephalotes.*

*Scop. introd. in hist. nat. p. 439. Fabr. mant. inf. 1. p. 2. Lathrus.*

*Habitat in Tataria, Rossia, Hungaria, desertis aridis sub terra, monogamus, lavis, niger, subopacus, subrotundus thorace convexo marginato, elytris coalitis, vix thoracis longitudinem superantibus, pedibus fossoriis, mandibula adunco-falcata intus denticula, medius inter scarabæos & lucanos.*

hemisphæricus. 406. Sc. hemisphæricus, clypeo anterius obtuse bidentato. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 20. A. 23. t. B. f. A. 23.*

*Habitat - - - sacro major, cephalotæ perquam affinis, an specie distinctus?*

190. LUCANUS. *Antennæ clavatæ* : clava compressa, latere latiore pectinatofissili.

*Maxillæ porrectæ, exsertæ, dentatæ.*

*Penicilli duo sub labio palpigeri.*

Alces. 8. L. mandibulis exsertis apice quadridentatis. *Fabr. sp. inf.*  
*I. p. I. n. I. mant. inf. I. p. I. n. I.*  
*Petiv. gazoph. t. 47. f. 15.*  
*Habitat in Asia.*

Cervus. 1. L. scutellatus : maxillis exsertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Fn. succ. 405. Scop. ent. carn. 1.*  
*Fn. succ. I. n. 377. Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus apice bifurcatis : introrsum ramis denticulisque instructis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. I. n. 2. mant. inf. I. p. I. n. 2. Lucanus mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo : ruga transversali elevata.*  
*Geoffr. inf. I. p. 61. n. I. t. I. f. I. Platycerus fuscus, &c.*  
*Mouff. inf. 148. Cervus volans.*  
*Raj. inf. p. 74. n. 2. Scarabæus maximus platyceros, &c.*  
*Olear. mus. t. 16. f. 5. Taurus volans.*  
*Aldrov. inf. 151. f. 1.*  
*Hoeffn. piæ. t. 6.*  
*Worm. mus. 242.*  
*Jonst. inf. t. 14. f. 1. 2.*  
*Merian. eur. t. 168.*  
*Imperat. nat. 924. f. 3.*  
*Roef. inf. 2. Scar. I. t. 4. 5.*  
*Bergstr. nomencl. I. p. 18. n. 1-3. t. 3. f. 1-3. & t. 4. f. 1.*  
*Sulz. inf. t. 1. f. 4.*  
*Degeer inf. 4. t. 12. f. 1.*  
*Schæff. ic. t. 133. f. 1.*  
*Koet. coleoptr. t. 29. f. 1. 3.*  
*Schluga t. 1. f. 1.*  
 b) Scarabæus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. *Fn. succ. 338. (femina).*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 60. n. 2. Platycerus fuscus, elytris lævibus, capite lævi.*  
*O. F. Müller prodr. zool. dan. p. 444. Lucanus Dorcas.*

*Imper. nat.* 925. f. 1. 2.

*Gron. zooph.* 446.

*Roef. inf.* 2. *Scar.* 1. t. 5. f. 8.

*Schaeff. elem. t.* 9. f. 1.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 25. n. 2. 3. t. 4. f. 2. 3.

*Voet. coleopt. t.* 29. f. 2. 4.

*Habitat in Europæ & Sibiſiæ ligno quercino putrefcente, femina minor, larva obesa albida, capite pedibusque ferrugineis, a Roefelio pro crasso veterum habita.*

*Elaphus.* 9. *L. mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 3.

*Voet. coleopt. t.* 30. f. 5.

*Habitat in Virginia, femina minor, mandibulis haud exsertis.*

*Capreolus.* 2. *L. scutellatus, maxillis exsertis, apice tantum furcatis. Amæn. acad.* 6. p. 391. n. 4. \* *Mus. Lud. Ulr.* 30. \*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 4. *Lucanus mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupta.*

*Degger inf.* 4. t. 19. f. 11. 12.

*Merian. Europ.* 168.

β) *Lucanus platyceros. Scriba Schr. der. berl. Naturf.* 7. p. 728.

*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 63. n. 5.

*Habitat in America boreali, Alsatia, Calabria, cervo dimidio minor.*

*Dania.* 10. *L. mandibulis exsertis intus bidentatis longitudine capitis. Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 5.

*Mus. Lud. Ulr.* 30. *Lucanus Capreolus β.*

*Habitat in Virginia.*

*Gazella.* 11. *L. mandibulis intus bidentatis, ater, elytrorum margine exteriori testaceo. Fabr. mant.* 1. p. 1. n. 6.

*Habitat in Siam, damæ magnitudine.*

*tridentatus.* 3. *L. maxillofus depressus niger, thorace utrinque tridentato. Fn. suec.* 406. *It. cel.* 152. \* *Bonsdorf. nov. ad. Stockh.* 1785. 3. n. 10. p. 216.

*Habitat in Oelandia, thorace trilobato; an cervi potius quæra varietas minor?*



- interrup- 4. *L. exscutellatus* antennis arcuatis, corpore oblongo de-  
tus. presso, vertice spina recumbente, thorace abdomineque  
remotis. *Mus. Lud. Ulr.* 33. \* *Mus. Ad. Fr.* 82. *Gron-  
zoph.* 447. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 3. n. 7. *mant. inf.* 1.  
p. 2. n. 8.  
*Brown jam.* 429. t. 44. f. 7. *Dermestes.*  
*Merian. surin.* t. 50.  
*Petiv. gaz.* t. 27. f. 7.  
*Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 2.  
*Degeer inf.* 4. t. 19. f. 13.  
*Voet coleoptr.* t. 27. f. 1.  
*Habitat in America, sub saccharo putrescente, scarabæo  
vulgo proxime affinis; mas major spina capitis incum-  
bente mandibulis truncato tridentatis, elytrorumque  
sulcis lateribus punctatis, femina spina capitis elevata,  
arcuata, mandibulis acuto-tridentatis, elytrorumque  
sulcis omnibus lævibus distincta.*
- carinatus. 5. *L. depressus*, thorace mutico capite brevior: angulis  
posterioribus excavatis. *Mus. Lud. Ulr.* 34. \*  
*Habitat in India abdomine brevissimo, pectore posterius  
angulum acutum terminato.*
- parallele- 6. *L. scutellatus depressus niger*, maxillis dente laterali ele-  
pipcdus. vato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 1. n.  
7. *Pontopp. atl. dan.* 1. p. 666. t. 29. f. 1.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 62. n. 3. *Platiceros niger, &c.*  
*Voet colcoptr.* t. 29. f. 7.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 1. f. 3. 4.  
*Degeer inf.* 4. t. 12. f. 9.  
*Schaeff. elem.* t. 101. f. 1.  
icon. t. 63. f. 7.  
*Habitat in Calabria, Gallia, Angliæ, Germaniæ, Da-  
niæ, Sueciæ, Sibiria silvis, cervo femina similis, at  
8-ies minor, niger, magis depressus; femina mare minor,  
mandibulis minoribus, punctoque capitis duplici pro-  
minente distincta.*
- crancroi- 12. *L. mandibulis incurvis: intus dente incrassato difformi;*  
des. elytris punctato-subpubescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1.  
p. 2. n. 9.  
*Habitat in terra van Diemen, virescente paulo major.*
- virescens. 13. *L. mandibulis tridentatis, corpore viridi-æneo.* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 3. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 2. n. 10.  
*Habitat in America.*

- tenebroi- 14. *L. mandibulis lunatis unidentatis ater*, thorace mar-  
des. ginato, elytris substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 2. n. 11.*  
*Habitat in Novogorod inferiori Rossiae, statura cara-*  
*boidis, at paulo major, ater.*
- caraboides. 7. *L. scutellatus caerulescens*, mandibulis lunatis, thorace  
marginato. *Fn. suec. 407. \*. Scop. ent. carn. 2. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 3. n. 9. mant. inf. 1. p. 2. n. 12.*  
*Udm. diff. n. 40. Carabæus caerulescens.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 63. n. 4. Platyceros violaceo-*  
*caeruleus, &c.*  
*Schaeff. ic. t. 6. f. 8. et. t. 75. f. 7. Platycerus.*  
*Degeer inf. 4. t. 12. f. 11.*  
*Voet coleoptr. t. 29. f. 8.*  
*Habitat in Europæ locis suffocatis, varians colore viridi*  
*& caeruleo.*
- piceus. 15. *L. ater glaber striatus*, antennis, abdomine & pedibus  
piceis. *Bonsdorf nov. act. Stockh. 1785. 3. n. 10. p.*  
*217. t. 8. f. a.*  
*Habitat in Ostrogothiæ & Westrogothiæ lapidosi, Junio*  
*frequens.*
- capensis. 16. *L. exscutellatus niger*, elytrorum sulcis punctatis.  
*Thunberg nov. inf. spec. 1. p. 5. f. 1.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, cylindricus, glaber, tene-*  
*brione fossore paulo major.*
- Pilmus. 17. *L. exscutellatus ater*, corpore depresso, thorace striato.  
*Molin. hist. nat. Chil. p. 184.*  
*Habitat in provincia Chilensi Makle, arvis legumine*  
*consitis infestus, 8 lineas longus; an hujus generis?*
- Tarandus. 18. *L. scutellatus ater glaberrimus*, mandibulis exsertis  
apice tridentatis a latere interiori bidentatis. *Swe-*  
*derus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 1. t. 8. f. 2.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, L. Cervo major.*
- Antilope. 19. *L. mandibulis exsertis a latere interiori bimarginatis:*  
margine superiori bidentato, inferiori quinqueden-  
tato. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3.*  
*2. t. 8. f. 3.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, brunneus, subglaber,*  
*magnitudine capreoli.*

- Bubalus. 20. *L. niger*, mandibulis bifidis : altera parte porrecta ;  
 sublunata interius tridentata ; altera majore deflexa  
 arcuata integra. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787.  
 3. n. 3. 3. t. 8. f. 4.  
*Habitat in Georgia Americæ, caraboide duplo major.*

191. DERMESTES. *Antennæ clavatæ : clava*  
*perfoliata : articulis tri-*  
*bus crassioribus.*

*Thorax convexus , vix*  
*marginatus.*

*Caput sub thorace in-*  
*flexum condens.*

\* *maxilla bifida.*

- lardarius.* 1. *D. niger*, elytris antèrius cinereis. *Fn. suec.* 408. *Geoffr.*  
*inf. parif.* 1. p. 100. n. 5. *Scop. ent. carn.* 34. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 63. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 1.  
*Goed. inf.* 2. t. 41.  
*Blank. inf. t.* 11. f. K. L. M.  
*Raj. inf.* p. 107. n. 4.  
*Mer. inf.* 2. t. 33.  
*Frisch. inf.* 6. t. 9.  
*Degeer inf.* 4. p. 192. n. 1. t. 7. f. 15.  
*Schaeff. elem.* t. 7. f. 1. 2.  
*icop. t.* 42. f. 3.

*Habitat in Europa, larva ovata cinerea hirsuta in ani-*  
*malibus diu asservatis, lardo, carnibus, repositoriis cu-*  
*linariis & museis libris potissimum corio suillo aut asinino a*  
*pilis non satis repurgato testis infesta, imago, olea*  
*& pinguedines aliis insectis lethalia appetens, scybala*  
*inter vorandum ex ano protrudit concatenata pendula ;*  
*rarior elytris antèrius ferrugineis conspicua.*

- elongatus.* 2. *D. niger*, elytris basi fasciaque posteriore lividis,  
 antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 409. \*  
*Habitat in Europa, fere filiformis.*

- andatus.* 3. *D. oblongus niger*, elytris fascia alba lineari duplici.  
*Fn. suec.* 410. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 6. *mant.*  
*inf.* 1. p. 34. n. 6.

*Degeer inf.* 4. p. 199. n. 5. *Dermestes oblongus niger*, &c.  
*Schaeff. ic. t.* 157. f. 7. a. b.  
*Habitat in Europæ putridis, suffocatis.*

pellio. 4. *D. niger*, coleopteris punctis albis binis. *Fn. suec.* 411. \*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 100. n. 4. *Scop. ent. carn.* 37.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 5.  
*Dermestes niger*, elytris puncto albo.

*Degeer inf.* 4. p. 197. n. 3. *Dermestes bipunctatus.*

*Raj. inf.* p. 85. n. 35.

*Frisch. inf.* 5. p. 22. t. 8.

*Schaeff. ic. t.* 42. f. 4.

8) *Dermestes minor non punctatus.* *Mus. Lesk. p.* 5. n. 101.  
*Habitat in Europæ pellibus, lardo, aliis cibariis, libris*  
*vetustis.*

*Larva oblonga, pilosa, cauda setosa.*

macella- 5. *D. niger glaber*, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
 rius. 63. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 4.  
*Habitat in Germania, lardario affinis.*

cadaveri- 7. *D. niger*, ore ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n.  
 nus. 3. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 3.  
*Habitat in insula S. Helenæ.*

carnivo- 8. *D. niger*, elytris antierius testaceis, abdomine albo.  
 rus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 2.  
*Habitat in nova Hollandia & Seelandia.*

trifascia- 9. *D. ovatus niger*, elytris fasciis tribus undatis cinereis.  
 rus. *Fabr. mant.* 1. p. 34. n. 7.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 112. n. 5. *Byrrhus fuscus*, &c.  
*Habitat in Europa magis australi, undui magnitudine*  
*& statura.*

20 gutta- 10. *D. oblongus ater*, punctis viginti albis. *Fabr. sp. inf.* 1.  
 tus. p. 64. n. 7. *mant.* 1. p. 34. n. 8.  
*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 3.

bicolor. 11. *D. oblongus niger* subtus testaceus, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 9.  
*Habitat in Germania, statura murini.*

---

*Dermestis larvæ exedunt & destruunt animalium cadavera, res culinares,*  
*zella, libros; apodes lignum putrescens.*

- domestici- 12. *D. niger*, elytris griseis margine nigris, thorace villosus.  
*Fn. suec.* 424. \*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 111. t. 1. f. 6. Byrrhus.  
*Habitat in Europa, thorace fere hemisphærico.*
- violaceus. 13. *D. nigro-cæruleus*, thorace villosus. *Fn. suec.* 422. \*  
*Scop. carn.* 51. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 65. n. 13. mant.  
*inf.* 1. p. 35. n. 15.  
*Fn. suec.* 373. *Dermestes nigro-cæruleus.*  
*Degeer inf.* 5. p. 163. n. 4. t. 5. f. 13. *Clerus cæruleus*, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 304. n. 2. *Clerus nigro-cæruleus.*  
*Raj. inf.* 100. *Scarabæus antennis clavatis* 12.  
*Habitat in Europæ cadaveribus frequens, etiam in floribus.*
- rufipes. 16. *D. nigro-cæruleus*, thorace villosus, pedibus rufis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 65. n. 14. mant. *inf.* 1. p. 35. n. 16.  
*Thunb. nov. inf. spec.* 1. p. 10. *Anobium rufipes.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, an varietas violacei?*
- ruficollis. 17. *D. violaceus*, thorace elytrorumque basi rufis. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 65. n. 15. mant. *inf.* 1. p. 35. n. 17.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 8. f. 7.  
*Habitat in Africa & India, violacei magnitudine, totus*  
*hirtus.*
- cæruleus. 24. *D. cæruleus hirtus linearis.*  
*Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 10. *Anobium cæruleum.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, violaceo similis, at linearis.*
- hirtus. 14. *D. ater hirtus.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 82. n. 6. *Hispa (hirta) antennæ*  
*ferratis atra hirta.*  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 94. n. 18. *Lagria atra.*  
*Habitat in Europa, undati magnitudine, pilis nigris*  
*hirtus.*
- fenestralis. 15. *castaneus*, capite nigricante, thorace fusco. *Fn. suec.*  
423. \* *Fab. sp. inf.* 1. p. 67. n. 24. mant. *inf.* 1. p.  
36. n. 29.  
*Degeer inf.* 5. p. 197. n. 7. *Ips spinosus*, &c.  
*Müll. prodr. zool. dan.* p. 57. n. 505. *Byrrhus fenestralis*, &c.  
*Habitat in Europa boreali, frequens in fenestris.*
- vulpinus. 25. *D. oblongus lævis niger*, thoracis lateribus cinereis  
villosis subtus albidus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 9.  
mant. *inf.* 1. p. 34. n. 10.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, carnivoro affinis & æqualis.*

- felinus.* 28. *D. oblongus villosus cinereus immaculatus. Fabr. mant. inf. 1. p. 34. n. 11.*  
*Habitat in terra van Diemen, an satis a vulpino distinctus?*
- murinus.* 18. *D. oblongus tomentosus nigro alboque nebulosus, abdomine niveo. Fabr. sp. inf. 1. p. 64. n. 10. mant. inf. 1. p. 35. n. 12.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 18. Fn. suec. 426.\* Scop. ent. carn. 35. Geoffr. inf. par. 1. p. 102. n. 7. Dermestes tomentosus oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutello luteo.*  
*Degeer inf. 4. p. 197. n. 2. Dermestes nebulosus, &c.*  
*Frisch inf. 4. p. 34. t. 18.*  
*Schaeff. ic. t. 42. f. 1. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 11.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus frequens.*  
*Larva oblonga brunnea, ore atro.*
- testellatus.* 31. *D. oblongus tomentosus fusco cinereoque nebulosus, abdomine fusco. Fabr. sp. inf. 1. p. 65. n. 11. mant. inf. 1. p. 35. n. 13.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 100. n. 8. Dermestes flavescens pilosus.*
- navalis.* 32. *D. elongatus ferrugineo-fuscus, oculis atris. Fabr. sp. inf. 1. p. 65. n. 12. mant. inf. 1. p. 35. n. 14.*  
*Habitat in nova Seelandia, murino quadruplo minor.*
- scaber.* 33. *D. griseus, thorace elytrisque scabris. Fabr. sp. inf. 1. p. 66. n. 20. mant. inf. 1. p. 35. n. 25.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- testaceus.* 34. *D. oblongus testaceus, oculis abdominisque basi nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 66. n. 19. mant. inf. 1. p. 35. n. 24.*  
*Habitat in Belgio.*
- fumatus.* 22. *D. oblongus testaceus, oculis nigris. Fn. suec. 432.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 104. n. 12. Fabr. sp. inf. 1. p. 66. n. 16. mant. inf. 1. p. 35. n. 19.*  
*Scop. ent. carn. 59. Dermelles rosæ.*  
*Degeer. inf. 4. p. 195. n. 3. Ips testaceo-flavus, &c.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 20. n. 7. t. 20. f. 1?*  
*Habitat in Europæ floribus, in viis, fimo equino.*
- picipes.* 35. *D. oblongus nigricans, pedibus piceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 35. n. 23.*  
*Habitat Halæ Saxonum, tomentosi statura & magnitudine.*



- chinenfis. 36. *D. oblongus ferrugineus*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 66. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 36. n. 27.  
*Habitat in seminibus e Sina allatis.*
- paniceus. 19. *D. oblongus ferrugineus*, oculis rufis. *Fn. suec.* 431. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 66. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 35. n. 22. *Frisch inf.* 2. p. 36. t. 8.  
*Habitat in Europæ pane diutius affervato, glutine biblioporum, & libris aliisque, quibus hoc adhæret, seminis milii magnitudine.*  
*Larva ovata alba nitida.*
- ferrugineus. 21. *D. oblongus ferrugineus femicylindricus*, elytris abbreviatis. *Fn. suec.* 433.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 91. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 51. n. 6. *Nitidula ferruginea?*  
*Schranck apud Fuesli n. entom. Mag.* 1. p. 140. *Dermestes testaceus.*  
*Laicharting inf. tyr.* 1. p. 104. n. 2. *Ostoma ferruginea?*  
*Lesk. it. p. 46. t. A. f. 11?*  
*Habitat in Europa.*
- Eustatius. 20. *D. ater glaber obtusissimus*, pedibus ferrugineis.  
*Habitat in insulæ Eustatii fungis, pediculi magnitudine.*
- pedicula- 23. *D. oblongus testaceus*, elytris abbreviatis. *Fn. suec.* 434.\* *Schranck inf. austr. n. 56. Herbst. apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 22. n. 13. t. 20. f. 6.  
*Fn. suec.* 1. n. 441. *Chrysomela dilute testacea hemiptera.*  
*Habitat in Europæ floribus frequens.*
- fuscus. 37. *D. oblongus villosus fuscus immaculatus.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 35. n. 21.  
*Habitat Halæ Saxonum & Kilonii, tomentosi statura & magnitudine.*
- tomento- 38. *D. oblongus villosus griseus*, capite punctis duobus fuscis.  
sus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 66. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 35. n. 20. *Degeer inf.* 4. p. 199. n. 4. t. 7. f. 18.  
*Habitat in Angliæ, Sueciæ floribus.*
- sanguini- 39. *D. elongatus hirtus violaceus*, thorace abdomineque  
collis, rufis. *Fabr. mant.* 1. p. 35. n. 18.  
*Habitat Halæ Saxonum, chrysomelæ statura, antennis dermestis.*

- limbatus. 40. *D. fuscus*, elytris punctatis : limbo cinereo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 66. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 36. n. 28.  
*Habitat in nova Seelandia, parvus.*
- scanicus. 26. *D. ater* thorace punctoque elytrorum testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 66. n. 22. *mant. inf.* 1. n. 27.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 564. n. 26. *Fn. suec.* 437.\* *Dermestes fuscus*, thorace testaceo.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 21. n. 8. t. 20. f. 2.  
*Habitat in Suecia & Germania.*
- Colon. 27. *D. thorace* lateribus flavis, elytris griseis : puncto nigro.  
*Fn. suec.* 430.\*  
*Habitat in Europa.*
- surina-  
mensis. 29. *D. testaceus*, elytris striatis, thorace striis tribus elevatis marginibusque denticulato.  
*Habitat in Surinamo & Sibiria, oblongus, pediculi magnitudine.* Rolander.
- hemipte-  
rus. 30. *D. elytris* abbreviatis basi exteriore apiceque testaceis.  
*Habitat Surinami, pediculi magnitudine.* Rolander.  
*Antennæ capitatae; pedes ferruginei; elytra abdomine dimidio breviora; singulis macula cuneiformis in apice, & punctum glaucum ad basin exteriorem elytri.*
- bifascia-  
tus. 41. *D. niger*, elytris fasciis binis undulatis luteis, thorace cinereo-testellato. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 6. f. 2.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, undati magnitudine, at latior.*
- interruptus. 42. *D. niger*, fascia baseos elytrorum rubra interrupta.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 6. f. 3.  
*Habitat - - - undati magnitudine.*
- bipustula-  
tus. 43. *D. ater* glaber, capite, thorace punctoque baseos elytrorum rubris. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. p. 6. f. 4.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 45. n. 7. *Ips humeralis.*  
*Habitat - - - magnitudine pulicis.*
- margina-  
tus. 44. *D. niger*, thoracis lateribus, pectore incisurisque abdominis albis. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. p. 7. f. 6.  
*Habitat in India & ad Caput bonæ spei, magnitudine & facie lardarii, sed paulo major, & totus hirtus.*

- piceus. 45. *D. totus ferrugineus, elytris striatis. Thunb. nov. inf. 1. p. 8.*  
*Habitat in India & ad Caput bonæ spei, marginati magnitudine & statura.*
- capensis. 46. *D. ater hirtus, elytris flexilibus violaceis: fasciis duabus albis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 9. f. 8. Anobium capense.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine majoris pediculi.*
- cafer. 47. *D. niger glaber, elytris fasciis duabus luteis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. t. 9. f. 9. Anobium bifasciatum.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, sublineari oblongus.*
- viridis. 48. *D. viridis hirtus, pedibus rubris.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 9. Anobium viride.*  
*Habitat in Africa & India.*
- fimera- 49. *D. flavescens fuscus, thorace marginato, antennis pe-*  
 rius, *ribusque spadiceis. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 21. n. 10. t. 20. f. 3.*  
*Habitat Berolini in fimo & floribus, convexus, 1½ lineas longus.*
- cellaris. 50. *D. fuscescens, antennis longis, elytris striatis. Scop. ent. carn. n. 42.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 22. n. 12. t. 20. f. 5.*  
*Habitat in Germaniæ parietibus, vix frequens, 2/3 lineæ longus.*
- longicor- 51. *D. fuscus, antennis longis, thorace medio excavato,*  
 nis, *elytris punctatis. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 23. n. 15. t. 20. f. 8.*  
*Habitat Berolini, lineam longus, cellari affinis.*
- flavescens. 52. *D. ferrugineus subtus flavescens, capite obscuriore,*  
*oculis nigris, thorace tereti. Schranck apud Fuesli n. ent. Mag. 1. p. 140.*  
*Habitat in Bavaria, ferrugineo affinis.*
- fulvipes. 53. *D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.*  
*Schranck apud Fuesli n. ent. Mag. 1. p. 141. Dermestes leucophilus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 108. n. 21.*  
*Habitat - - -*

---

*Plura hujus nominis insecta habent Scopos, & Geoffroi, Schranck, Laicharting, Moll.*

fulcatus. 61. *D. fusco ruber*, oculis nigris, elytris fulcatis punctatis.  
*Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 2. n. 1.*  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major.*

fenestra- 62. *D. fuscus*, elytris maculis sedecim pallidis, tibiis omni-  
tus. bus spinosis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 3. n. 2.*  
*Habitat Upsaliæ, ptini mollis magnitudine.*

ruber. 63. *D. ruber*, thorace glaberrime ferrugineo-nigro, la-  
teribus rufis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 3. n. 3.*  
*Habitat Upsaliæ, pediculo vix major, silphæ melano-*  
*cephalæ affinis.*

linearis. 64. *D. corpore elytrisque linearibus ferrugineis*, capite thora-  
ceque fuscis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 4. n. 4.*  
*Habitat in Suecia, fenestrali similis, at multoties major.*

ater. 658. *D. ater nitidus*, elytris tenuissime punctatis. *Thunb.*  
*nov. act. Ups. 4. p. 4. n. 5.*  
*Habitat Upsaliæ, magnitudine coccinellæ bipunctatæ.*

bipustula- 66. *D. niger*, capite thoraceque rubris, elytris nigris: basi  
tus. macula rubra. *Thunb. nov. act. Ups. 1. p. 4. n. 6.*  
*Habitat Upsaliæ, pediculo vix major.*

fasciatus. 67. *D. niger*, elytris fasciis duabus undulatis lutescentibus.  
*Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 5. n. 7.*  
*Habitat Upsaliæ, pediculi magnitudine.*

**\*\* maxilla unidentata : *Apate*.**

murica- 6. *D. elytris reticulatis posterius retusis dentatis*, thorace  
tus. muricato gibbo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 1. mant.*  
*inf. 1. p. 33. n. 1.*

*Pall. spic. zool. 9. p. 7. t. 1. f. 3. Ligniperda terebrans.*  
*Habitat in Americæ meridionalis lignis.*

hamatus. 54. *D. elytris ante apicem unispinosis thoracis margine ante-*  
riori bihamato denticulato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 2.*  
*Habitat in Saxonæ lignis, statura muricati, at minor.*

Mona- 55. *D. elytris obtusis*, thorace gibbo truncato. *Fabr. sp.*  
chus. *inf. 1. p. 62. n. 2. mant. inf. 1. p. 33. n. 3.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 8. t. 1. f. 4. Ligniperda cornuta.*  
*Habitat in Americæ meridionalis lignis.*

- Jesuita. 56. *D. elytris integris variolosis, thorace antèrius truncato!*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 3. mant. inf. 1. p. 33. n. 4.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- indicus. 57. *D. elytris integris nigris, thorace antèrius scabro.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 4. mant. inf. 1. p. 33. n. 5.*  
*Habitat in Coromandel, minuto affinis, at paulo major.*
- minutus. 58. *D. niger, elytris integris piceis, thorace antèrius scabro.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 5. mant. inf. 1. p. 33. n. 6.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- exilis. 59. *D. ater, elytris integris pallidis: margine omni nigro.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 7.*  
*Habitat Kilonii sub fagi cortice, parvus.*
- villosus. 60. *D. thorace villoso, elytris integris fuscis: margine punctif-*  
*que ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 8.*  
*Habitat Halæ Saxonum.*
- pallipes. 68. *D. oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque*  
*testaceis. Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Sueciæ floribus, minutus.*
- lunatus. 69. *D. oblongus niger, elytris lunula dorsali cinerea. Fabr.*  
*ment. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Suecia, sub arborum corticibus, parvus.*
- ruficornis. 70. *D. fuscus capite retracto, antennis pedibusque rufis.*  
*Mus. Lesk. p. 5. n. 108. b.*  
*Habitat in Europa, minimus.*

## BOSTRICHUS. *Antennæ clavatæ: clava solida.*

*Thorax convexus vix marginatus.*

*Caput sub thorace inflexo conditum.*

- Capucinus. 1. *B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace retuso. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 67. n. 1. mant. inf. 1. p. 36. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 5. Fn. succ. 416. Dermestes*  
*capucinus.*  
*Geoff. inf. par. 1. p. 302. n. 1. t. 5. f. 1. Bostrichus*  
*niger, &c.*  
*Schæff. elem. t. 28.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 5. 6. c.*
- β) *Dermestes capucinus abdomine nigro. Lepechin' it. 2.*  
*t. 11. f. 3.*  
*Habitat in Europæ, β) Sibiria truncis, præsertim*  
*emortuis, parietibus.*

- flavico- 2. *B. piceus*, elytris apice spinoso-dentatis, antennis flavis.  
nis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 67. n. 2. mant. inf. 1. p. 36. n. 2.*  
*Habitat in America boreali.*
- elonga- 3. *B. elongatus ater*, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1.*  
tus. *p. 36. n. 3.*  
*Habitat in Upsaliæ ligno antiquo.*
- typogra- 4. *B. testaceus pilosus*, elytris striatis reticulis præmorfo-denta-  
phus. tis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 67. n. 3. mant. inf. 1. p. 36. n. 4.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 7. Fn. suec. 418. It. oel.*  
*26. 195. Lepeck. it. 2. p. 202. t. 81. f. 21. Dermestes*  
*typographus.*  
*Degeer inf. 5. p. 193. n. 1. t. 6. f. 1. 2. Ips pilosus fuscus, &c.*  
*Raj. inf. p. 100. n. 10.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 4.*  
*Habitat intra Europæ, Americæ, Sibiricæ cortices arbo-*  
*rum, præsertim piceæ infestissimus, fertilissimus, voraci-*  
*ssimus, intra corticem canalem effodiens, ex quo ad la-*  
*tus plures utrinque minores subparalleli exeunt, pro*  
*ætate magnitudine, magis adhuc colore flavescente, fusc-*  
*escente, fusco, subatro varians, vitæ tenacissimus.*
- chalco- 5. *B. ater*, elytris præmorfo-dentatis rufis. *Fabr. sp. inf.*  
graphus. *1. p. 68. n. 4. mant. inf. 36. n. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 8. Fn. suec. 417. Dermestes*  
*chalcographus.*  
*Habitat intra arborum Europæ cortices, colore nigro & tes-*  
*taceo varians.*
- polygra- 6. *B. nigricans*, elytris glaucis obtusiusculis. *Fabr. sp. inf.*  
phus. *1. p. 68. n. 5. mant. inf. 1. p. 37. n. 6.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 10. Fn. suec. 420. Dermestes*  
*polygraphus.*  
*Degeer inf. 5. p. 196. n. 5. Ips rufo-fuscus, &c.*  
*Habitat in Europa boreali sub arborum corticibus, labyrin-*  
*thos formans, inter nocentiores sui generis.*
- microgra- 7. *B. ferrugineus*, elytris integris testaceis. *Fabr. mant.*  
phus. *inf. 1. p. 37. n. 7.*

---

*Bostrichi fertilissimi larva et imago cortices arborum et ligna exedit, silvarum aliquando pestis perniciosissima. J. F. Gmelin Abh. von der Wurmtrocknis. Lips. 1787.*



*Syst. nat.* XII. 2. p. 562. n. 9. *Fn. succ.* 419. Dermestes (micrographus) testaceus glaber, thorace nigro, elytris apice retuso-dentatis.

*Habitat in Europæ ligno, etiam intra cortices arborum, parvus, niger; elytris, antennis pedibusque testaceis.*

bidentatus. 8. B. niger, coleopteris testaceis apice retusis bihamatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 37. n. 8.

*Herbst apud Fuesli Arch. inf.* 4. p. 24. n. 6. t. 20. f. 10. Bostrichus bidentatus.

*Lepech. it.* 2. p. 202. t. 11. f. 22. Scarabæus thorace mutico, elytris apice excavatis mucronibus 4 instructis?

*Habitat in Saxonia & Sibiria, polygraphi magnitudine.*

Scolytus. 9. B. glaber nigricans, elytris truncatis integris, abdomine renato, fronte villosa cinerascens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 68. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 37. n. 9.

*Geoffr. inf. parisi.* 1. p. 310. n. 1. t. 5. f. 5. Scolytus.

*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 13.

*Schaeff. ic. t.* 112.

*Habitat sub Angliæ ulmorum cortice, quas misere devastat.*

crenatus. 10. B. glaber ater, elytris integris piceis crenato-striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 37. n. 10.

*Habitat in Germania, scolyti statura & magnitudine.*

pygmæus. 11. B. ater nitidus, elytris integris rufis, abdomine retuso. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 37. n. 11.

*Habitat Halæ Saxonum, scolyto proxime affinis, at triplo minor.*

ligniperda. 12. B. villosus testaceus, corpore nigricante, tibiis quatuor posterioribus ferratis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 37. n. 12.

*Habitat in Germaniæ ligno, piniperda paulo major.*

piniperda. 13. B. niger subvillosus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 68. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 37. n. 13. *Lesk. it.* p. 11. t. A. f. 2.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 563. n. 11. *Fn. succ.* 421. Dermestes piniperda.

*Degeer inf.* 5. p. 194. n. 2. t. 6. f. 8. 9. Ips subvillosus niger nitidus, &c.

*Habitat in Europæ pini ramulis inferioribus, quos perforat, exsiccatur, destruit, hortulanus naturæ, curculionis fere statura; colore elytrorum varians.*

- testaceus. 14. *B. glaber testaceus*, elytris lævibus, longitudine abdominis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 37. n. 14.*  
*Habitat in pini truncis, piniperdæ statura oblonga.*
- varius. 15. *B. subvillosus*, corpore nigro cinereoque vario. *Fabr. sp. inf. 1. p. 69. n. 8. mant. inf. 1. p. 38. n. 15.*  
*Habitat in Hafniæ arboretis antennarum clava acuminata.*
- vittatus. 16. *B. subvillosus fuscus*, elytris vitta abbreviata cinerea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 38. n. 16.*  
*Habitat in Europæ truncis arborum, statura varii, at duplo minor.*
- minutus. 17. *B. glaber ater immaculatus*, elytris integris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 69. n. 9. mant. inf. 1. p. 38. n. 17.*  
*Habitat Kilonii in boleto versicolore.*
- maculatus. 18. *B. niger*, elytris fascia undata punctisque rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 7. f. 5.*  
*Habitat in Suecia, statura dermestis undati, antennis moniliformibus, an hujus generis?*
- bifasciatus. 19. *B. ater*, elytris flavis: fasciis duabus nigro-cæruleiscentibus denticulatis. *Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 3. Dermestes bifasciatus.*  
*Habitat in Sibiria.*
- limbatus. 20. *B. niger*, elytris flavescens marginatis fusco-limbatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 1. p. 24. n. 7. t. 20. f. 11.*  
*Habitat in Pomerania, 1½ lineas longus thorace capucino similis.*
- fuscus. 21. *B. fuscus*, elytris striatis: striis apice cohærentibus; tibiis extus dentatis, plantis rufis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 112.*  
*Habitat in Europa.*
- pilosus. 22. *B. testaceus pilosus*, elytris punctato-striatis, apice retusis dentatis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 113.*  
*Habitat in Europa.*

**MELYRIS.** *Labium* clavatum emarginatum.

*Antennæ* totæ perfoliatae.

*Maxilla* unidentata acuta.

viridis. 1. *M. viridis* elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 67. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 36. n. 1.  
*Habitat* ad Caput bonæ spei.

nigra. 2. *M. nigra*, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 67. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 36. n. 2.  
*Habitat* - - - *statura viridis*, at triplo minor.

**192. PTINUS.** *Antennæ* filiformes : articulis ultimis majoribus.

*Thorax* subrotundus, non marginatus, caput excipiens.

\* *palpis clavatis* : *Anobia*.

rugosus. 1. *Pt. fuscus* thorace inæquali, elytris striatis. *Fabr. mant.*  
1. p. 39. n. 1.  
*Habitat* Kilouii, *pertinace duplo major*, *immaculatus*.

pertinax. 2. *Pt. fuscus* unicolor. *Fn. suec.* 414.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 71. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 2. *Anobium fuscum immaculatum*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 112. n. 4. *Byrrhus* totus nigro-fuscus.  
*Degeer inf.* 4. p. 227. n. 1. t. 8. f. 24. 25. *Byrrhus* nigro-fuscus, &c.  
*Habitat* in Europa captus mortui instar se contrahens immobilis, e ligno, potissimum querno confecta destruens, libris etiam infestus, ab attelabo formicario eradicatur.

mollis. 3. *Pt. testaceus* oculis fuscis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 71. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 3. *Anobium testaceum*, oculis nigris.  
*Fn. suec.* 415. *Bergius nov. act. Stockh.* 1786. 4. p. 268. *Dermestes mollis*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 112. n. 2. *Byrrhus* testaceus glaber.  
*Degeer inf.* 4. p. 230. n. 4. t. 8. f. 29. *Byrrhus* rufo-fuscus, oculis nigris, &c.

*Habitat in Europæ quisquiliis , herbariis etiam invisus , calore furni pellendus.*

*Larva alba frigoris patientissima.*

- frumenta-  
rius. 7. Pt. testaceus , thorace ciliato : dorso plano carinato.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 71. n. 3. mant. inf. 1. p. 39. n. 5.*  
*Habitat in pane diutius asservato , capitur in navi prope Brasiliam.*
- planus. 8. Pt. fuscus , thorace plano , elytris crenato-striatis. *Fabr. mant. 1. p. 39. n. 4.*  
*Habitat Kilonii.*
- flavipes. 9. Pt. villosus niger , antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 71. n. 4.*  
*Habitat Hamburgi.*
- lineatus. 10. Pt. pilosus niger , elytris lineis sesquitertiis rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 6.*  
*Habitat in Brasilia , statura cantharidis nigræ ; an hujus generis ?*
- cyaneus. 11. Pt. subvillosus cyaneus , antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 7.*  
*Habitat in America magis australi , cantharidis nigræ statura & magnitudine.*
- minutus. 12. Pt. subvillosus niger thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 8.*  
*Habitat in nova Seelandia , statura cyanei , at duplo minor , elytris interdum virescentibus.*
- pulsator. 13. Pt. cylindricus opacus rugosus maculis griseis adpersus.  
*Schaller Abh. hall. Naturf. Ges. 1. p. 249.*  
*Habitat Halæ Saxonum in truncis vetustis salicis & domibus , noctu præsertim termitis instar pulsans , statura pertinacis , magnitudine dermestis lardarii.*
- fagi. 14. Pt. niger , antennis spadiceis , elytris punctato-fulcatis.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 26. n. 2. t. 20. f. 12.*  
*Habitat Berolini , 3. lineas longus.*
- ferrugineus. 15. Pt. ferrugineus , oculis nigris , elytris obsolete striatis.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 3. t. 20. f. 13.*  
*Habitat in Marchia.*

testaceus. 16. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris glaberrimis. *Herbst*  
*apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 158. n. 4.*  
*Habitat Berolini, an satis a ferrugineo distinctus?*

capensis. 26. Pt. ferrugineus, elytris striatis pallidioribus. *Fabr. mant.*  
*inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura pertinacis, at duplo*  
*minor.*

fuscus. 27. Pt. fuscus, corpore griseo irrorato, scutello griseo, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 121.*  
*Habitat in Europa.*

rufus. 28. Pt. rufus luteo nitens, thorace utrinque posterius macula lutea, elytris punctato striatis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 122.*  
*Habitat in Europa.*

ferrugineus. 29. Pt. ferrugineus, thorace inæquali, elytris punctato striatis, antennis rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 123.*  
*Habitat in Europa, antennarum articulis 3 ultimis majoribus, compressis obconicis.*

striatulus. 30. Pt. testaceus, elytris levissime striatis, antennarum articulis tribus ultimis majoribus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 127.*  
*Habitat in Europa.*

brunneus. 31. Pt. brunneus, elytris levissime striatis, pubescentibus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 128.*  
*Habitat in Europa.*

\* \* palpis filiformibus : Ptini.

Gigas. 17. Pt. griseus, elytris posterius cinereis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 1. mant. inf. 1. p. 40. n. 1.*

imperialis. 4. Pt. fuscus, thorace subcatinato, coleoptris macula lobata alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 5. mant. inf. 1. p. 40. n. 5.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 57. n. 507. Bruchus imperialis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in Europa boreali. & Calabriae arboribus, seminis tritici magnitudine.*  
*Antennæ longitudine corporis pedesque ferruginei; scutellum niveum; elytra nigra, macula alba aquilam insigne quodammodo referente notata.*

- Fur. 5. Pt. testaceus subapterus, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 4. mant. inf. 1. p. 40. n. 4.*  
*Fn. suec. 651. Cerambyx Fur.*  
*Geoffr. inf. parif. 1. p. 164. n. 4. t. 2. f. 6. Bruchus testaceus.*  
*Degeer inf. 4. p. 231. n. 5. t. 9. f. 5. 6. Byrrhus rapax.*  
*Scop. ent. carn. 210. Buprestis Fur.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 8.*  
*Schaeff. elem. t. 30.*  
*Frisch inf. 13. t. 15.*  
*Habitat in Europæ seminibus, in museis pessimus, destruens herbaria, insecta, aves, pelles, utensilia, libros, culinaria, imo pulverem tabaci, ambrosiacis non pellendus, frigoris & humiditatis amans, calore & sicciatate arcendus, arsenico & alumine, certius mercurio corrosivo sublimato albo occidendus, habitu, facie, moribus, metamorphosi ad dermestes, dentibus thoracis lateralibus ad cerambyces accedens; femina aptera; larva hexapoda obesa, mollis, pilosa, segmentis dorsalibus prominulis; puppa intra globum glutinosum.*
- longicor- 18. Pt. ater nitidus, pedibus flavescens. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 3. mant. inf. 1. p. 40. n. 3.*  
 nis. *Habitat in Germania, furis magnitudine.*
- germa- 6. Pt. fuscus, thorace transversim rugoso, pedibus ferrugineis.  
 nus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 2. mant. inf. p. 40. n. 2. Ptinus fuscus, thorace quadridentato, elytris villosis cinereo-variis.*  
*Habitat in Europæ quercu, furi affinis, sed major.*  
*Antennæ ferrugineæ, longitudine corporis.*
- Latro. 19. Pt. testaceus immaculatus, thorace bidentato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 6. mant. inf. 1. p. 40. n. 6.*  
*Habitat Argentorati. Hermann.*
- spinicor- 20. Pt. oblongus, antennarum articulis duobus prioribus  
 nis. longioribus spinosis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 40. n. 7.*  
*Habitat in Sandwichii insulis.*
- fulcatus. 21. Pt. albidus, thorace quadrisulcato villosus, elytris con-  
 natis fusco-testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 7. mant. inf. 1. p. 40. n. 6.*  
*Habitat in plantis siccis ex insulis Canariis missis, fure minor.*



Scotias. 22. Pt. thorace lævi piceo, elytris connatis fusco testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 74. n. 8. mant. inf. 1. p. 40. n. 8. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 27. n. 5. t. 20. f. 14. Czempinsk. diff. 51. 155. Jacquin miscell. austr. t. 23. f. 1. Scotias ptylloides.*  
*Schranck inf. austr. Scotias Seminulum.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 164. n. 2. Bruchus totus testaceus, &c. Scop. introd. hist. nat. 505. Gibbium?*  
*Habitat in Europæ magis australis betula.*

fstriatus. 23. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 40. n. 10.*  
*Habitat Halæ Saxonum, statura scotiæ.*

upfalien- 24. Pt. testaceus, oculis nigris, elytris striatis, thorace  
 fis. convexo-plano. *Thunb. nov. aed. Ups. 4. p. 6. n. 9.*  
*Habitat Upsaliæ, pediculi magnitudine, molli duplo minor, an hujus tribus?*

Faber. 25. Pt. testaceo-obscurus, elytris lævibus cinereo-undulatis.  
*Thunb. nov. aed. Ups. 4. p. 6. n. 10.*  
*Habitat in Hollandia, pertinace major.*

apterus. 32. Pt. capite fusco: fronte canaliculata, elytris annatis pedibus antennisque rufis, femoribus clavatis, tibiis ciliatis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 130.*  
*Habitat ---*

193. HISTER. *Antennæ clavatæ: clava solida, infimo articulo compresso, decurvato.*

*Caput intra corpus retractile.*

*Os forcipatum.*

*Elytra corpore breviora.*

*Tibiæ anteriores dentatæ.*

maximus. 1. H. maximus.

*Mus. Lud. Utr. 36.\* Hister unicolor.*

*Habitat in India, unicolori similis, sed decuplo major, thoracis angulis rotundatis, pectoris apice non ad os usque extenso.*

- major. 2. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 60. n. 1. mant. inf. I. p. 32. n. 1.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 6.*  
*Habitat in Africa, unicolori simillimus, at duplo major.*
- niger. 7. *H. niger*, punctis elevatis scaber. *Fabr. mant. inf. I. p. 32. n. 4.*  
*Habitat in Hispania, unicoloris magnitudine.*
- unicolor. 3. *H. ater*, elytris oblique striatis. *Fn. succ. 440.\* Scop. ent. carn. 30. Fabr. sp. inf. I. p. 60. n. 2. mant. inf. I. p. 32. n. 2.*  
*Degeer inf. 4. p. 342. n. 1. t. 12. f. 12. Hister niger nitidus, elytris striatis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 94. t. 1. f. 4. Attelabus totus niger, &c.*  
*Raj. inf. p. 91. n. 7. Scarabæus antennis globulosis, &c.*  
*Gunner aæ. nidros. 4. t. 16. f. 4.*  
*Schæff. ic. t. 42. f. 10. & t. 208. f. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 8. 9.*  
 β) *Hister elytris striis quinque punctatis dimidiatis. Mus. Lesk. p. 5. n. 89.*  
 γ) *Hister elytris striis tribus integris duabusque parvulis. Mus. Lesk. p. 5. n. 90.*  
*Habitat in Europæ & Americæ arena, terra, stercore, β) triplo, γ) quadruplo minor.*
- cyaneus. 8. *H. thorace æneo, elytris cærulescentibus. Fabr. sp. inf. I. p. 60. n. 3. mant. inf. I. p. 32. n. 4.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- planus. 9. *H. planus ater opacus, elytris lævissimis. Fabr. mant. inf. I. p. 32. n. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Helvetia.*
- brun-  
neus. 10. *H. ferrugineus, elytris substriatis. Fabr. sp. inf. I. p. 61. n. 4. mant. inf. I. p. 32. n. 6.*  
*Habitat in Sueciæ stercore.*
- pygmæus. 4. *H. ater, elytris lævissimis. Fn. succ. 441. Fabr. sp. inf. I. p. 61. n. 5. mant. inf. I. p. 32. n. 7.*  
*Degeer inf. 4. p. 344. n. 4. Hister nigro-fuscus, &c.*  
*Schæff. ic. t. 42. f. 10.*  
*Habitat in Europa boreali, unicolori simillimus, at quadruplo minor.*

- depressus. 11. *H. depressus ater nitidissimus*, elytris substriatis. *Fabr. mant. inf. p. 32. n. 8.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 20. n. 7.* Hister compressus.  
*Habitat sub betulæ cortice.*
- abbreviatus. 12. *H. ater*, elytris crenato-striatis: striis interioribus abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 61. n. 6. mant. inf. 1. p. 32. n. 9.*  
*Habitat in America boreali, statura pygmaei.*
- bimaculatus. 5. *H. ater*, elytris posterius rubris. *Fn. suec. 442.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 6. n. 7. mant. inf. 1. p. 33. n. 10.*  
*Scop. ent. carn. 51.* Hister fimetarius.  
*Degeer inf. 4. p. 343. n. 2.* Hister niger nitidus, &c.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 95. n. 2.* Attelabus niger, &c.  
*Udm. diff. 80.* Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.  
*Schaeff. ic. t. 3. f. 9.*  
*elem. t. 24. f. 1.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 1.*  
*Habitat in Europæ stercore bovino.*
- quadrimaculatus. 6. *H. ater*, elytris bimaculatis. *Fn. suec. 443.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 61. mant. inf. 1. p. 33. n. 11.*  
*Degeer inf. 4. p. 344. n. 3.* Hister niger nitidus, &c.  
*Gadd satag. 76.* Scarabæus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro.  
*Schaeff. elem. t. 24. f. 2.*  
*icon. t. 3. f. 9. & t. 14.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 3.*  
*Habitat in Europa boreali, maculis elytrorum interdum cohærentibus.*
- æneus. 13. *H. æneus*, elytris basi striatis apice punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 9. mant. inf. 1. p. 33. n. 12.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 95. n. 3.* Attelabus nigro cupreus.  
*Habitat in Anglia, Gallia.*
- detritus. 14. *H. ater nitens*, elytris piceis apice obscuris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 10. mant. inf. 1. p. 33. n. 13.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- striatus. 152. *H. ater*, thorace elytrisque striatis. *Forster nov. sp. inf. cent. 1. p. 11. n. 11.*  
*Habitat in Anglia,*

pulica-  
rius! 16. *H. niger*, elytris striatis apice pallidis. *Thunb. nov. act.*  
*Ups. 4. p. 7. n. 11.*  
*Habitat in Suecia, pygmæi magnitudine.*

apterus. 17. *H. fulvus*, alis nullis. *Scop. ent. carn. n. 32.*  
*Habitat in Carniola.*

# 194. GYRINUS. *Antennæ cylindricæ.*

*Maxilla cornea, acutissima.*

*Oculi 4: duo supra, duo infra.*

Natator. 1. *G. substriatus*. *Geoffr. ins. par. 1. p. 194. t. 3. f. 3. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 297. n. 1. mant. inf. 1. p. 194. n. 1.*  
*Fn. suéc. 779. Scop. ent. carn. 299. Dytiscus ovatus*  
*glaber, antennis capite brevioribus obtusis.*  
*Merret pin. 203. Pulex aquaticus.*  
*Pet. gaz. 21. t. 13. f. 9. Scarabæus niger nostras, supra*  
*aquam velociter circumnâns.*  
*Raj. inf. p. 89. n. 9. Scarabæus aquæ, subrotundus e*  
*caruleo viridi splendente undique tinctus.*  
*Modeer act. soc. physiogr. Lond. 1. 3. p. 158. Gyrinus*  
*pygolampis.*  
*Roef. inf. 3. p. 195. t. 31.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 43.*  
*Poda inf. 44. n. 4.*  
*Schæff. elem. t. 67.*  
*Habitat in Europæ lacubus, frequens, nitidissimus, fœtens,*  
*velocissime supra aquam per orbés cursitans, dum verò*  
*urinatur, bullam aëream hydrargyricoloris secum trahens.*

bicolor. 3. *G. niger* subtus ferrugineus, pedibus posterioribus com-  
pressis. *Fabr. mant. 1. p. 194. n. 2.*  
*Habitat in Sueciæ aquis, natatore major.*

australis. 4. *G. substriatus* virescens: elytris abbreviatis unidentatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 2. mant. inf. 1. p. 194. n. 3.*  
*Modeer act. soc. physiogr. Lond. 1. 3. p. 159. n. 5.*  
*Habitat in novæ Hollandiæ aquis.*

america-  
nus. 2. *G. lævis* ater opacus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 3.*  
*mant. inf. 1. p. 194. n. 4. Modeer act. soc. physiogr.*  
*Lond. 1. 3. p. 157. n. 2.*  
*Habitat in Americæ meridionalis aquis, natatori similis,*  
*sed dupla major.*

spinofus. 5. *G. niger nitidus*, thoracis elytrorumque margine flavo, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 298. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 194. n. 5.

*Habitat in Coromandel, congeneribus similis, at spinis elytrorum duabus elongatis acutissimis distinctus.*

grossus. 6. *G. subtus ater*, supra niger, lævis, glaberrimus, elytris apicibus rotundatis. *Modeer aḡ. soc. physiogr. Lond.* 1. 3. p. 156. n. 1.

*Habitat in aquis claris ad Caput bonæ spei.*

formosus. 7. *G. subtus ater*, pectore, sterno pedibusque ferrugineis, supra obscure æneo-virescens, linea labii transversa, maculis binis frontis, thoracis linea transversa interrupta, striisque elytrorum rubro-subauratis. *Modeer aḡ. soc. physiogr. Lond.* 1. 3. p. 157. n. 3.

β) *Gyrinus minor non auratus*. *Modeer aḡ. soc. physiogr. Lond.* 1. 3. p. 157.

*Habitat in aquis claris ad Caput bonæ spei, β) duplo minor.*

orientalis. 8. *G. subtus pallide ferrugineus*, supra æneo-niger, elytris utrinque compressis striatis subauratis, posterius quadridentatis. *Modeer aḡ. soc. physiogr. Lond.* 1. 3. p. 160. n. 6.

*Habitat — — teretiufculus, elytris abdominis longitudine.*

Viola aquatica. 9. *G. subtus pallide ferrugineus*, supra ater glaberrimus, subdomen oso murinus. *Modeer aḡ. soc. physiogr. Lond.* 1. 3. p. 160. n. 7.

*Aldr. inf.* 1. 7. c. 1. *Jonst. inf.* 1. 4. c. 1. *Viola aquatica.*  
*Habitat in aquis falsis.*

## 195. BYRRHUS. *Antennæ clavatæ* : clava perforata.

*Palpi æquales, subclavati.*

*Maxilla bifida.*

*Labium bifidum.*

Gigas. 1. *B. niger*, elytris punctatis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 38. n. 1.

*Habitat in Austria, pilula major.*

*Feminae anus aculeo armatus.*

- Pilula.* 4. *B. fuscus*, elytris striis atris interruptis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 69. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 38. n. 2.  
*Fr. succ.* 427. *Dermestes tomentosus* ovatus fusco-nebulosus.  
*Degeer inf.* 4. p. 213. n. 9. t. 7. f. 23. *Dermestes ovatus*, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 4. p. 116. n. 1. t. 1. f. 8. *Cistela subvillosa* viridescens, &c.
- β) *Byrrhus maculatus*. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 25. n. 2.  
*Habitat in Europæ sabulosis*, colore nigro interdum conspicuus.
- ater.* 2. *B. niger immaculatus*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 69. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 38. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 117. n. 3. *Cistela nigra nitens glabra*.  
*Habitat in Germania*, *pistulæ statura & magnitudine*.
- dorsalis.* 3. *B. nigricans*, coleoptris macula transversa ferruginea.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 38. n. 4.  
*Habitat Kilonii*, *atro proxime affinis*, *at paulo minor*.
- varius.* 5. *B. niger*, thorace æneo, elytris fuscis: striis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 69. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 38. n. 5.  
*Habitat in Anglia*.
- æneus.* 6. *B. totus æneus*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 70. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 38. n. 6.  
*Habitat Upsaliæ*, *scutello albido*.
- nitidus.* 7. *B. totus nitidus*, supra æneo-viridis, subtus niger. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 252.  
*Habitat Halæ Saxonum in saxosis*, *vere infra saxa frequens*.
- fasciatus.* 8. *B. nigricans*, elytris fascia lata fusca. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 26. n. 4.  
*Voet coleoptr. t.* 32. f. 2?  
*Habitat Berolini*.
- viridescens.* 9. *B. virescens*, scutello luteo. *Mus. Lesk. p.* 6. n. 116.  
*Habitat in Europa*.



**ANTHRENUS.** *Antennæ* clavatæ : clava solida.  
*Palpi* inæquales , filiformes.  
*Maxilla* membranacea , linearis ,  
 bifida.  
*Labium* integrum.

Pimpinel- 4. *A. niger*, elytris fascia alba apice ferrugineus, litura alba.  
 læ. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 70. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 1.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 114. n. 1. *Anthrenus squamosus niger*, &c.  
*Habitat in pimpinellæ floribus Galliæ.*

Scrophu- 1. *A. niger*, elytris albo-maculatis : futura sanguinea. *Fabr.*  
 lariæ. *sp. inf.* 1. p. 70. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 2.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 569. *Byrrhus Scrophulariæ.*  
*Fn. suec.* 429. *Dermestes tomentosus maculatus*, futura  
 elytrorum rubra.  
*Degeer inf.* 4. p. 200. n. 6. t. 7. f. 20. *Dermestes ovatus*  
*niger*, &c.  
*Raj. inf.* p. 85. n. 35.  
*Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 11. h.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 11. f. 9. 10.  
*Schaeff. elem.* t. 17.  
 icon. t. 176. f. 4.  
*Habitat in Europæ scrophulariis.*

museo- 2. *A. nebulosus*, elytris subnebulosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 70.  
 rum. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 3.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 568. n. 2. *Byrrhus museorum.*  
*Fn. suec.* 430. *Dermestes tomentosus maculatus*, elytris  
 puncto albo.  
*Degeer inf. par.* 4. p. 203. n. 7. t. 8. f. 11. 12. *Dermestes*  
*ovatus fuscus*, &c.  
*Habitat in museis, animalia asservata destruens, libris quo-*  
*que infestus, præcedenti similis, at minor.*

Verbasci. 3. *A. niger*, elytris fasciis tribus undatis albis. *Fabr. sp. inf.*  
 1. p. 70. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 39. n. 4.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 568. n. 3. Byrrhus fuscus, elytris fasciis tribus undularis pallidis.

*Geoffroi inf. par.* I. p. 115. n. 2. Anthrenus squamosus niger, elytris fuscis, &c.

*Bergstr. nomencl.* I. t. II. f. II. 12.

- vagus. 5. A. cinereus, elytris fasciis nigris tribus obsoletis.  
*Habitat in Europa, Suecia; an hujus generis?*
- glaber. 6. A. glaber niger, elytris, pedibus antennisque fuscis.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 26. n. 4.  
*Habitat Berolini, magnitudine dermestis pellionis.*
- fuscus. 7. A. fuscus pilis luteis levissime tomentosus apice pallido.  
*Mus. Lesk. p.* 20. n. 119. b.  
*Habitat in Europa.*

196. SILPHA. *Antennæ clavatæ: clava perfoliata.*  
*Elytra marginata.*  
*Caput prominens.*  
*Thorax planiusculus, marginatus.*

- germani- I. S. oblonga atra, clypeo obrotundo inæquali marginato,  
 ca. elytris obtusissimis margine laterali ferrugineis.  
*Degeer inf.* 4. p. 173. n. 2. t. 6. f. 4. Silpha tota atra,  
 elytris truncatis abdomine brevioribus.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 83. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 569. n. 1.  
 Necrophorus ater, thorace obrotundo inæquali.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 99. n. 2. Dermestes thorace mar-  
 ginato, elytris abscessis, totus niger.  
*Raj. inf. p.* 107. n. 1.  
*List. scar. angl. p.* 381.  
*Voet coleoptr. t.* 30. f. 4. 5.  
*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 10.
- β) Silpha speciosa, elytris maculis duabus aurantiacis.  
*Schulze Naturf.* 6. p. 95. t. 4.
- γ) Silpha humator. *Bergstr. nomencl.* I. t. 10. f. 9.  
*Habitat multiplici varietate in Germania, cadavera ovo*  
*imprægnata sepeliens.*

Vespillo. 2. *S. oblonga atra*, clypeo orbiculato inæquali, elytris fascia duplici ferruginea. *Fn. suec.* 444\* *Mus. Lud. Ulr.* 37.\*  
*Degeer inf. par.* 4. p. 168. n. 1. t. 6. f. 1. *Silpha nigra*,  
 elytris truncatis, &c.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 84. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 48. n. 2. *Nicrophorus ater*, elytris fascia duplici ferruginea.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 98. n. 1. t. 1. f. 5. *Dermeestes thorace marginato*, &c.

*Scop. ent. carn.* 33. *Dermeestes vespillo*.

*Raj. inf.* 106.

*Lister scar.* p. 381. n. 2.

*Mouff. inf.* 149. f. 1.

*Imp. alt.* 692. t. 2. f. 2.

*Blanck. inf.* 160. t. 14. f. 1.

*Gleditsch act. Berol.* 1752. p. 53.

*Petiv. gazoph.* t. 13. f. 6.

*Poda inf. t.* 1. f. 2.

*Voet coleopt. t.* 30. f. 1-3.

*Roef. inf.* 4. t. 1. f. 1. 2.

*Frisch inf.* 12. p. 28. t. 3. f. 2.

*Bergstr. nomencl.* 1. 10. 14. t. 1. f. 14.

*Schaeff. ic. t.* 9. f. 4.

g) *Silpha vespilloides*. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 32. n. 3.

*Habitat multiplici varietate, in Europa, America, cada- vera ovo imprægnata sepeliens, moschum non raro spi- rans, elytris erectis approximatis, ocysime volitans, acaris infestata; in America interdum decuplo major.*

bimaculata. 3. *S. ovata nigra*, antennarum capitulis globosis, pedibus ferrugineis.

*Habitat in Barbaria, oryzae magnitudine, thoracis margine subferrugineo, elytris in medio macula rubra notatis.*

quadripustulata. 5. *S. oblonga nigra*, elytris punctis duobus ferrugineis. *Fn. suec.* 446.\*

*Degeer inf.* 4. p. 185. n. 12. t. 6. f. 20. 21. *Silpha nigra oblonga depressa*, &c.

*Fabr. syst. ent.* p. 69. n. 3. *Tritoma quadripustulata*.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 80. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 45. n. 5.

*Ips quadripustulata*.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 106. n. 16?

*Frisch inf.* 9. 36. t. 19.

g) *Silpha americana* quadruplo major.

*Habitat in Europæ & Americæ ligno putrescente, glaber-  
rimus, statura scarabæi, larva oblonga hirsuta grisea.*

dorsalis. 4. *S. oblonga supra pallida coleoptris macula media nigra.  
Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 4.*

*Habitat in Europa australi, quadripustulata paulo major.*

notata. 17. *S. atra, elytris macula basæos rufa. Fabr. mant. inf. 1.  
p. 45. n. 3.*

*Habitat Halæ Saxonum, dorsalis statura.*

bipunc- 53. *S. atra, elytris rufis: macula magna atra. Fabr. mant.  
tata. inf. 1. p. 45. n. 2.*

*Habitat in Europa magis australi.*

fasciata. 24. *S. atra, elytris fasciis duabus rufis: anteriori nigro-  
maculata. Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 1. mant. inf. 1.  
p. 45. n. 1.*

*Habitat in America boreali.*

rufipes. 25. *S. atra, capite, thorace pedibusque ferrugineis. Fabr.  
mant. inf. 1. p. 45. n. 6.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 2. Tritoma rufipes.*

*Habitat in Norvegiæ fungis arboreis, in Germania du-  
plo major.*

quadri- 27. *S. rufa, thorace elytrisque nigris: his maculis duabus  
maculata. rufis. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 8.*

*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 256. Silpha qua-  
drimaculata oblonga ferruginea, superne nigra, ely-  
tris striatis: maculis duabus ferrugineis.*

*Habitat Halæ Saxonum, ad russicam accedens.*

punctu- 32. *S. oblonga nigra, elytris punctis fasciæque posteriore  
lata. fulvis. Fabr. mant. inf. 1. p. 46. n. 9.*

*Habitat Halæ Saxonum, parva.*

glabra. 34. *S. oblonga nigra, thorace rufo, elytris nigris: ma-  
culis duabus obsolete rufis, pedibus rufis. Schaller  
Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 255.*

*Fabr. mant. inf. 1. p. 46. n. 10. Ips sanguinicollis.*

*Habitat Halæ Saxonum, mediæ magnitudinis, ad russi-  
cam accedens.*

picea. 36. *S. picea, elytris nigris, basi fasciæque posteriore ferru-  
gineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 81. n. 3. mant. inf. 1. p. 46.  
n. 11.*

*Habitat in Germania, quadripustulata minor.*

- quadri- 37. *S. oblonga nitida atra*, elytris maculis duabus albis, an-  
guttata, teriore lineata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 81. n. 4. *mant. inf.*  
1. p. 46. n. 14. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 7. p.  
158. n. 4. t. 43. f. 17.  
*Habitat Kilonij.*
- nigricor- 38. *S. flava*, antennis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 46. n. 12.  
nis. *Habitat Halæ Saxonum, ænea paulo major; an hujus  
generis?*
- ænea. 39. *S. oblonga rufa*, elytris cæruleo-viridibus, antennis  
nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 254.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 46. n. 13. *Ips ænea.*  
*Habitat in silvis Magdeburgicis, mediæ magnitudinis.*
- crenata. 40. *S. oblonga nigra*, thorace rugoso, elytris striato-crenatis :  
maculis duabus rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 81. n. 5.  
*mant. inf.* 1. p. 46. n. 15. *Herbst apud Fuesli Arch.*  
*Inf.* 4. p. 31. n. 2. t. 20. f. 2.  
*Fabr. Syst. ent.* p. 69. n. 4. *Tritoma crenata.*  
*Habitat in Suecia, quadripustulata quadruplo minor.*
- rufifrons. 41. *S. oblonga glabra atra*, fronte pedibus maculisque duabus  
elytrorum ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 81. n. 6.  
*mant. inf.* 1. p. 46. n. 16.  
*Fabr. syst. ent.* p. 69. n. 5. *Tritoma rufifrons.*  
*Habitat in Anglia.*
- bifasciata. 42. *S. nigra*, elytris fasciis duabus punctoque apicis ferru-  
gineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 47. n. 17.  
*Habitat Halæ Saxonum, minuta.*
- nigra. 43. *S. oblonga nigra immaculata.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 47.  
n. 18.  
*Habitat in Uplandiæ boletis, parva.*
- hæmor- 79. *S. rufa*, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inf.* 2.  
rhoidalis. *app.* p. 378.  
*Habitat in Suecia, rufipedi proxime affinis.*
- binotata. 80. *S. testacea*, elytris striatis : maculis duabus nigris. *Pe-  
tagn. inf. Calabr. p.* 7. n. 31. f. XXXIII.  
*Habitat in sepibus circa Bellimontum Calabriae, statura  
rufficæ.*



- spadicea. 81. *S. oblonga* glabra, oculis apiceque elytrorum nigris.  
*Lesk. it. p. 14. t. A. f. 3.*  
*Habitat in Lufatiæ monte Keulenberg, 2½ lineas longa.*
- sexdenta- 44. *S. nigra*, thorace sexdentato, elytris angustis punctato-  
 ta. fulcatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 31. n. 3. t. 20. f. 21.*  
*Habitat in oryza, 1½ lineas longa.*
- collaris. 45. *S. ovata* nigra, thorace, pedibus antennisque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 256.*  
*Habitat in ligno ducatus Magdeburgici, ruffica dimidio minor.*
- carriaria. 46. *S. fusca*, elytris obtusis pubescentibus : maculis duabus testaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 257.*  
*Habitat in cadaveribus, nitidula rufipedi similis, at minor.*
- indica. 6. *S. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace anteri-  
 rius bidentato. *Mus. Lud. Ulr. 38. \* Fabr. sp. inf. I. p. 85. n. 3. mant. inf. I. p. 48. n. 4.*  
*Habitat in India.*
- americana- 7. *S. ovata* fusca, clypeo flavo, centro nigro intra annu-  
 na lum fulvum.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 85. n. 4. mant. inf. I. p. 48. n. 5. Silpha depressa nigra, thorace flavo : centro nigro.*  
*Catesb. Car. 3. t. 10. f. 5. Blatta americana.*  
*Habitat in America, vespillonis magnitudine.*
- Seminu- 8. *S. ovata* atra nitida immaculata, abdomine rubro. *Fn. suec. 447. \**  
 lum. *Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 16. mant. inf. I. p. 44. n. 13.*  
*Sphæridium atrum, abdomine pedibusque rufis.*  
*Habitat in Europæ hortis & floribus, parva; testam dasypodis instar componens, terrefacta similis semini caput & pectus abdomini applicans, ut exacte granum glabrum lucidum referat, quiete jaciendo facile seducens inventorem.*
- agaricina. 9. *S. ovata* atra glaberrima hemiptera. *Fn. suec. 448.*  
*Scop. ent. carn. 43. Dermestes agaricinus.*  
*Habitat in agaricis,*
- ruffica. 10. *S. oblonga* rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris.  
*Fn. suec. 449. \* Fabr. sp. inf. I. p. 85. n. 5. mant. inf. I. p. 48. n. 6.*



*Uddm. diff.* 7. *Dermestes elytris nigris*, capite, clypeo & abdomine rubro.

*Degeer inf.* 5. p. 283. n. 1. t. 8. f. 12. *Antribus ruber*, &c.  
*Herbst Apud Fuesli Arch. Inf.* 7. p. 159. n. 14. t. 43. f. 6.

*Habitat in Europa boreali, & Calabria.*

livida. 47. *S. fusca thorace elytris pedibusque lividis.* *Fabr. mant.*  
*I. p.* 48. n. 3. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 37.  
n. 10.

*Habitat in Germania littoralis flatura, sed duplo minus*

littoralis. 11. *S. atra*, elytris lævibus : lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Fn. suec.* 450. \* *Scop. ent. carn.* 5.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 85. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 48. n. 1.  
*Fn. suec.* 380. Castida atra, elytris lineis tribus elevatis  
antennis antice testaceis.

*Degeer inf.* 4. p. 176. n. 4. *Silpha rufo-clavata*, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 102. n. 3. *Peltis nigra*, &c.  
*Schaeff. ic. t.* 218. f. 1.

*Frisch inf.* 6. p. 12. t. 5.

*Bergstr. nomencl.* 1. 24. 6. t. 3. f. 6.

β) *Silpha clavipes?* *Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 14?

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 11. f. 3.

*Habitat in Europæ cadaveribus.*

*Larva ovata, depressa, fusca, voracissima.*

furina- 48. *S. atra*, elytris fascia posteriore flava, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 85. n. 1. *mant. inf.*  
mensis. *I. p.* 48. n. 1.

*Habitat in America meridionali.*

inæqualis. 49. *S. atra*, elytris lævibus : lineis elevatis tribus, thorace inæquali emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 1.  
*mant. inf.* 1. p. 49. n. 13.

*Habitat in America septentrionali, atratae affinis.*

granulata. 50. *S. atra*, elytris lineis elevatis tribus punctisque granularis, thorace emarginato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 49. n. 12.  
*Habitat in Africa, atrata paulo major.*

atrata. 12. *S. atra*, elytris punctatis : lineis elevatis tribus lævibus, thorace integro. *Fn. succ.* 451. \* *Scop. ent. carn.* 5.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 11.  
*Laichart. inf. tyr.* 1. p. 98. n. 10. *Silpha tyrolensis.*  
*Degeer inf.* 4. p. 177. n. 5. t. 6. f. 15. *Silpha punctata*, &c.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 118. n. 1. Peltis nigra, &c.*

*Schaeff. elem. t. 96. f. 1.*

*icon. t. 93. f. 5.*

*Habitat in Europæ agris & viis frequens.*

thoracica. 13. *S. nigra*, elytris obscuris: linea elevata unica, thorace testaceo. *Fn. suec. 452. \* Scop. ent. carn. 54. Stroem. act. nigr. 3. p. 384. t. 6. f. 1. Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 6. mant. inf. 1. p. 48. n. 7.*

*Degeer inf. 4. p. 174. n. 3. t. 6. f. 7. Silpha nigra, &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 121. n. 6. Peltis nigra, &c.*

*Gadol. diff. 25. Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, macula lata nigra nitida.*

*Raj. inf. p. 90. n. 10. Scarabæus primo similis, parum canaliculatus, scapulis croceis.*

*Bergstr. nomencl. 1. 23. 5. t. 3. f. 5.*

*Schaeff. ic. t. 75. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 12.*

*Habitat in Europæ cadaveribus.*

lævicol- 51. *S. gibba nigra*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, lis. thorace lævi emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 7. mant. inf. 1. p. 48. n. 8.*

*Habitat in nova Hollandia.*

margina- 52. *S. atra*, thoracis margine pallido, elytris fuscis. *Fabr. lis. sp. inf. 1. p. 86. n. 8. mant. inf. 1. p. 48. n. 9. Forster cent. inf. 1. p. 17. n. 17. Silpha noveboracensis. Habitat in America boreali, atratæ magnitudine.*

quæri- 14. *S. nigra*, elytris pallidis: puncto bascos medioque nigro, punctata. thorace emarginato. *Fn. suec. 453. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 17. mant. inf. 1. p. 49. n. 20.*

*Pet. gaz. t. 12. f. 2.*

*Schreb. inf. 2. f. 5. Silpha quadripunctata nigra*, elytris exalbidis: maculis 4 nigris.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 122. n. 7. Peltis nigra*, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptorumque 5 nigris.

*Degeer inf. 4. p. 181. n. 6. t. 4. Silpha corpore nigro, &c.*

*Lepcehin it. 1. p. 202. t. 16. f. 4. Silpha flavicans.*

*Habitat in Europæ, frequens in Angliæ quercu.*

pedemon- 54. *S. testacea*, antennis apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88. tana. n. 18. mant. inf. 1. p. 49. n. 21.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 123. n. 9.*

*Habitat in agris Pedemontanis.*

hirta. 55. *S. nigricans*, villis flavis splendidis hirta, elytris lineis duabus & dimidia elevatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 34. n. 11.*

*Habitat Berolini, sinuatae affinis.*

sinuata. 56. *S. thorace emarginato scabro*, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88. n. 16. mant. inf. 1. p. 49. n. 19.*

*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 15. Silpha appendiculata.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 119. n. 2. Peltis nigra, &c.*

*Habitat in Anglia & Germania.*

carinata. 57. *S. spadicea*, clypeo glaberrimo, latissimo, marginato, anterius exciso, elytris margine carinatis glabris: lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 34. n. 12.*

*Habitat in Pomerania, opacae affinis.*

opaca. 15. *S. fusca*, elytris concoloribus: lineis elevatis subternis thorace anterie truncato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88. n. 15. mant. inf. 1. p. 49. n. 18.*

*Müller prodr. zool. dan. p. 63. n. 535. Peltis opaca, &c. Schaeff. ic. t. 93. f. 6.*

rugosa. 16. *S. nigricans*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace rugoso. posterius sinuato. *Fn. suec. 445. \* Scop. ent. carn. 53. Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 9. mant. inf. 1. p. 49. n. 10.*

*Fn. suec. 1. n. 379. Cassida atra*, elytris striis quinque punctisque elevatis.

*Degeer inf. 4. p. 182. n. 7. & inf. 5. p. 43. n. 5. t. 2. f. 21.*

*Silpha nigra opaca, &c. & Tenebrio rugosus, &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 120. n. 4. Peltis nigra, &c.*

*Raj. inf. 90. p. 9. Scarabæus inter cadavera frequens, &c.*

*Bergstr. nomencl. 1. 23. 4. t. 3. f. 4.*

β) *Silpha pellæ acephalos. Bergstr. nomencl. t. 9. f. 8.*

*Habitat frequentissima in Europa & Sibiria, cadavera pisces, carnes consumens, capta humorem fetidissimum evomens.*

cancellata. 58. *S. nigra*, thorace lævi, elytris rugosis: lineis elevatis tribus. *Fabr. mant. 1. p. 49. n. 17.*

*Habitat Halæ Saxonum, obscurae proxime affinis.*

obscura. 18. *S. nigra*, elytris punctatis : lineis elevatis tribus, thorace antèrius truncato. *Fn. suec.* 457. *Scop. ent. carn.* 57. *Fabr. sp. inf.* I. p. 33. n. 14. *mant. inf.* I. p. 49. n. 16. *Uddm. diff.* 8. *Cassida ovata nigra*, lineis elevatis tribus : media longissima.

β) *Silpha punctata*. *Bergstr. nomencl. t.* 9. f. 9?  
*Habitat in Europa boreali, rarior.*

ferruginea. 19. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatissimis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. suec.* 458. *Scop. ent. carn.* 60. *Fabr. sp. inf.* I. p. 89. n. 19. *mant. in.* I. p. 49. n. 22. *Degeer inf.* 4. p. 183. n. 9. *Silpha cimicoides*, &c. *Laichart. inf. tyr.* I. p. 102. n. 1. *Ostoma rubicunda*. *Raj. inf.* p. 84. n. 33. *Schaeff. ic. t.* 40. f. 7. *Habitat in Europa boreali, etiam Calabria.*

reticulata. 20. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato serrato. *Habitat in Europa, ferruginea duplo angustior.* *Clypeus lunatus*, latitudine thoracis, & ultra thoracem exsertus; hic elytris angustior, marginibus lateralibus crenulatis; elytra profunde sulcata; inter singulos sulcos ordine punctorum excavato.

grossa. 21. *S. atra*, elytris punctatis : lineis elevatis tribus laevibus, thorace transverso emarginato. *Fn. suec.* 459. *Uddm. diff.* 9. *Fabr. sp. inf.* I. p. 87. n. 12. *mant. inf.* I. p. 49. n. 14. *Silpha truncata.* *Habitat in Europa, ovata, punctis elytrorum confertis.*

laevigata. 59. *S. atra*, elytris laevibus subpunctatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 87. n. 13. *mant. inf.* I. p. 49. n. 15. *Geoffr. inf. par.* I. p. 122. n. 8. *Peltis nigra tota*, &c. *Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 16. *Habitat in Europæ silvis.*

oblonga. 22. *S. nigra*, elytris striato-punctatis, lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Fn. suec.* 460. *Fabr. sp. inf.* I. p. 89. n. 20. *mant. inf.* I. p. 50. n. 23. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. t. 20. f. 22. *Degeer inf.* 4. p. 185. n. 71. *Silpha oblonga*, &c. *Fn. suec.* 381. *Cassida atra*, elytris striis 10 elevatis, punctis excavatis striatis.

β) *Silpha flavifrons*, *Schaeff. elem. t.* 18?

- Scabra.** 23. *S. oblonga nigra*, thorace antèrius elytrisq[ue] ante apicem bidentatis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 50. n. 24. Silpha dentata?*  
*Habitat in Europa, statura & magnitudine oblongæ.*
- limbata.** 60. *S. nigra*, thoracis elytrorumq[ue] margine, subferrugineo, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 89. n. 21. mant. inf. 1. p. 50. n. 25.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura ferrugineæ, paulo minor.*
- undata.** 61. *S. nigra nitida*, elytris fasciis duabus undatis, punctoq[ue] apicis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 50. n. 26.*  
*Habitat in Saxonia, sub arborum cortice, dermestiti undati statura & magnitudine.*
- succincta.** 26. *S. ferruginea nitida*, elytris medio nigris.  
*Habitat in Suecia, pediculo major.*
- fulca.** 28. *S. fusca elongata*, subtus picea.  
*Habitat in Suecia, pediculo major, statura cicindelæ.*
- depressa.** 29. *S. ferruginea*, elytris lævibus, thorace emarginato.  
*Fn. suec. 463. \**  
*Habitat in Europa.*
- uralensis.** 62. *S. supra atra*, subtus ferruginea, thoracis atq[ue] elytrorum marginibus rubicundis. *Lepech. it. 1. p. 312. t. 16. f. 3.*  
*Habitat in deserto Uralensi, aliorum insectorum cadaverum sepeliens; an hujus generis?*
- grisea.** 30. *S. grisea*, elytris lævibus, thorace emarginato. *Fn. suec. 464.*  
*Habitat in Europa.*
- testacea.** 31. *S. testacea*, thorace integro.  
*Habitat in Germania, nitidula æstiva triplo major, hujus generis?*
- pulicaria.** 33. *S. nigra oblonga*, elytris abbreviatis, abdomine acuto.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 70. n. 12. mant. inf. 1. p. 44. n. 15.*  
*Spæridium pulicarium.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 564. n. 24. Fn. suec. 370. Dermestes pulicarius.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 308. n. 4. Anthribus niger.*  
*Raj. inf. 108. n. 29.*  
*Habitat frequens in Europa, in floribus cursitans.*



- minuta. 63. *S. atra*, elytris striatis, pedibus concoloribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 11. mant. inf. I. p. 44. n. 14.*  
*Habitat in Anglia.*
- funeraria. 64. *S. atra*, immaculata, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 9. mant. inf. I. p. 43. n. 12. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 30. n. 4. t. 20. f. 17.*  
*Habitat in Angliæ stercore.*
- cruentata. 65. *S. atra nitida*, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 8. mant. inf. I. p. 43. n. 11.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- rufa. 66. *S. atra nitida*, thorace pedibusque anterioribus rufis. *Fabr. mant. inf. I. p. 43. n. 10.*  
*Habitat Halæ Saxonum, statura parva & gibba hamor-rhoidalis.*
- hamor-rhoidalis. 67. *S. atra*, elytris apice rufis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 7. mant. inf. I. p. 43. n. 9.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 308. n. 5. Anthribus niger ovatus, &c.*  
*Habitat in Europæ stercore bovino.*
- melano-cephala. 68. *S. atra glabra*, elytris griseis: macula communi baseos nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 6. mant. inf. I. p. 43. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 16. Fn. suec. 425. Dermestes melanocephalus, &c.*  
*Habitat in Europæ stercore frequens.*
- atomaria. 69. *S. nigra subovata*, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 5. mant. inf. I. p. 43. n. 7.*  
*Sphæridium læve atrum, elytris crenato-striatis, pedibus pallidis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 117. n. 19. Dermestes niger subrotundus, &c.*  
*Habitat in Europæ stercore.*
- striata. 69. *S. ferruginea*, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 43. n. 6.*  
*Habitat Kilonii, statura marginata.*
- marginata. 70. *S. lavis atra*, elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. I. p. 43. n. 5.*  
*Habitat Halæ Saxonum, glabrata statura & magnitudine.*



- glabrata. 71. *S. atra*, antennis pedibusque rufis, elytris lævibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 4. mant. inf. 1. p. 43. n. 4.*  
*Habitat in insula Madera, statura dyticolis, at minor.*
- dyticolis- 72. *S. ferruginea*, elytris atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 3.*  
 des. *mant. inf. 1. p. 43. n. 3.*  
*Habitat in insula S. Helenæ.*
- stercorea. 73. *S. atra nitida*, elytrorum macula apicis rubra, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 2. mant. inf. 1. p. 43. n. 2.*  
*Habitat Kilonii in stercore.*
- scarabæoides. 74. *S. ovata atra*, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 1. mant. inf. 1. p. 43. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 17. Fn. succ. 428.\* Scop. ent. carn. 36. Dermestes scarabæoides.*  
*Gadd satag. 76. Scarabæus ovatus niger glaber; maculis 2 rubris in singulo elytro.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 106. n. 17. Dermestes niger, &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 345. t. 12. f. 17. Hister testudinarius, &c.*
- insignita. 75. *S. nigra*, elytris obsolete striatis: maculis duabus magnis coccineis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 30. n. 1. t. 20. f. 18.*  
*Habitat rarior Berolini in stercore vaccino.*
- nigricans. 76. *S. nigricans*, elytris lævissimis: maculis quatuor flavis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 30. n. 6. t. 20. f. 19.*  
*Habitat rarior Berolini in stercore vaccino, statura magnitudine melanocephalæ.*
- histeroides. 77. *S. nigra*, antennis pedibusque rubris, elytris abbreviatis macula rubra. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 8. n. 12.*  
*Habitat Upsaliæ, oblonga, angusta, pediculo vix majore.*
- biguttata. 78. *S. tota ferruginea*, elytris linea punctoque pallida. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 9. n. 13.*  
*Habitat Upsaliæ, depressæ magnitudine & facie.*
- lutea. 81. *S. lutea*, elytris pubescentibus lævibus. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Suecia.*
- ruficornis. 82. *S. atra glabra*, antennis, abdomine pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 142.*  
*Habitat in Europa.*

- exilis.* 83. *S. atra* glabra minima, capite thoraceque incurvis.  
*Mus. Lesk. p. 7. n. 144. c.*  
*Habitat in Europa.*
- spadicea.* 84. *S. ferrugineo fusca* glabra, capite thoraceque incurvis.  
*Mus. Lesk. p. 8. n. 144. A.*  
*Habitat in Europa.*
- trilineata.* 85. *S. elytris punctatis* : lineis elevatis tribus ; intermedia longissima. *Mus. Lesk. p. 8. n. 154. b.*  
*Habitat in Europa.*
- melan-* 86. *S. testacea* , oculis nigris, elytris guttis quinque nigris ;  
*ophthalma.* una communi ad scutellum. *Mus. Lesk. p. 9. n. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- multico-* 87. *S. nigra* , antennis pedibusque rufis , thoracis testacei  
*lor.* dorso fusco : punctis duobus impressis ; elytris testaceis : punctis duobus , tænia media , fascia inæquali versus apicem apiceque ipso nigris. *Mus. Lesk. p. 9. n. 171.*  
*Habitat in Europa , antennarum apice fusco.*
- bicolor.* 88. *S. fusca* , pedibus rufis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 172. 174.*  
*Habitat in Europa.*
- nebulosa.* 89. *S. testacea* , capite , thorace elytrisque fusco nebulosis.  
*Mus. Lesk. p. 9. n. 173.*  
*Habitat in Europa.*
- rubigino-* 90. *S. thorace angusto* : dorso sulcato , corpore fusco , elytris  
*fa.* rugosis , capite , thorace , abdomine pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. b.*  
*Habitat - - -*
- pallipes.* 91. *S. nigra* , capite , thorace , elytris pedibusque pallidis ; oculis nigris. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. d.*  
*Habitat in Europa.*
- squalida.* 92. *S. fusco testacea* ; capite , thorace antennarumque testacearum apice testaceis , elytris fordide testaceis , pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. e.*  
*Habitat - - -*
- friatula.* 93. *S. ferruginea* , elytris levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. f.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor.* 94. *S. nigra* , antennis pedibusque rufis , elytris fusco-brunneis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. g.*  
*Habitat in Europa.*

NITIDULA. *Antennæ clavatæ* : clava solida.

*Elytra marginata*.

*Caput prominens*.

*Thorax planiusculus, marginatus*.

\* *labio quadrato* : *Elophori*.

aquatica. 1. *N. fusca*, thorace rugoso elytrisq[ue] fusco-æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 1.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 573. n. 25. *Fn. suec.* 461.\* *Silpha cinerea*, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 105. n. 15. *Dermestes viridi-æneus*, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.

*Degeer inf.* 4. p. 379. n. 5. t. 15. f. 5. 6. *Hydrophilus æneus*, &c.

*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, parva, frequens inter conservas.*

elongata. 2. *N. fusca*, thorace rugoso, elytris fulcatis crenatis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 257.

*Habitat Halæ Saxonum in aquis stagnantibus sub lemna, magnitudine media ptini pertinacis, angustâ & elongata, pedibus piceis.*

nubila. 3. *N. grisea*, thorace elytrisq[ue] fulcato-rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 2.

*Habitat Hamburgi.*

minuta. 4. *N. fusca*, thorace rugoso æneo, elytris pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 3.

*Habitat in Angliæ aquis stagnantibus, aquaticæ affinis, at triplo minor.*

coccinel-28. *N. nigra*, capite, thorace elytrisq[ue] fumatis. *Musl. loides.* *Lesk. p.* 7. n. 137. b.

*Habitat in Europa, statura coccinellæ.*

fusca. 29. *N. fusco testacea*, elytris punctato striatis, antennis pedibusq[ue] testaceis. *Musl. Lesk. p.* 7. n. 137. c.

*Habitat in Europa.*

nebulosa. 30. *N. testaceo grisea*, capite fusco: tuberculis inter oculos quatuor, thorace aspero, elytris lineis elevatis sex: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 138. b.*  
*Habitat* - - an forte eadem cum *nubila*?

**\*\* labio cylindrico.**

bipustulata. 5. *N. ovata nigra*, elytris puncto rubro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 1. mant. inf. 1. p. 51. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 570. n. 4. Fn. suec. 445.* *Silpha oblonga nigra*, elytris singulis puncto unico rubro.  
*Laichart. inf. tyr. 1. p. 106. n. 3.* *Ostoma bipustulata.*  
*Degeer inf. 4. p. 186. n. 13. t. 6. f. 22. 23.* *Silpha nigra, &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 100. n. 3.* *Dermeistes niger, &c.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus, carnibus, lardo.*

obscura. 6. *N. ovata nigra obscura*, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 2. mant. inf. 1. p. 51. n. 2.* *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 2. t. 20. f. 23.*  
*Habitat in Germania.*

abbreviata. 7. *N. ovata nigra obscura*, elytris lævibus obtusis abbreviatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 3. mant. inf. 1. p. 51. n. 3.*  
*Habitat in nova Seelandia, obscuræ statura & magnitudine, pedibus nunc flavis, nunc nigris.*

marginata. 8. *N. ovata*, elytris sulcatis: margine punctisque disci ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 4. mant. inf. 1. p. 51. n. 4.*  
*Habitat in Italia, statura bipustulata.*

æstiva. 9. *N. testacea subtomentosa*, thorace emarginato, oculis nigris  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 5. mant. inf. 1. p. 51. n. 5.* *Herbst. apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 3. t. 20. f. 24.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 574. n. 32. Fn. suec. 465.* *Silpha æstiva.*  
*Habitat in Europæ floribus.*

strigata. 10. *N. ovata fusca*, thoracis margine, elytris margine, lineola baseos strigae apicis fulvis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 51. n. 7.*  
*Habitat Halæ Saxonum, mediæ magnitudinis, subtus fusca.*

varia. 11. *N. ovata*, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 92. n. 7. mant. inf. 1. p. 52. n. 8.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 76. n. 4. t. 20. f. 25.*  
*Habitat Kilonii in hortis, statura dermeistes ferruginei,*

- bicolor. 12. *N. ferruginea*, elytris nigris, fascia bascos punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 9.  
*Habitat in arvis Kiloniensibus.*
- Colon. 13. *N. nigra*, elytris ferrugineo-variis, thorace emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 10. *Syst. nat.* XII. 2. p. 573. n. 27. *Fn. suec.* 462. *Degeer inf.* 4. p. 117. n. 14. t. 6. f. 24. *Silpha Colon.*  
*Habitat in Europæ borealis graminosis.*
- limbata. 14. *N. nigra*, thoracis margine, elytrorumque limbo ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. p. 52. n. 11.  
*Habitat Halæ Saxonum parva.*
- hæmor- 15. *N. nigra*, elytris apice ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. rhoidalis. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 12.  
*Habitat Hamburgi.*
- discoidea. 16. *N. nigra*, thorace marginato, elytrorum disco ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 13.  
*Habitat in Anglia.*
- pedicula- 17. *N. nigra*, elytris lævibus, thorace marginato. *Fabr. sp.* inf. 1. p. 92. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 14.  
 ria. *Syst. nat.* XII. 2. p. 574. n. 34. *Fn. suec.* 466. *Silpha pedicularia.*  
 β) *Dermestes (psyllus) ovatus niger*, abdomine obtuso thorace elytrisque marginatis.  
*Habitat in Europæ borealis hortis, floribus, pediculi magnitudine, ovato-oblonga.*
- litura. 18. *N. testacea*, elytris litura arcuata nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 52. n. 15.  
*Habitat Halæ Saxonum, parva.*
- bipuncta- 19. *N. testacea*, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabr.* mant. inf. 1. p. 52. n. 16.  
 ta. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 58. n. 32. t. 23. f. 20. c. *Chrysomela scutellata.*  
*Habitat Halæ Saxonum, statura lituræ.*
- ænea. 20. *N. viridi-ænea*, thorace marginato, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 93. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 17.  
*Habitat in Anglia.*



- viridescens. 21. *N. viridi-ænea*, thorace marginato, pedibus rufis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 52. n. 18.*  
*Habitat Kilonii, statura æneæ.*
- pubescens. 22. *N. thorace elytrisque griseis pubescentibus. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 93. n. 14. mant. inf. 1. p. 52. n. 19.*  
*Habitat in Germania.*
- hirta. 23. *N. atra*, thorace elytrisque pubescentibus. *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 93. n. 15. mant. inf. 1. p. 52. n. 20.*  
*Habitat in Germania, pubescenti affinis.*
- rufipes. 24. *N. nigra nitida*, pedibus pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 93.*  
*n. 16. mant. inf. 1. p. 52. n. 21.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 573. n. 24. Silpha nigra lævis, tho-*  
*race submarginato, pedibus pallidis.*  
*Habitat in Europæ hortis.*
- setacea. 25. *N. ochracea immaculata*, oculis nigris, elytris lævissi-  
 mis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 6.*  
*Habitat - - - statura & magitudine coli, dermesti ferru-*  
*gineo affinis.*
- pectoralis. 26. *N. fusca*, capite pedibusque ferruginea, antennarum  
 clava flava. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 41. n.*  
*12. t. 21. f. M. m.*
- pilosa. 27. *N. nigra*, elytris villosis, antennis pedibusque ferrugineis.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 39. n. 7. t. 21. f. G. g.*  
*Habitat in Marchia, lineam longa.*

OPATRUM. *Antennæ moniliformes, extrorsum*  
*crassiores.*

*Elytra marginata.*

*Caput prominens.*

*Thorax planiusculus, marginatus.*

- griseum. 1. *O. cinereum*, thorace plano marginato, elytris striis tri-  
 bus elevatis posterius dentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 89. n.*  
*1. mant. inf. 1. p. 50. n. 1.*  
*Habitat in Italia, sabuloso major.*



- fabulo- 2. *O. fuscum*, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace  
sum. emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 89. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 50. n. 2.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 572. n. 17. *Fn. suec.* 456. *Silpha* fabulosa.  
*Udm. diff.* 5. *Dermestes niger*, inter elytrorum lineas quatuor elevatas scrobiculis exaratus.  
*Fn. suec.* 382. *Castida nigra*, elytris striis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 350. n. 7. *Tenebrio atra*, &c.  
*Habitat in Europæ & borealis Americæ campis apricis fabulosis.*
- gibbum. 3. *O. nigrum*, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 90. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 50. n. 3.  
*Habitat in Sueciæ collibus arenosis.*
- læviga- 4. *O. nigrum*, clypeo anterieus piceo, elytris substriatis. *Fabr. tum. sp. inf.* 1. p. 90. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 50. n. 4.  
*Habitat in nova Seelandia, statura gibbi.*
- arenarium. 5. *O. griseum*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 90. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 51. n. 5.  
*Habitat ad caput bonæ spei.*
- orientale. 6. *O. cinereum*, thorace elytrisquè rugosis, tibiis anterioribus dilatatis triangularibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 90. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 511. n. 6.  
*Forsk. Fn. ar. p.* 77. n. 1. *Silpha multistriata.*  
*Habitat in Orientis arenosis.*
- tibiale. 7. *O. nigrum*, elytris punctato subrugosis, tibiis anterioribus compresso-triangularibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 90. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 51. n. 7.  
*Habitat sub Scaniæ lapidibus, parva.*
- Agricola. 8. *O. nigrum*, thorace lævi, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 57. n. 8. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 35. n. 2.  
*Habitat Berolini & Halæ Saxonum, parva.*
- minutum. 9. *O. cinereum*, thorace rugoso, elytris lineis elevatis quatuor lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 90. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 51. n. 9.  
*Habitat in Sueciæ arenosis, primis speciebus quadruplo minora.*

- quifqui- 10. *O. nigrum*, thorace granulato medio glabro elytris gla-  
liarum. berrimis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 35. n. 3.*
- cinereum. 11. *O. nigrum* cinereo obumbratum, elytris punctato-fulca-  
tis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 159. n. 4. t. 43.*  
f. 10.  
*Habitat in India.*
- Lithophi- 12. *O. nigrum*, thorace & subtus coccineum, thorace emar-  
lus. ginato posterius utrinque acuminato, elytris glaberrimis, tarsis triarticulatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 1. t. 21. f. A. a.*  
*Habitat in Marchia sub saxis, 2 lineas longum, dubii generis.*
- melinum. 13. *O. ochraceum* glabrum, thorace elytrisque tenerrime  
punctatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 2. t. 21. f. B. b.*  
*Habitat rarius in Marchia floribus, 1½ lineas longum, dubii generis.*
- cineterium. 14. *O. badium* elongatum, elytris planis glaberrimis. *Herbst apud Fuesli Arch. inf. 4. p. 38. n. 3. t. 21. f. C. c.*  
*Habitat in Pomerania.*
- bipustula- 15. *O. ferrugineum*, elytris tenerrime sulcatis thoraceque  
tum. posterius ferrugineis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 38. n. 4. t. 21. f. D. d.*  
*Habitat in Pomerania, 2 lineas longum, angustum, elongatum.*
- monili- 16. *O. fuscum*, thorace elytrisque villosis. *Herbst apud Fuesli*  
corne. *Arch. Inf. 4. p. 39. n. 5. t. 21. f. E. e.*  
*Habitat in Germania, 4 lineas longum.*
- fulphoi- 17. *O. nigrum* glabrum, thorace retrorsum dilatato, elytris  
des. punctato striatis: maculis duabus fulvis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 41. n. 11. t. 21. f. L. l.*  
*Habitat in fungis quernis, generis dubii.*
- unipunc- 18. *O. fuscum* hirtum, thorace subcylindrico immarginato  
tatum. media fovea excavato, antennarum articulis duobus ultimis distantibus majoribus.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 40. n. 8. t. 21. f. H. h.*  
*Dermestoides unipunctatus.*  
*Habitat - - - ultra duas lineas longum, utrum hujus? an cum sequenti proprii generis?*

- bipunctatum. 19. *O. fuscum*, thorace subcylindrico immarginato : foveis binis, antennarum articulis duobus ultimis distantibus majoribus.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 40. n. 9. t. 21. f. 1. i.*  
*Habitat* — — unipunctato affine, at minus & magis depressum.
- clathratum. 20. *O. nigrum*, elytris striatis : striis punctatis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna.*
- testaceum. 21. *O. testaceus*, oculis, thorace, elytris antennisque fuscis, his basi apiceque rufis, elytrorum basi lunula magna testacea, thorace punctis duobus impressis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 178.*  
*Habitat in Europa, statura quadripustulati, elytris punctato striatis.*
- brunneum. 22. *O. brunneum* luteo sericeum, elytris levissime punctato striatis : maculis sex luteis, antennis pedibusque lutescentibus. *Mus. Lesk. p. 10. n. 179.*  
*Habitat* — —

TRITOMA. *Antennæ clavatæ : clava perfoliata.*  
*Palpi anteriores securiformes.*

- bipustulatum. 1. *Tr. atrum* elytris macula laterali coccinea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 1. mant. inf. 1. p. 44. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 335. n. 1. t. 6. f. 2. Tritoma?*  
*Habitat in Angliæ boletis arboreis.*
- glabrum. 2. *Tr. glabrum atrum*, antennis pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 2.*  
*Habitat sub Sueciæ arborum corticibus, statura bipustulati.*
- dubium. 3. *Tr. nigrum*, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 3. mant. inf. 1. p. 44. n. 3.*  
*Habitat Kilonii.*
- vittatum. 4. *Tr. rufum*, elytris nigris : vitta rufa. *Fabr. mant. inf. 1. p. 44. n. 4.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

- Morio. 5. Tr. atrum holosericeum, antennis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 44. n. 5.*  
*Habitat Kilonii, statura dubii, at duplo major.*
- sericeum. 6. Tr. nigricans holosericeum, pedibus testaceis. *Fab. mant. inf. 1. p. 44. n. 6.*  
*Habitat in Germania, statura dubii, sed major.*
- collare. 7. Tr. nigrum, thoracis lateribus abdomineque rubris, *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 4. mant. inf. 1. p. 44. n. 7.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

197. CASSIDA. *Antennæ moniliformes.*  
*Elytra marginata.*  
*Caput sub thoracis clypeo*  
*plano reconditum.*

- viridis. 1. C. viridis. *Fn. suec. 467. It. cel. 153. Scop. ent. carn. 117. Geoffr. inf. par. 1. p. 313. n. 1. Fabr. sp. inf. p. 107. n. 1. mant. inf. 1. p. 62. n. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 174. n. 2. Cassida cardui, &c.*  
*Goed. inf. 1. p. 94. t. 43.*  
*Blank. inf. 89. t. 11. f. F.*  
*Merian. europ. t. 115.*  
*Volk. hesper. 1. p. 166. f. 4.*  
*Raj. inf. 107. n. 5.*  
*Reaum. inf. 3. t. 18.*  
*Roef. inf. 2. scar. 3. p. 13. t. 6.*  
*Schaeff. el. t. 35. icon. t. 27. f. 5.*

*Habitat in Europæ carduis & verticillatis frequens.*  
*Larva hexapus depressa, spinis lateralibus acutis & cauda*  
*bifeta armata proprio stercore obvoluta obambulat.*

- Murrae. 2. C. nigra, clypeo rubro, elytris sanguineis: punctis  
 nigris sparsis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 108. n. 6. mant. 1. p. 62. n. 8. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 50. n. 5. t. 22. f. 29.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 314. n. 5. β. Cassida rubra maculis*  
*rubris variegata.*  
*Habitat in Europæ plantis, statura viridis, J. A. Murray.*

- atrata. 32. *C. atra*, clypeo anterieus sanguineo. *Fabr. mant. inf.*  
p. 62. n. 7.  
*Habitat in Austria, statura nebulosa, at minor.*
- nebulosa. 3. *C. pallido-nebulosa*, fusco punctata. *Fn. succ.* 468.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 108. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 6.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 313. n. 2.  
*Raj. inf.* p. 88. n. 13.  
*Frisch inf.* 4. p. 30. t. 15.  
*Goed. inf.* 1. p. 96. t. 44.  
*List. goed.* 287. t. 117.  
*Roes. inf.* 2. *Scar.* 3. p. 13. t. 6.  
*Schaeff. ic.* t. 27. f. 4.  
*Habitat in Europæ carduis.*
- nobilis. 4. *C. grisea*, elytris linea cærulea nitidissima. *Fn. succ.*  
469. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 110. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 62.  
n. 21.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 313. n. 3.  
*Raj. inf.* p. 107. n. 7.  
*Schaeff. ic.* t. 96. f. 6.  
*Habitat in Europæ carduis, & plantis stellatis.*  
*Linea elytrorum cum vita perit, in aqua calida reviviscens.*
- cribraria. 33. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numero-  
sis nigris, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1.  
110. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 20.  
*Habitat in America.*
- deusta. 34. *C. rufescens*, thorace punctis duobus, elytris numero-  
cyaneo nigris, clypeo integro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109.  
n. 15. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 19.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- octopunctata. 35. *C. rufescens*, thorace punctis duobus, elytris qua-  
tuor cyaneo nigris. *Fabr. mant.* 1. p. 63. n. 18.  
*Habitat in Siam, statura & magnitudine deustæ.*
- interrupta. 36. *C. flavescens*, thorace immaculato elytris ante  
marginem punctisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 14.  
*mant. inf.* 1. p. 36. n. 17.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- sempunctata. 37. *C. flavescens*, coleoptorum disco ferrugineo : punctis  
sex nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 13. *mant.*  
*inf.* 1. p. 63. n. 16.  
*Habitat in Cayenna.*



- annulus. 38. *C. flavescens*, coleoptrorum disco atro : annulo fasciæque posteriore flavescens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 15.  
*Habitat in Cayenna, statura judaica.*
- judaica. 39. *C. ferruginea*, coleoptrorum disco punctis impressis maculisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 14.  
*Habitat in Cayenna, hebræa minor.*
- hebræa. 40. *C. pallida*, coleoptris lineolis numerosissimis diffusis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 13.  
*Habitat in Cayenna, parva, flavescens.*
- cincta. 41. *C. thorace elytrisque obscuris* : margine flavescens, elytris ante marginem macula albo-hyalina. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 109. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 12.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura interrupta.*
- marginella. 42. *C. viridis*, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 108. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 63. n. 11.  
*Habitat in Brasilia.*
- limbata. 43. *C. capite thoraceque pubescentibus obscure æneis* : margine pubescente. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 63. n. 10.  
*Habitat Halæ Saxonum in diantho carthusianorum, statura & magnitudine ferruginea.*
- ferruginea. 44. *C. nigra*, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 108. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 9.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 50. n. 6. t. 22. f. 28.  
*Schranck Beytr.* 62. 3. *Cassida tubferruginea.*  
*Habitat in Germania, in Calabria viridi paulo minor.*
- Vibex. 5. *C. virens*, sutura dorsali sanguinolenta. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 108. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 5.  
*Habitat in Germaniæ plantis, viridi similis, elytrorum tamen dorso virescente.*
- affinis. 45. *C. elytris griseis nigro-punctatis*, thorace flavescens immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 108. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 4.  
*Habitat in Germania, viridi valde affinis.*



- maculata. 6. *C. viridis*, elytris rarius, futura dorsali confecta nigro maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 107. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 314. t. 5. f. 6. *Cassida viridis* maculis nigris variegata.  
*Degeer inf.* 5. p. 175. n. 3. *Cassida* supra viridis, sub nigra, &c.  
*Habitat in Germaniæ plantis, an varietas viridis?*
- equestris. 46. *C. viridis*, elytrorum basi argentea, abdomine atque margine pallido. *Fabr. mant.* 1. p. 62. n. 2.  
*Habitat Halæ Saxonum in mentha aquatica, varietas major, pedibus flavescentibus.*
- truncata. 47. *C. rufa*, elytris subreticulatis nigro-maculatis distincte gibbis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 41.  
*Habitat - - - magna.*
- gibbosa. 48. *C. atra*, thorace maculis duabus villosa-aureis, elytris virescenti-reticulatis: spina suturali obtusa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 40.  
*Habitat in Brasilia, magna.*
- bidens. 49. *C. atra*, elytris antè porrectis: spina suturali erecta. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 39.  
*Habitat in Brasilia, magna.*
- spinifex. 7. *C. ferruginea*, elytris angulo anteriore spina porrecta thorace utrinque spina transversali. *Amæn. acad.* 6. p. 92. n. 7.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 38.  
*Habitat in India, ad basin elytrorum linea nigra notata.*
- bicornis. 8. *C. cyanea*, elytris angulo anteriore spina truncata. *Amæn. acad.* 6. p. 393. n. 9.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 36.  
*Habitat in America australi & India.*
- perforata. 50. *C. testacea*, elytris angulo anteriore spinoso basi perforatis. *Pall. spicil. zool.* 9. p. 3. t. 1. f. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 35.  
*Habitat in America meridionali.*

- margaritacea. 51. *C. virens*, elytris viridi-argenteis lucidis, capite pectoreque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 259. *Fabr. mant.* 1. p. 63. n. 22.  
*Habitat* Halæ Saxonum vere sub lapidibus, nebulosæ proximie affinis, colore cum vita pereunte.
- fastuosa. 52. *C. atra*, elytris rubro-æneis nigro maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 259.  
*Habitat* rarior Halæ Saxonum in populo alba, nobili vix major, colore cum vita pereunte.
- fusca. 53. *C. spadicea*, elytris striis duabus elevatis. *Laichart. inf. tyr.* 1. n. 4. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 51. n. 9.  
*Habitat* in Germania, viridi minor.
- cruciata. 9. *C. pallida*, elytris disco fusco-cruciato.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 110. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 23.  
*Cassida* flavescens, coleoptris disco nigro: maculis quatuor flavescens.  
*Degeer inf.* 5. p. 187. n. 12. t. 15. f. 15. *Cassida* hyalina pallide flava, &c.  
*Habitat* in Europæ plantis.
- crux. 54. *C. flava*, thoracis linea dorsali ferruginea, coleopterorum disco ferrugineo: maculis quatuor flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 110. n. 119. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 24.  
*Habitat* in Cayenna, an vere a cruciata diversa?
- 11 punctata. 55. *C. flavescens*, thoracis puncto medio, coleoptris undecim nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 110. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 25.  
*Habitat* in America meridionali, subtus dilute ferruginea.
- bifasciata. 10. *C. pallida*, corpore fasciis duabus fuscis.  
*Habitat* in America meridionali.
- flava. 11. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 42.  
*Degeer inf.* 5. p. 184. t. 15. f. 13. *Cassida* pallide flava immaculata, &c.  
*Habitat* in Europa australi.
- purpurea. 12. *C. flava*, supra corpus purpurea.  
*Habitat* in America, parva.

- leuco- 13. *C. testacea*, margine punctis flavis. *Amæn. Acad.* 6. p.  
phæa. 392. n. 8. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 36. *mant. inf.*  
1. p. 65. n. 43.  
*Habitat in America.*
- tubercu- 14. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavo  
lata. coleoptris basi trituberculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111.  
n. 21. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 26.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 576. n. 14. *Cassida marginata.*  
*Degeer inf.* 5. p. 186. n. 11. t. 15. f. 14. *Cassida cinerea.*  
*Habitat in Sierra Leon Africa.*
- futuralis. 56. *C. brunnea*, elytris flavis : futuris brunneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 27.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- biguttata. 57. *C. thorace flavo*, elytris rufescentibus : margine  
nigro; maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 28.  
*Habitat in Cayenna.*
- miliaris. 58. *C. flava*, thorace immaculato, elytris nigro-punctatis  
margine bifasciato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 29.  
*Habitat in insula S. Helenæ.*
- punctata. 59. *C. nigro clypeo brunneo*, elytris flavis nigro-punctatis  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 64. n. 30.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, miliaris magnitudine.*
- reticula- 15. *C. flava*, elytris cæruleo-variegatis : lateribus unicoloribus  
ris. fasciatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 44.  
*Degeer inf.* 5. p. 188. n. 14. t. 15. f. 17. *Cassida pellucida*  
albo-flavescens, &c.  
*Habitat in America meridionali, magna.*
- variegata. 16. *C. rufa*, elytris cæruleo-variegatis : lateribus unicoloribus  
fasciatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 45.  
*Degeer inf.* 5. p. 178. n. 2. t. 15. f. 6. *Cassida fuscicornis*  
rubra, &c.  
*Habitat in America, magna.*
- trifasciata. 60. *C. rufa*, elytrorum lateribus trifasciatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 65. n. 46.  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

- annulata. 61. *C. cærulea*, thorace maculis duabus, elytris annulis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 47.
- β) *Cassida ornata*. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 50. n. 8. t. 22. f. 30.  
*Habitat in America australi & India magna.*
- grossa. 17. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis: margine lineis ramosis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 48.  
*Schulze Naturf.* 6. p. 89. t. 4. f. 1.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 1.  
*Degeer inf.* 5. t. 15. f. 5.  
*Habitat in America meridionali, congenerum maxima.*
- clathrata. 18. *C. ferruginea*, elytris margine omni, linea longitudinali & dimidiata transversali nigris.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Thorax immaculatus; elytra latissima; femina lineis transversis dimidiatis tribus distincta.*
- 7 guttata. 19. *C. nigra*, coleoptris maculis septem albis.  
*Habitat in India, an varietas blattæ Petiverianæ? Brünnich.*
- exclamationis. 20. *C. flava*, elytris lineis ternis nigris, intermedia signum! referente. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 114. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 49.  
*Habitat in America meridionali, viridi paulo major, subtus livida.*
- lineata. 62. *C. cinerascens*, lineis elytrorum quatuor albidis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 65. n. 50.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, cassidæ exclamationis magnitudine & statura.*
- jamaicensis. 21. *C. luteo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 34.  
*Sloan. jam.* 2. p. 208. t. 233. f. 27. 28.  
*Habitat in America, ad futuram antè gibba, colorem in spiritu vini deperditum in aqua calida recuperans.*
- dorsata. 63. *C. thorace elytrisq; obscuris, elytris spina suturali margineq; albicante: basi obscuro.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 64. n. 33.  
*Habitat in Siam, statura jamaicensis, at duplo minor.*

- quadripus- 64. *C. thorace obscuro, elytris sanguineis; marginatula.* cyaneo; maculis duabus rubris. *Fabr. sp. inf. I. p. 111. n. 26. mant. inf. I. p. 64. n. 32.*  
*Habitat in America, mediæ magnitudinis, atra.*
- cyanea. 22. *C. cyaneo-ænea, elytris immaculatis excavato-punctatis.*  
*Mus. Lud. Ulr. 39. \* Fabr. sp. inf. I. p. 112. n. 30. mant. inf. I. p. 65. n. 37.*  
*Petiv. gazoph. t. 57. f. 6.*  
*Degeer inf. 5. p. 181. n. 5. t. 15. f. 9.*  
*Habitat in America.*
- marginata. 23. *C. elytris testaceis, corpore elytrorumque marginat nigro, thorace æneo.* *Fabr. sp. inf. I. p. 111. n. 25. mant. inf. I. p. 64. n. 31. Schulze Naturf. 9. p. 103. t. 2. f. 3.*  
*Degeer inf. 5. p. 185. n. 10. Cassida thorace violaceo nigro, &c.*  
*Habitat in America australi & India.*
- inæqualis. 24. *C. ferrugineo-ænea, elytris macula flava subovata disciformi.* *Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 42. mant. inf. I. p. 65. n. 51. Schulze Naturf. 9. t. 2. f. 6. Mus. petrop. 650. n. 130.*  
*Degeer inf. 5. p. 182. n. 6. t. 16. f. 2. Cassida bimaculata, &c.*  
*Habitat in America meridionali.*
- supposita. 25. *C. elytris nigris antè annulatis: puncto centrali fulvo.*  
*Lederm. microsc. t. 28. f. F. g. & t. 44. f. b. c. d.*  
*Habitat in America calidiore.*
- lateralis. 26. *C. fusco-ænea, elytris macula flava laterali.* *Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 43. mant. inf. I. p. 66. n. 52.*  
*Degeer inf. 5. p. 184. n. 8. t. 15. f. 12. Cassida fusco-ænea, &c.*  
*Sulz. hist. inf. I. t. 3. f. 2.*  
*Habitat in America meridionali, inæquali duplo minor.*
- discoides. 27. *C. viridi-ænea, elytris macula didyma flava disciformi.* *Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 44. mant. inf. I. p. 66. n. 53.*  
*Degeer inf. 5. p. 183. n. 7. t. 15. f. 11. Cassida quadrimaculata, &c.*  
*Habitat in America meridionali.*
- décussata. 28. *C. nigro-cærulescens, elytris flavo-maculatis, maculis dorsalis reticulatis, lateralibus distinctis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 115. n. 48. mant. inf. I. p. 66. n. 57.*  
*Habitat in Jamaica.*



- bipuncta*-29. *C. flavescens*, elytris punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 115. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 66. n. 58.  
*Habitat in India, nebulosæ magnitudine & facie, elytrorum punctis interdum tribus.*
- bipustulata*-30. *C. viridis*, elytris maculis duabus lateralibus sanguineis. *Amœn. acad.* 6. p. 392. n. 8. *Schulze Naturf.* 6. p. 911. t. 4. f. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 114. n. 45. *mant. inf.* 1. p. 66. n. 54.  
*Habitat in Cayenna.*
- sempustulata*-31. *C. cayanea*, elytris maculis tribus rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 114. n. 46. *mant. inf.* 1. p. 66. n. 55.  
*Habitat in Brasilia, mediæ magnitudinis.*
- 16-pustulata*-32. *C. nigra*, thorace punctis duobus, elytris septem rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 115. n. 47. *mant. inf.* 1. p. 66. n. 55.  
*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.*
- angustata*-33. *C. flavescens* elytris posterius angustatis.  
*Habitat in India.*
- bituberculata*-34. *C. brunnea albo marginata*, elytris nigro maculatis basi unituberculatis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 378.  
*Habitat in Cayenna, tuberculatæ affinis, at duplo minor.*
- Taurus*-35. *C. atra*, elytris angulo anteriore spina truncata. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 380.  
*Habitat in Cayenna, statura bicornis, at paulo minor.*
- retiformis*-36. *C. nigra thorace bimaculato*, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 378.  
*Habitat in Cayenna, statura tauri.*
- palliat*-37. *C. nigra*, thorace villosa virescente, elytris viridibus; margine lineaque media ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 370.  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- cuprea*-38. *C. supra cuprea*, thoracis margine, elytrisque maculis duabus marginalibus rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 379.  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- rubiginosa*-39. *C. ferruginea*, thorace elytrisque fuscis, punctatis; marginibus externis ciliatis. *Mus. Lesk. p.* 12. n. 236.  
*Habitat in Europa.*



1644 INSECTA COLEOPTERA A. Coccinella.

nitens. 38. *C. nigra*, thorace elytrisq[ue] griseis aureo nitentibus,  
pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 237.*  
*Habitat - - -*

superba. 39. *C. nigro*, elytris punctatis clypeoque viridi-aureis,  
antennis abdomine pedibusq[ue] viridibus. *Mus. Lesk.*  
*p. 13. n. 238.*  
*Habitat in Europa, aurco nitore cum vita pereunte.*

fanguinolenta. 40. *C. aureo-flava*, elytrorum annulo ovali tuberculoq[ue]  
futurali sanguineis. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787.*  
*3. n. 3. 11.*  
*Habitat in Rio Janeiro, subtus pallida, magnitudinis mediæ.*

arcuata. 41. *C. albida*, disco communi nigro: limbo, annulo ovali  
arcuq[ue] posterius flavissimis. *Swederus nov. act. Stockh.*  
*8. 1787. 3. n. 3. 12.*  
*Habitat in Rio Janeiro, mediæ magnitudinis, pectore*  
*& abdomine nigris.*

198. COCCINELLA. *Antennæ clavatæ: clava*  
*solida.*

*Palpi anteriores securiformes,*  
*posteriores filiformes.*

*Corpus hemisphæricum, tho-*  
*race elytrisq[ue] margina-*  
*tis, abdomine plano.*

\* *coleoptris rubris flavisq[ue]: punctis nigris maculatis.*

marginata 1. *C. coleoptris flavis immaculatis: margine nigro, tho-*  
*cis margine punctis duobus albis.*

*Coccinella coleoptris rubris: margine nigro, thorace*  
*utrinque puncto marginali albo. Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*93. n. 1. mant. inf. 1. p. 53. n. 1.*

*Habitat in America, mediæ magnitudinis, nigra.*

immaculata. 155. *C. coleoptris flavescens immaculatis, thoracis*  
*macula nigra: punctis duobus albis. Mus. Lesk. p.*  
*11. n. 211.*

*Habitat in Suecia.*

INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 1645

- marginella. 6. *C. coleoptris obscure testaceis: margine flavo.* Fabr.  
mant. inf. 1. p. 53. n. 3.  
*Habitat in America, magna.*
- limbata. 50. *C. atra, coleoptrorum disco rubro: punctis duobus atris.*  
Fabr. sp. inf. 2. app. p. 497: mant. inf. 1. p. 53. n. 2.  
*Habitat Hamburgi, mediæ magnitudinis.*
- furina- 2. *C. coleoptris rubris immaculatis, thorace, capiteque nigris.*  
mensis. Amæn. acad. 6. p. 393. n. 12.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 93:  
n. 2. mant. inf. 1. p. 53. n. 4.  
*Habitat in America meridionali.*
- sanguinea. 3. *C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis nigris.*  
Amæn. acad. 6. p. 393. n. 11.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 93:  
n. 3. mant. inf. 1. p. 53. n. 5.  
*Habitat in America meridionali, parva, subtus atra.*
- impunctata. 4. *C. coleoptris rubris: puncto nullo.* Fabr. sp. inf. 1. p. 93:  
n. 4. mant. inf. 1. p. 53. n. 6.  
*Habitat in Sueciæ hortis, minor.*
- livida. 51. *C. coleoptris rubris impunctatis, scutello nigro, thorace  
maculis quinque nigris.* Herbst apud Fuesli Arch. Inf.  
4. p. 42. n. 1. t. 22. f. 1. a.  
*Habitat Berolini, supra ex luteo pallide fuscescens; subtus  
fusca.*
- Colon. 52. *C. coleoptris rubris: puncto nigro, scutello maculaque  
thoracis obsolete nigris.* Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4.  
p. 42. n. 2. t. 22. f. 1. b.  
*Habitat Berolini, magnitudine & colore ad lividum accedens.*
- fimbriata. 53. *C. elytris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis mar-  
gine posteriori punctis quatuor nigris.* Thunb. nov. inf.  
sp. 1. p. 11. f. 10.  
*Habitat - - - magnitudine quinquepunctatæ.*
- minuta. 54. *C. elytris rubris thoraceque immaculatis.* Thunb. nov.  
inf. sp. 1. p. 11.  
*Habitat in India, minima.*
- dimidia- 55. *C. coleoptris sanguineis apice atris.* Fabr. sp. inf. 1. p. 94:  
ta. n. 5. mant. inf. 1. 53. n. 7.  
*Habitat in Coromandel, magna.*

1646 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella.

- albida. 56. *C. coleoptris flavis* : margine albido ; punctis utrinque duobus nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 53. n. 8.*  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 260.* Coccinella margine punctata.  
*Habitat Halæ Saxonum, magna.*
- Lineola. 57. *C. elytris rubris* : lineola baseos apicisque nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 94. n. 6. mant. inf. 1. p. 53. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- unifascia- 58. *C. coleoptris rubris* : fascia media atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 94. n. 7. mant. inf. 1. p. 53. n. 10.*  
*Habitat Hamburgi, punctis duobus capitis thoracisque margine albis varians.*
- annulata. 5. *C. coleoptris rubris* : macula sublunari nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 94. n. 8. mant. inf. 1. p. 53. n. 11.*  
*Habitat in Germania, nigra, mediæ magnitudinis. D. Schreber.*  
*Thorax marginibus lateralibus pallidus ; elytra sanguinea ; fascia media nigra, alteraque posteriore, exterius cum priore connexa.*
- trinotata. 59. *C. elytris rubris hirtis* : punctis tribus nigris, capite rubro. *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 11. f. 11.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, congenerum minima.*
- trilineata. 60. *C. coleoptris flavis* : lineis tribus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 53. n. 12.*  
*Habitat in America, parva, atra.*
- sexlinea- 61. *C. coleoptris flavis* : lineis sex punctisque tribus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 94. n. 9. mant. inf. 1. p. 54. n. 15.*  
*Habitat in Sibiria, magna, nigra.*
- moscovi- 62. *C. coleoptris flavis* : lineis quatuor abbreviatis punctis sex  
 ca. atris. *Fabr. mant. 1. p. 54. n. 13.*  
*Habitat in Russia magis australi, magna.*
- abbrevia- 63. *C. coleoptris rubris* : fascia posteriore abbreviata punctisque  
 ta. duobus nigris, thorace atro : lineis duabus albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 54. n. 14.*  
*Habitat in America boreali, oblonga, atra, Blagden.*

- lipuncta- 7. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris duobus. *Fn. suec.* 471.\*  
 ta. *Scop. ent. carn.* 234. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 94 n. 10; *mant.*  
*inf.* 1. p. 54. n. 16.  
*Petiv. gazoph.* 34. t. 21. f. 4.  
*Merian. inf.* 69. t. 136.  
*Raj. inf.* 86. n. 2.  
*List. loq.* 383. n. 8.  
*Bradl. natur.* t. 27. f. 4.  
*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 16.  
*Friseh inf.* 9. p. 33. t. 16. f. 4.  
*Sulz. inf. hist.* t. 3. f. 3.  
*Schaeff. ic.* t. 9. f. 9.  
*Stroem ac.* *Nidros.* 3. t. 6. f. 2.  
*Degeer inf.* 5. p. 389. n. 2.  
*Habitat in Europæ hortis & silvis frequens, visitans aphidibus.*
- tripuncta- 8. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris tribus. *Fn. suec.* 472.\*  
 tata. *Fabr. mant.* 1. p. 54. n. 17.  
*Habitat in Germania, statura septempunctata.*
- quadri- 9. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuor. *Fabr. sp. inf.* 1.  
 punctata. p. 95. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 56. n. 28.  
*Habitat in Europa, mediæ magnitudinis, subtus nigra.*  
*Thorax flavus: punctis quatuor nigris; pedes flavi.*
- hebræa. 10. *C. coleoptris luteis*: maculis luteis sex longitudinalibus  
 difformibus. *Fn. suec.* 473.\*  
*Habitat in Europa.*
- quadrino- 64 *C. coleoptris rubris*: punctis quatuor basæos nigris, tho-  
 tata. racis marginibus albidis. *Fabr. mant.* 1. p. 56. n. 29.  
*Habitat Kilonii.*
- quadri- 65. *C. coleoptris rubris*: punctis quatuor nigris, thorace atro :  
 maculata. macula marginali alba. *Fabr. mant.* 1. p. 56. n. 30.  
*Habitat Halæ Saxonum, nigra.*
- quinque- 11. *C. coleoptris sanguineis*: punctis nigris quinque. *Fn.*  
 punctata. *suec.* 474.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 96. n. 17. *mant. inf.* 1.  
 p. 56. n. 31.  
*Degeer inf.* 5. p. 370. n. 7.  
*Schaeff. ic.* t. 9. f. 8.  
*Merian. europ.* t. 69.  
*Habitat in Europæ arboribus.*

quinque- 66. *C. oblonga*, coleoptris flavescens : punctis nigris maculata. quinque, thorace atro : margine anteriore triradiato albo. *Fabr. mant.* 1. p. 56. n. 32.

*Habitat* Halæ Saxonum.

sempunctata. 12. *C. coleoptris fulvis* : punctis nigris sex. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 96. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 56. n. 33.

*Habitat in Europæ hortis*, parva, atra, thoracis margine punctisque duobus albis.

glacialis. 67. *C. coleoptris rubris* : punctis sex nigris; intermediis majoribus sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 96. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 56. n. 34.

*Habitat in America boreali.*

sexinaculata. 68. *C. coleoptris rubris* : punctis sex nigris; anterioribus quatuor transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 96. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 56. n. 35.

*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 262. *Coccinella* (undulata) coleoptris rubris : fasciis binis interruptis undulatis nigris, postice puncto unico.

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 7. p. 160. t. 43. f. 12.

*Habitat in India*, mediæ magnitudinis, pallide flavescens.

sexnotata. 69. *C. elytris flavis* : arcibus quatuor punctisque duobus nigris. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 9. n. 15. t. 1. f. 2.

*Habitat in Suecia*, thorace flavo punctis 5 nigris contiguis variis, bipunctatæ magnitudine.

trifasciata. 13. *C. coleoptris rubris*, fasciis nigris tribus. *Fn. succ.* 475. \*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 95. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 55. n. 26.

*Raj. inf.* p. 87. n. 9. *Scarabæus hemisphæricus minor*, &c.

*Habitat in Europæ hortis.*

bifasciata. 70. *C. coleoptris ferrugineis* : fasciis duabus punctisque quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 95. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 56. n. 27.

*Thunb. nov. inf. spec.* 1. f. 24. *Coccinella flexuosa.*

*Habitat ad Caput bonæ spei*, magna nigra, capite, thorace pedibusque ferrugineis.

---

*Species diversæ confusas vidi. ut bipunctatam cum sexpunctatâ; species maculis interdum variant, unde incautus plures numerantur, nisi rationem thoracis habeas.*



- inæqualis. 71. Coleoptris flavis: punctis anterioribus tribus futura fasciaque apicis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 95. n. 13. mant. inf. 1. p. 55. n. 25.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- cingulata. 72. C. coleoptris luteis: punctis quatuor baseos fascia posteriore punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 55. n. 24.*  
*Habitat Tranquebariæ, magna, nigra, capite, thorace pedibusque flavis.*
- flexuosa. 73. C. ovata, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thoracis margine albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 95. n. 12. mant. inf. 1. p. 55. n. 23.*  
*Habitat Hamburgi.*
- undata. 74. C. oblonga, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 55. n. 22.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magna, atra.*
- arcuata. 75. C. ovata, coleoptris rubris: punctis quatuor, fasciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 55. n. 21.*  
*Habitat in Sina, mediæ magnitudinis, nigra, capite albido.*
- tricincta. 76. C. ovata, coleoptris rubris: fasciis tribus atris; anteriore abbreviata tricuspidata. *Fabr. mant. inf. 1. p. 55. n. 20.*  
*Habitat in Sina, mediæ magnitudinis, nigra.*
- rivularis. 77. C. coleoptris luteis: fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thorace atro flavo-bipunctato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 54. n. 19.*  
*Habitat in Suecia, mediæ magnitudinis.*
- hieroglyphica. 14. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Fn. suec. 476.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 95. n. 11. mant. inf. 1. p. 54. n. 18.*  
*Degeer inf. 4. p. 382. n. 15. Coccinella coleoptris flavo-rubris, &c.*  
*Sulzer hist. inf. t. 3. f. 4.*  
*Habitat in Europæ hortis, affinis decempustulatae.*
- septem-punctata. 15. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Fn. suec. 477.\* Scop. ent. carn. 235. Geoffr. inf. par. 1. p. 321. t. 6. f. 1. Fabr. sp. inf. 1. p. 96. n. 21. mant. inf. 1. p. 57. n. 36.*



*Frisch. inf. 4. p. 1. t. 1. f. 4.*

*Petiv. gar. 33. t. 21. f. 3.*

*Goed. inf. 2. p. 58. t. 18.*

*Raj. inf. 86. n. 1.*

*Merian. europ. 24. f. 11.*

*Albin. inf. 61. f. C.*

*Roes. inf. 2. scar. 3. p. 7. t. 2.*

*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 18.*

*Bradl. nat. t. 27. f. 4.*

*List. sc. angl. 382. n. 7.*

*Ammir. inf. 1. 14.*

*Sulz. inf. 1. 3. f. 13.*

*Hollar. t. 4. f. 8.*

*Degeer inf. 5. p. 370. n. 4. t. 10. f. 14.*

*Schaeff. ic. 1. 9. f. 7.*

*Habitat in Europæ plantis frequens.*

*Elytrorum puncta in triangulum posita.*

septem- 78. *C. oblonga, coleoptris rubris: punctis nigris septem;*  
maculata. *communi trilobo. Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 22. mant.*  
*inf. 1. p. 57. n. 37.*

*Habitat in Germania.*

*Thorax ater, margine albus.*

octopunc- 79. *C. coleoptris rubris: punctis nigris octo. Fabr. sp. inf. 1.*  
tata, *p. 97. n. 23. mant. inf. 1. p. 57. n. 38.*

*Habitat in Germania, an varietas sexpunctata?*

transver- 80. *C. coleoptris luteis: maculis octo nigris; anterioribus qua-*  
salis, *tuor transversis sinuatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 24.*  
*mant. inf. 1. p. 57. n. 39.*

*Habitat in Coromandel, mediæ magnitudinis, nigra.*

octoma- 81. *C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anterioribus sex*  
culata, *transversis sinuatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 25. mant.*  
*inf. 1. p. 57. n. 40.*

*Habitat - - - magna, nigra, capite & thorace luteis.*

novem- 82. *C. coleoptris rubris: punctis novem nigris; posteriori*  
maculata. *communi, thorace bipunctato. Fabr. sp. inf. 1. p. 97.*  
*n. 26. mant. inf. 1. p. 57. n. 41.*

*Fabr. syst. ent. p. 81. n. 15. Coccinella novempunctata.*

*Habitat in nova Hollandia.*

---

*Coccinellarum larvæ aphides consumunt, eoque plantas a phthiriasi hæ purgant.*

- novem-  
punctata. 16. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris novem. *Fn. suec.*  
478.\* *Scop. ent. carn.* 236. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 97. n.  
27. *mant. inf.* 1. p. 57. n. 42.  
*Uddm. diff.* 14. *Coccinella nigra*, elytris rubris, punctis  
novem nigris.  
*Fabr. syst. ent.* p. 81. n. 16. *Coccinella decempunctata*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 322. n. 4.  
*Degeer inf.* 5. p. 373. n. 6.
- β) *Coccinella coleoptris rufescentibus* : punctis 1. 2. 1.  
cum puncto communi ad scutellum, thorace albido:  
macula scutiformi nigra : punctis duobus albis, capite  
posterior fascia nigra. *Mus. Lesk.* p. 10. n. 193.  
*Habitat in Europæ hortis & juniperetis.*
- decem-  
punctata. 17. *C. coleoptris fulvis* : punctis nigris decem. *Fn. suec.*  
479.\* *Scop. ent. carn.* 237. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n.  
28. *mant. inf.* 1. p. 57. n. 43.  
*Degeer inf.* 5. p. 374. n. 7.
- β) *Coccinella coleoptris flavo rufescentibus* : punctis 1. 3.  
1. thorace maculis 4 punctisque interpositis 3. nigris.  
*Mus. Lesk.* p. 11. n. 195.  
*Habitat in Europæ plantis. Thorax maculis quatuor.*
- decem-  
maculata. 83. *C. oblonga*, elytris fulvis: punctis nigris decem; duo-  
bus communibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n. 29. *mant.*  
*inf.* 1. p. 57. n. 44.  
*Habitat in America boreali, atra, statura tredecimpunc-*  
*tata.*
- dilatata. 84. *C. subrotunda*, coleoptris marginatis fulvis: punctis  
nigris decem, thorace bipunctato. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
98. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 57. n. 45.  
*Habitat in America.*
- 11-punc-  
tata. 18. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris undecim. *Fn. suec.*  
480.\* *Ström afd. nidsk.* 3. p. 388. t. 6. f. 2. *Geoffr.*  
*inf. par.* 1. p. 325. n. 9. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n.  
31. *mant. inf.* 1. p. 57. n. 46.  
*Merian. europ.* 168.  
*Degeer inf.* 5. p. 375. n. 8.
- β) *C. thorace albo* : punctis quinque septemve nigris,  
coleoptris rubicundis; punctis 11, aliis 6, aliis 4 ni-  
gris. *Mus. Lesk.* p. 10. n. 181.

- 2) *C. coleoptris rubris* : punctis nigris undecim<sup>1</sup> 1. 3.  
una cum communi ad scutellum, thorace flavescens  
guttis 5 nigris & utrinque punctulo nigro. *Mus. Lesh.*  
*p. 11. n. 194.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- II-macu- 85. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris undecim, corpore  
lata. ferrugineo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 57. n. 47. Schaeff. i.*  
*t. 254. f. 3. a. 3. b?*  
*Habitat in Hispania, II-punctata duplo major.*
- II-punc- 19. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris sex; extimo lineae  
tata. repando. *Fabr. sp. inf. 1. p. 98. n. 32. mant. inf.*  
*p. 57. n. 48.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 13. t. 22. f. 8.*  
*Habitat in Europa, minuta, flava, subtus nigra.*
- variega- 86. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris duodecim fasciis  
ta. media nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 33. mant. inf.*  
*p. 57. n. 49.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis, flavo-*
- chryso- 87. *C. coleoptris rufis* : punctis nigris duodecim, thorace  
melina. immaculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 34. mant. inf.*  
*p. 57. n. 50.*  
*Thunb. nov. sp. inf. 1. p. 16. f. 21.*  
*Habitat in casto opuntia Africa, & in Calabria, orac-*  
*gibba, oculata magnitudine.*
- borealis. 88. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris duodecim; duobus  
communibus, ultimis orbicularis. *Fabr. sp. i. f. 1. f.*  
*99. n. 35. mant. inf. 1. p. 58. n. 51.*  
*Thunb. nov. inf. spec. 1. p. 15. f. 20. Coccinella elytra-*  
*rufis: punctis duodecim nigris, thorace quadripunctate*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, gibba, subtus lutea, ocul-*  
*ata magnitudine.*
- castidea. 89. *C. oblonga rubra*, coleoptris punctis duodecim, tho-  
race quatuor nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 36.*  
*mant. inf. 1. p. 58. n. 52.*  
*Habitat in America boreali.*
- 13-macu- 90. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris tredecim, corpore  
lata. orbiculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 37. mant. inf. 1.*  
*p. 58. n. 53.*

*Forster nov. inf. sp. cent. 1. p. 18. n. 18. Coccinella coleoptris luteis : punctis nigris tredecim, thorace albo nigro-punctato.*

*Habitat in Europa boreali.*

13-notata. 91. *C. elytris flavis ; punctis nigris tredecim thorace luteo : punctis septem nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 10. n. 16. t. 1. f. 4.*

*Habitat in Europa, bipunctatae magnitudine, flava, antennis rubris.*

13-punctata. 20. *C. coleoptris luteis : punctis nigris tredecim, corpore oblongo. Fn. suec. 481. Scop. ent. carn. 238. Geoffr. inf. par. 1. p. 323. n. 6. Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 38. mant. inf. 1. p. 58. n. 54.*

*Degeer inf. 5. p. 375. n. 9.*

*Reaumur inf. 3. t. 31. f. 79.*

*Schaeff. ic. t. 48. f. 6.*

β) *Coccinella oblonga. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 43. n. 7. t. 22. f. 4. d.*

*Habitat in Europa frequens.*

urficolor. 92. *C. coleoptris flavis : punctis quatuordecim nigris ; duobus communibus. Fabr. mant. inf. 1. p. 58. n. 55.*

*Habitat in Sina, orbiculata, gigantea, flava, olivacea aut nigra.*

14-punctata. 21. *C. coleoptris flavis : punctis nigris quatuordecim ; quibusdam contiguis. Fn. suec. 482. Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 39. mant. inf. 1. p. 58. n. 56.*

*Scop. ent. carn. 243. Coccinella tessulata.*

*Schaeff. ic. t. 62. f. 6.*

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. t. 22. f. 5. e.*

*Habitat in Europæ hortis, frequens.*

14-maculata. 93. *C. coleoptris luteis : sutura punctisque quatuordecim nigris distinctis. Fabr. mant. inf. 1. p. 58. n. 57.*

*Habitat Halæ Saxonum, 14-punctata major, thorace nigro-punctato & capite albis.*

16-punctata. 22. *C. coleoptris flavis : punctis nigris sedecim. Fn. suec. 483.\* Scop. ent. carn. 240. Fabr. sp. inf. 1. p. 100. n. 41. mant. inf. 1. p. 58. n. 59. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 44. n. 11. t. 22. f. 6. f.*

*Habitat in Italia, & Germania major, oblonga, albida, capite quadripunctato.*

16-macu- 94. *C. coleoptris rubris: punctis nigris sedecim, capite im-*  
lata. *maculato. Fabr. mant. inf. 1. p. 58. n. 60.*

*Habitat Halæ Saxonum; majuscula, oblonga.*

oculata. 95. *C. elytris rubris: punctis novem nigris, circulo flavo*  
*circum oculos. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 14. f. 18.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, atra, magnitudine septem-*  
*punctata.*

ocellata. 23. *C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim subocel-*  
*latis. Fn. suec. 484. Fabr. sp. inf. 1. p. 100. n. 40.*  
*mant. inf. 1. p. 58. n. 58.*

*Gadd. sat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis*  
*quindecim nigris oculo flavo cinctis.*

*Degeer inf. 5. p. 376. n. 10. t. 11. f. 1.*

*Merian. inf. eur. 48. f. 5.*

*Sulz. inf. t. 13. f. 14.*

*Schaeff. ic. t. 1. f. 2.*

*elem. t. 47. f. 1.*

*Habitat in Europæ hortis, congeneribus plurimis major.*

18-punc- 24. *C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo*  
tata. *arcuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 100. n. 42. mant. inf. 1.*  
*p. 59. n. 61. Mus. Lesk. p. 10. n. 184.*

*Coccinella gemella. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p.*  
*44. n. 12. t. 22. f. 7. g.*

*Habitat in Europa boreali, thoracis lateribus flavis.*

19punc- 25. *C. coleoptris flavis: punctis nigris novendecim. Fn.*  
tata. *suec. 485. Geoffr. inf. par. 1. p. 325. n. 10. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 100. n. 43. mant. inf. 1. p. 59. n. 62.*

*Müll. prodr. zool. dan. p. 67. n. 632. Coccinella lutea, &c.*

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 14. t. 22. f. 9. l.*

*Habitat in Europæ plantis.*

20-punc- 96. *C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti. Geoffr. inf.*  
tata. *par. 1. p. 329. n. 17. Scop. ent. carn. 242. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 100. n. 44. mant. inf. 1. p. 59. n. 63.*

*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. par. t. 22. f. 10. k.*

*Habitat rarior in Europa.*



- 22-punctata. 26. *L. coleoptris flavis* : punctis nigris viginti duobus.  
*Fn. suec. 486. Fabr. sp. inf. 2. p. 101. n. 45. mant.*  
*inf. 1. p. 59. n. 64.*  
*Degeer inf. 5. p. 379. n. 12.*  
*Raj. inf. p. 87. n. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 30. f. 10.*  
*Habitat in Europæ hortis , parva.*
- 23-punctata. 27. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti tribus distinctis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 46. mant. inf. 1. p. 59. n. 65.*  
*Habitat in Europæ plantis , parva , rubra , subtus rufa.*
- 24-punctata. 28. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quatuor.  
*Fn. suec. 487. Geoffr. inf. par. 1. p. 326. n. 11.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 47. mant. inf. 1. p. 59. n. 66.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 16. t. 22. f. 11. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 381. n. 14. Coccinella coleoptris rufifuscis, &c.*  
*Habitat in Europæ hortis.*
- 25-punctata. 29. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quinque.  
*Fn. suec. 488.*  
*Habitat in Europa.*  
*Puncta quadrata , passim ovalita.*
- 28-punctata. 97. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti octo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 48. mant. inf. 1. p. 59. n. 67.*  
*Habitat Tranquebariæ.*
- conglobata. 30. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris plurimis subcontiguis. *Fn. suec. 489. \**  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 326. n. 12.*  
*Degeer inf. 5. p. 378. n. 11. Coccinella rosea.*  
*Frich. inf. 9. p. 34. t. 17. f. 6.*  
*Habitat in Europa , an mera conglomerata varietas ?*
- conglomerata. 31. *C. coleoptris flavescens* : punctis nigris plurimis contiguis. *Fn. suec. 490. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 49. mant. inf. 1. p. 59. n. 68.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 316. n. 12.*  
*Degeer inf. 5. p. 383. n. 17.*  
*Raj. inf. p. 87. t. 5.*  
*List. loq. p. 383. n. 9.*  
*Frisch inf. 9. 34. t. 17. f. 4. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 171. f. 1. a. b.*



*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. t. 22. f. 14. 15?*  
*Habitat in Europæ hortis frequens.*

tricolor. 98. *C. coleoptris flavis: punctis decem rubris, maculisque decem atris marginalibus. Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 69.*  
*Habitat in insula Amsterdam maris australis.*

detrita. 99. *C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 102. n. 50. mant. inf. 1. p. 59. n. 70.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

japonica. 100. *C. elytris flavis, cruce futuræ duplici maculisque quatuor nigris. Thunb. nov. inf. spec. 1. p. 12. f. 12.*  
*Habitat in Japonia, magnitudine hieroglyphicæ.*

grandis. 101. *C. elytris flavis: punctis nigris tredecim thorace nigro: marginibus flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 12. f. 13.*  
*Habitat in Sina, coccinellarum maxima.*

gibba. 102. *C. elytris rubris, fascia punctisque sex nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 14.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, tenuissime hirta, rubra; pedore nigro, magnitudine septempunctatæ.*

capensis. 103. *C. elytris rubris: punctis octo nigris, thorace immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 15.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, rubra, magnitudine septempunctatæ;*

Pfl. 104. *C. elytris flavis: margine exteriori maculis quatuor nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 16.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine fere septempunctatæ, flavicans, pedore nigro.*

iridea. 105. *elytris rubris: punctis novem nigris ocellaribus. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 14. f. 17.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glabra, rubra, magnitudine fere septempunctatæ.*

similis. 106. *C. elytris rubris: fasciis duabus punctisque quatuor nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 15. f. 19.*  
*Habitat - - magnitudine septempunctatæ, supra pilis brevissimis cincreis hirta, subtus nigra.*

pusilla. 107. *C. elytris flavis: punctis octo nigris quadrifariis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 16. f. 22.*  
*Habitat - - - flavescens, glabra, pulice vix major.*

- distincta. 108. *C. elytris rubris : punctis sedecim nigris distinctis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 17. f. 23.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, nigra, supra pilis minimis cinereis adpersa, quinquepunctata magnitudine.*
- repanda. 109. *C. elytris flavis : fasciis tribus undatis nigris.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 18. f. 25.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glabra, nigra, septempunctata magnitudine.*
- flavicollis. 110. *C. elytris sanguineis : punctis decem nigris, thorace flavo.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 18. f. 26.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, flavicans, pilis tenuissimis hirta, septempunctata magnitudine.*
- undulata. 111. *C. elytris rubris : fasciis undatis dentatisque variis nigris.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 18. f. 27.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, septempustulata magnitudine, supra pilis brevissimis cinereis hirsuta flavescens, subtus nigra.*
- lunaris. 112. *C. elytris flavis : fasciis duabus, arcu punctisque quinque nigris.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 19. f. 28.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, septempunctata fere magnitudine, glabra, nigra.*
- Crux. 113. *C. elytris flavis : lineis duabus cruceque nigris.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 20. f. 29.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, subtus nigra.*
- Comma. 114. *C. elytris flavis : sutura, margine lineaque nigris.* *Thunb. nov. sp. inf. 1. p. 20. f. 30.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, quinquepunctata magnitudine, supra flava.*
- lineata. 115. *C. elytris rubris : margine omni maculisque duabus oblongis nigris.* *Thunb. nov. sp. inf. 1. p. 21. f. 31.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glabra, quinquepunctata magnitudine, flava, abdomine femoribusque nigris.*
- oculogut-tata. 116. *C. elytris rubris : maculis octo flavis.* *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 24. f. 37.*  
*Habitat in Japonia, ocellata paulo major, glabra, rubra.*

- variabilis. 117. *C. elytris rubris*: maculis undecim nigris, thoracis quatuor cordatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 42. n. 6. t. 22. f. 3. c.*  
*Habitat Berolini, bipunctata paulo major, magis oblonga, macularum punctorumque numero varians.*
- centum- 118. *C. elytris fulvis*: punctis nigris plurimis; multis confluentibus. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 17. t. 22. f. 13.*  
*Habitat in India, septem lineas longa.*
- quadrilineata. 119. *C. elytris flavis*: lineis tribus longitudinalibus transverseque maculisque duabus confluentibus nigris. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 46. n. 18. t. 22. f. 12. m.*  
*Habitat - - - oblonga, nigra.*
- sparsa. 120. *C. elytris spadiceis*: punctis viginti-quatuor nigris. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 160. n. 37. t. 43. f. 11.*  
*Habitat in India, septempunctatae magnitudine, pilis albicantibus hirsuta, spadicea.*
- Punctum. 121. *C. elytris fulvis immaculatis*, thoracis macula media angulosa nigra. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 161. n. 40. t. 43. f. 14. g. h.*  
*Habitat - - - 1½ lineas longa, capite nigra, thorace fulvo.*  
 \*\* *coleoptris rubris flavisve, albo-maculatis.*
- bimaculosa. 122. *C. elytris fulvis*: lituris duabus obsoletis albis semilunaribus. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 160. n. 39. t. 43. f. 13. e. f.*
- punctatoguttata. 32. *C. coleoptris rubris*: punctis albis quatuordecim, nigris tribus. *Fn. suec. 491. \**  
*Habitat in Europa, an solo sexu a decempustulata distincta?*
- biguttata. 123. *C. coleoptris rufis*: punctis duobus flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 72.*  
*Habitat - - - parva, thorace glabro atro, margine laterali flavo.*
- camtschatcensis. 124. *C. coleoptris obscure rufis*: punctis octo albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 71.*  
*Habitat in Camtschatca, mediae magnitudinis, atra.*  
 33. *C.*

- 10-guttata. 33. *C. coleoptris luteis* : punctis albis decem. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 102. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 60. n. 73. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 47. n. 20. t. 22. f. 16. p. 8.  
 β) *Coccinella 10-guttata minor*, coleoptris rubris, puncto anteriori marginali lunato. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 263.  
*Habitat in Sueciæ hortiis, minor.* Fabricius.
- 12-gut- 125. *C. coleoptris ex luteo fuscis* : punctis albis 12. *Herbst*  
 tata, *apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 47. n. 25. t. 22. f. 10. v.  
 β) *Schranck enum. inf. Austr.* p. 61. n. 111.  
 γ) *C. coleoptris flavo rufescentibus* : guttis sex albis 1. 2.  
 2. 1. *Mus. Lesk. p.* 11. n. 210.  
*Habitat* - - -
- bissep- 126. *C. coleoptris luteis* : punctis quatuordecim albis. *Schal-*  
 temgutta- *ler Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 265.  
 ra. *Habitat* - - - citrea, 16-guttatæ statura & magnitudine.
- 14-guttata. 34. *C. coleoptris rufis* : punctis quatuordecim albis. *Fn. suec.* 492.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 327. n. 13. *Scop. ent. carn.* 248. *Fabr. sp. inf.* p. 102. n. 52. *mant. inf.* 1. p. 60. n. 74.  
*Raj. inf.* p. 86. n. 3.  
*List. loq.* 383. n. 10.  
*Deger. inf.* 5. p. 385. n. 20.  
*Schaeff. ic. t.* 9. f. 11.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 47. n. 21. t. 22. f. 17. r.  
*Habitat in Europæ salicibus, ex testaceo lutea, capite nigro.*
- cayen- 156. *C. coleoptris fulvis* : punctis duodecim lunulisque utrin-  
 nensis. que duabus connatis albis. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 379.  
*Habitat in Cayenna, rufa, mediæ magnitudinis.*
- 15-gutta- 127. *C. coleoptris luteis* : punctis quindecim albis; communi  
 ta, medio obsoleto. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 102. h. 53. *mant. inf.* 1. p. 60. n. 75.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 327. n. 14.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 47. n. 22. t. 22. f. 18. f.  
*Habitat in Europa magis australi.*
- 16-guttata. 35. *C. coleoptris luteis* : punctis albis sedecim. *Fn. suec.* 493. *Scop. ent. carn.* 249. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 103. n. 54.  
*mant. inf.* 1. p. 60. n. 79.  
*Deger. inf.* 5. p. 385. n. 21.

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 5.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 161. n. 42. t. 43. f. 16. l. m.*

*Habitat in Europa.*

18-guttata. 36. *C. coleoptris rubris : punctis albis octodecim. Fn. suec. 494. Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 55. mant. inf. 1. p. 60. n. 77. Scop. ent. carn. 241.*

*Schaeff. ic. t. 9. f. 12.*

β) *Coccinella ornata. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 47. n. 23. t. 22. f. 19. t.*

20-guttata. 37. *C. coleoptris rubris : punctis albis viginti. Fn. suec. 495. Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. n. 78. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 47. n. 24. t. 22. f. 20. u.*

oblongo- 38. *C. coleoptris rubris : lineis punctisque albis. Fn. suec. guttata. 496. Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. n. 79. Scop. ent. carn. 242.*

*Degeer inf. 5. p. 384. n. 19.*

*Schaeff. ic. t. 9. f. 10.*

*Bergstr. nomencl. 1. t. 9. f. 6.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 14.*

*Habitat rarior in Europæ hortis.*

obliterata. 39. *C. coleoptris flavis : punctis quatuor rufis; anterioribus obsoletis. Fn. suec. 497.\**

*Habitat in Europa.*

pallida. 128. *C. elytris flavis : lineis quatuor fuscis. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 9. n. 14. t. 1. f. 1.*

*Habitat Upsaliæ, flava, bipunctatæ magnitudine.*

\*\*\* *Coleoptris nigris : rubro maculatis.*

impustu- 40. *C. coleoptris nigris : puncto nullo. Fabr. sp. inf. 1. p. lara. 103. n. 58. mant. inf. 1. p. 60. n. 80.*

*Habitat in Germaniæ nemoribus, statura quadripustulatæ, tota atra, thoracis lateribus flavis : puncto nigro.*

analis. 129. *C. coleoptris atris apice rubris immaculatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 60. n. 81.*

*Habitat Halæ Saxonum, hæmorrhoidali affinis, at duplo minor.*

hæmor- 130. *C. coleoptris atris apice rubris : fascia nigra. Fabr. sp. rhoidalis, inf. 1. p. 104. n. 59. mant. inf. 1. p. 60. n. 82.*



*Habitat Hamburgi ; frequenter puncto sanguineo communi in dorso notata.*

*navipes.* 131. *C. elytris nigris , thorace nigro : maculis duabus flavis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 21.*

*Habitat ad Caput bonæ spei , bipustulata magnitudine , impustulata affinis , at punctum nigrum nullum ad latera thoracis.*

*Cacti.* 41. *C. coleoptris atris : maculis duabus rubris.* *† Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 60. mant. inf. 1. p. 60. n. 83.*

*Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris , macula solitaria subrotunda utrinque.*

*Merian. surin. p. 2. t. 2. f. summa.*

*Pet. gar. t. 1. f. 5.*

*Sloen. jam. 2. t. 237. f. 31-33. & t. 9. f. 13.*

*Habitat in Americæ cactis , sæpius inter coccos cacti lecta , bipustulata similis.*

*bipustulata.* 42. *C. coleoptris nigris : punctis rubris duobus , abdomine sanguineo.* *Fn. succ. 498.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 61. mant. 1. p. 60. n. 84. Laichart. inf. tit. 1. p. 134.\**

*Geoffr. inf. par. 1. p. 334. n. 26.*

*Degeer inf. 5. p. 387. n. 27. t. 10. f. 25.*

*Frisch. inf. 9. p. 34. t. 16. f. 6.*

*Roes. inf. 2. scar. 3. p. 10. t. 3.*

*ß) Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 48. n. 27. t. 22. f. 22. w.*

*Habitat in Europæ hortis frequens , etiam in America septentrionali.*

*Elytrorum singula puncta e tribus conflata.*

*mutabilis.* 132. *C. coleoptris nigris , punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus , corpore oblongo.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 62. mant. inf. 1. p. 60. n. 85.*

*Habitat Hamburgi.*

*Elytra junioribus lutescentia ; puncto flavescente.*

*frontalis.* 133. *C. coleoptris nigris : punctis duobus rubris , fronte pedibusque anterioribus rubris.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 60. n. 86.*

*Habitat Halæ Saxonum , capite interdum nigro , punctisque elytrorum quatuor.*



- tripustulata. 157. *C. coleoptris* nigris : basi macula magna lutea , medio  
pustulis duabus apiceque unica rubra. *Mus. Lesk. p. 12. n. 215.*  
*Habitat in Europa.*
- lunulata. 158. *C. coleoptris* nigris margine reflexis : puncto medio ba-  
seosque lunula media rubris. *Mus. Lesk. p. 12. n. 317.*  
*Habitat - - -*
- limbata. 159. *C. coleoptris* nigris : lunula ad marginem baseos exte-  
riorem rubra, thorace nigro : margine albo. *Mus. Lesk. p. 12. n. 219.*
- leucocephala. 160. *C. nigra*, thorace antèrius, capite, punctisque elytro-  
rum septem albis. *Mus. Lesk. p. 12. n. 223.*  
*Habitat - - - macula capitis trigona nigra, punctis*  
*elytrorum tribus ad marginem externum positis margine*  
*connexis.*
- nigra. 161. *C. nigra*, elytris singulis posterius gutta rubra notatis.  
*Mus. Lesk. p. 12. n. 224.*
- ruficauda. 162. *C. rubra*, elytris nigris apice rubris. *Mus. Lesk. p. 12. n. 225.*  
*Habitat in Europa.*
- bifasciata. 163. *C. nigra*, thoracis margine externo elytrisque flavis :  
fascia media longitudinali & communi suturæ nigræ.  
*Mus. Lesk. p. 12. n. 226.*  
*Habitat in America.*
- quadripustulata. 43. *C. coleoptris* nigris : punctis rubris quatuor : interioribus  
longioribus. *Fn. suec. 449.\* Scop. ent. carn. 244. Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 63. mant. inf. 1. p. 61. n. 87.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 333. n. 25.*  
*Degeer inf. 5. p. 389. n. 24.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 9. f. 5.*  
*Schauff. ic. t. 30. f. 16. 17.*  
*Habitat in Europæ hortis, aliquando cum bipunctata*  
*copula conjuncta.*
- erythrocephala. 134. *C. coleoptris* atris : punctis rubris sex, capite thora-  
cisque margine pallide rufescentibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 61. n. 88. Mus. Lesk. p. 12. n. 220.*  
*Habitat Kilonii, sexpustulata minor, capite & abdomine*  
*rubris.*

- sexpustu- 44. *C. coleoptris nigris* : punctis rubris sex. *Fn. suec.* 500. \*  
lata. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 331. n. 20. *Scop. ent. carn.* 245.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 64. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 89.  
*Degeer inf.* 5. p. 390. n. 25.  
*Raj. inf. p.* 87. n. 4.  
*Schaeff. ic. t.* 30. f. 12.  
β) *Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 6.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 9. f. 4.  
*Habitat in Europæ hortis , rarius varians puncto adhuc mi-  
nutissimo ad suturam rubro.*
- lunata. 135. *C. coleoptris nigris* : maculis decem rubris , sex lunatis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 65. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 90.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 22. f. 33. *Coccinella rivofa.*  
*Habitat in insula S. Helenæ & ad Caput bonæ spei , gibba ,  
glabra , ocellatæ magnitudine.*
- hirta. 136. *C. elytris nigris* : maculis duodecim rubris. *Thunb. nov*  
*inf. sp.* 1. p. 23. f. 35.  
*Habitat ad Caput bonæ spei , ocellatæ magnitudine , atra ,  
pilis cinereis hirta.*
- Reppen- 137. *C. oblonga elytris nigris* : maculis fulvis orbicularibus  
lis. duabus. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 48. n. 28.  
*t.* 22. f. 23. x.  
*Habitat in Marchia , nigra.*
- campef- 138. *C. subrotunda , elytris nigris* : maculis duabus orbicula-  
tris. ribus fulvis , pedibus anterioribus fulvis. *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf.* 4. p. 48. n. 29. *t.* 22. f. 24. y.  
*Habitat in Marchia.*
- fasciata. 139. *C. elytris nigris* : fascia transversa maculis quatuor fulvis  
constata. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 49. n. 30.  
*t.* 22. f. 25. z.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 334. n. 26.  
*Habitat in Gallia & Germania.*
- decem- 45. *C. coleoptris nigris* : punctis fulvis decem. *Fn. suec.* 501. \*  
pustulata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 66. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 91.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 330. n. 19.  
*Degeer inf.* 5. p. 391. n. 26.  
*Schaeff. ic. t.* 30. f. 10. & *t.* 171. f. 2.  
*List. loq.* 383. n. 9.

*Frisch inf. 9. t. 17. f. 4. 5.*

*Raj. inf. 87. n. 15.*

*Habitat in Europæ horti, varians elytrorum punctis flavis & rubris.*

russica. 140. *C. elytris nigris : punctis duodecim fulvis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 49. t. 22. f. 26.*

*Habitat in Russiâ, septempunctatæ magnitudine.*

16-pustu- 47. *C. coleoptris nigris : punctis fulvis sedecim. Fn. suec. 503.*  
lata. *Habitat in Europa.*

20-pustu- 141. *C. elytris nigris : punctis fulvis viginti. Thunb. nov. inf.*  
lata. *sp. 1. p. 24. f. 36.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, septempunctatæ magnitudine, gibba, nigra, tenuissime hirta.*

guttato- 142. *C. coleoptris nigris : punctis duobus flavis quatuorque*  
pustulata, *rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 106. n. 69. mant. inf. 1. p. 61.*  
*n. 94.*

*Habitat in nova Hollandia.*

\*\*\* *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

atra. 143. *C. elytris nigris : maculis duabus flavis, thoracis margi-*  
*nibus anoque flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 21.*

*Habitat - - bipustulata minor, valde gibba, glaber-*  
*rima.*

lævis. 144. *C. elytris nigris : punctis sex flavis, thoracis angulis an-*  
*terioribus flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 22. f. 32.*

*Habitat - - glabra, nigra, capite pedibusque flavis,*  
*bipustulatæ magnitudine.*

dentata. 145. *C. elytris nigris : margine exteriori linea tridentata pun-*  
*ctisque sex flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 23. f. 34.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, 14-punctatæ magnitudine,*  
*nigra, capite, thoracis & abdominis margine pedibusque*  
*flavis.*

aptheri- 48. *C. coleoptris nigris : punctis flavis octo. Fn. suec. 504.\**  
nâ. *Fabr. sp. inf. 1. p. 106. n. 71. mant. inf. 1. p. 61. n. 96.*

*Degeer inf. 5. p. 392. n. 28.*

*Habitat in Europa boreali.*

- humera- 146. *C. coleoptris nigris* : punctis flavis octo : anterioribus  
lis. duobus uncinatis. *Scheller Abh. der hall. Naturf. Ges.*  
*I. p. 266.*  
*Habitat Halæ Saxonum, flavicans, ad 14-pustulatam accen-*  
*dens.*
- 14-pustu- 46. *C. coleoptris nigris* : punctis flavis quatuordecim. *Fn.*  
lata. *suec. 502.\* Geoffr. ins. par. I. p. 330. n. 18. Scop. ent.*  
*carn. 246. Fabr. sp. ins. I. p. 106. n. 68. mant. ins.*  
*I. p. 61. n. 93.*  
*Uddm. diff. 15. Coccinella coleoptris nigris : maculis de-*  
*cem pallide flavis.*  
*Pod. ins. 26. Coccinella 14-maculata.*  
*Degeer ins. 5. p. 391. n. 27.*  
*Schaeff. ic. t. 30. f. 10.*  
*Habitat in Europæ floribus.*
- tigrina. 49. *C. coleoptris nigris* : punctis albidis viginti. *Fn. suec.*  
*505.\* Uddm. diff. 11. Fabr. sp. ins. I. p. 107. n. 74.*  
*mant. ins. I. p. 61. n. 100.*  
*Herbst apud Fuesli arch. ins. 4. p. 49. n. 36. t. 22. f. 27.*  
*Schaeff. ic. t. 30. f. 9.*  
*Habitat in Europa boreali, an varietas 20-guttatæ ?*
- felina. 147. *C. coleoptris atris* : punctis sex albis, corpore globoso.  
*Fabr. sp. ins. I. p. 106. n. 70. mant. ins. I. p. 61. n. 95.*  
*Habitat in America boreali.*
- pardeli- 148. *C. coleoptris nigris* : punctis decem margineque sinuato  
na. albis. *Fabr. sp. ins. I. p. 106. n. 72. mant. ins. I. p. 61.*  
*n. 97.*  
*Habitat - - - magna, atra.*
- ursina. 149. *C. coleoptris atris* : punctis decem albis, capite thoracif-  
que margine anteriore albis. *Fabr. mant. ins. I. p. 61.*  
*n. 98.*  
*Habitat in America boreali, parva, nitida, atra, capite*  
*pedibusque albis.*
- 12-pustu- 150. *C. coleoptris nigris* : punctis duodecim albis ; exteriori-  
lata. bus margine connexis. *Fabr. sp. ins. I. p. 106. n. 67.*  
*mant. ins. I. p. 61. n. 92.*  
*Habitat Hamburgi.*
- leonina. 151. *C. coleoptris nigris* : punctis albis sedecim. *Fabr. sp.*  
*ins. I. p. 106. n. 73. mant. ins. I. p. 61. n. 99.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

canina. 152. *C. coleoptris nigris* : punctis albis viginti , capite thoraceque villosis immaculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 107. n. 75. mant. inf. I. p. 62. n. 101.*

*Habitat ad Caput bonæ spei , magna , nigra.*

Thunbergii. 153. *C. elytris nigris* : margine punctisque duobus albis , capite nigro : punctis albis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 10. n. 17.*

*Habitat Upsaliæ , bipustulatæ magnitudine , nigra.*

villosa. 154. *C. villosa nigra* , elytrorum marginibus flavis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*

*Habitat in Cayenna , magna.*

## ALURNUS. *Antennæ filiformes.*

*Palpi sex brevissimi.*

*Maxilla cornea , fornicata.*

grossus. 1. *A. ater* , thorace coccineo , elytris flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 115. n. 1. mant. inf. I. p. 66. n. 1.*

*Habitat in America australi & India.*

femora- tus. 2. *A. viridi-æneus* , femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 115. n. 2. mant. inf. I. p. 66. n. 2.*

*Drury inf. 2. t. 34. f. 5. Tenebrio femoratus.*

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 8. Tenebrio viridis.*

*Habitat in India , magnus , lævis , nitidus , antennis corpore dimidio brevioribus : articulis ultimis nigris.*

dentipes. 3. *A. niger* , femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 66. n. 3.*

*Habitat ad Caput bonæ spei , lævis , immaculatus , femorato affinis.*

199. CHRYSOMELA. *Antennæ moniliformes.**Palpi sex extrorsum crassiores.**Thorax, nec elytra, marginatus.**Corpus (plerisque) ovatum.**\* femoribus posterioribus æqualibus.*

tenebrioides. 1. Chr. aptera atra, antennis pedibusque violaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 1. mant. inf. 1. p. 66. n. 1. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. t. 23. f. 1.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 29.* Tenebrio (lævigatus) apterus niger lævis, elytris lævibus, thorace lunato, subtus cæruleus.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 295. n. 19.* Chrysomela atro-purpurea, &c.

*Habitat in Europa magis australi.*

*Larva gibba, violacea, ano rufo, polyphaga, plantis viciat.*

Morio. 2. Chr. atra, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 66. n. 2.*

*Habitat in terra van Diemen, tenebrioides paulo minor.*

scæstin- 4. Chr. atra, pedibus violaceis. *Fn. succ. 506. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 2. mant. inf. 1. p. 67. n. 3.*

*Degeer inf. 5. p. 298. n. 8.* Chrysomela violaceo-nigra, &c.

*Laichart. inf. tyr. 1. p. 143. n. 2.* Chrysomela coriaria.

*Habitat in Europa.*

vittata. 3. Chr. cyanea, elytris margine vitæque media flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 3. mant. inf. 1. p. 67. n. 4.*

*Habitat in America, magna, crassa.*

bicolor. 72. Chr. viridi-ænea, subtus violacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 4. mant. inf. 1. p. 63. n. 5.*

*Forsk. Fn. ar. p. 77. n. 2.* Chrysomela viridi-ænea.

*Habitat Alexandriæ.*

*Elytra punctato-striata.*



- affinis. 73. Chr. obscure ænea, subtus violacea, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 67. n. 6.*  
*Habitat sub lapidibus Barbariæ, bicolori affinis, at duplo minor.*
- Lusitanica. 74. Chr. thorace cupreo, elytris æneis: punctis impressis cæruleo-fulgentibus, subtus violacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 5. mant. inf. 1. p. 67. n. 7.*  
*Habitat in Lusitania, major chr. Banksii.*
- ferruginea. 75. Chr. ferruginea, subtus nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 6. mant. inf. 1. p. 67. n. 8.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magna.*
- Banksii. 76. Chr. supra ænea, subtus testacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 7. mant. inf. 1. p. 67. n. 9.*  
*Habitat in Lusitania & Calabria.*
- Sophiæ. 77. Chr. cærulea, tibiis plantisque flavis. *Fabr. mant. 1. p. 73. n. 86.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 272. Chrysomela ovata viridis, elytris postice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.*  
*Habitat Halæ Saxonum in Sisymbrio Sophia, lævis, glabra, statura & magnitudine chr. ermoraciæ.*
- pallipes. 78. Chr. nigra, elytris pedibusque pallescentibus. *Fabr. mant. 1. p. 73. n. 215.*  
*Habitat Kilonii, parva.*
- bimaculata. 79. Chr. oblonga atra, elytris testaceis: macula atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 127. n. 67. mant. inf. 1. p. 73. n. 87.*  
*Habitat in America.*
- fasciata. 80. Chr. oblonga atra, elytris fasciis tribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 68. mant. inf. 1. p. 73. n. 88.*  
*Habitat in America.*
- ruficollis. 81. Chr. oblonga viridi-ænea, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 69. mant. inf. 1. p. 72. n. 89.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 162. n. 61. t. 45. f. 3.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 263. n. 16. Chrysomela nigra, &c.*  
*Habitat in Europa magis australi, etiam Germania.*

---

Chrysomelarum & cryptocephalorum larvæ consumunt folia, reliquis eorum vasibus, pulpa contentæ.

- flavicornis. 82. Chr. oblonga punctata viridi-ænea, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 73. n. 90.*  
*Habitat in Cayenna, minor.*
- crenata. 83. Chr. oblonga subtus ænea, supra cuprea, antennis flavis : articulo quinto & ultimo fuscis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 73. n. 91.*  
*Habitat in Cayenna, flavicorni major.*
- littoralis. 84. Chr. oblonga atra, elytris porcatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 74. n. 92.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 252. n. 1. t. 4. f. 6.* Galleraca atrofusca, lineis tribus elevatis punctis numerosis.  
*Habitat ad Europæ australis littora, statura chr. tanacetii, at major.*
- cayennensis. 85. Chr. oblonga atra, capite, thorace, femoribusque quatuor anterioribus obscure rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 74. n. 93.*  
*Habitat in Cayenna, statura chr. tanacetii, at paulo major.*
- tanacetii. 5. Chr. atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Fn. succ. 507. It. gotl. 270.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 70. mant. inf. 1. p. 74. n. 94.*  
*Degeer inf. 5. p. 299. n. 4. t. 8. f. 27.* Chrysomela oblonga nigra punctata, elytris coriaceis.  
*Merian. inf. eur. t. 68.*  
*Schaeff. ic. t. 21 f. 14.*  
*Habitat in Europæ tanaceto, rarius tota obscure grisea.*
- rustica. 86. Chr. oblonga nigra, thorace elytrisque griseis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 74. n. 95.*  
*Schaller Abh. hall. Naturf. Ges. 1. p. 274.* Chrysomela ovata nigra, elytris griseis : striis quinque eminentibus.  
*Habitat in Europæ fruticibus, affinis chr. tanacetii.*
- 12-punctata. 87. Chr. oblonga, thorace flavescente, elytris viridibus : punctis sex nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 71. mant. inf. 1. p. 74. n. 96.*  
*Habitat - - -*
- hæmorrhoidalis. 6. Chr. nigra nitida, antennis basi flavescens, ano supra rubro. *Fn. succ. 508. \* Scop. ent. carn. 225. Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 60. mant. inf. 1. p. 72. n. 78.*  
*Degeer inf. 5. p. 287. n. 6.*  
*Habitat in betula & alno, elytris striato-punctatis.*

- fucata. 88. Chr. atra , thorace elytrisque viridi-æneis. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 126. n. 61. *mant. inf.* I. p. 72. n. 79.  
*Habitat in Italia , statura & magnitudine hæmorrhoidalis.*
- fuscicor- 89. Chr. viridi-ænea , antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp.*  
nis. *inf.* I. p. 126. n. 62. *mant. inf.* I. p. 73. n. 80.  
*Habitat in Russia , magnitudine & statura hæmorrhoidalis.*
- graminis. 7. Chr. viridi-cærulea nitida , antennis pedibusque concoloribus. *Fn. succ.* 509. *Scop. ent. carn.* 220. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 118. n. 16. *mant. inf.* I. p. 68. n. 21.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 260. n. 10.  
*Degeer inf.* 5. p. 304. n. 16.  
*Schacff. ic. t.* 21. f. 10.  
*Habitat in Europæ plantis , præsertim gramine.*
- cuprea. 90. Chr. capite thoraceque æneis , elytris cupreis , corpore atro. *Fabr. sp. inf.* I. p. 118. n. 17. *mant. inf.* I. p. 68.  
n. 22.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 263. n. 15.  
*Laichart. ins. tir.* I. p. 144. n. 3. *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf.* 4. p. 55. n. 26. t. 23. f. 14. *Chrysomela metallica?*  
*Habitat in Germania.*
- asiatica. 91. Chr. viridi-ænea nitidissima elytris cyaneis. *Pall. it.* I.  
p. 463. n. 10. *Fabr. sp. inf.* I. p. 118. n. 15. *mant. inf.*  
I. p. 68. n. 20.  
*Habitat in Sibiria , surinamensi major.*
- glaberrima. 92. Chr. cyanea glaberrima , antennis plantisque fuscis.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 118. n. 14. *mant. inf.* I. p. 68. n. 19.  
*Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 16. *Chrysomela americana.*  
*Habitat Surinami , rarior in Europa boreali , aliquando*  
*to'a ænea.*
- ignita. 93. Chr. cyanea nitida , elytris æneis , antennis plantisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 68. n. 18.  
*Habitat in Cayenna , maxima.*
- ænea. 8. Chr. viridis nitida , abdomine posterius ferrugineo. *Fn. succ.* 510. \*  
*Fn. succ.* I. n. 420. *Chrysomela viridis nitida , thorace*  
*antice excavato.*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 130. n. 80. *mant. inf.* I. p. 75. n. 106.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 261. n. 12.*

*Degeer inf. 5. p. 305. n. 18. t. 9. f. 4.*

*Habitat in betula alno, etiam in Calabria.*

dresden-  
fis. 95. Chr. oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis,  
elytris nigro-æneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 75. n. 105.*  
*Habitat Dresdæ, statura & magnitudine vitellinæ.*

alni. 9. Chr. violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennif-  
que nigris. *Fn. suec. 511.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n.*  
*72. mant. inf. 1. p. 74. n. 97.*  
*Degeer inf. 5. p. 314. n. 21. t. 9. f. 18.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 332. n. 1.*  
*Frisch inf. 7. 13. t. 8.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 13.*  
*Schæff. elem. t. 53. f. 1. 2.*  
*Habitat in betula alno.*

absinthii. 97. Chr. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis  
tribus nigris. *Pall. it. 2. p. 725. n. 70. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 129. n. 73. mant. inf. 1. p. 74. n. 98.*  
*Habitat in Sibiria, magnitudine Chr. tanacetii.*

concolor. 98. Chr. oblonga flavescens nitida, oculis fuscis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 129. n. 74. mant. inf. 1. p. 74. n. 99.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, Chr. tanacetii paulo major.*

picea. 99. Chr. oblonga picea, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 129. n. 75. mant. inf. 1. p. 74. n. 100.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magna, glabra, nitida.*

betulæ. 10. Chr. violacea, elytris punctato-striatis. *Fn. suec. 514.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 129. n. 76. mant. inf. 1. p. 74. n.*  
*101. Scop. ent. carn. 221.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 264. n. 17. Chrysomela nigro-*  
*purpurea, &c.*  
*Degeer inf. 5. p. 318. n. 24. t. 9. f. 24. a. b. Chrysomela*  
*cærulea salicis, &c.*  
*Roef. inf. 2. scar. 3. t. 1.*  
*Raj. inf. 90. f. 5.*  
*Mus. Lesk. p. 14. n. 267?*  
*Habitat in betulæ albæ foliis, paginam inferiorem*  
*exedens.*

tricolor. 100. Chr. oblonga, thorace fulvo-viridi punctato, elytris  
viridibus nitidis, abdomine nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*129. n. 77. mant. inf. 1. p. 74. n. 102.*

*Habitat* - - - *major Chr. betulae*, capite viridi, ore & pedore pedibusque fulvis, antennis fuscis.

- hæmoptera.** 11. *Chr. violacea*, plantis aliisque rubris. *Fn. suec.* 512.<sup>\*</sup>  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 118. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 68. n. 23.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 258. n. 5. *Chrysomela tota violacea.*  
*Degeer inf.* 5. p. 312. n. 20. t. 9. f. 13. *Chrysomela hyperici?*  
*Pod. inf.* 26. *Chrysomela graminis.*  
*Habitat in Europa.*

**fuscipes.** 250. *Chr. violacea*, antennis tibiis plantisque fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk.* p. 13. n. 243.  
*Habitat in Europa.*

**nitens.** 251. *Chr. oblonga violacea nitida*, elytris lævissime punctatis. *Mus. Lesk.* p. 13. n. 261.  
*Habitat* - - -

**femistria-12.** 101. *Chr. nigra*, elytris flavis : fascia media nigra, antèrius & postèrius nigro-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 119. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 26.  
*Habitat in Brasilia.*

**centaurei.** 102. *Chr. cuprea nitens*, subtus viridi-ænea, pedibus cupreis. *Fabr. mant.* 1. p. 68. n. 25.  
*Habitat in Germaniæ centaureo*, variantis statura & magnitudine.

**varians.** 103. *Chr. cærulea f. viridis*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant.* 1. p. 68. n. 24.  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 271. *Chrysomela subglobosa nitida*, colore varians, antennis nigris.  
*Habitat in Saxonia*, statura & magnitudine fastuosa.

**occidentalis.** 12. *Chr. viridi-ænea*, pedibus antennisque flavis.  
*Habitat in America*, *chr. vitellinæ similis.* *Rolander*

**cerasi.** 13. *Chr. livida*, antennarum apicibus, oculisque nigris. *Fn. suec.* 570.<sup>\*</sup>  
*Habitat in pruni padi foliis*, quæ cribri instar perforat subtus hærens larva, depressa, viridis, setosa.  
*T. Bergman.*  
*Magnitudo cimicis lectularii*; thoracis margo anterior nigricans.



- padi. 14. Chr. nigra, elytris apice lividis. *Fn. suec.* 813.\*  
*Habitat in pruno pado, pulice major.*
- minutissi- 15. Chr. nigra opaca.  
 ma. *Habitat in Suecia, pulice quadruplo minor, elytris  
 abdomine brevioribus.*
- armora- 16. Chr. nigra nitidissima subcærulescens, subtus nigra.  
 ciæ. *Fn. suec.* 515.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 127. n. 66. *mant.*  
*inf.* 1. p. 73. n. 84. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. t.  
 44. f. 7. c. d.  
*Degeer inf.* 5. p. 322. n. 25. Chryfomela plantaginis.  
*Habitat in plantagine, cochlearia armoracia, ranun-  
 culo aquatili, flammula.*
- melanof- 254. Chr. oblonga nigra, capite, thorace elytrisq̃ue ru-  
 toma. bris: illo posterius puncto oreque, illo utrinque puncto,  
 dorso scutelloque, his futura nigris. *Mus. Lesk.* p. 14.
- carbona- 255. Chr. nigra, elytris lævissime punctatis: punctorum  
 ria. seriebus novem. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 285.  
*Habitat in Europa.*
- decem- 256. Chr. nigra, elytris ordinibus punctorum quinque  
 punctata. parium. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 266.  
*Habitat in Europa.*
- luteicor- 257. Chr. nigra, antennis luteo-rufescentibus, elytris  
 nis. lævissime punctatis: punctorum seriebus novem; mar-  
 gine inflexo testaceo. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 275.  
*Habitat in Europa.*
- subpunc- 258. Chr. nigra æneo nitens, elytris lævissime punctatis.  
 tata. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 276.  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 259. Chr. atra, elytris lævibus punctatis margine san-  
 melas. guineis. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 270.  
*Habitat in Europa, an distincta satis a limbata?*
- cyaano- 260. Chr. violacea, capite, thorace elytrisq̃ue nigris: his  
 melas. profunde punctatis, antennarum basi rubra. *Mus.*  
*Lesk.* p. 14. n. 265.  
*Habitat in Europa.*
- lichroa. 261. Chr. oblonga violacea, thorace, elytris tibiisque  
 viridibus. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 280.  
*Habitat in Europa.*



- elegans. 262. Chr. oblonga violaceo-ænea, capite, thorace, elytris profunde punctatis pedibusque viridi-æneis. *Mus. Lesk. p. 14. n. 281.*  
*Habitat in Europa.*
- ruffica. 104. Chr. cyanea antennarum basi, thorace pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 71. n. 55.*  
*Habitat in Russia meridionali, statura chr. polygoni, at paulo minor.*
- brunnea. 105. Chr. testacea, elytris futura lineolaque media fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 44. mant. inf. 1. p. 71. n. 56.*  
*Habitat in nova Hollandia, parva.*
- quinque-252. Chr. oblonga testacea, elytris punctis profundis maculata. striatis: singulis maculis quinque nigris notatis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 260.*  
*Habitat in Europa.*
- erythrop-253. Chr. ænea, capite thoraceque fusco-æneis, elytris tera, rubris basi gibbis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 257.*
- cerealis. 17. Chr. aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque cæruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 124. n. 45. mant. inf. 1. p. 71. n. 57.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 262. n. 14. Chrysomela aurea. Schaeff. ic. t. 1. f. 3.*  
*Habitat in Europæ magis australis segete, montis vogeli spatio scopario, mediæ magnitudinis, subtus obscure violacea, rarius tota purpurea.*
- america-106. Chr. viridi-ænea, elytris striis quinque sanguineis. na. *Fabr. sp. inf. 1. p. 124. n. 46. mant. inf. 1. p. 71. n. 58.*  
*Habitat in America & Galliæ australis lavandula, verticis macula coccinea.*
- festiva. 107. Chr. nigro-ænea, elytris lineis tribus futuraque anteriore flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 124. n. 47. mant. inf. 1. p. 71. n. 59.*  
*Habitat in America.*
- fastuosa. 18. Chr. aurea, coleoptris lineis tribus cæruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 125. n. 48. mant. inf. 1. p. 71. n. 60. Scop. ent. carn. 232. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 53. n. 15. t. 23. f. 6.*

Geoffr. *inf. par.* 1. p. 261. n. 11. Chrysomela viridis nitida, &c.

Gron. *zooph.* 561.

Habitat in Europæ lamio albo, urticis, rubis.

gloriosa. 108. Chr. viridis nitida, elytris linea cærulea. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 497. mant. *inf.* 1. p. 71. n. 61.  
Habitat in Italia, fastuosæ affinis, at duplo major.

speciosa. 19. Chr. viridi-sericea, elytris lineis duabus aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 124. n. 49. mant. *inf.* 1. p. 71. n. 62. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 54. n. 16. t. 23. f. 7?  
*Scop. ent. carn.* 231. Chrysomela speciosissima.  
Hollar *inf.* t. 6. f. 2.  
Habitat in Germaniæ silvis.  
Elytrorum lineæ antèrius & postèrius coeunt.

cyanea. 109. Chr. thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 124. n. 50. mant. *inf.* 1. p. 71. n. 63.  
Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.

nitida. 110. Chr. thorace rotundato viridi-æneo, antennis cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 71. n. 64.  
Habitat in Siam, auratæ affinis, at paulo major.

aurata. 111. Chr. thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: margine cyaneo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 124. n. 51. mant. *inf.* 1. p. 71. n. 65.  
Habitat in America boreali.

limbata. 112. Chr. atra, coleoptorum limbo sanguineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 125. n. 52. mant. *inf.* 1. p. 71. n. 66.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 260. n. 9. Chrysomela nigro-cærulea, &c.  
*Schaeff. ic.* t. 21. f. 20.  
Habitat in Europa magis australi.

hypo-  
chæridis. 21. Chr. aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. scan.* 210. *Fn. suec.* 516.  
*Scop. ent. carn.* 193. Buprestis syngenesiæ.  
Habitat in hypochæridis maculatæ floribus.

vulgaris-  
sima. 22. Chr. oblonga cærulea, antennis basi ferrugineis. *Fn. suec.* 517. *Scop. ent. carn.* 223. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 130. n. 79. mant. *inf.* 1. p. 75. n. 104.

*Degeer inf. 5. p. 317. n. 23. Chrysomela cærulea betulæ.  
Habitat in Europa, potissimum in salice.*

*vitellinæ. 23. Chr. viridi-cærulea. Fn. suec. 519.\* Scop. ent. carn. 224.  
Fn. suec. 426. Chrysomela ænei coloris.  
Fabr. sp. inf. 1. p. 130. n. 78. mant. inf. 1. p. 74. n. 103.  
Chrysomela oblonga viridi-ænea.*

*Degeer inf. 5. p. 323. n. 27.*

*Roef. inf. 2. scar. 3. p. 5. t. 1.*

*Habitat in Europæ salicibus glabris populoque, vulgaris-  
sima paulo minor, folia subtus consumens.*

*Larvæ, dum pascuntur, per lineas parallelas dispositæ.*

*polygoni. 24. Chr. cærulea, thorace, femoribus anoque rufis. Fn.  
suec. 520.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 43. mant. inf.  
1. p. 70. n. 54.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 283. n. 4.*

*Degeer inf. 5. p. 322. n. 26.*

*Raj. inf. 100. n. 4.*

*Reaumur inf. 3. t. 17. f. 14. 15.*

*Schæff. ic. t. 51. f. 5. & t. 161. f. 4. & t. 173. f. 4.*

*Habitat in polygono aviculari, rumice acetosa, pedibus,  
interdum rufis, ut tamen plantæ nigrae sint.*

*Femina ovīs gravida ultra coleoptra ventricosa.*

*18-gutta-113. Chr. elytris fuscis: punctis octo pallidis; quibusdam  
ta. connexis. Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 42. mant. inf. 1.  
p. 70. n. 53.*

*Habitat in nova Hollandia.*

*pallida. 25. Chr. flavescens, oculis nigris. Fn. suec. 521.\* Fabr.  
sp. inf. 1. p. 122. n. 34. mant. inf. 1. p. 70. n. 44.*

*Fn. suec. 1. n. 423. Chrysomela pallido-grisea.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 243. Chrysomela pallida, oculis  
nigris.*

*Habitat in Europæ salicibus.*

*striata. 114. Chr. atra nitida, elytris striatis testaceis, futura atra.  
Fabr. sp. inf. 1. p. 122. n. 35. mant. inf. 1. p. 70. n. 45.  
Habitat ad Caput bonæ spei, gibba; mediæ magnitudinis.*

*notata. 115. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris  
pallidis nigro-variis. Fabr. sp. inf. 1. p. 122. n. 36.  
mant. inf. 1. p. 70. n. 46.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, pallida, capite fulva,  
statura pallidæ.*

- rumicis. 116. Chr. thorace fulvo : punctis quatuor nigris, elytris fulvis : sutura vittaque media nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 70. n. 47.  
*Habitat in Hispaniæ rumice spinoso, statura & magnitudine pallidæ.*
- vulpina. 117. Chr. atra, elytris margine, punctis quatuor apiceque nigro-maculato albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 122. n. 37.  
*mant. inf.* 1. p. 70. n. 48.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura notatæ.*
- crassicornis. 118. Chr. flavescens, elytris maculis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 122. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 49.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- staphylæa. 26. Chr. obscure testacea tota. *Fn. suec.* 518.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 119. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 29.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 263. n. 15. Chrysomela supra rubro-cuprea, &c.  
*Degeer inf.* 5. p. 294. n. 3. t. 8. f. 24. Chrysomela cuprea  
*Habitat in Europæ pratis.*
- fervida. 119. Chr. testacea, elytris æneis : margine testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 119. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 30.  
*Habitat in insula Java.*
- polita. 27. Chr. thorace aurato, elytris rufis. *Fn. suec.* 522.\*  
*Scop. ent. carn.* 229.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 119. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 31.  
Chrysomela ovata, thorace aurato, elytris testaceis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 257. n. 2.  
*Degeer inf.* 5. p. 294. n. 2. t. 8. f. 2. 3.  
*Schaeff. ic. t.* 65. f. 9.  
*Habitat in salice, populo.*
- lurida. 28. Chr. nigra, elytris castaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 120. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 33.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 258. n. 3.  
*Habitat in Galliæ vite, Germania, statura politæ, at dimidio minor.*
- lunata. 120. Chr. ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 69. n. 34.  
*Habitat - - - statura & magnitudine politæ.*

clavicornis. 29. Chr. nigra, elytris abdomineque nigris, antennis clavatis. *Habitat in America, chr. populi facie.* Rolander.

tremula. 121. Chr. cærulescens, elytris testaceis. *Fabr. mant. I. p. 69. n. 28.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 256. n. 2.*

*Habitat in Europæ populo, chr. populi duplo minor.*

populi. 30. Chr. thorace cærulescente, elytris rubris apice nigris. *Fn. suec. 523.\**

*Scop. ent. carn. 228. Fabr. sp. inf. I. p. 119. n. 20. mant. inf. I. p. 69. n. 27. Pod. inf. 27. Chrysomela 7-punctata.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 256. n. 1.*

*Degeer inf. 5. p. 290. n. 1. t. 8. f. 16.*

*List. scar. angl. 381. n. 6.*

*Merian. inf. eur. 14. t. 27.*

*Albin. inf. 63. f. 6.*

*Schaeff. ic. t. 21. f. 9. & t. 9. & t. 47. f. 4. 5.*

*Habitat in populo tremula, folia sæpe devastans, quæ excorticata rudis vasis relinquit.*

*Larva fætens, hexapus, albo nigroque varia ex tuberculorum duplici serie humorem lacteum fundit.*

viminalis. 31. Chr. nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 121. n. 30. mant. inf. I. p. 69. n. 39. Syst. nat. XII. 2. p. 590. n. 31. Fn. suec. 524.\* Chrysomela ovata nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 265. n. 18. Chrysomela rubra, &c.*

*Scop. ent. carn. 233. Chrysomeia signata.*

*Degeer inf. p. 297. n. 6.*

*Habitat in Europæ salicibus, aliquando cum hæmorrhoidali copia conjuncta.*

cyani- 122. Chr. rufa, elytris punctis posteriusque cyaneis. *Fabr. pes. sp. inf. I. p. 121. n. 31. mant. inf. I. p. 69. n. 40. Habitat in nova Hollandia.*

cyani- 123. Chr. rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus, cornis. coleoptris maculis octo cyaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 121. n. 32. mant. inf. I. p. 59. n. 41. Habitat in nova Hollandia.*

10-punctata. 32. Chr. thorace rubro posterius nigro, elytris rufis: punctis subquinis nigris. *Fn. suec. 525. Fabr. sp. inf. I. p. 121. n. 33. mant. inf. I. p. 69. n. 42.*

*Fn. suec.* 1. n. 436. Chrysomela supra rufa, thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.

*Geoff. inf. par.* 1. p. 258. n. 4. Chrysomela rubra, &c.

*Degeer inf.* 5. p. 294. n. 4. t. 8. f. 25. Chrysomela rufipes.

*Schaeff. ic. t.* 21. f. 13.

β) Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Fn. suec.* 1. n. 1354.

*Habitat in Europæ populo, punctorum in elytris numero varians.*

sexpunctata. 124. Chr. nigra, thorace rufo: punctis duobus, elytris rufis: punctis tribus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 70. n. 43.

*Habitat in Europæ plantis, decempunctatæ affinis.*

variolosa. 33. Chr. nigra, elytris rubris: punctis sparsis impressis cæruleis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 122. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 50.

*Habitat in Africa.*

lapponica. 34. Chr. thorace viridi, elytris rubris, fascia inter punctum maculamque lunatam cærulea. *Fn. suec.* 536. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 123. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 51. *Degeer inf.* 5. p. 302. n. 12. t. 9. f. 3. Chrysomela curvilinea.

*Schaeff. ic. t.* 44. f. 2.

*Habitat in Europa boreali, Saxonix fraxino, elytrorum futura cærulea.*

undulata. 35. Chr. rufa, elytris fasciis tribus atro-cæruleis undulatis. *Amæn. ac.* 6. p. 393. n. 14. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 173. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 52.

*Habitat in India.*

boleti. 36. Chr. nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis. *Fn. suec.* 527. \* *Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 9. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 120. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 34.

*Uddm. diss.* 4. f. 3. Dermestes ater nitens, elytris nigris: fasciis duabus flavis undulatis.

*Scop. ent. carn.* 247. Coccinella fasciata.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 337. t. 6. f. 3. *Schaeff. elem. t.* 58. ic. t. 77. f. 6. Diaperis.

*Degeer inf.* 5. p. 49. n. 9. t. 3. f. 3. Tenebrio boleti.

*Habitat in boletis arboris.*



novem- 125. Chr. thorace nigro æneo, coleoptris flavis : vittis novem  
vittata. fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 120. n. 26. *mant. inf.* 1.  
p. 69. n. 35.

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine chr. boleti.*

stolida. 126. Chr. ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris va-  
riegatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 120. n. 27. *mant. inf.* 1.  
p. 69. n. 36.

*Habitat in America.*

nigricor- 127. Chr. nigro-ænea, capite thoracis lateribus, elytro-  
nis. rumque macula duplici baseos ferrugineis. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 121. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 37.

*Habitat in nova Hollandia.*

collaris. 37. Chr. violacea, thoracis marginibus albis : puncto nigro.  
*Fn. succ.* 528. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 121. n. 29.  
*mant. inf.* 1. p. 69. n. 38.

*Degeer inf.* 5. p. 302. n. 13.

*Schaeff. ic. t.* 52. f. 11. 12.

*Habitat in Europæ & borealis Americæ salicibus.*

sanguino- 38. Chr. atra, elytris margine exteriori sanguineis. *Fn.*  
lenta. *succ.* 529. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 125. n. 53. *mant. inf.*  
1. p. 71. n. 67.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 259. n. 8. t. 4. f. 8. *Chrysomela*  
nigro-cærulea, &c.

*Degeer inf.* 5. p. 298. n. 7. t. 8. f. 26. *Chrysomela ru-*  
bro-marginata.

*Scop. ent. carn.* 203. *Buprestis fanguinolenta.*

*Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 10.

*Schaeff. ic. t.* 21. f. 15.

*Habitat in Europæ salicetis.*

marginata. 39. Chr. nigro-ænea, elytris margine luteis. *Fn. succ.*  
529. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 125. n. 54. *mant. inf.* 1. p.  
71. n. 68.

*Degeer inf.* 5. p. 303. n. 14.

*Schaeff. ic. t.* 21. f. 19.

*Habitat in Europæ pratis apricis.*

*Elytra striato-punctata.*

aucta. 128. Chr. thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis :  
margine rubro. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 72. n. 69.

*Habitat Dresdæ, magnitudine & statura marginatæ.*

- marginel- 40. Chr. nigro-cærulea, thorace elytrisque margine luteis.  
la, *Fn. succ.* 530. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 125. n. 55. *mant.*  
*inf.* 1. p. 42. n. 70. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4.  
t. 23. f. 9.  
*Degeer inf.* 5. p. 304. n. 15. *Chrysomela ranunculi.*  
*Raj. inf.* 99.  
*Habitat in Europæ ranunculis.*
- hannove- 129. Chr. cyanea, thorace margine, elytris margine  
riana. vittaque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 56.  
*mant. inf.* 1. p. 72. n. 71. *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf.* 4. p. 54. n. 22. t. 23. f. 10.  
β) *Chrysomela potentillæ.* *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
4. p. 55. n. 23. t. 23. f. 11.  
γ) *Chrysomela ranunculi.* *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4.  
p. 55. n. 24. t. 23. f. 11.  
*Habitat in Germania.*
- 5-punctata. 130. Chr. nigra, thorace rufo, coleoptris testaceis: punctis  
quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 72. n. 72.  
*Habitat Hamburgi, mediæ magnitudinis.*
- scutellata. 131. Chr. rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 58. n. 32. t. 23. f. 20. c.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 72. n. 73.  
*Habitat in Germania, parva.*
- litura. 123. Chr. rufescens, elytris futura lineaque longitudinali  
nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 57. *mant. inf.* 1. p.  
72. n. 74. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 57. n.  
30. t. 23. f. 18. a.  
*Habitat in Anglia & Germania.*
- flavicans. 133. Chr. flavesens, elytris viridi-cinereis. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 72. n. 75.  
*Habitat Halæ Saxonum, statura & magnitudine lituræ.*
- castanea. 41. Chr. fusca, elytris margine exteriori castaneo. *Amæn.*  
*ac.* 6. p. 394. n. 15.  
*Habitat Surinami.*
- analis. 42. Chr. atra, elytris fuscis: margine exteriori testaceo.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 130. n. 81. *mant. inf.* 1. p. 75. n. 107.  
*Habitat in Europa, capta primum ad prædium Hammarby.*  
*Fabricius.*

- cruenta*. 134. *Chr. oblonga fanguinea*, thorace immaculato; elytris punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 130. n. 82. *mant. inf.* I. p. 75. n. 108.  
*Habitat in India, coccineæ statura.*
- coccinea*. 43. *Chr. thorace marginato fanguineo*: macula nigra, elytris fanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. suec.* 532. \* *Fabr. sp. inf.* I. p. 131. n. 83. *mant. inf.* I. p. 75. n. 109.  
*Uddm. diff.* 13. *Coccinella coleoptris rubris*, maculis quatuor nigris.  
*Degeer inf.* 5. p. 301. n. 10. t. 9. f. 1. *Chrysomela quadrimaculata.*  
*Habitat in Europæ borealis corylo.*
- cruciata*. 135. *Chr. oblonga rubra*, coleoptris cruce nigra. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* I. p. 273. *Fabr. mant. inf.* I. p. 75. n. 110.  
*Habitat Halæ Saxonum, coccinea minor, elytris, &c. marginatis a plurimis congeneribus distans, an forte cum chr. rustica, & cryptocephalis capreæ, nymphaeæ, &c. proprii generis?*
- quadrimaculata*. 136. *Chr. oblonga*, thorace testaceo immaculato, elytris testaceis: maculis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 131. n. 84. *mant. inf.* I. p. 75. n. 111.  
*Habitat in nemoribus Kiloniensibus.*
- decemmaculata*. 137. *Chr. oblonga nigra*, coleoptris rubris: punctis decem nigris; duobus communibus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 131. n. 85. *mant. inf.* I. p. 75. n. 112.  
*Habitat in America.*
- 20-punctata*. 138. *Chr. oblonga viridi-ænea* thoracis marginibus albis, elytris albis: maculis decem æneis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 131. n. 86. *mant. inf.* I. p. 75. n. 112.  
*Bergstr. nomencl.* I. p. 87. t. 13. f. 10. *Chrysomela vicia maculata.*  
*Petiv. garoph.* t. 29. f. 5.  
*Habitat in Anglia.*
- bipunctata*. 139. *Chr. testacea*, elytris macula fusca. *Fabr. sp. inf.* I. p. 127. n. 64. *mant. inf.* I. p. 73. n. 82.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura philadelphicæ, at major.*

- philadel- 44. Chr. viridis, elytris flavis: punctis virescentibus oblongisculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 127. n. 65. *mant. inf.* I. p. 73. n. 83.  
phica. *Degeer inf.* 5. p. 353. n. 6. t. 16. f. 13.  
*Petiv. gaz.* t. 26. f. 11.  
*Habitat in Pennsylvania, elytrorum futura nunc viridi, nunc flava.*
- trimaculata. 45. Chr. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 117. n. 9. *mant. inf.* I. p. 67. n. 11.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 592. n. 45. Chrysomela ovata nigra, elytris flavis, maculis tribus oblongis nigris, intermedia futuræ communi.  
*Habitat in America, minuta, forma coccinellæ.*
- Adonidis. 140. Chr. atra, thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris flavis: futura vittaque nigris. *Pall. it.* I. p. 463. n. 29.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 117. n. 10. *mant. inf.* I. p. 67. n. 12.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 56. n. 39. t. 23. f. 17.  
*Habitat in Tiberiæ adonide & Austria.*
- dorsalis. 141. Chr. atra, thoracis margine testaceo: puncto nigro, elytris testaceis: futura abbreviata atra. *Fabr. sp. inf.* I. p. 117. n. 11. *mant. inf.* I. p. 67. n. 13.  
*Habitat in Austria.*
- clavata. 142. Chr. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta flavescente. *Fabr. mant. inf.* I. p. 67. n. 14.  
*Habitat --- nigra, mediæ magnitudinis.*
- bifasciata. 143. Chr. testacea, elytris æneis nitidis: punctis duobus fasciisque duabus flavis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 68. n. 15.  
*Habitat in Cayenna, magna.*
- futuralis. 144. Chr. ænea, elytris flavis: futura vittaque æneis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 117. n. 1. 2. *mant. inf.* I. p. 68. n. 16.  
*Habitat in America boreali.*
- barbarica. 46. Chr. viridi-ænea, elytris lineis quinque rubris, alis fanguineis.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 16.  
*Habitat in Barbaria, inter coccos officinarum lecta, ex cæruleo virescens, subtus ex picco ænea.*

Lineola. 47. Chr. flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 58. mant. inf. p. 72. n. 76.*

*Habitat in America, pulicis magnitudinis, capite & thorace pallidis, oculis nigris. Brünniche.*

æstuans. 48. Chr. ferruginea, elytris maculis quatuor flavicantibus difformibus. *Gron. zooph. 565.*

*Habitat in America, coccinellæ maximæ magnitudine, elytris glabris obsolete punctato-striatis.*

sacra. 49. Chr. supra rufa, thoracis linea, punctis duobus, elytrorumque futura nigris. *Mus. Lud. Ulr. 40.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 59. mant. inf. 1. p. 72. n. 77.*

*Habitat in Palæstina, alis sanguineis.*

14-punctata. 94. Chr. testacea, coleoptris flavis: punctis sedecim nigris: duobus communibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 13. mant. inf. 1. p. 68. n. 17.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 599. Chrysomela cylindrica, femoribus posticis incrassatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis punctis XIV nigris.*

*Habitat in India, bipunctatæ similis, at major.*

obscura. 96. Chr. nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 127. n. 63. mant. inf. 1. p. 73. n. 81.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 599. Fn. suec. 561.\* Chrysomela subcylindrica, thorace pedibusque nigris.*

*Degeer inf. 5. p. 336. n. 40. Chrysomela nigro-quadrata. Habitat in Europæ plantis, thorace gibbo, elytris angustiore.*

violacea. 145. Chr. violacea, elytris lineis quatuor viridescentibus. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 270. Schaeff. ic. t. 21. f. 10.*

*Habitat æstate gregaria in Europæ salicibus, chr. alni major, ceterum cereali similis.*

olivacea. 146. Chr. æneo-olivacea, thoracis marginibus lateralibus crassis, elytris punctato-striatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 272.*

*Habitat in Germaniæ plantis, staphyleæ statura & magnitudine, nitida, punctorum excavatorum in elytris seriebus 9.*

- sternicor- 147. Chr. violacea, sterno porrecto. *Schaller Abh. der hall.*  
nis. *Naturf. Ges.* 1. p. 274. t. 1. f. 1.  
*Habitat in India, scarabæi vernalis magnitudine, punctis plurimis in thorace et elytris excavatis.*
- globosa. 148. Chr. elytris nigris, thorace sanguineo, pedibus rufo-  
fuscis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 11. n. 18.  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major, globosa, nigra.*
- hollandi- 149. Chr. supra ænea, elytris punctatis, subtus nigra, cine-  
ca. reo-tomentosa. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 11. n. 19.  
*Habitat in Hollandia Sueciæ, statura & magnitudine chr. vitellinæ.*
- undata. 150. Chr. elytris testaceis: punctis fasciisque duabus nigris,  
capite thoraceque testaceis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4.  
p. 12. n. 20.  
*Habitat Upsaliæ, pallidæ statura & magnitudine, subtus testacea.*
- bipustu- 151. Chr. elytris nigris: apicis macula flava, capite thoracif-  
lata. que lateribus flavis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 13. n. 21.  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major, nigra, glabra, subdepressa.*
- gibba. 152. Chr. oblonga, elytris brunneis, capite thoraceque fuscis.  
*Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 14. n. 24.  
*Habitat Upsaliæ, magnitudine vulgatissimæ, subdepressa.*
- gigas. 153. Chr. tota cyanea, oculis ex luteo fuscis, elytris glaber-  
rimis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 51. n. 2. t. 23. f. 2.  
*Habitat in India.*
- Gronovii. 154. Chr. nigra nitida, thoracis fascia duplici & margine ni-  
gris, elytris luteis: macula, vitta interrupta, punctisque  
duobus nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 52.  
n. 4. t. 23. f. 4.  
*Habitat - - - ultra dimidium pollicem longa, fascia thoracis priore dentata.*
- indica. 155. Chr. nigra, abdomine luteo, elytris subdiaphanis fuscis:  
fasciis tribus luteis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p.  
52. n. 5. t. 23. f. 5.  
*Habitat in India.*



- lomata. 156. Chr. nigra, capite, thorace, elytrisque cyaneis, his obsolete punctatis margine sanguineis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 1. p. 54. n. 20. t. 23. f. 8.*  
*Habitat in Germania, marginatae affinis.*
- centaura. 157. Chr. viridi-aurea, thorace elytrisque rubris punctatis, antennis nigris, tarsis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 56. n. 27. t. 23. f. 15.*  
*Habitat Berolini, ultra 2 lineas longa.*
- taraxa- 158. Chr. rubro aurea, subtus viridi-aurea, elytris punctator-  
 conis. striatis, antennis nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 56. n. 28. t. 23. f. 16.*  
*Habitat Berolini in taraxacone.*
- exilis. 159. Chr. nigra, capite & thorace glaberrimis pedibusque fulvis, elytris punctis fuscis seriatim maculisque duabus nigris confluentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 57. n. 31. t. 23. f. 19. b.*
- unicolor. 160. Chr. livida, elytris glabris: punctis sparsis excavatis. *Herbst apud. Fuesli arch. inf. 7. p. 161. n. 56. t. 44. f. 1.*  
*Habitat in America, maxima.*
- grisea. 161. Chr. ex virescente grisea subvillosa, pedibus antennisque flavescentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 161. t. 44. f. 2. a. b.*  
*Habitat Berolini, vix lineam superans.*
- rubi. 162. Chr. angusta chalybea, elytris glabris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 562. n. 59. t. 44. f. 4. e. f.*  
*Habitat Berolini.*
- cacaliae. 163. Chr. virens, elytris striata longitudinali futuraque caeruleis, alis rubris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 162. n. 62. t. 45. f. 2.*  
*Habitat in Austria.*
- bulgaren- 164. Chr. atra, elytris nigro-æneis punctatis, unguiculis  
 fis. rubris. *Schränck in! austr. p. 70. n. 127. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 55. n. 25. t. 23. f. 13.*  
*Habitat in Austria.*

---

Huc referas quoque Chrysomelam bimaculatam. *Schaff. ic. inf. t. 51. f. 7. & lit. M. t. 21. f. 1. 2.*

- binotata. 165. Chr. testacea, elytris basi ferrugineis. Müll. *fn. fridrichsd. p. 8. n. 73.*  
*Habitat in Dania.*
- Fridrichs- 166. Chr. thorace macula nigra, elytris sanguineis imma-  
 dalensis. culatis, abdomine nigro. Müll. *fn. fridr. p. 8. n. 74. prodr. zool. dan. p. 81. n. 885.*  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 4.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- similis. 167. Chr. nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque  
 basi rubris. Müll. *zool. dan. prodr. p. 81. n. 880.*  
*Habitat in Dania.*
- orichal- 168. Chr. nigra, supra ænea, elytris punctis striatis. Müll.  
 cea. *zool. dan. prodr. p. 82. n. 889.*  
*Habitat in Dania.*
- grossa. 169. Chr. atra, subtus violacea, tarsis spongiosis subtus  
 fuscis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 81. n. 875.*  
*Schaeff. ic. t. 126. f. 1.*  
*Habitat in Dania.*
- punctata. 170. Chr. violacea, elytris punctato-striatis, ano rubro.  
 Müll. *zool. dan. prodr. p. 82. n. 890.*  
*Habitat in Dania.*
- obtusa. 171. Chr. violacea, thorace pedibusque rufis. Müll. *zool.*  
*dan. prodr. p. 82. n. 895.*  
*Habitat in Dania.*
- thoracica. 172. Chr. violacea, thoracis margine laterali dilatato, elytris  
 punctato-striatis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 82. n. 898.*  
*Habitat in Dania.*
- bilineata. 173. Chr. viridi-aurea, thorace anterieus excavato, elytro-  
 rum linea duplici cærulea. Müll. *zool. dan. prodr.*  
*p. 83. n. 904.*  
*Ad. nigr. 4. p. 8. t. 16. f. 5.*  
*Habitat in Scandinavia.*
- serotina. 174. Chr. nitida rufa, oculis nigris, tibiis posterioribus  
 arcuatis. Müll. *prodr. zool. dan. p. 83. n. 905.*  
*Habitat in Dania.*
- cærulea. 175. Chr. cærulea, thorace violaceo. Geoffr. *ins. par. 1.*  
*p. 259. n. 6.*  
*Habitat in Gallia.*

- atrata. 176. Chr. atra, alis sanguineis. *Geoffr. inf. par. 1. 259. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- decem- 177. Chr. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum  
 striata. serie duplici divis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 261. n. 13.*  
*Habitat in Gallia.*
- ruficauda. 178. Chr. viridi-ænea obscura nitida, abdominis lateribus,  
 ano alarumque margine rubris. *Degeer inf. 5. p. 307.*  
*n. 17.*  
*Habitat - - -*
- viridula. 179. Chr. viridis aurata nitida, thorace antèrius æquali, ab-  
 domine supra toto nigro. *Fn. suec. 1. n. 421. 2. n. 520. B.*  
*Goed. inf. 1. t. 45.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 261. n. 11.*  
*Degeer inf. 5. p. 311. n. 19.*  
*Habitat in Europa.*
- amethytina. 180. Chr. supra ex cæruleo violacea, subtus ex violaceo  
 viridis, punctis excavatis sparsis.  
*Degeer inf. 5. p. 316. n. 22.*  
*Habitat - - - thorace amplo, antennis brevioribus nigris.*
- longicornis. 181. Chr. oblonga, thorace teretiufculo, supra ex griseo  
 fusca nitida, subtus nigra capite nigro.  
*Degeer inf. 5. p. 325. n. 29. t. 9. f. 35.*  
*Habitat in Europa, antennis longis.*
- cruentata. 182. Chr. nigra, elytris glabris: fasciis transversis undulatis  
 maculisque rubris.  
*Degeer inf. 5. p. 350. n. 2. t. 16. f. 9.*  
*Habitat in America australi.*
- hæmostata. 183. Chr. capite thoraceque viridi-æneis obscuris, elytris  
 nigris: maculis plurimis rubris punctisque excavatis.  
*Degeer inf. 5. p. 350. n. 3. t. 16. f. 10.*  
*Habitat in America australi.*
- fuliginosa. 184. Chr. fusca depressa, thorace elytrisque griseo-fuscis,  
 antennis nigris.  
*Degeer inf. 5. p. 354. n. 8. t. 16. f. 15.*  
*Habitat Surinami.*
- asclepiada. 185. Chr. obscure cærulea nitida, antennis nigris, thoracis  
 punctis sparsis, elytrorum lineatis. *Pall. it. 2. app. n. 69.*  
*Habitat ad Volgam & Irtin Siberiæ in Asclepiada.*

- Lapphina*. 186. *Chr. cyanea nitida*, ore oculisque rubris, antennis nigris. *Forst. nov. inf. gen. p. 19. n. 19.*  
*Habitat* - - - *sanguinolenta iriplo major*, thorace elytrisque punctis minutissimis conspersis.
- anglica*. 187. *Chr. atro-cærulea*, elytris nigro-æneis striato-punctatis, alis rubris. *Forst. nov. inf. gen. p. 20. n. 20.*  
*Habitat in Angliæ hypericone perforato*, fastuosæ magnitudine.
- rhoeis*. 188. *Chr. ferruginea*, capite, thorace & striis aliquot elytrorum pallidis. *Forst. nov. inf. gen. p. 21. n. 21.*  
*Habitat in Americæ septentrionalis rhoe glabro*, politæ magnitudine.
- noveboracensis*. 189. *Chr. thorace rufo*: disco punctis nigris, elytris rufis: futura, punctis lineolisque nigris. *Forst. nov. inf. gen. p. 22. n. 22.*  
*Habitat in Noveboraco*, habitu *chr. populi*, magnitudine fere politæ.
- vernalis*. 190. *Chr. nigra*, capite, thorace, elytris pedibusque olivaceis, elytris stria longitudinali & futura nigra. *Forst. nov. inf. gen. p. 23. n. 23.*  
*Habitat in Anglia*, primo vere in arena conspicua, magnitudine & habitu *chr. vitellinæ*.
- frontalis*. 191. *Chr. nigra*, capite antennarum basi, elytrorum margine & pedibus ferrugineis. *Forst. nov. inf. gen. p. 24. n. 24.*  
*Habitat in America septentrionali*, mediæ magnitudinis.
- sisymbrii*. 192. *Chr. capite atro*, thoracis elytrorumque marginibus undique sanguineis. *Lepechin it. 1. p. 10. t. 4. f. 16.*  
*Habitat in Russiæ Sisymbrio Sophia.*
- Lepechini*. 193. *Chr. capite cæruleo*, thorace elytrisque rubris: fasciis duabus cæruleis. *Lepech. it. 1. p. 29. t. 4. f. 7.*  
*Habitat in Russiæ australi.*
- rubicunda*. 194. *Chr. atra*, thorace elytrisque rubicundis, incisuris abdominis albis. *Lepech. it. 1. p. 311. t. 20. f. 3.*  
*Habitat in Russiæ australis polygono frutescente.*
- distincta*. 195. *Chr. obscure viridis*, thoracis elytrorumque limbo interrupto flavescente. *Lepech. it. 1. p. 312. t. 20. f. 6.*  
*Habitat in Russiæ australi.*

quadri- 196. Chr. capite nigro, thorace nigro, margine rubro,  
punctata. elytris miniatis: punctis quatuor nigris. *Lepech. it.* 2.  
p. 208. t. 11. f. 20.  
*Habitat in Sibiria.*

menthæ. 197. Chr. nigro-ænea nitida. *Schranck Beytr. z. Naturg.*  
p. 63. §. 5.  
*Habitat in mentha aquatica; an propria species?*

pruni. 198. Chr. nigra, capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis.  
*Schranck Beytr. z. Naturg.* p. 63. §. 6.  
*Habitat in pruno.*

cognata. 199. Chr. cærulea, pedibus nigris, ano supra, primisque  
antennarum articulis fulvis. *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf.* 4. p. 58. n. 37.  
*Habitat Berolini, statura & magnitudine chr. vitellinæ,*  
*ceterum hæmorrhoidali affinis.*

erythro- 200. Chr. viridis nitens granulata: elytris obtuse mucronatis,  
pus. antennis fulvis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 59.  
n. 38.  
*Habitat Berolini in salicibus, statura & magnitudine chr.*  
*vitellinæ.*

raphani. 201. Chr. viridis nitens, elytris granulatis, antennarum  
ultimis articulis tarsisque nigris. *Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf.* 4. p. 59. n. 42. t. 23. f. 21.  
*Habitat Berolini in armoracia.*

ærofa. 202. Chr. nigra cærulescenti irrorata, subtus fusca, antennis  
pedibusque nigris, punctorum in elytris seriebus septem.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 60. n. 43. t. 23. f. 22.  
*Habitat in Pomerania.*

melano- 203. Chr. cærulea subtus fusca, antennis pedibusque nigris,  
pus. elytrorum punctis sparsis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
4. p. 60. n. 44.  
*Habitat Berolini, ærosæ affinis.*

japonica. 248. Chr. testacea, thorace livido: margine posteriori punc-  
tis 5 nigris, elytris nigro-cæruleis. *Hornstedt*  
*Schrift. der berl. Naturf.* 8. I. t. 1. f. 1.  
*Habitat in Japonia, chr. alni magnitudine.*

249. Chr.

- malac- 249. Chr. capite, thorace pedibusque ferrugineis, elytris  
 centis. nigro-æneis : margine interiori ferrugineo. *Hornst.*  
*Schrift. berl. Naturf.* 8. 1. p. 2. t. 1. f. 9.  
*Habitat in Malacca, Sumatra & Java, marginatæ mag-*  
*nitudine.*
- crassipes. 263. Chr. testacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, fe-  
 moribus crassis. *Mus. Lesk. p. 14. n. 277.*  
*Habitat in Europa.*
- janthina. 264. Chr. oblonga, fusco ænea, elytris violaceis : puncto-  
 rum ordinibus novem, tibiis compressis rufis. *Mus. Lesk.*  
*p. 14. n. 286.*  
*Habitat in Europa.*
- bimacu- 265. Chr. oblonga rufa, elytris testaceis, punctato-striatis :  
 lara. maculis, duabus oblongis obsolete fuscis. *Mus. Lesk.*  
*p. 15. n. 287.*
- \*\* saltatoriæ, femoribus posterioribus incrassatis -  
 Alticæ.
- flava. 204. Chr. flava, thorace nigro punctato, elytris violaceis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 87. mant. inf. 1. p. 75. n. 113.*  
*Fabr. syst. ent. app. p. 821. Altica thoracica.*
- carolinia- 205. Chr. flavescens, thorace punctis duobus, coleoptis  
 na. vittis quinque flavis. *Fabr. mant. 1. p. 75. n. 114.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 156. n. 38. Crioceris caroliniana.*  
*Habitat in America boreali.*
- oleracea. 51. Chr. virefcenti-cærulea. *Fn. suec. 534. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 133. n. 94. mant. inf. 1. p. 77. n. 126.*  
*Geoffr. inf. per. 1. p. 245. a. 1. Scop. ent. carn. 212.*  
*Altica oleracea.*  
*Degeer inf. 5. p. 344. n. 49.*  
*Habitat in Europæ plantarum, præsertim tetradynama-*  
*rum, cotyledonibus, quas misere destruit, nisi forte ante*  
*seminationem immersis seminibus, cineribus herbarum,*  
*potissimum tabaci, pellenda.*
- albicollis. 206. Chr. thorace pallido, elytris æneis : maculis duabus fas-  
 ciaque aureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 133. n. 95. mant.*  
*inf. 1. p. 77. n. 127.*  
*Habitat in nova Hollandia.*



fulvicolor. 207. Chr. thorace rufescente, elytris pallidis: futura maculifque duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 133. n. 96. mant. inf. 1. p. 77. n. 128.*

*Habitat* — — — *mediæ magnitudinis, pallida, capite pedumque geniculis nigris.*

bicolor. 52. Chr. rufa, elytris femoribusque posterioribus cæruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 192. mant. inf. 1. p. 77. n. 124.*

*Degeer inf. 5. p. 357. n. 12. t. 16. f. 20.*

*Habitat in America.*

*Corpus colore & magnitudine chr. polygoni.*

famelica. 208. Chr. flavesceus, elytris viridibus: margine pallida. *Fabr. mant. inf. 1. p. 76. n. 123.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 91. Chrysomela marginata.*

leucopicta. 209. Chr. nigra, thorace albo, elytris obscure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *Fabr. mant. 1. p. 76. n. 122.*

*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*

quadri-fasciata. 210. Chr. ferruginea, elytris strigis quatuor albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 76. n. 121.*

*Habitat in Cayenna, magna.*

cincta. 211. Chr. nigra, elytris viridi-æneis: margine punctifque duobus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 90. mant. inf. 1. p. 76. n. 119.*

*Habitat in Lusitania, magna.*

equestris. 212. Chr. thorace elytrisque albis: margine baseos fasciaque media ferrugineis. *Fabr. mant. 1. p. 76. n. 118.*

*Habitat in America, magna.*

quadri-guttata. 213. Chr. ferruginea, thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 89. mant. inf. 1. p. 76. n. 117.*

*Habitat in Cayenna, biguttatæ affinis.*

biguttata. 214. Chr. ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 88. mant. inf. 1. p. 76. n. 116.*

*Habitat in America.*

glabrata. 215. Chr. thorace pallido : punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *Fabr. mant.* I. p. 76. n. 115.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 156. n. 39. *Crioceris glabrata*.

nobilitata. 216. Chr. ferruginea, elytrorum margine fasciaque albis.  
*Fabr. mant.* I. p. 76. n. 120.  
*Habitat in Cayenna, magna.*

chrysocephala. 53. Chr. atro-cærulea, capite pedibusque quatuor anterioribus luteis. *Fn. suec.* 535. *Scop. ent. carn.* 213.  
*Habitat in Suecia.*

hyoscyami. 54. Chr. virescenti-cærulea, pedibus testaceis, femoribus posterioribus violaceis. *Fn. suec.* 536.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 133. n. 97. *mant. inf.* I. p. 77. n. 129.

*Fn. succ.* 540. *Mordella ovata* cærulea nitida, tibiis ferrugineis.

*Degeer inf.* 5. p. 345. n. 51. *Chrysomela ovata* saltatoria, &c.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 248. II. *Altica cærulea*, &c.

*Raj. inf.* 98. 9. *Capricornus exiguus saltatorius*.

*Habitat in Europæ hyoscyamo, brassica.*

quadripustulata. 217. Chr. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 135. n. 107. *mant. inf.* I. p. 77. n. 139.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 250. n. 15.

*Habitat in Angliæ, Galliæ hortis.*

anglica-na. 218. Chr. atra, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 135. n. 106. *mant. inf.* I. p. 77. n. 138.

*Habitat in Angliæ plantis.*

dorsalis. 219. Chr. nigra, thorace elytrorumque margine pallidis.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 135. n. 105. *mant. inf.* I. p. 77. n. 137.

*Habitat in Anglia, statura atricillæ, an varietas?*

atricilla. 55. Chr. nigra, thorace, elytris tibiisque testaceis. *Fn. suec.* 537.\*

*Fabr. sp. inf.* I. p. 135. n. 104. *mant. inf.* I. p. 77. n. 136.  
*Chrysomela saltatoria nigra*, thorace elytris cinereis.

β) *Chrysomela melanocephala*. *Degeer inf.* 5. p. 348. n. 57.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 251. n. 19.

*Habitat in Europæ plantis.*

erythrocephala. 56. Chr. atro-cærulea, capite geniculisque pedum rufis. *Fn. suec.* 538.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 134. n. 103. *mant. inf.* I. p. 77. n. 135.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 246. n. 4. Altica nigro-ænea, &c.  
Habitat in Europæ plantis.*

Modeeri. 57. Chr. ænea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posterioribus luteis. *Fn. suec. 539.  
Fabr. sp. inf. 1. p. 134. n. 102. mant. inf. 1. p. 77. n. 134.  
Chrysomela saltatoria viridi-ænea, elytris macula politica pedibusque anticis flavis.  
Habitat in Europæ plantis.*

helxines. 58. Chr. viridi-ænea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Fn. suec. 543. Fabr. sp. inf. 1. p. 134. n. 100. mant. inf. 1. p. 77. n. 132.  
Fn. suec. 539. Mordella atro-ænea subrotunda.  
Degeer inf. 5. p. 345. n. 52. Chrysomela viridi-aurata.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 209. n. 14. Altica aurea, pedibus flavis.  
Sulz. hist. inf. t. 3. f. 12.  
Habitat in polygono fagopyro aliisque.*

exoleta. 59. Chr. ferruginea, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 136. n. 18. mant. inf. 1. p. 18. n. 143.  
Syst. nat. XII. 2. p. 594. Fn. suec. 541.\* Chrysomela saltatoria livida, elytris testaceis, abdomine capiteque fusco.  
Fn. suec. 533. Mordella flava.  
Degeer inf. 5. p. 338. n. 42.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 250. n. 16.  
Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 163. n. 63. t. 44. f. 7. l. m.  
Habitat in Europæ echii floribus, quos consumit.*

nitidula. 60. Chr. viridis nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 134. n. 99. mant. inf. 1. p. 77. n. 131.  
Syst. nat. XII. 2. p. 594. Fn. suec. 542.\* Chrysomela saltatoria, elytris caruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis.  
Degeer inf. 5. p. 346. n. 54.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 249. n. 13.  
Schaeff. ic. t. 87. f. 5.  
Habitat in Europæ salice.*

trifasciata. 61. Chr. supra albida, fasciis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 134. n. 101. mant. inf. 1. p. 77. n. 132.  
Habitat in Europæ plantis, mediæ magnitudinis.  
Capitis fascia una, elytrorum duæ.*

- nigripes. 220. Chr. viridi-ænea, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 133. n. 98. *mant. inf.* 1. p. 77. n. 130.  
*Habitat in Anglia.*
- tabida. 221. Chr. pallida oculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 136. n. 113. *mant. inf.* 1. p. 78. n. 145.  
*Habitat in Angliæ plantis.*
- brassicæ. 222. Chr. atra, elytris pallide testaceis : margine omni fasciaque media atris. *Fabr. mant.* 1. p. 78. n. 146.  
*Habitat in Germaniæ oleribus, parva.*
- nemorum. 62. Chr. elytris flavis : margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 136. n. 114. *mant. inf.* 1. p. 78. n. 147.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 595. *Fn. suec.* 543.\* *Scop. ent. carn.* 215. Chrysomela saltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis.  
*Fn. suec.* 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.  
*Degeer inf.* 5. p. 347. n. 55. Chrysomela fasciata.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 247. n. 9.  
*Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 11.  
*Habitat in pulmonaria, dentaria, cardamine, polyphaga.*
- atra. 223. Chr. atra nitida, antennarum basi plantisque piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 137. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 78. n. 148.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 247. n. 8.  
*Habitat in Hafniæ.*
- rustica. 63. Chr. atra, antennis, pedibus elytrorumque apicibus testaceis.  
*Habitat in Europa, elytris subtilissime punctatis.*
- pulicaria. 64. Chr. nigra, elytris posteritis macula ferruginea.  
*Habitat in Europa, pulicis magnitudine.*
- rufipes. 65. Chr. cærulea obovata, capite, thorace, pedibus antennisque rufis. *Fn. succ.* 545.\* *Scop. ent. carn.* 212.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 135. n. 108. *mant. inf.* 1. p. 77. n. 140.  
*Degeer inf.* 5. p. 343. n. 47. t. 10. f. 11.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 245. n. 2.  
*Schæff. ic. t.* 166. f. 5.  
β) Chrysomela africana. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 135.  
*Habitat in Europæ plantis, præsertim malva parviflora,*  
β) major in Africa æquinoctiali.

fuscipes. 224. Chr. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus  
nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 135. n. 109. mant. inf. I.*  
*p. 77. n. 141.*

*Habitat in Angliæ plantis, an varietas rufipedis?*

testacea. 225. Chr. testacea gibba, elytris lævissimis. *Fabr. sp.*  
*inf. I. p. 136. n. 110. mant. inf. I. p. 77. n. 142.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 250. n. 17.*

*Habitat in Angliæ plantis.*

fascicor- 66. Chr. cærulea obovata, capite, thorace pedibusque  
nis. rufis, antennis fuscis. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I.*  
*p. 8 n. 9. t. I. f. 10.*

*Habitat in Germania, & Java, ad rufipedem proxime  
accedens, at paulo major.*

holfatica. 67. Chr. nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 136. n. 112. mant. inf. I. p. 78. n. 144.*

*Habitat in Holfatia frequens, olera devastans.*

hemis- 68. Chr. suborbiculata depressa nigra. *Fabr. sp. inf. I. p.*  
phærica. *137. n. 116. mant. inf. I. p. 78. n. 149.*

*Degeer inf. 5. p. 348. n. 8.*

*Habitat in Saxonix corylo.*

furina- 69. Chr. flavescens, elytris margine fasciaque fanguineis.  
menfis. *Fabr. sp. inf. I. p. 137. n. 117. mant. inf. I. p. 78. n. 150.*

*Degeer inf. 5. p. 355. n. 10. t. 16. f. 17.*

*Habitat Surinami.*

S. littera. 70. Chr. pallida, elytris nigris: linea longitudinali  
flexuosa alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 137. n. 118. mant.*  
*inf. I. p. 78. n. 151.*

*Degeer inf. 5. p. 357. n. 13. t. 16. f. 21.*

*Habitat Surinami.*

æquinoc- 71. Chr. thorace rubro, elytris violaceis: maculis qua-  
tialis. tuor albis alternis. *Fabr. sp. inf. I. p. 132. n. 93.*  
*mant. inf. I. p. 77. n. 115.*

*Degeer inf. 5. p. 356. n. 11. t. 16. f. 19.*

*Habitat in America meridionali.*

*Chrysomelæ saltatoriæ plantarum cotyledonibus & tenellis foliis infestæ; an  
huc spectat chrysomelâ maulica, Molin. hist. nat. Chil. p. 183. aurata,  
antennis cæruleis, in umbellis visnagæ in provincia Chilensi Maule  
habitans, muscæ magnitudine?*

INSECTA COLEOPTERA. Chrysomela. *Altica*. 1697

- Lens. 226. Chr. tota cæruleo-nigra, elytris punctatis. *Thunberg nov. act. Ups. 4. p. 13. n. 22.*  
*Habitat* Upsaliæ glabra, lentis magnitudine.
- exclama- 227. Chr. thorace nigro, elytris nigris : maculis quatuor  
tionis. flavis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 14. n. 23.*  
*Habitat* Upsaliæ, pulice fere minor.
- flavipes. 228. Chr. chalybea, elytris obsolete granulatis, pedibus  
antennarumque articulis primis luteis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 61. n. 53.*  
*Habitat* Berolini.
- pedicula- 229. Chr. viridi-aurea, granulata subtus nigra, pedibus  
ria. antennisque fuscescentibus : articulis extremis nigris.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 61. n. 54.*  
*Habitat* Berolini, vix pediculi magnitudine.
- minima. 230. Chr. ex atro virens, elytris tenerrime punctatis,  
antennis exortum fuscis, versus finem nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 61. n. 55.*  
*Habitat* Berolini, pulice dimidio minor.
- tamaricis. 231. Chr. capite nigro, thorace flavo : discis macula ni-  
gra, elytris glaberrimis ex fuscescente nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 163. n. 64. t. 45. f. 6. g. h.*  
*Habitat* in Austria.
- imbriata. 232. Chr. oblonga, capite, thorace quadripunctato, ely-  
tris pallide testaceis linea nigra cinctis, femoribus  
rufis. *Forst. nov. inf. gen. p. 25. n. 25.*  
*Habitat* in America septentrionali, magnitudine & sta-  
tura cryptocephali capræ.
- hudson- 233. Chr. atra oblongiuscula, antennarum basi ferruginea.  
nia. *Forst. nov. inf. sp. p. 26. n. 26.*  
*Habitat* in America septentrionali, nitens, magnitudine  
cryptocephali cyanotæ.
- quadrino- 234. Chr. nigra, antennarum basi flavescente, elytrorum  
tata. maculis quatuor testaceis. *Pontoppid. Naturg-  
Daennem. p. 204. t. 16.*  
*Habitat* in Dania.



1698 INSECTA COLEOPTERA. *Chryfomela. Altica.*

- pufilla.* 235. *Chr. nigra*, antennis pedibusque pallidis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 923.*  
*Habitat in Dania.*
- luteola.* 236. *Chr. lutea*, oculis, pectore antennarumque apice nigris. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 924.*  
*Habitat in Dania.*
- flaveola.* 237. *Chr. nigra*, thorace capiteque rufo, elytris, antennis pedibusque luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 925.*  
*Habitat in Dania.*
- latiuscula.* 238. *Chr. ex nigro fusca*, tibiis tarsisque subluteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 926.*  
*Habitat in Dania.*
- cærulef-cens.* 239. *Chr. viridi-cærulea nitidissima*, thorace lævi, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus nigris. *Degeer inf. 5. p. 346. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*
- cyano-picta.* 240. *Chr. thorace punctato virefcenti-cæruleo*, elytris violaceis punctato-friatis, pedibus rufis. *Degeer inf. 5. p. 344. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*
- friata.* 241. *Chr. cærulea*, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris friatis. *Degeer inf. 5. p. 343. n. 48.*  
*Habitat in Europa.*
- ferruginea.* 242. *Chr. ferruginea*, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n. 216.*  
 β) *Chryfomela (lurida) fusco-rufa*, abdomine oculisque nigris. *Scop. ent. carn. n. 219.*
- truncata.* 243. *Chr. nigra*, elytris truncatis apice ferruginæis, pedibus antennisque rufis. *Scop. ent. carn. n. 218.*  
*Habitat in Carniola.*
- verficolor.* 244. *Chr. nigra*, elytris nigro-æneis friatis, thorace rubro. *Geoffr. inf. par. 1. p. 245. n. 3. t. 4. f. 4.* *Altica bicolor.*  
*Habitat in Gallia.*
- ovalis.* 245. *Chr. nigro-ænea*, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 246. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*

crucifera- 246. Chr. nigro-ænea oblonga, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 246. n. 6.*

*Habitat in Galliæ tetradynamis.*

ochropus. 201. Chr. nigra, pedibus rufis, elytris non striatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 246. n. 7.*

*Habitat in Gallia.*

denigrata. 248. Chr. nigra, thorace elytrisq. flavis: oris nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 248. n. 10.*

*Habitat in Gallia.*

lævigata. 247. Chr. cærulea, elytris punctis sparvis, tibiis ferrugineis. *Geoffr. inf. par. I. p. 249. n. 12.*

picipes. 266. Chr. viridi-ænea punctata, pedibus piceis, elytris spadiceis futuram versus nigris. *Mus. Lesk. p. 16. n. 324.*

*Habitat in Europa.*

concolor. 267. Chr. fusco-ænea, elytris striatis, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus fusco-æneis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 325.*

*Habitat in Europa.*

crenata. 268. Chr. nigra, elytris æneis: striis crenatis antennarum basi tibiisque piceis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 331.*

*Habitat in Europa.*

discolor. 269. Chr. capite thoraceque nigro, elytris testaceo-fuscis glabris, pedibus quatuor anterioribus tibiisque posterioribus subtestaceis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 332.*

*Habitat in Europa.*

annulata. 270. Chr. fusco-ænea, elytris striis crenatis, antennarum basi tibiisque quatuor anterioribus rufis: annulo fusco-æneo. *Mus. Lesk. p. 16. n. 333.*

*Habitat in Europa.*

CRYPTOCEPHALUS. *Antennæ filiformes.**Palpi quatuor.**Thorax, nec elytra, marginatus.**Corpus subcylindricum.*\* *palpis æqualibus filiformibus.*† *maxilla unidentata.*‡ *labio integro, cylindrici.*

*longipes.* 1. *Cr. niger obscurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 137. n. 1. mant. inf. 1. p. 78. n. 1.*

*Laichart. inf. tir. 1. p. 166. n. 1. Clytra longipes. Schaeff. ic. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Germaniæ, Calabriæ corylo, salice.*

*sexmaculatus.* 2. *Cr. niger, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 138. n. 2. mant. inf. 1. p. 78. n. 2.*

*Habitat in Italia, quadripunctato paulo major.*

*quadripunctatus.* 3. *Cr. niger, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ferratis. Fabr. sp. inf. 1. p. 138. n. 3. mant. inf. 1. p. 78. n. 3.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 596. n. 79. Fn. succ. 432. Degeer inf. 5. p. 32. t. 10. f. 7. Chrysomela quadripunctata.*

*Scop. ent. carn. 206. Buprestis quadripunctata.*

*Laichart. inf. tir. 1. p. 167. n. 2. Clytra quadripunctata.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 195. t. 3. f. 4. Melolontha coleoptris rubris, &c.*

*Schaeff. elem. t. 83. f. 1.*

*ic. t. 6. f. 1. 2. 3.*

*Habitat in Europæ corylo frequens.*

*Larva saccata: sacco ovato scabro anterieus oblique truncato.*

*quadrinotatus.* 4. *Cr. cyaneo-niger, elytris rubris: maculis duabus cyaneis: antennis brevibus. Fabr. mant. inf. 1. p. 79. n. 4.*

*Habitat in Barbaria, statura quadripunctati, at quadruplo minor.*

- atraxapha-  
xidis. 5. *Cr. niger*, thorace rubro trimaculato, elytris testaceis :  
maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 138. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 79. n. 5.  
*Pall. it.* 2. p. 725. n. 68. *Chrysomela atraphaxidis*.  
*Habitat in Sibiria atraphaxide, magnitudine quadripunc-*  
*tati.*
- lunulatus. 6. *Cr. ater nitidus*, elytris flavis : lunula, fascia punctoque  
apicis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 138. n. 5. *mant. inf.*  
1. p. 79. n. 6.  
*Habitat - - - quadripunctato paulo minor.*
- 12-macu-  
latus. 7. *Cr. niger*, thorace elytrisque rubris : punctis quatuor ni-  
gris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 79. n. 7.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, lunulati statura & magnitudine.*
- obtus. 8. *Cr. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 79. n. 8.  
*Habitat in America meridionali.*
- tridentat-  
tus. 9. *Cr. cærulescens*, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 139.  
n. 8. *mant. inf.* 1. p. 79. n. 9.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 73. *Fn. suec.* 546. *Chryso-*  
*mela tridentata.*  
*Degeer inf.* 5. p. 333. n. 36. t. 10. f. 10. *Chryso-*  
*mela cærulea nitida, &c.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 196. n. 3. *Melolontha nigro-viri-*  
*dis, &c.*  
*Schæff. ic. t.* 77. f. 5.  
*Habitat in corylo, Lonicera xylosteo, etiam in Calabria.*  
*Feminae pedes anteriores elongati.*
- lineatus. 10. *Cr. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus ni-  
gris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 79. n. 10.  
*Habitat in Brasilia.*
- venustus. 11. *Cr. griseo-fuscus*, thorace, margine maculisque duabus  
flavis, elytris flavis : vittis duabus nigris. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 79. n. 11.  
*Habitat in America, mediæ magnitudinis.*
- Gorte-  
riæ. 12. *Cr. ater glaber*, thorace elytrisque punctis quatuor  
flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 10. *mant. inf.*  
1. p. 79. n. 12.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 74. *Amæn. acad.* 6. p. 394.  
n. 16. *Chrysomela Gorteriæ*.

*Habitat in Capitis bonæ spei Gorteriis.*

octopunc- 13. *Cr. niger*, thorace rufo, elytris testaceis : punctis  
tatus. quatuor nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 79. n. 13.

*Habitat in Barbariæ plantis, statura & magnitudine cr.  
Gorteriæ.*

maxillo- 14. *Cr. capite thoraceque fulvis*, elytris flavis : puncto baseos  
fus. scutelloque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 11. *mant.  
inf.* 1. p. 80. n. 14.

*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis, ant.  
tennis ferratis.*

auritus. 15. *Cr. ater*, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 139. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 80. n. 15.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 75. *Chrysomela aurita*.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 163. n. 19. t. 44. f. 5. g. h.

*Habitat in Saxonie corylo, in Calabria.*

didymus. 16. *Cr. rufus*, elytris maculis tribus nigris, anteriore poster-  
ius didyma. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 140. n. 13. *mant. inf.*  
1. p. 80. n. 16.

*Habitat in nova Hollandia.*

quadri- 17. *Cr. rufus*, capitis basi elytrorumque maculis duabus cy-  
maculatus. neis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 140. n. 14. *mant. inf.* 1.  
p. 80. n. 17.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 77. *Fn. suec.* 547. \* *Chry-  
somela quadrimaculata.*

*Fn. suec.* 432. *Chrysomela oblonga nigra*, coleoptris ru-  
bris : maculis quatuor nigris.

*Scop. ent. carn.* 206. *Buprestis quadripunctata*.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 195. t. 3. f. 4.

*Pontopp. atl. dan.* 1. t. 29.

*Schaeff. ic.* t. 6. f. 6. 7.

*Habitat in Germania, Calabria, abdomine cinereo.*

flavicol- 18. *Cr. niger*, thorace fulvo : punctis sex nigris, elytris  
lis. pallidis : punctis duobus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 140. n.  
15. *mant. inf.* 1. p. 80. n. 18.

*Habitat in Sibiria, quadrimaculato proxime affinis.*

- longima- 19. *Cr. obscure æneus, elytris testaceis : puncto baseos*  
nus. *nigro. Fabr. sp. inf. 1. p. 140. n. 16. mant. inf. 1. p. 80. n. 19.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 95. Fn. suec. 562. Pall. it. 2. app. n. 67? Chrysomela longimana.*  
*Habitat in Europæ borealis trifolio montano, euphorbia cyparissia, tridentato affinis, sed minor, pedibus anterioribus in altero sexu longissimis.*  
*Larva faccata.*
- Lar. 20. *Cr. rufus, elytris fuscis cyaneo-nitidis, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 80. n. 20.*  
*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.*
- margina- 21. *Cr. nigro-æneus, elytris flavis : margine nigro. Fabr.*  
tus. *sp. inf. 1. p. 140. n. 17. mant. inf. 1. p. 80. n. 21.*  
*Schaller Abh. der hall. Nat. Ges. 1. p. 276. Chrysomela phalerata.*  
*Habitat in Germania, longimano affinis.*
- hirsutus. 22. *Cr. thorace elytrisquæ obscure æneis pubescentibus.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 18. mant. inf. 1. p. 80. n. 22.*  
*Habitat in America boreali.*
- bipuncta- 23. *Cr. niger nitidus, elytris rubris : punctis duobus nigris,*  
tus. *antennis longitudine corporis. Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 19. mant. inf. 1. p. 80. n. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 234. n. 1. t. 4. f. 3. Cryptocephalus niger, &c.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 597. n. 78. Fn. suec. 548. Chrysomela bipunctata.*  
*Uddm. diff. 22. Chrysomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.*  
*Petiv. gaz. t. 31. f. 4.*  
*Degeer inf. 5. p. 332. n. 35.*  
ß) *Uddm. diff. 21. Chrysomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinali.*  
*Gadd diff. 25. Cassida nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris, &c.*  
*Habitat in Europæ borealis corylo.*
- bimaculatus. 24. *Cr. niger obscurus, thorace fulvo, elytris testaceis : punctis duobus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 120.*  
*mant. inf. 1. p. 80. n. 24.*



*Schaller Abh. der hall. Nat. Ges.* 1. p. 274. *Chrysomela melanocephala*.

*Habitat in Italia & Saxonia.*

cordiger. 25. *Cr. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 141. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 80. n. 25.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 235. n. 7. *Cryptocephalus niger*.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 91. *Fn. suec.* 558. *Chrysomela cordigera*.

*Uddm. diff.* 23. *Chrysomela nigra, elytris subflavis, punctis quatuor nigris.*

*Degeer inf.* 5. p. 330. n. 33.

*Schaeff. ic. t.* 30. f. 1.

*Habitat in Europæ corylo, salice, thoracis macula media interdum cordata.*

bothnicus. 26. *Cr. ater, thorace linea longitudinali rubra.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 142. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 80. n. 26.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 90. *Fn. suec.* 557. *Chrysomela bothnica*.

*Degeer inf.* 5. p. 335. n. 39. *Chrysomela cylindrica nigra, &c.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 164. n. 21. t. 44. f. 8. n. 0.

*Habitat in Suecia, cum decempunctato copula interdum connexus.*

vitis. 27. *Cr. niger glaber, elytris rufis.* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 233. n. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 142. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 81. n. 27.

*Habitat in Europæ magis australis vite vinifera, quam nifere aliquando devastat.*

coryli. 28. *Cr. niger, thorace elytrisque testaceis immaculatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 142. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 81. n. 28.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 88. *Fn. suec.* 555.\* *Chrysomela coryli*.

*Habitat in Europæ corylo.*

pallens. 29. *Cr. niger, thorace, elytris tibiisque pallidis.* *Fabr. mant.* 1. p. 81. n. 29.

*Habitat in Sina, Cr. coryli proxime affinis.*

variegatus. 30. *Cr. niger, thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris testaceis.* *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 497. *mant. inf.* 1. p. 81. n. 31.

*Habitat in Italia, statura cr. coryli.*

- trifascia-  
tus. 31. *Cr. supra testaceus, thoracis fascia, elytris tribus atris.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 81. n. 31.*  
*Habitat in Sina, statura & magnitudine cr. coryli.*
- ruficollis. 32. *Cr. niger, thorace rufo, elytris testaceis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 25. mant. inf. 1. p. 81. n. 32.*  
*Habitat in insula S. Helenæ.*
- nigripes. 33. *Cr. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 26. mant. inf. 1. p. 81. n. 33.*  
*Habitat in America boreali.*
- sexpunc-  
tatus. 34. *Cr. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 27. mant. inf. 1. p. 81. n. 34.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 92. Fn. suec. 559.\* Chrysomela sexpunctata.*  
*Degeer inf. 5. p. 321. n. 34. t. 10. f. 9. Chrysomela rubra, &c.*  
*Scop. ent. carn. 208. Buprestis sexpunctata.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 18.*  
*Schaeff. ic. t. 90. f. 1-3.*  
*Habitat in Europæ borealis corylo, etiam in Calabria.*
- cæruleus. 35. *Cr. cyaneus nitidus, antennis fuscis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 28. mant. inf. 1. p. 81. n. 35.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, oblongus.*
- cupreus. 36. *Cr. rubro-cupreus nitidus subtus cyaneus.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 81. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, calcarati statura & magnitudine.*
- rubri-  
frons. 37. *Cr. cyaneus nitidus, fronte, thoracis fascia, femoribusque rubris.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 81. n. 37.*  
*Habitat - - - statura calcarati. Leske.*
- calcara-  
tus. 38. *Cr. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 29. mant. inf. 1. p. 82. n. 38.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*
- sapphiri-  
nus. 39. *Cr. cyaneus, thorace pedibusque rufis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 30. mant. inf. 1. p. 82. n. 39.*  
*Geoff. inf. par. 1. p. 197. n. 4. Melolontha cærulea, thorace pedibusque ferrugineis.*  
*Habitat in Gallia.*

- cinctus. 40. *Cr. capite thoraceque rufis, elytris nigris : margine rufis. Fabr. mant. inf. 1. p. 82. n. 40.*  
*Habitat in America meridionali, sapphirini statura, sed triplo minor.*
- bucephalus. 41. *Cr. cyaneus, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris. Fabr. mant. inf. 1. p. 82. n. 41.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 276. Chrysomela bucephala.*  
*Habitat in Saxonie anthyllide vulneraria.*
- collaris. 42. *Cr. cyaneus nitidus, thoracis lateribus, elytrorum apicibus femoribusque rubris. Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 31. mant. inf. 1. p. 82. n. 42.*  
*Habitat in Sibiria, sericeo major.*
- sericeus. 43. *Cr. viridi-cæruleus antennis nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 32. mant. inf. 1. p. 82. n. 43.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 233. n. 3. Cryptocephalus viridicinctus auratus sericeus.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 86. Fn. suec. 554. Chrysomela sericea.*  
*Degeer inf. 5. p. 334. n. 37.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 13.*  
*Habitat in Europæ salicibus, rarius tota ænea.*
- nitens. 44. *Cr. viridis nitens, ore pedibusque testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 144. n. 33. mant. inf. 1. p. 82. n. 44.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 84. Fn. suec. 551. Chrysomela nitens.*  
*Degeer inf. 5. p. 334. n. 38.*  
*Habitat in Europæ salice.*
- glabratus. 45. *Cr. violaceus, thorace elytrisque æneis, antennis fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 144. n. 34. mant. inf. 1. p. 82. n. 45.*  
*Habitat in Brasilia.*
- levarum. 46. *Cr. ater, elytris flavis : vitta media abbreviata atrata. Fabr. sp. inf. 1. p. 144. n. 35. mant. inf. 1. p. 82. n. 46.*  
*Habitat in Germania.*
- vittatus. 47. *Cr. niger, elytris margine striaque abbreviata flavata. Fabr. sp. inf. 1. p. 144. n. 36. mant. inf. 1. p. 82. n. 47.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 233. n. 4.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 62. n. 10. t. 23. f. 23.*  
*Habitat in Europæ magis australis gramineis.*
48. *Cr.*

- limbatus. 48. *Cr. ferrugineus*, thorace rufo, elytrorum futuris cyaneo-nitidis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 498. *mant. inf.* 1. p. 82. n. 48.  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- Moræi. 49. *Cr. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 144. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 82. n. 49. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 234. n. 5. *Cryptocephalus niger*, &c. *Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 82. *Fn. suec.* 550. *Chryso-*  
*mela Moræi.*  
*Scop. ent. carn.* 202. *Buprestis Moræi.*  
*Uddm. diff.* 28. *Cassida nigra nitida*, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem & basim elytrorum lutea.  
*Schaeff. ic. t.* 30. f. 5.  
*Habitat in Europæ hypericonibus.*
- octoguttatus. 50. *Cr. ater*, elytris maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 82. n. 50.  
*Habitat in Saxonix fraxino, magnitudine cr. Moræi.*
- 15-guttatus. 51. *Cr. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 144. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 51.  
*Habitat in Brasilia.*
- decempunctatus. 52. *Cr. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis punctis decem nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 53. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. t. 45. f. 4. a. b.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 599. n. 93. *Fn. suec.* 561. *Chryso-*  
*mela decemmaculata.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 64. n. 18. t. 43. f. 26. c. *Cryptocephalus hieroglyphicus?*  
*Habitat in Europa.*
- bipustulatus. 53. *Cr. ater*, elytris macula apicis rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 53.  
*Loichart. inf. tir.* 1. p. 197. n. 7. *Cryptocephalus Podæ.*  
*Schaeff. ic. t.* 77. f. 7.  
*Habitat in Europæ chrysanthemo coronario.*
- bifasciatus. 54. *Cr. rufus*: thorace maculis duabus, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 54.  
*Habitat in Africa æquinoctiali.*

- quadri- 55. *Cr. niger*, elytris lævibus rufo bimaculatis. *Fabr. sp.*  
 pustulatus. *inf. 1. p. 145. n. 43. mant. inf. 1. p. 83. n. 55.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 597. n. 80. Fn. succ. 549.\* Chry-*  
*somela quadripustulata.*  
*Habitat in Sueciæ nemoribus.*
- notatus. 56. *Cr. niger*, elytris punctato-striatis : fascia punctoque  
 apicis testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 83. n. 56.*  
*Habitat in America, parva, immaculata.*
- Histrio. 57. *Cr. niger*, thorace elytrisque ferrugineo-variegatis,  
 pedibus ferrugineis : geniculis nigris. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 145. n. 43. mant. inf. 1. p. 83. n. 57.*  
*Habitat in Italia, magnitudine cr. Scopoli.*
- Scopoli. 58. *Cr. niger*, thorace rufo, elytris rufis : fasciis duabus  
 cyaneis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 145. n.*  
*44. mant. inf. 1. p. 83. n. 58.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 597. n. 81. Chrysomela Scopolina.*  
*Habitat in Europa australi & America, mediæ magni-*  
*tudinis.*
- Koenigii. 59. *Cr. rufus*, elytris punctis duobus cærulescentibus. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 146. n. 45. mant. inf. 1. p. 83. n. 59.*  
*Habitat Tranquebariæ, ad cr. Scopoli proxime accedens.*
- Paracen- 60. *Cr. elytris flavis : lineola punctisque tribus nigris. Fabr.*  
 thesis. *sp. inf. 1. p. 146. n. 46. mant. inf. 1. p. 83. n. 60.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 1066. n. 1. Chrysomela Paracen-*  
*thesis.*  
*Habitat in Europæ salice, betula, supra flavus, thorace*  
*nigro variegato.*
- hordei. 61. *Cr. æneus nitidus*, fronte cuprea. *Fabr. mant. inf. 1.*  
*p. 83. n. 61.*  
*Habitat in Barbariæ hordeo marino, parvus, antennis*  
*ferratis.*
- pini. 62. *Cr. testaceus*, elytris pallidis, antennis fuscis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 146. n. 47. mant. inf. 1. p. 84. n. 62.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 89. Fn. succ. 556.\* Chryso-*  
*mela pini.*  
*Habitat in Sueciæ pino.*
- reticula- 63. *Cr. thorace elytrisque albis, testaceo reticulatis. Fabr.*  
 tus. *mant. inf. 1. p. 84. n. 63.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*

- pufillus. 64. Cr. thorace fulvo, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 146. n. 48. *mant. inf.* I. p. 84. n. 64.  
*Habitat* Haniburgi.
- nitidulus. 65. Cr. thorace aeneo nitido, elytris cyaneis, capite, antennarum basi pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 84. n. 65.  
*Habitat in* Russia meridionali, *labiato major.*
- labiatus. 66. Cr. ater nitidus, ore, pedibus basique antennarum lutescentibus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 146. n. 49. *mant. inf.* I. p. 84. n. 65.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 87. *Fn. succ.* 553.\* *Chrysomela labiata.*  
*Habitat in* Europæ rosis.
- flavilabris. 67. Cr. obscure æneus nitidus, ore lutescente, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* I. p. 84. n. 67.  
*Müll. prodr.* 7001. *dan.* n. 519.  
*Geoffr. inf. par.* I. n. 8.  
*Habitat in* Saxonix betula, *labiato affinis, at elytra striato-punctata.*  
*Larva succata.*
- flavipes. 68. Cr. ater nitidus, capite pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 146. n. 50. *mant. inf.* I. p. 84. n. 68.  
*Habitat in* Italia, *labiato affinis, at quadruplo major.*
- cyaneus. 69. Cr. ex fusco cyaneus, thorace lævi marginato, antennis nigris.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 72. *Chrysomela cyanea.*  
*Habitat in* America, *magnitudine chrysomelæ graminis.*
- bilineatus. 70. Cr. niger, elytris lineis duabus flavescens, pedibus ferrugineis.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 83. *Chrysomela bilineata.*  
*Habitat in* Europa, *minutus.*
- barbareæ. 71. Cr. antennis basi oreque ferrugineis.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 85. *Fn. succ.* 552.\* *Chrysomela barbareæ.*  
*Habitat in* Erylimi barbareæ floribus; *an varietas labiati?*
- glaucoccephalus. 72. Cr. niger nitidus, capite pedibusque flavis, thorace elytrisque anterieus albo-marginatis.  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* I. p. 277. *Chrysomela glaucoccephala.*



1710 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus*.

*Habitat Halæ, rarior in betula, statura & magnitudine.*  
*cr. Moræi.*

- biguttatus. 73. *Cr. niger, capite, apicibus elytrorum pedibusque flavis.*  
*Schranck enum. inf. austr. n. 169?*  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 278. Chry-*  
*somela biguttata.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 163. n. 20. t. 44. f.*  
*6. i. k?*

*Habitat rarior Halæ Saxonum, magnitudine chryso-*  
*melæ nemorum.*

- Martinius. 75. *Cr. cæruleus nitidus, elytris rubris.*  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 278. Chry-*  
*somela Martinia.*  
*Habitat in Malabar, statura & magnitudine ad quadri-*  
*punctatum accedens.*

- cassimilis. 75. *Cr. ex cæruleo niger, capitis maculis duabus, pedibus*  
*anterioribus antennisque flavis.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 63. n. 13.*  
*Habitat Berolini, labiato similis, sed major.*

- ornatus. 76. *Cr. niger, capitis macula biloba fulva, thoracis linea*  
*& margine flavis.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 63. n. 15. t. 23. f. 24.*  
*Habitat - - - labiato similis, at major.*

- peregrinus. 77. *Cr. niger glaberrimus, capite, thorace elytrisque*  
*cæruleis.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 63. n. 16. t. 23. f. 25.*  
*Habitat in India, 5 lineas longus.*

- laticlavus. 78. *Cr. niger, capite, thorace elytrisque rufis, futura &*  
*margine elytrorum nigris, antennis ferratis.*  
*Forst. nov. inf. spec. p. 27. n. 27. Chrysomela laticlavata.*  
*Habitat in America septentrionali, sericei magnitudine.*

- viridans. 79. *Cr. viridis, elytris marginatis.*  
*Lepech. it. 1. p. 312. t. 20. f. 6. Chrysomela obscure*  
*viridis.*  
*Habitat in Russia australi.*

- octonotus. 80. *Cr. thorace elytrisque flavis: singulis punctis quatuor*  
*nigris.*  
*Lepech. it. 2. p. 207. t. 11. f. 19. Chrysomela octo-*  
*punctata.*  
*Habitat in Russia australi.*

- sexta-* 81. *Cr. niger*, thoracis margine rufo, elytrorum punctis  
*rus.* duobus maculisque quatuor nigris.  
*Lepech. it. 2. p. 207. t. 10. f. 14.* *Chrysomela sexpunctata.*  
*Habitat in Russia australi.*
- Mülleri.* 82. *Cr. niger villosus*, elytris punctis duobus rubris.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 58. n. 511.* *Chrysomela bima-*  
*culata.*  
*Habitat in Dania.*
- musci-* 83. *Cr. viridi-cæruleus*, thorace rubro : macula cærulea,  
*mis.* tibiis ferrugineis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 197. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*
- Vibex.* 84. *Cr. niger*, elytris rubris striatis : maculis quatuor limbo-  
que nigris.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 234. n. 6. t. 4. f. 3.*  
*Habitat in Gallia.*
- livens.* 85. *Cr. ex cæruleo violaceus punctato-striatus*; antennarum  
basi maculaque oris pallida.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 58. n. 519.* *Cryptocephalus*  
*parvulus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 235. n. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- puncta-* 86. *Cr. cæruleus* sparsim punctatus, tibiis anterioribus fer-  
*rus.* rugineis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- parifinus.* 87. *Cr. niger* striatus, pedibus rufis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- rufipes.* 88. *Cr. niger* striatus, thorace pedibusque rufis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- fulvus.* 89. *Cr. capite* thoraceque fulvo, elytris pallidis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 237. n. 12.*  
*Habitat in Gallia.*
- ferrugi-* 90. *Cr. niger nitidus*, antennis corpore duplo longioribus,  
*nosus.* elytris apice macula lutea.

*Schranck Beytr. 2. Naturg. p. 64. §. 7. Chrysomela ferrugata.*  
*Pod. mus. Græc. p. 38. sp. 9.*  
*Habitat in Germania superiore.*

multico- 246. Cr. elytris flavis : fasciis duabus coccineis.  
 lor. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 3. n. 3. t. 1. f. 6. Chry-*  
*somela bifasciata.*  
*Habitat in Java, magnitudine chrysomelæ vulgarissimæ,*  
*thorace rubro, abdominis apice nigro.*

sumatra- 247. Cr. elytris luteis : macula in medio castanea.  
 nus. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 4. n. 4. t. 1. f. 4. Chry-*  
*somela bimaculata.*  
*Habitat in Sumatra, rarior in Java, magnitudine chryso-*  
*melæ vulgarissimæ.*

coffææ. 248. Cr. thoracis fulco transverso, abdomine viridi, elytris  
 flavescens. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 5. n.*  
*5. t. 1. f. 7.*  
*Habitat in Bantam in hortis, in quibus coffea colitur, hujus*  
*orillos magnitudine, facie, colore referens.*

orientz- 249. Cr. flavus, thorace rufo : fulco transverso, elytris nigro-  
 lis. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 5. n. 6. t. 1.*  
*f. 3.*  
*Habitat in Malacca, Java, aliisque oceani indici insulis,*  
*cr. phallandrii magnitudine.*

batavien- 250. Cr. capite, thorace, elytris pedibusque lividis. *Hornst.*  
 sis. *Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 6. n. 7. t. 1. f. 12.*  
*Habitat in Java, magnitudine chr. nymphææ ; an hujus*  
*generis & tribus ?*

javanus. 251. Cr. ater, thorace elytrisque rubris nigro-maculatis,  
 antennis nigris basi rufescentibus.  
*Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 7. n. 8. t. 1. f. 2. 5.*  
*8. 11. Chrysomela cryptocephala.*  
*Habitat in Java, 4-punctati magnitudine & facie ; an idem*  
*cum 10-maculato ?*

cyanoce- 252. Cr. capite, thoracis margine, elytris femorum basi &  
 phalus. apice violaceis, vertice & thorace coccineis. *Mus. Lesk.*  
*p. 15. n. 298. b.*  
*Habitat extra Europam.*

flavifrons. 253. *Cr. ater nitidus*, fronte, ore, pedibus, antennarum  
basi elytrorumque margine lutescentibus. *Mus. Lesk.*  
*p. 15. n. 306.*

*Habitat in Europa.*

fuscatus. 254. *Cr. fuscus*, capite, thorace elytrisque violaceis: his  
profunde punctatis. *Mus. Lesk. p. 15. n. 310.*

*Habitat in Europa.*

ochroce- 255. *Cr. niger*, capite antierius, elytrisqne flavis: his  
phalus. guttis quatuor punctoque apicis nigris. *Mus. Lesk. p.*  
*15. n. 312.*

*Habitat in Europa, thorace flavo, maculis utrinque 2*  
*connatis.*

laturalis. 256. *Cr. ater glaber*, elytris flavis: futura vittaque atra  
apice connata. *Mus. Lesk. p. 16. n. 314.*

*Habitat in Europa.*

chryso- 257. *Cr. ater glaber*, elytris punctato-striatis, capite,  
pus. elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 16.*  
*n. 315.*

*Habitat in Europa.*

† labio bifido; oblongi, *Cistela.*

Gigas. 91. *Cr. villosus fuscus*, elytris, abdomine femoribusque  
testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 84. n. 1.*

*Habitat in Gallia magis australi, prægrandis.*

cervinus. 92. *Cr. lividus*, pedibus fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 146. n.*  
*1. mant. inf. 1. p. 85. n. 2.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 115. Fn. suec. 575. Chry-*  
*somela cervina.*

*Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria.*

cinereus. 93. *Cr. lividus*, elytris pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 146. n. 2. mant. inf. 1. p. 85. n. 3.*

*Habitat in Italia, cervino proxime affinis, an varietas?*

lividus. 94. *Cr. lividus*, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 146.*  
*n. 3. mant. inf. 1. p. 85. n. 4.*

*Habitat in terra del fuego, cinereo affinis, at duplo minor.*

ceramboi- 95. *Cr. ater*, thorace antierius angustato, elytris striatis  
des. testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 4. mant. inf. 1. p.*  
*85. n. 5.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 17. Fn. suec. 576.*  
*Chrysomela ceramboides.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 354. n. 3. Mordella nigra, &c.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 64. n. 1. t. 23. f. 27.*  
*Habitat in Europa boreali, & Calabria, thorace rarius*  
*testaceo.*

rufitarsis. 96. *Cr. ater, thorace quadrato, elytris striatis testaceis.*  
*Habitat in Europæ magis australis spicis secalinis, ce-*  
*raniboidi affinis.*

testaceus. 97. *Cr. niger, thorace, elytris & abdomine testaceis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 147. n. 5. mant. inf. 1. p. 85. n. 7.*  
*Habitat in chrysanthemo, sambuco, aliisque Barbariæ*  
*plantis, polyphaga.*

fulphu- 98. *Cr. flavus, elytris sulphureis. Fabr. sp. inf. 1. p. 147.*  
 reus, *n. 6. mant. inf. 1. p. 85. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 114. Chrysomela sulphurea.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 11. Tenebrio luteus.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 64. n. 2. t. 23. f. 28.*  
*Habitat in Europæ umbellatarum floribus.*

rubricollis. 99. *Cr. ater, thorace ferrugineo, elytris striatis. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 147. n. 7. mant. inf. 1. p. 85. n. 9.*  
*Habitat in Europæ santolina, statura & magnitudine*  
*sulphureæ.*

cærulef- 100. *Cr. ater, elytris striatis cærulescentibus. Fabr. mant.*  
 cens. *inf. 1. p. 85. n. 10.*  
*Habitat in Barbariæ plantis, rubricollis statura & magni-*  
*tudine.*

analis. 101. *Cr. rufescens, antennis, macula elytrorum anoque*  
*nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 8. mant. inf. 1. p.*  
*85. n. 11.*  
*Habitat Tranquebariæ, macula elytrorum interdum*  
*duplici.*

varians. 102. *Cr. testaceus, oculis nigris, elytris substriatis. Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 85. n. 12.*  
*Habitat Halæ Saxonum, murinæ proximè affinis, at*  
*paulo major, antennis pedibusque interdum testaceis.*

murinus. 103. *Cr. niger, elytris pedibusque testaceis. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 147. n. 9. mant. inf. 1. p. 85. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 118. Fn. suec. 577. Chry-*  
*somela murina.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Cistela.* 1715

*Geoff. inf. par. 1. p. 355. n. 4. Mordella nigra, &c.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 64. n. 3. t. 23. f. 29.*  
*Habitat in Europa boreali.*

- humeralis. 104. *Cr. niger, elytris puncto baseos ferrugineo. Fabr. mant. inf. 1. p. 85. n. 141.*  
*Habitat Halæ Saxonum, parvus.*
- Morio. 105. *Cr. niger obscurus, pedibus testaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 86. n. 15.*  
*Habitat in Suecia, parvus, oblongus, angustus, villosus.*
- angustatus. 106. *Cr. thorace elytrisq. obscure rufis medio nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 10. mant. inf. 1. p. 86. n. 16.*  
*Habitat in Anglia, murini statura, sed angustior.*
- pallidus. 107. *Cr. pallidus, capite elytrorumque apicibus fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 11. mant. inf. 1. p. 86. n. 17.*  
*Habitat in Anglia.*
- ferrugineus. 108. *Cr. flavus, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 12. mant. inf. 1. p. 86. n. 18.*  
*Habitat in Africæ plantis.*
- festivus. 109. *Cr. ferrugineus, elytris cyaneo-viridibus: margine ferrugineo. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 13. mant. inf. 1. p. 86. n. 19.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parvus.*
- fulvus. 110. *Cr. ater, thorace rufo, elytris cyaneis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 14. mant. inf. 1. p. 86. n. 20.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- innubus. 111. *Cr. niger, thorace rufo, elytris nigris: margine vitæ luteis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 15. mant. inf. 1. p. 86. n. 21.*  
*Habitat in America.*
- americana-nus. 112. *Cr. thorace flavo, elytris pallidis: vitta media nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 16. mant. inf. 1. p. 86. n. 22.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- quinque-vittatus. 113. *Cr. testaceus, elytrorumque marginibus vitæ media nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 17. mant. inf. 1. p. 86. n. 23.*  
*Habitat in America boreali.*



1716 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Cissela.*

- hirtus.* 114. *Cr. hirtus*, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 149. n. 18. mant. inf. I. p. 86. n. 24.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, ad lagrias accedens.*
- fexlineatus.* 115. *Cr. ferrugineus*, elytris flavis : lineolis tribus nigris.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 149. n. 19. mant. inf. I. p. 86. n. 25.*  
*Habitat - - -*
- minutus* 116. *Cr. niger*, elytris pubescentibus pedibusque griseis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 149. n. 20. mant. inf. I. p. 86. n. 26.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 593. n. 50. Fn. suec. 533.\* Chrysomela minuta.*  
*Habitat in Europæ plantis aquaticis, dytici facie.*
- lepturoides.* 117. *Cr. obscure æneus*, antennis plantisque ferrugineis.  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 30. n. 30.*  
*Habitat in Novæboraco, leptura melanura major.*
- alpinus.* 118. *Cr. niger nitens*, elytris castaneis rugosis : futura nigra.  
*v. Moll. naturh. Br. üb. Oestr. &c. vol. I. p. 49.*  
*Habitat in alpibus Salzburgicis.*
- Luperus.* 119. *Cr. niger*, elytris virenti nitentibus, pedibus antennarumque longarum articulo primo fulvis, ultimo palporum prægrandi cordato. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 65. n. 4. t. 23. f. 30.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 15.*  
*Schæff. elem. t. 80.*  
*Habitat in Germania, an hujus tribus?*
- betulæ.* 120. *Cr. niger*, thorace suborbiculato piloso, elytris fuscentibus obsolete striatis. *Herbst. apud Fuesli arch. inf. 4. p. 65. n. 5. t. 23. f. 31.*  
*Habitat Berolini, 5 fere lineas longus.*
- repennis.* 121. *Cr. niger*, thorace antèrius angustato, postèrius dilatato, elytris lævibus pedibusque fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 65. n. 6. t. 23. f. 32.*  
*Habitat rarior in Marchia, 2 circiter lineas longus.*
- strigosus.* 122. *Cr. rubescens*, abdomine nigro, fronte duobus thorace tribus, elytrisquè quatuor fasciis nigris.  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 16.*  
*Habitat - - - an hujus tribus?*

Forsteri. 240. Cr. subvillosus fuscus, fasciis longitudinalibus nigricantibus interruptis.

*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 12. n. 12. Cistela fasciata.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 116. t. 1. f. 8.*

*Schaeff. ic. t. 95. f. 3.*

*Habitat in Europæ arena, obovatus, chrysomelæ politæ magnitudine.*

pustulatus. 241. Cr. niger ovatus, macula elytrorum rufa undata. *Geoffr. inf. par. 1. p. 116. n. 2.*

*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 13. n. 13.*

*Habitat in Europæ arena, magnitudine chrysomelæ fastuosæ.*

denigratus. 242. Cr. totus niger nitens glaber.

*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 14. n. 14. Cistela nigra.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 117. n. 3.*

*Habitat in Europæ arena, pustulato minor.*

quadrifasciatus. 243. Cr. obovatus niger, elytris striatis.

*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 15. n. 15. Cistela striata.*

*Habitat in Angliæ arena, statura & magnitudine cr. Forsteri.*

holosericeus. 244. Cr. ovatus, fusco-viridis, elytrorum fasciis longitudinalibus interruptis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 16. n. 16.*

*Habitat in Europæ arena, magnitudine denigrati.*

capucinus. 258. Cr. ferrugineus, capite, thorace elytrisque fuscis: his crenato-striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 335.*

*Habitat in Europa.*

confusus. 259. Cr. supra polline luteo, subtus argenteo confusus, antennis fuscis, pedibus fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 337.*

*Habitat in Europa, curculionis facie.*

fulphureus. 260. Cr. fuscus, antennis elytris pedibusque sulphureis, plantis fuscis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 338.*

*Habitat in Europa, statura sulphurei, an varietas?*

truncatus. 261. Cr. fuscus, elytris lævibus, antennis pedibusque flavo-rufescentibus, thorace posterius truncato. *Mus. Lesk. p. 17. n. 339.*

*Habitat in Europa.*

1718 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.*

*brunneus.* 262. *Cr. brunneus*, abdomine fusco, elytris lævibus. *Musl. Lesk. p. 17. n. 340.*  
*Habitat in Europa.*

*rufitarsis.* 268. *Cr. oblongus*, corpore, capite, antennis pedibusque nigro-æneis pilosis, elytris testaceis punctatis, tarsis rufis. *Lesk. it. p. 15. t. A. f. 4.*  
*Habitat in Lusatiæ monte Keulenberg.*

†† *maxilla bifida, oblongi, Criocerides.*

*trilobus.* 123. *Cr. capite thoraceque flavescens* nigro-maculatis, elytris griseis, corpore nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 149. n. 1. mant. inf. 1. p. 86. n. 1.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus niger.*

*Lineola.* 124. *Cr. griseus*, thorace linea dorsali, elytris puncto basaeo nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 149. n. 2. mant. inf. 1. p. 86. n. 2.*  
*Habitat in Italia, statura cr. nymphaæ.*

*nymphaæ.* 125. *Cr. fuscus*, elytrorum margine prominulo flavescente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 3. mant. inf. 1. p. 86. n. 3. Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 99. Fn. suec. 565. Chrysomela nymphaæ.*  
*Degeer inf. 5. p. 326. n. 31. t. 20. f. 1. 2. Chrysomela ovata nigro-fusca.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 254. n. 4. Galleruca pallida, &c.*  
*Habitat in Europæ nymphaïs, tardus.*

*capreæ.* 126. *Cr. thorace nigro-maculato elytrisque griseis*, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 4. mant. inf. 1. p. 86. n. 4. Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 100. Fn. suec. 516. Chrysomela capreæ.*  
*Degeer inf. 5. p. 325. n. 30. Chrysomela grisea alni.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 254. n. 5. Galleruca nigra, &c.*  
*Fn. suec. 1. n. 424. Chrysomela nigra, thorace elytrisque griseis.*  
*Habitat in Europæ salicibus.*

*atratus.* 127. *Cr. pallidus*, elytrorum omni margine atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 5. mant. inf. 1. p. 86. n. 5.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

*palliat- tus.* 128. *Cr. luteus*, elytris nigris. *Fabr. man. inf. 1. p. 87. n. 6. Schall. Abh. hall. Nat. Ges. 1. p. 279. Chrysomela oblonga lutea, oculis elytrisque nigris.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

INSECTA COLEOPTERA. Cryptotephalus. *Crioceris*. 1719

- calma-  
rienfis. 129. *Cr. ovatus cinereus*, elytris vitta lineolaque baseos nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 150. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 7.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 600. n. 101. *Chrysomela calmarienfis*.  
*Geoff. inf. par.* 1. p. 253. n. 3. *Galleruca pallida*, &c.  
*Habitat in Europæ salice, alno.*
- abdomi-  
nalis. 130. *Cr. flavus*, antennis abdomineque fuscis, ano flavo.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 151. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 8.  
*Habitat in India, & ad Caput bonæ spei.*
- capensis. 131. *Cr. niger*, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 151.  
n. 8. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 9.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, minor, opacus.*
- sangui-  
neus. 132. *Cr. ovatus rufus*, antennis oculisque nigris. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 151. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 10.  
*Habitat Halæ Saxonum, pedibus ut plurimum cinereis.*
- tenellus. 133. *Cr. ferrugineus*, thorace elytrorumque margine flavis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 151. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 11.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 600. n. 102. *Fn. suec.* 564. *Chrysomela tenella*.  
*Habitat in Europæ salice.*
- pictus. 134. *Cr. fuscus*, capite thoraceque flavis nigro-maculatis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 87. n. 12.  
*Habitat in India, tenelli statura.*
- halensis. 135. *Cr. flavescens*, capitis basi elytrisque æneis, antennis  
nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 151. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 87.  
n. 13.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 589. n. 20. *Chrysomela halensis*.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 104. n. 15. t. 45. f. 5.  
*Habitat in Germania, chrysomela polygoni major.*
- bituber-  
culatus. 136. *Cr. fulvus*, elytris pallidis : margine omni fulvo. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 151. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 14.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura melanocephali.*
- bident-  
tus. 137. *Cr. flavus*, elytris nigris apice flavescens. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 151. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 15.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura bituberculati.*
- melano-  
cephalus. 138. *Cr. rufus*, capite nigro, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 152. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 87. n. 16.  
*Habitat in nova Hollandia.*

1720 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.*

- cantha- 139. *Cr. violaceus*, capite, thorace pedibusque rufis. *Fabr.*  
roides. *sp. inf. 1. p. 152. n. 15. mant. inf. 1. p. 87. n. 17.*  
*Habitat in Anglia, statura cr. nymphææ.*
- melano- 140. *Cr. pallidus*, elytrorum maculis duabus abdomineque  
gaster. atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 16. mant. inf. 1. p. 87. n. 18.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 66. n. 6. t. 23. f. 33.*  
*Crioceris quadrimaculata.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in Germania.*
- pygmæus. 141. *Cr. rufus*, capite abdomineque atris. *Fabr. mant. inf.*  
*1. p. 87. n. 19.*  
*Habitat in Cayenna, minutus.*
- indicus. 142. *Cr. niger*, capite, thorace, elytris pedibusque testaceis  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 87. n. 20.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*
- exilis. 143. *Cr. niger*, thorace elytrisque pallidis immaculatis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 152. n. 17. mant. inf. 1. p. 88. n. 20.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- erythro- 144. *Cr. niger*, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridi-  
cephalus. bus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 17. mant. inf. 1. p. 88. n. 22.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura exilis.*
- siamensis. 145. *Cr. niger*, elytris maculis duabus testaceis, thorace  
cylindrico. *Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 23.*  
*Habitat in Siam, statura merdigeri, at duplo major.*
- impressus. 146. *Cr. ater* elytris rubris, thorace cylindrico utrinque sub-  
impresso. *Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 24.*  
*Habitat in Siam, statura merdigeri, at paulo major.*
- merdiger. 147. *Cr. supra ruber*, thorace cylindrico utrinque impresso.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 19. mant. inf. 1. p. 88. n. 25.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 97. Fn. suec. 563. Chryso-*  
*mela merdigera.*  
*Degeer inf. 5. p. 338. n. 43. Chrysomela rubra liliorum.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 239. n. 1. Crioceris rubra.*  
*Scop. ent. carn. 112. Attelabus lilii.*  
*Blank. inf. 91. t. 11. f. 1.*  
*Valisn. nat. 1. p. 265. t. 32.*  
*Merian. inf. eur. 3. t. 21.*  
*Reaum. inf. 3. t. 17. f. 12.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 14.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.* 1721

*Schaeff. elem. t. 52. f. 1.*

*icon. t. 4. f. 4.*

*Habitat in convallaria majali, liliis, etiam Calabriae.*

12-punctatus. 148. *Cr. ruber, thorace cylindrico, elytris punctis sex nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 153. n. 20. mant. inf. I. p. 88. n. 26. Syst. nat. XII. 2. p. 601. n. 110. Fn. suec. 568. Chrysomela 12-punctata.*

*Scop. ent. carn. 114. Attelabus 12-punctatus.*

*Geoff. inf. par. I. p. 241. n. 2. t. 4. f. 5. Crioceris rubra, punctis 13 nigris.*

*Frisch inf. 13. t. 28.*

*Schaeff. ic. t. 4. f. 5.*

*Habitat in asparago, frequens.*

14-punctatus. 149. *Cr. thorace cylindrico fusco: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis septem. Fabr. sp. inf. I. p. 153. n. 21. mant. inf. I. p. 88. n. 27.*

*Scop. ent. carn. 116. Attelabus 14-punctatus.*

*Habitat in Germania magis australi.*

cayennensis. 150. *Cr. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: fasciis duabus nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 88. n. 28.*

*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*

fucatus. 245. *Cr. cyaneus, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*

*Habitat in insula S. Bartholomæi.*

quinque-notatus. 151. *Cr. niger, thorace rufo, coleoptris flavescens: maculis quinque nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 88. n. 29.*

*Habitat in Germania superiori, statura cayennensis.*

ebraeus. 152. *Cr. flavescens, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 89. n. 30.*

*Habitat in Cayenna, pedibus albis.*

australis. 153. *Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fasciis duabus albis. Fabr. sp. inf. I. p. 153. n. 22. mant. inf. I. p. 89. n. 31.*

*Habitat in nova Hollandia.*

unifasciatus. 154. *Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fascia atra. Fabr. sp. inf. I. 153. n. 23. mant. inf. I. p. 89. n. 32.*

*Habitat in nova Hollandia, an varietas australis?*



1722 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.*

novæ 155. *Cr. flavus*, thorace cylindrico, antennis, pectore pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 155. n. 25. mant. inf. I. p. 89. n. 33.*

*Habitat in nova Hollandia.*

griseus 156. *Cr. pallidus*, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 154. n. 24. mant. inf. I. p. 89. n. 34.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*

oculatus. 157. *Cr. flavus*, thorace cylindrico, elytris basi nigris: puncto flavo. *Fabr. sp. inf. I. p. 154. n. 26. mant. inf. I. p. 89. n. 35.*

*Habitat in nova Hollandia.*

bioculatus. 158. *Cr. testaceus*, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 154. n. 27. mant. inf. I. p. 89. n. 36.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura oculati.*

nigricornis. 159. *Cr. pallidus*, thorace subcylindrico, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 154. n. 28. mant. inf. I. p. 89. n. 37.*

*Habitat - - - oculato paulo minor.*

nitidus. 160. *Cr. viridi-æneus nitidus*, elytris testaceis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 154. n. 29. mant. inf. I. p. 89. n. 38.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

Cyanella. 161. *Cr. cæruleus*, thorace cylindrico: lateribus gibbis

*Fabr. inf. I. p. 154. n. 30. mant. inf. I. p. 89. n. 39.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 104. Fn. suec. 572. Chrysomela cyanella.*

*Degeer inf. 5. p. 340. n. 44. Chrysomela cæruleo-violacea.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 243. n. 5. Crioceris tota cæruleo-viridis.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 67. n. 10. t. 23. f. 34.*

*Habitat in Europæ plantis.*

melanopus. 162. *Cr. cæruleus*, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 155. n. 31. mant. inf. I. p. 89. n. 40.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 601. n. 105. Fn. suec. 573. Chrysomela melanopa.*

*Degeer inf. 5. p. 342. n. 46.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 19.*

*Habitat in Europa, in Calabriæ quercu.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.* 1723

*ochropus.* 163. *Cr. niger*, thorace pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 89. n. 41.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 106. *Chrysomela flavipes.*  
*Habitat in Germania, frequens, melanopodi affinis.*

*subspinosus.* 164. *Cr. niger*, capite, thorace subspinoso, pedibusque rufis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 89. n. 42.  
*Habitat in Anglia, statura ochropodis.*

*saxonicus.* 165. *Cr. ater nitidus*, antennarum basi pedibusque rufis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 89. n. 43.  
*Habitat in Saxoniae fruticibus, melanopode paulo major.*

*cyanoccephalus.* 166. *Cr. cyaneus*, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 44.  
*Habitat in nova Hollandia.*

*asparagi.* 167. *Cr. thorace rubro*: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 45.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 112. *Fn. succ.* 567. *Chrysomela asparagi.*

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 241. n. 3. *Crioceris thorace rubro, &c.*

*Scop. ent. carn.* 113. *Attelabus asparagi.*

*Frisch inf.* 1. p. 27. t. 6.

*Roes. inf.* 2. scar. 3. t. 4.

*Schaeff. ic.* t. 52. f. 9. 10.

β) *Cr. elytrorum maculis duabus basi connatis.*

γ) *Cr. elytrorum fasciis duabus angustis rubris.*

*Habitat in Europa, asparagos depascens, β) in Italia, γ) in Gallia.*

*phellandrii.* 168. *Cr. niger*, thoracis margine, elytrorumque lineis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 156. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 46.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 14. *Fn. succ.* 569. *Chrysomela phellandrii.*

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 266. n. 20. *Chrysomela oblonga nigra.*

*Degeer inf.* 5. p. 324. n. 28. t. 9. f. 34. *Chrysomela oblonga nigro-ænea.*

*Habitat ad phellandrii aquatici radices.*

*campestris.* 169. *Cr. nigro-cærulescens*, thoracis limbo nigro, elytris punctis tribus posterius margine flavo connexis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 90. n. 47.

1724 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris?*

*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 113. Chrysomela campestris.*

*Valisn. op. 1. t. 7. Cancarella asparagi.*

*Habitat in Europa magis australi, statura & magnitudine cr. asparagi.*

longus. 170. *Cr. elongatus niger, elytris vitta flava. Fabr. sp. inf. 1. p. 156. n. 37. mant. inf. 1. p. 90. n. 48.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, magis elongatus, quam reliqui hujus tribus.*

trilineatus. 171. *Cr. pallidus, thorace maculis tribus, elytris striis abbreviatis tribus nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 90. n. 49.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

equestris. 172. *Cr. capite thoraceque testaceis, elytris brunneis: margine, lineola bascos fasciæque media flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 90. n. 50.*

*Habitat in Cayenna, parvus.*

flolatus. 173. *Cr. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 156. n. 38. mant. inf. 1. p. 90. n. 51.*

*Habitat in Carolina, pedibus flavescentibus: geniculis nigris.*

cratægi. 174. *Cr. ruber, elytrorum linea longitudinali punctoque nigris. Forst. nov. inf. sp. cent. 1. p. 28. n. 28.*

*Habitat in Angliæ cratægo oxyacantha, subtus niger, statura & magnitudine cr. nymphææ.*

trifuscat. 175. *Cr. niger, thorace elytrisque pallidis, elytris margine & futura, furca tridente, punctisque octo nigris. Forst. nov. inf. sp. cent. 1. p. 29. n. 29.*

*Habitat in America septentrionali, magnitudine & habitu ochropodis.*

parvus. 176. *Cr. fuscus, capite bimaculato, antennarum basi fulva. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 66. n. 4.*

*Habitat Berolini, cupreo dimidio minor.*

pallens. 177. *Cr. pallidus, capite nigro, antennis flavescentibus. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 66. n. 5.*

*Habitat Berolini, cr. nymphææ paulo major.*

erythropus. 178. *Cr. totus ruber, femoribus solis ad finem nigris. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 67. n. 8.*

*Habitat Berolini, meridigero proxime affinis.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus*. *Crioceris*. 1725

- beroli-  
nenfis. 179. *Cr. capite & thorace coccineis glaberrimis, elytris granulatis oculisque nigris, pedibus fulvis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 67. n. 12.*  
*Habitat Berolini, melanopode duplo minor.*
- ochra-  
ceus. 180. *Cr. ochraceus, thoracis punctio & abdomine nigris, ano fulvo. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 165. n. 16. t. 44. f. 9. p. 9.*  
*Habitat in India, 3 lineas longus.*
- fulvipes. 181. *Cr. ater nitens, antennarum basi pedibusque supra fulvis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 165. n. 17.*  
*Habitat in Austria, 2 lineas longus.*
- tristis. 182. *Cr. niger, elytris caeruleis punctato-striatis, pedibus fulvis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 165. n. 18.*  
*Habitat in Austria, cyanellæ similis, sed minor, sesquilineam longus.*
- nigricans. 183. *Cr. niger, thorace pedibusque rubris. Geoffr. inf. par. I. p. 231. n. 1. t. 4. f. 2. Luperus niger.*  
*Habitat in Gallia.*
- erythro-  
melas. 184. *Cr. niger, pedibus rufis. Geoffr. inf. par. I. p. 231. n. 2. Luperus rufipes.*  
*Habitat in Gallia.*
- æru-  
ginosus. 185. *Cr. pallidus, capite & pectore nigris, elytris viridibus politis. Müll. zool. dan. prodr. p. 84. n. 913. Luperus æruginosus.*  
*Habitat in Dania.*
- aquati-  
cus. 186. *Cr. niger, thorace maculato, elytrorum margine suturaque lata, pedibus flavis. Müll. zool. dan. prodr. p. 83. n. 908.*  
*Habitat in Daniæ aquis; an hujus tribus?*
- veris. 187. *Cr. niger, thorace cupreo, elytris viridibus, pedibus rufis. Müll. zool. dan. prodr. p. 83. n. 910. Galleruca veris.*  
*Habitat in Dania, vere conspicuus.*
- striatus. 188. *Cr. ater, capite supra, elytris & abdomine apice albidis. Müll. zool. dan. prodr. p. 85. n. 940. Crioceris striata. Geoffr. inf. par. I. p. 307. n. 3. t. 5. f. 2. Anthribus, &c. Schaeff. ic. t. 89. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*

1726 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.*

ruficus. 189. *Cr. viridis*, elytris flavis, pedibus anterioribus longioribus.

*Lepech. it. 1. p. 312. t. 16. f. 10. Chrysomela longipes.*  
*Habitat in Russia australi.*

lusitani- 190. *Cr. testaceus*, capite, pectore pedibusque nigris.  
cus. *Syst. nat. XII. 2. p. 1066. n. 2. Chrysomela lusitanica.*  
*Habitat in Lusitania, habitu tridentati.*

tricolor. 263. *Cr. nigra*, thorace cylindrico ad latera gibbo, capite elytrorum futura marginibusque ferrugineis, elytris testaceis, pedibus antennis palpisque flavo-rufescentibus.  
*Mus. Lesk. p. 17. n. 354.*  
*Habitat in Europa.*

mela- 264. *Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo luteo-rufescente,*  
nophthal- capite rufo posterius nigro, elytris polline rufo, abdomine argenteo conspersis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 355.*  
mus. *Habitat in Europa.*

gibbus. 265. *Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo, capite, thorace pedibusque flavo-rufescentibus, elytris nigris profunde punctatis.* *Mus. Lesk. p. 17. n. 356.*  
*Habitat in Europa.*

fuligino- 266. *Cr. niger*, thorace pedibusque rufis, elytris laevissimis.  
fus. punctatis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 357.*  
*Habitat in Europa.*

ochropus. 267. *Cr. niger*, elytris fuscis, thorace antennarum basi pedibusque flavis, femoribus basi fuscis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 358.*  
*Habitat in Europa.*

*\*\* palpis inæqualibus, anterioribus securiformibus.*  
*† labio corneo, Erotyli.*

gigan- 191. *Cr. ovatus niger*, coleoptris punctis fulvis numerosissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 157. n. 1. mant. inf. 1. p. 91. n. 1.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 1. Chrysomela gigantea.*  
*Degeer inf. 5. p. 349. t. 16. f. 8. Chrysomela oblonga nigra, &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 8. & f. 15. Coccinella gigantea.*  
*Habitat in India.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Erotylus.* 1727

- caneella- 192. *Cr. ater*, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant.*  
tus. *inf. 1. p. 91. n. 2.*  
*Habitat in Brasilia, magnus, fere globosus.*
- Histrio. 193. *Cr. ater*, elytris nigro flavoque fasciatis : macula  
baseos apicisque coccinea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 91. n. 3.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- lugubris. 194. *Cr. testaceus*, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 157. n. 2. mant. inf. 1. p. 91. n. 4.*  
*Habitat in America.*
- gibbosus. 195. *Cr. niger*, elytris flavescentibus nigro-punctatis :  
fascia media & posteriore nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*157. n. 3. mant. inf. 1. p. 91. n. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 2. Amoen. ac. 6. p. 393. n. 13.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 8? mant. inf. 1. p. 67. n. 10?*  
*Chrysomela gibbosa.*  
*Gron. zooph. 606. t. 14. f. 5. Coccinella.*  
*Habitat in America meridionali.*
- pustula- 196. *Cr. ater* elytris fasciis quinque punctorum fulvorum.  
tus. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 498. mant. inf. 1. p. 91. n. 6.*  
*Habitat - - - giganteo affinis, sed non gibbosus.*
- concate- 197. *Cr. ater*, elytris flavo nigroque reticulatis : fasciis  
natus. duobus atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 91. n. 7.*  
*Habitat - - - magnus.*
- quinque- 198. *Cr. ovatus*, elytris nigris : punctis quinque rubris.  
punctatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 157. n. 4. mant. inf. 1. p. 91. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 3. Chrysomela quinque-*  
*punctata.*  
*Gron. zooph. 613. t. 16. f. 7. Coccinella coleoptris ni-*  
*gris punctato-impressis : maculis decem rubris.*  
*Habitat in America.*
- punctatis- 199. *Cr. niger*, elytris flavis : punctis numerosissimis nigris.  
simus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 157. n. 5. mant. inf. 1. p. 91. n. 9.*  
*Habitat in America.*
- varius. 200. *Cr. ater*, elytris punctatis medio fulvo maculatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 157. n. 6. mant. inf. 1. p. 92. n. 10.*  
*Habitat Surinami, statura punctatissimi, at minor,*  
*thorace atro, punctis quasi cicatricibus notato.*



1728 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Erotylus.*

macro- - 201. Cr. ater, elytris fasciis atris flavisque undatis alter  
cheiros. nis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf. 1.*  
*p. 92. n. 11.*

*Habitat in India, variegato affinis, at paulo major.*

fasciatus. 202. Cr. ater, elytris fasciis tribus flavescens. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 158. n. 7. mant. inf. 1. p. 92. n. 12.*

*Habitat - - - mediæ magnitudinis.*

Zebra, 203. Cr. flavescens, capite, thoracis basi, fasciis tribus  
elytrorum pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 92.*  
*n. 13.*

*Habitat in Cayenna, reliquis hujus tribus minor,  
capite atro.*

immacu- 204. Cr. ater immaculatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 158. n. 8.*  
latus. *mant. inf. 1. p. 92. n. 14.*

*Habitat in nova Hollandia.*

venereus. 205. Cr. ater, thorace elytrisque cupreis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 158. n. 9. mant. inf. 1. p. 92. n. 15.*

*Habitat in nova Hollandia.*

nebuloso- 206. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis. *Fabr.*  
fus. *sp. inf. 1. p. 158. n. 10. mant. inf. 1. p. 92. n. 16.*

*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis, mediæ  
magnitudinis.*

dilatatus. 207. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 158. n. 11. mant. inf. 1. p. 92. n. 17.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

smarag- 208. Cr. ater, elytris striatis viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
dulus. *158. n. 12. mant. inf. 1. p. 92. n. 18.*

*Habitat in nova Hollandia.*

amethyf- 209. Cr. ater, thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
tinus. *p. 158. n. 13. mant. inf. 1. p. 92. n. 19.*

*Habitat in nova Hollandia.*

bicolor. 210. Cr. ater, supra æneus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 158. n.*  
*14. mant. inf. 1. p. 92. n. 20.*

*Habitat in nova Hollandia.*

kilonien- 211. Cr. niger, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 158.*  
fis. *n. 15. mant. inf. 1. p. 92. n. 21.*

*Habitat Kilonii.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus*. *Lagriæ*. 1729

jamaicensis. 212. *Cr. viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flavescens. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 16. mant. inf. 1. p. 92. n. 22.*

*Habitat in Jamaica, antennis elongatis, ore piceo.*

cichorei. 213. *Cr. ore porrecto, rostro depresso elongato oblongo. Hasselq. ii. p. 449. n. 101.*

*Habitat in Orientis cichoreo, medius quasi inter cryptocephalos, dermestes, curculiones, cantharides; an ex hac tribu?*

†† *labio membranaceo, Lagriæ.*

æneus. 214. *Cr. obscure æneus immaculatus. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 1. mant. inf. 1. p. 93. n. 1.*

*Habitat in Americæ meridionali oppositis insulis.*

tahitiensis. 215. *Cr. lividus, oculis nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 2. mant. inf. 1. p. 93. n. 2.*

*Habitat in insula Tahiti.*

pacificus. 216. *Cr. lividus, thorace lineis, elytris vitta fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 3. mant. inf. 1. p. 93. n. 3.*

*Habitat in nova Seelandia.*

fuscicornis. 217. *Cr. cyaneus, antennis fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 4. mant. inf. 1. p. 93. n. 4.*

*Habitat in nova Hollandia.*

meridionalis. 218. *Cr. rufus, elytris fuscis: marginibus lineaque media rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 5. mant. inf. 1. p. 93. n. 5.*

*Habitat in America meridionali, eleganti affinis, at duplo major.*

elegans. 219. *Cr. rufus, elytris vitta abdomineque apice fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 6. mant. inf. 1. p. 93. n. 6.*

*Habitat in America meridionali.*

rufifrons. 220. *Cr. cyaneus, capite thoraceque rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 7. mant. inf. 1. p. 93. n. 7.*

*Habitat in America boreali.*

elongatus. 221. *Cr. ater, thorace rufo villosus. Fabr. sp. inf. 1. p. 160. n. 8. mant. inf. 1. p. 93. n. 8.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 122. Chrysomela elongata.*

*Habitat in Europa, præsertim Anglia.*

1730 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Lagria.*

- ambu- 222. Cr. glaber ater, elytris punctatis. *Fabr. mant. inf. I.*  
lans. p. 93. n. 9.  
*Habitat in Germania, elongato proxime affinis, at  
thorax ater.*
- tubercu- 223. Cr. ovatus glaber ater, elytris tuberculatis. *Fabr.*  
latus. *mant. inf. I. p. 93. n. 10.*  
*Habitat in Cayenna, villosus major.*
- villosus. 224. Cr. villosus ater, thorace elytrisque viridibus. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 160. n. 9. mant. inf. I. p. 93. n. 11.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, hirtus proxime affinis.*
- pubes- 225. Cr. niger, thorace marginato villosus, elytris glabris  
cens. testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 160. n. 10. mant. inf. I.*  
p. 93. n. 12.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 120. Chrysomela pubescens.*  
*Habitat in Germania, hirtus affinis.*
- hirtus. 226. Cr. villosus niger, thorace tereti, elytris testaceis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 160. n. 11. mant. inf. I. p. 93. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 119. Fn. suec. 578.\**  
*Chrysomela hirta.*  
*Degeer inf. 5. p. 446. t. 2. f. 23. 24. Tenebrio alatus*  
*villosus niger, &c.*  
*Habitat in Europæ saponariis.*
- indus. 227. Cr. cyaneus, pedibus longitudine corporis.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 121. Chrysomela inda.*  
*Habitat in India, magnitudine scarabæi stercorarii.*
- ventralis. 228. Cr. villosus cyaneus, elytris lineis elevatis tribus,  
abdomine rufo. *Fabr. mant. inf. I. p. 93. n. 14.*  
*Habitat in India, tomentoso affinis.*
- tomento- 229. Cr. villosus cyaneus, abdomine femoribusque rufis.  
lus. *Fabr. sp. inf. I. p. 160. n. 12. mant. inf. I. p. 94. n. 15.*  
*Habitat in nova Hollandia, elytris rarius fuscis.*
- glabratus. 230. Cr. glaber, thorace rufescente, elytris flavis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 160. n. 13. mant. inf. I. p. 94. n. 16.*  
*Habitat in Anglia.*
- scutella- 231. Cr. niger, cinereo-hirtus, scutello albo. *Fabr.*  
ris. *mant. inf. I. p. 94. n. 17.*  
*Habitat in Hispania, statura & magnitudine triticeæ.*
- niger. 232. Cr. pilosus niger, elytris læviusculis ferratis. *Fabr.*  
*mant. inf. I. p. 94. n. 19.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Lagria. 1731*

*Syst. nat. XII. 2. p. 564. n. 28. Fn. suec. 439. Dermestes niger.*

*Fabr. sp. inf. I. p. 71. n. 5. Anobium nigrum.*

*Scop. ent. carn. 131. Cantharis biloba.*

barba- 233. *Cr. antennis ferratis, hirtus, obscure æneus. Fabr. mant. inf. I. p. 94. n. 23.*

*Habitat in Barbariæ floribus compositis, dermestihirto affinis.*

antheri- 234. *Cr. niger, elytris fasciis duabus ferrugineis. Fabr. sp. inf. I. p. 160. n. 14. mant. inf. I. p. 94. n. 24.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 681. n. 16. Fn. suec. 829. Meloë antherinus.*

*Syst. nat. X. p. 418. n. 7. Tenebrio pedicularius.*

*Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pediculo major.*

floralis. 235. *Cr. niger, thorace ferrugineo. Fabr. sp. inf. I. p. 161. n. 15. mant. inf. I. p. 94. n. 25.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 681. n. 15. Fn. suec. 829? Meloë floralis.*

*Habitat in Europæ plantis.*

Marchiæ. 236. *Cr. niger villosus, thorace cylindrico capitifque margine posteriore rubris, elytris striato-punctatis.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 68. n. 2. t. 23. f. 35.*

*Habitat Berolini, 4 lineas longus.*

† † *dubiæ species.*

caraboi- 237. *Cr. niger, elytris subcæruleis, plantis ferrugineis. des. Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 115. Fn. suec. 574. Chrysomela caraboides.*

*Habitat in Europa.*

punctula- 238. *Cr. viridi-æneus punctatissimus, pedibus ferrugineis. tus. Syst. nat. XII. 2. p. 601. n. 108. Amæn. ac. 6. p. 394. n. 18. Chrysomela punctatissima.*

*Habitat Surinami.*

lampyro- 239. *Cr. elytris subtomentosis nigris: linea longitudinali des. margineque pallidis.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 601. n. 107. Chrysomela tomentosa.*

*Habitat in Carolina, cr. capreae affinis, facie lampyridis, lividus.*

200. HISPA. *Antennæ cylindricæ, basi approximata, inter oculos sitæ.*

*Palpi fusiformes.*

*Thorax & elytra sæpius aculeata.*

atra. 1. *H. corpore toto atro. Schr. der berl. Naturf. Ges. 4. t. 7. f. 6. Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 10. mant. inf. 1. p. 47. n. 9. Hispa antennis fusiformibus, thorace elytrisque spinosis, corpore atro. Geoffr. inf. par. 1. p. 243. n. 7. Crioceris atra spinis horrida. Habitat in Europa australi & Africa boreali ad radices graminum.*

testacea. 2. *H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 11. mant. inf. 1. p. 47. n. 10. Habitat in Barbaria, atræ magnitudine; thoracè spinis sexuplici armato.*

bihamata. 3. *H. inermis nigra, rubro-maculata, elytris truncatis hamatis. Habitat in India, oblonga, depressa, cr. capræ magnitudine.*

mutica. 4. *H. inermis, antennis pilosis. Fn. suec. 413. Dermestes (clavicornis) niger, antennis clavatis pilosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 9. mant. inf. 1. p. 47. n. 7. Hispa antennis pilosis, nigra, elytris striatis. Degeer inf. 5. p. 47. t. 3. f. 1. Tenebrio hirticornis. Habitat in Europæ quisquiliis, muscis.*

sanguini- 5. *H. inermis atra, thorace sanguineo. Mant. 530. collis. Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 12. mant. inf. 1. p. 48. n. 11. Hispa antennis fusiformibus, thorace elytrorumque basi sanguineis, elytris ferratis. Habitat in America meridionali.*

ferrata. 6. *H. antennis fusiformibus, nigra, elytris rufescentibus apice ferratis nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 48. n. 12. Habitat Surinami, statura sanguinicollis.*

picipes. 7. *H. antennis fusiformibus, atra, elytris pedibusque piccis. Fabr. mant. inf. 1. p. 47. n. 8. Habitat Halæ Saxonum, congeneribus longior.*



- cornuta. 8. *H. tota atra*, thorace antèrius posteriusque spinoso, elytris porcatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 15. n. 25. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in Suecia, opatri sabulosi magnitudine, sed angustior.*
- scabra. 9. *H. tota nigra*, thorace alato elytrisque margine ferrato-ciliatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 15. n. 26. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in Suecia, filphæ ferruginæ magnitudine.*  
*Huic & cornatæ, & scabræ antennæ fusiformes.*
- capensis. 10. *H. picea hispida*, thoracis spina palmata. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 66. f. 76.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, pediculi majoris magnitudine, colore nigro & piceo varians.*
- angulata. 11. *H. antennis fusiformibus*, flava, capite, thoracis linea dorsali elytrorumque margine sinuato nigris. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna.*
- dentata. 12. *H. antennis filiformibus*, nigra, thoracis margine, elytrorum ferratorum macula baseos fasciaque media flavis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Cayenna.*
- cærulea. 13. *H. antennis subferratis cærulea hirta.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- bipustulata. 14. *H. antennis ferratis*, atra hirta, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 8. mant. inf. 1. p. 47. n. 6.*  
*Habitat in Italia, dermeste hirta minor.*
- cornigera. 15. *H. antennis ferratis*, thorace rufo, elytris cæruleis, capite bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 5. mant. inf. 1. p. 47. n. 5.*  
*Habitat in Anglia, an proprii generis?*
- ferraticornis. 16. *H. fusca*, antennis ferratis, elytris striatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 5. n. 8. Ptinus ferraticornis.*  
*Habitat Upsaliæ, pini mollis magnitudine.*
- pectinicornis. 17. *H. fusca*, antennis pectinatis, pedibus luteis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 3. mant. inf. 1. p. 47. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 565. n. 1. Ptinus pectinicornis.*  
*En. suec. 412. Dermestes pectinicornis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 65. n. 2. Ptinus atro-fuscus, &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in Europæ quiquiliis, coryli foliis.*



bicornis. 18. H. antennis pectinatis, thorace & elytrisque viridi-æneis, capite bicorni. *Fabr. sp. inj. 1. p. 82. n. 4. mant. inf. 1. p. 47. n. 4.*

*Habitat in America boreali, an hujus generis?*

flabelli- 19. H. nigra, antennis pectinatis, elytris striatis. *Fabr. sp. cornis. inf. 1. p. 81. n. 2. mant. inf. 1. p. 47. n. 2.*

*Schaeff. ic. t. 215. f. 3?*

*Habitat in Anglia.*

myrtaci- 20. H. antennis pectinatis, elytris striatis albo punctatis. *Fabr. na. sp. inf. 1. p. 81. n. 1. mant. inf. 1. p. 47. n. 1.*

*Drury inf. 3. t. 48. f. 7.*

*Habitat in nova Hollandia, prægrandis.*

## 201. BRUCHUS. *Antennæ filiformes.*

*Palpi æquales, filiformes.*

*Labium acuminatum.*

pisi. 1. Br. elytris nigris albo-maculatis, podice albo: punctis binis nigris. *Mus. Lud. Ulr. 35. Fabr. sp. inf. 1. p. 74. n. 2. mant. inf. 1. p. 41. n. 4.*

*Syst. nat. X. p. 356. Dermestes pisorum.*

*Amæn. ac. 3. p. 347. Curculio pisorum.*

*Kalm it. 2. p. 294. Bruchus Americæ septentrionalis.*

*Degeer inf. 5. p. 278. n. 1. t. 16. f. 3. 4. Bruchus nigrifuscus, &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 267. n. 1. t. 4. f. 9. Mylabris fusca cinereo-nebulosa, &c.*

*Scop. ent. carn. 63. Larva falicis.*

*Ledermüll. micr. 195. t. 100.*

*Gron. zooph. 569.\**

*Habitat in America septentrionali, nuperius quoque in Europa australi, pisorum agros devastans, pomonæ etiam floribus infestus, devoratur a gracula quiscula.*

umbella- 8. Br. squamosus supra griseus subtus cinereus. *Fabr. mant. tarum. inf. 1. p. 41. n. 3.*

*Habitat in Barbariæ ambulatis, magnus.*

Robinæ. 9. Br. griseo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 3. mant. inf. 1. p. 41. n. 5.*

*Habitat in Robinia Pseudacacia ex America allatis  
seminibus, magnus.*

**Gibbosus.** 10. Br. thorace gibboso cupreo, elytris nigris tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 4. mant. inf. 1. p. 41. n. 6.*

*Habitat in America boreali.*

**Scabrosus.** 11. Br. niger, elytris rufis elevato-friatis: punctis nigris sparsis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 5. mant. inf. 1. p. 41. n. 7.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 28. n. 1. t. 20. f. 15.*

*Habitat in Europæ potissimum æsculo.*

**Clathratus.** 12. Br. totus niger, thorace albido-cancellato, elytrorum striis ex nigro & griseo variis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 158. n. 5.*

*Habitat Berolini, scabrosi statura & magnitudine.*

**Cacao.** 13. Br. corpore fusco griseo-maculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 6. mant. inf. 1. p. 41. n. 8.*

*Habitat in Theobromatis seminibus.*

**Undatus.** 14. Br. niger, elytris fuscis: strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 41. n. 9.*

*Habitat in Africæ floribus, mediæ magnitudinis.*

**Theobromatis.** 2. Br. elytris griseis nigro-maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 75. n. 7. mant. inf. 1. p. 41. n. 10.*

*Habitat in Theobromatis seminibus, indicus, ex nigro canescens, br. pisti dimidio minor.*

**Marginalis.** 15. Br. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 8. mant. inf. 1. p. 42. n. 11.*

*Habitat in Germania.*

**Canalis.** 16. Br. subferrugineus, elytris apice atris, ano atro: linea media alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 9. mant. inf. 1. p. 42. n. 12.*

*Habitat in India, parvus.*

**Bipunctatus.** 17. Br. cinereus, elytris fuscis: puncto baseos ocellari atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 10. mant. inf. 1. p. 42. n. 13.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 2.*

*Habitat in Helvetiæ plantis.*

- varius. 18. *Br. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis striatis, femoribus muticis. Fabr. mant. inf. 1. p. 42. n. 14. Habitat in Sueciæ pinetis, statura bipunctati.*
- Gleditschia. 3. *Br. elytris striatis longitudine abdominis, corpore piceo, antennis nigris. Amæn. ac. 6. p. 392. n. 5. Dermestes Gleditsiæ. Habitat in Americæ septentrionalis Gleditschiæ seminibus. Femora mutica.*
- Spinosus. 19. *Br. griseus, thorace elytrisque spinosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 74. n. 1. mant. inf. 1. p. 41. n. 1. Habitat in Jamaica.*
- Baëtris. 4. *Br. cinereus, elytris sublaevibus, femoribus posterioribus ovatis, tibiis incurvis. Amæn. ac. 6. p. 392. n. 6. Fabr. mant. inf. 1. p. 41. n. 2. Jacq. hist. stirp. amer. t. 170. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 28. n. 3. t. 20. f. 16. Habitat in Baëtris, palmæ americanæ, nucleis.*
- rufipes. 20. *Br. niger, elytris albo-punctatis, pedibus anterioribus rufis, posterioribus nigris unidentatis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 29. n. 4. Habitat in Pomerania, grunario proxime affinis, at minor, an varietas?*
- granarius. 5. *Br. elytris nigris: atomis albis, femoribus posterioribus unidentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 11. mant. inf. 1. p. 42. n. 15. Syst. nat. XII. 2. p. 605. n. 5. Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, posticis dentatis. Fn. suec. 628. Curculio atomarius.\* Habitat in Europæ plantarum seminibus.*
- cisti. 21. *Br. ater immaculatus, femoribus muticis. Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 12. mant. inf. 1. p. 42. n. 16. Habitat in cisti helianthemi floribus frequens.*
- abdominalis. 22. *Br. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus anterioribus testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 13. mant. inf. 1. p. 42. n. 17. Habitat in India, parvus,*

- femina-  
rius. 6. Br. ater, antennarum basi pedibusque anterioribus testaceis, femoribus muticis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 79. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 18.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 268. n. 3. Mylabris nigra, abdomine albo sericeo.  
*Habitat in Europæ floribus, pediculi magnitudine.*
- macula-  
tus. 23. Br. elytris punctatis testaceis nigro-maculatis, podice griseo: punctis binis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 76. n. 14. *15. mant. inf.* 1. p. 42. n. 19.  
*Habitat in Americæ feminibus.*
- mimosæ. 24. Br. testaceus immaculatus, elytris substriatis femoribus posterioribus acute dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 76. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 20.  
*Habitat in mimosæ Americæ meridionalis feminibus, seminario paulo major.*
- ferrati-  
cornis. 25. Br. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griseo fusco maculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 21.  
*Habitat in Oriente.*
- pectini-  
cornis. 7. Br. antennis pectinatis corpore ferrugineo, longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 22. *Syst. nat.* X. p. 386. n. 79. *Curculio chinensis.*  
*Degeer inf.* 5. p. 201. n. 2. *Bruchus rufus.*  
*Schæff. elem. t.* 86. f. 1.  
*Habitat in feminibus e Sina allatis.*

PAUSUS. *Antennæ biarticulatæ, clavatæ; clava solida, uncinata.*

- microce-  
phalus. 1. P. *Dahl. diff. big. insect. sist. Ups.* 1775. *Fuesli Arch. Inf.* 3. p. 1. t. 13.  
*Habitat in America septentrionali, totus niger, magnitudine dermestidis lardarii, capite minutissimo, thorace angusto: anterieus margine transverso elevato, elytris abdomine posterius fere truncato paulo longioribus truncatis.*

**ZYGIA.** *Antennæ moniliformes.*

*Palpi inæquales, filiformes.*

*Labium elongatum, membranaceum.*

*Maxilla unidentata.*

oblonga. 1. *Z. Fabr. sp. inf. 1. p. 161. n. 1. mant. inf. 1. p. 94. n. 1.*  
*Habitat in Oriente, oblonga, rufa, capite elytrisq;*  
*obscurè cyaneis.*

**ZONITIS.** *Antennæ setaceæ.*

*Palpi quatuor filiformes, maxilla integra breviores.*

*Labium emarginatum.*

chryso- 1. *Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris. Fabr.*  
 melina. *sp. inf. 1. p. 161. n. 1. mant. inf. 1. p. 95. n. 1.*  
*Habitat in Oriente, Ægypto, subtus atra, ano rufescente.*

flava. 2. *Z. rufescens, elytris flavis apice nigris. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 161. n. 2. mant. inf. 1. p. 95. n. 2.*  
*Habitat in Oriente.*

**APALUS.** *Antennæ filiformes.*

*Palpi æquales, filiformes.*

*Maxilla cornea, unidentata.*

*Labium membranaceum, truncatum,*  
*integrum.*

bimaculatus. 1. *Ap. Fabr. sp. inf. 1. p. 161. n. 1. mant. inf. 1. p. 95.*  
*n. 1. Syst. nat. 2. p. 680. n. 9. Fn. suec. 828. Uddm.*  
*diff. 82. Meloë (bimaculatus) alatus niger, elytris*  
*luteis, macula nigra postica.*  
*Degeer inf. 5. t. 1. f. 18. Pyrochroa bimaculata.*  
*Habitat primo vere in Sueciæ arenosis.*

**BRENTUS.** *Antennæ moniliformes, ultra medium rostri exsertæ.*

*Os rostro porrecto, recto, cylindrico.*

*\* femoribus simplicibus.*

barbicor- 1. Br. cylindricus, rostro longissimo subtus barbato, elytris  
nis. elongato-elevatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 59.* Curculio barbicornis.  
*Habitat in nova Seelandia.*

affimilis. 2. Br. cylindricus, rostro apice glabro atro, elytris ferrugi-  
neo-subfasciatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 2.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 60.* Curculio affimilis.  
*Habitat in nova Seelandia.*

monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis unistriatis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 3.*  
*Habitat in nova Hollandia, statura barbicornis, at minor.*

semipunc- 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis.  
tatus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 4.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 61.* Curculio semipunctatus.  
*Habitat in nova Hollandia.*

*\*\* femoribus dentatis.*

Drurya- 5. Br. æneus, thorace tereti, antennis rostro longioribus,  
nus. elytris apice spinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall.*  
*inf. russ. 1. p. 16. n. 3.*  
*Drury inf. t. 42. f. 37.*  
*Habitat - - -*

Anchorago. 6. Br. linearis, elytris flavo-striatis, thorace elongato.  
*Fabr. mant. 1. p. 96. n. 5.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118.*  
*Sulz. nat. XII. 2. p. 613. n. 56. Mus. Lud. Utr. 52.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118.* Curculio anchorago.  
*Degeer inf. 5. p. 273. n. 8. t. 15. f. 28.* Curculio longicollis.  
*Gron. zooph. 583. t. 15. f. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6.*  
*Habitat in America australi & India.*



hastile. 7. Br. aterrimus rostro tenuissimo longo ad apicem subarcuato, thorace medio coarctato, elytris subfulcatis, apice subacuminatis. *Pall. inf. russ. 1. p. 25. n. 2.*  
*Habitat - - sesquipollicem longus, crassitie vix libellæ puellæ.*

nasutus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato æneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 6.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 119. Curculio nasutus.*  
*Habitat in Jamaica, anchoragini affinis, at paulo major.*

dispar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro striatis. *Fabr. mant. 1. p. 96. n. 7.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 55. Mus. Lud. Ulr. 50.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 120. Curculio dispar.*  
*Pall. inf. russ. 1. p. 24. t. B. f. 4. Curculio anomaloceph.*  
*Habitat in America.*

cylindri- 10. Br. thorace rotundato nigro-æneo, elytris ferrugineis  
 cornis. flavo substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 8.*  
*Habitat in nova Seelandia, statura & magnitudine disparis.*

bifrons. 11. Br. niger, elytris striatis : maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 9.*  
*Habitat in Cayenna, statura anchoraginis.*

202. CURCULIO. *Antennæ clavatæ, infidentes*  
*rostro corneo, prominenti.*  
*Palpi quatuor filiformes.*

\* *Longirostres.*

† *femoribus simplicibus.*

Gigas. 55. C. thorace elytrisque scabris, antennis apice albis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 161. n. 1. mant. inf. 1. p. 97. n. 1.*  
*Habitat in Japonia.*

palma- 1. C. ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis.  
 rum. *Mus. Lud. Ulr. 42.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 2.*  
*mant. inf. 1. p. 97. n. 2.*  
*Degger inf. 5. p. 269. n. 4. t. 15. f. 26. Curculio*  
*longirostris, antennis fractis &c.*

Rumpf amb. 1. p. 79. t. 17. f. g. *Cossus fagiarius*.

Petiv. gazoph. t. 35. f. 5.

Scop. ann. hist. nat. 5. p. 89. n. 47.

Gron. zooph. 578. t. 16. f. 4.

Merian. furin. t. 48. f. 3.

Sulz. hist. inf. t. 3. f. 20.

Habitat in Indiæ palmis.

Larva assata in deliciis. Jacq. stirp. am. 278.

cruentatus. 56. *C. ater*, thorace lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 162. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 3.  
Habitat in Carolina, c. palmarum minor.

longipes. 96. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 162. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 4.  
*Drury inf.* 2. t. 33. f. 3.  
Habitat ad caput bonæ spei.

zanizæ. 550. *C. ruber*, thoracis linea nigra; rostro setaceo longissimo. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 29. t. 1. f. 7.  
Habitat ad caput bonæ spei, in cycade cassia, larva hexapus, setis albidis obsessa intra squamas strobili femineæ, nucibus rubraque carne hanc obvelanti viditans.

exoticus. 554. *C. griseus*, thorace basi impresso, dorsî ruga brevi, elytris posterius gibbis: punctorum alborum ordinibus decem; interstitiis, profunde nigro punctatis. *Mus. Lesk.* p. 18. n. 368.  
Habitat extra Europam.

brachy- 555. *C. ater*, thorace plano punctato: linea media parum  
pteros. elevata, elytris abbreviatis substriatis: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk.* p. 18. n. 374.  
Habitat in Europa.

undatus. 556. *C. niger*, elytris ordine punctatis: fasciis undulatis interruptis albis. *Mus. Lesk.* p. 18. n. 379.  
Habitat in Europa.

atomarius. 557. *C. fuscus*, elytris striatis: interstitiis lævissime punctatis atomis griseis pilosis adpersis, tibiis rufis. *Mus. Lesk.* p. 18. n. 380.  
Habitat in Europa.

coccineus. 558. *C. coccineus*, elytris punctatis : punctorum ordinibus decem. *Mus. Lesk. p. 18. n. 381.*  
*Habitat in Europa.*

futuralis. 559. *C. griseus*, elytris striatis: futura albida nigro punctata, macula communi oblonga versus apicem marginumque exteriorum posteriorum punctis nigris. *Mus. Lesk. p. 18. n. 384.*  
*Habitat in Europa.*

indus. 2. *C. ater*, thorace subovato excavato punctato, elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis. *Mus. Lud. Ulr. 43.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 5. mant. inf. 1. p. 97. n. 5.*  
*Degeer inf. 5. p. 265. n. 1. t. 15. f. 22.*  
*Habitat in India.*

paganus. 97. *C. griseus*, thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bifurcato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 6. mant. inf. 1. p. 197. n. 6.*  
*Habitat in America australi & India.*

Elephas. 98. *C. fuscus*, thorace elytrisq. variolosis, elytris posterius spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 7. mant. inf. 1. p. 97. n. 7.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnus.*

hemipterus. 3. *C. obscure purpurascens*, elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis. *Mus. Lud. Ulr. 44.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 8. mant. inf. 1. p. 97. n. 8.*  
*Degeer inf. 5. p. 271. n. 5. t. 15. f. 25. Curculio rufo-fasciatus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 5.*  
*Habitat in India.*

variegatus. 99. *C. rufo nigroque varius*, rostro apice nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 9. mant. inf. 1. p. 97. n. 9.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

alliariæ. 4. *C. violaceus totus.* *Fn. suec. 580.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 40. mant. inf. 1. p. 101. n. 53.*  
*Fn. suec. 468. Curculio nigro-cærulefcens.*

---

*Curculionum longirostrum larvæ plurimæ fructus & semina, brevisrostrum vero folia consumunt; aliæ etiam caules consumunt.*

*Degeer inf. 5. p. 251. n. 39. Curculio cæruleus.*

*Frisch inf. 9. 35. t. 18.*

*Habitat in erysimi alliarie caulibus, quos perforat.*

erysimi. 100. *C. niger*, thorace bituberculato virescente, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 54.*

*Habitat Kilonii, cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.*

cyaneus. 5. *C. ater*, elytris violaceis, scutello albo. *Fn. suec. 581.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 41. mant. inf. 1. p. 101. n. 55.*

*Degeer inf. 5. p. 252. n. 41. Curculio longirostris, antennis rectis, &c.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 70. n. 11. t. 24. f. 5. c.*

*Habitat in Europæ borealis potissimum salicibus.*

cracca. 6. *C. gibbus* supra ater, subtus cinereus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 42. mant. inf. 1. p. 101. n. 56.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 606. n. 6. Curculio longirostris niger ovatus, rostro subulato, abdomine pallido.*

*Degeer inf. 5. t. 6. f. 31. 32? Curculio viciae.*

*Habitat in Europæ viciarum seminibus, pediculi magnitudine.*

malvæ. 101. *C. griseus*, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 43. mant. inf. 1. p. 101. n. 57.*

*Habitat in Angliæ malvis.*

*Rostrium & abdomen atra.*

campanulæ. 7. *C. niger ovatus* elytris striatis obtusis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 31. mant. inf. 1. p. 100. n. 40. Lesk. ic. p. 16. t. A. f. 5.*

*Degeer inf. 5. p. 226. n. 23. Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, &c.*

*Habitat in campanulæ rotundifoliæ pericarpis incrassatis.*

fuscirostris. 102. *C. griseus*, pedibus rufis, rostro femoribusque basinigris *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 32. mant. inf. 1. p. 100. n. 41.*

*Habitat in Germaniæ plantis.*

roboris. 103. *C. rostro* thoraceque rufis, elytris violaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 42.*

*Habitat in Saxonie quercu, statura & magnitudine fuscirostris.*

cuprirostris. 104. *C. oblongus* viridi-æneus, elytris striatis, rostro cupreo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 43.*

*Habitat Dresdæ in betula, parvus.*

- nigrirostris. 105. *C. viridis* rostro atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 33. mant. inf. 1. p. 100. n. 44.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 69. n. 8. t. 24. f. 3.*  
*Habitat in Angliæ arvis.*
- variabilis. 106. *C. subtestaceus*, thorace viridi lineato, rostro apice fusco. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 34. mant. inf. 1. p. 100. n. 45.*  
*Habitat Hamburgi.*
- rufirostris. 107. *C. niger*, rostro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 35. mant. inf. 1. p. 100. n. 46.*  
*Habitat in Anglia.*
- picrostris. 108. *C. oblongus niger argenteo-holofericeus*, rostro dimidiato pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 47.*  
*Habitat Hafniæ, rufirostri affinis, ut major.*
- salicariæ. 109. *C. niger*, antennarum basi, coleoptrorum disco tibiisque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 36. mant. inf. 1. p. 101. n. 48.*  
*Habitat in Angliæ lythro salicariæ, parvus.*
- badensis. 8. *C. niger*, pedibus piceis.  
*Habitat in Germania, magnitudine c. cerasi, thorace leviusculo ovato, elytris obsolete striatis, femoribus clavatis. Dr. Blom.*
- æquatus. 9. *C. æneus elytris rubris*, rostro nigro elongato.  
*Habitat in Germania, statura c. nucum, sed dimidio minor.*
- cerasi. 12. *C. ater*, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 30. mant. inf. 1. p. 100. n. 138.*  
*Habitat in foliis pruni cerasi.*
- quadrifidus. 110. *C. thorace quadrifidus nigro, elytris striatis cinctus. nereo variegatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 39.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- ægidulus. 13. *C. piceus*, abdomine ovato. *Fn. suec. 584. Fabr. sp. inf. 1. p. 169. n. 46. mant. inf. 1. p. 102. n. 62.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 291. Curculio pyriformis nigro-cærulescens.*  
*Degeer inf. 5. p. 235. n. 22. Curculio longirostris antennis fractis fuscis, &c.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. t. 24. f. 12.*

*Habitat frequens in Europæ borealis & Calabriae floribus tetradynamis.*

flavipes. III. C. ater, femoribus luteis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 47. mant. inf. 1. p. 102. n. 63.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 272. n. 8. Rhinomacer subglobosus, &c.*

*Habitat frequens primo vere in Europæ locis apricis calidis.*

purpureus. 14. C. purpureus nitens, rostro longissimo. *Fn. suec. 585. Fabr. sp. inf. 1. p. 169. n. 48. mant. inf. 1. p. 102. n. 64. Degeer inf. 5. p. 250. n. 38. Curculio rostro longissimo, &c. Petiv. gaz. t. 22. f. 5. List. loc. 394.*

*Bergstr. nomencl. 1. 16. 12. t. 2. f. 12.*

*Habitat in Europæ plantis, frumentario proxime affinis.*

frumentarius. 15. C. sanguineus. *Fn. suec. 586. Fabr. sp. inf. 1. p. 169. n. 49. mant. inf. 1. p. 102. n. 65. Degeer inf. 5. p. 251. n. 40.*

*Ad. Stockh. 1750. p. 186. n. 1.*

*Ad. nidros. 3. p. 391.*

*Leeuwenh. arc. nat. 168. augm. 6. p. 83. f. 3.*

*Habitat in Europæ frumento diutius asservato, pessimus.*

bituberculatus. 112. C. ferrugineus, thorace longitudine elytrorum punctiferae duobus dorsalibus elevatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 58. mant. inf. 1. p. 103. n. 76.*

*Habitat in nova Seelandia, granario proxime affinis.*

oryzæ. 113. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 57. mant. inf. 1. p. 103. n. 75.*

*Amæn. acad. 6. p. 395. n. 19. Curculio (oryzæ) longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.*

*Habitat in oryza, diutius asservata.*

granarius. 16. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. suec. 587. Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 56. mant. inf. 1. p. 103. n. 74. Scop. ent. carn. 89.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 285. n. 18. Curculio rufo-testaceus, &c.*

*Degeer inf. 5. p. 239. n. 25. Curculio longirostris, antennis fractis, &c.*

*Raj. inf. 38. Scarabæus parvus fordide fulvus, &c.*



*Joblot obs. microscop.* 1754. t. 7. f. 1.

*Wilcke aed. Stockh.* 37. tr. 4. nr. 2.

*Habitat in frumento diutius in granariis asservato, pessimus; isatide, hyoscyamo, sambuco, thlaspidi pelli dicitur.*

- dorsalis. 17. *C. elytris rubris: sutura nigra.* *Fn. suec.* 588. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 66.  
*Fn. suec.* 1. n. 475. *Curculio niger elytris in medio rufescentibus.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. t. 44. f. 10. r. f.  
*Habitat in Europæ borealis ranunculo ficaria.*
- melano-cardius. 18. *C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca.*  
*Mus. Lud. Utr.* 18. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10.  
*mant. inf.* 1. p. 97. n. 10.  
*Sulz. hist. inf.* 40. t. 4. f. 11.  
*Habitat in India.*
- cruciatus. 114. *C. niger, thorace subspinoso: lineis, elytris posterius cruce albis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 11.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- striatus. 115. *C. niger, elytris holosericeo-striatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 12.  
*Habitat in insula terræ novæ.*
- Rubetra. 116. *C. ater lævis immaculatus, femoribus fulcatis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 97. n. 13.  
*Habitat in Cayenna, magnitudine c. pini.*
- pini. 19. *C. elytris testaceis: fasciis nebulosis.* *Fn. suec.* 589.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 14.  
*Degeer inf.* 5. p. 222. n. 15. *Curculio longirostris, antennis fractis, &c.*  
*Frisch inf.* 11. t. 23. f. 5.  
*Habitat in pinus sylvestris cortice, cum c. abietis aliquando copula juncus.*
- onopordi. 117. *C. niger cinereo-villosus, rostro atro: utrinque sulco abbreviato baseos.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 98. n. 15.  
*Habitat in Africæ onopordis, vittato affinis, at major*
- stolatus. 118. *C. ferrugineo fuscus albo-lineatus, rostro nigro: utrinque sulco abbreviato baseos.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 164. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 98. n. 16.  
*Habitat in Italia, majusculus.*

- jaceæ. 119. *C. niger cinereo irroratus*, elytris puncto baseos distincto. *Fabr. sp. inf. I. p. 164. n. 15. mant. inf. I. p. 98. n. 17.*  
*Habitat in Centaurea Jacea, adultior magis glaber.*
- punctulatus. 120. *C. flavo fuscoque varius*, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inf. I. p. 98. n. 18.*  
*Habitat in America, statura c. jaceæ, at paulo minor.*
- cynaræ. 121. *C. niger virescenti irroratus*, rostro nigro subcarinato. *Fabr. mant. inf. I. p. 98. n. 19.*  
*Habitat in Africæ floribus cynaræ, c. jaceæ affinis, at duplo fere major.*
- Colon. 122. *C. griseus*, elytris puncto albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 164. n. 16. mant. inf. I. p. 98. n. 20.*  
*Mant. p. 531. Curculio longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace utrinque linea, elytrisquo puncto albo.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 280. n. 6. Curculio oblongus fuscus.*  
*Scop. ent. carn. 104. Curculio palustris.*  
*Schaeff. ic. t. 155. f. 2.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 68. n. 3. t. 24. f. 1.*  
 β) *Curculio ( semicolon ) nigricans. Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 69. n. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- bimaculatus. 123. *C. fuscus*, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. I. p. 98. n. 21.*  
*Habitat Halæ Saxonum, statura c. Colon, at paulo minor.*
- biguttatus. 124. *C. niger*, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque posterioribus flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 164. n. 17. mant. inf. I. p. 99. n. 22.*  
*Habitat in Germania.*
- bilineatus. 125. *C. fuscus*, elytris lineis duabus punctorum alborum. *Fabr. sp. inf. I. p. 164. n. 18. mant. inf. I. p. 99. n. 23.*  
*Habitat in Germania, mediæ magnitudinis.*
- teffellatus. 126. *C. cinereus*, elytris apice striis albis nigro punctatis: *Fabr. sp. inf. I. p. 165. n. 19. mant. inf. I. p. 99. n. 24.*  
*Habitat in Germania, mediæ magnitudinis.*
- decurtatus. 127. *C. ater*, thorace plano punctato, elytris abbreviatis substriatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 99. n. 25.*

*Habitat Halæ saxonum, sive in pice c. palmarum, at quædruplo minor.*

- equiseti. 128. *C. thorace lævi, elytris mucronatis nigris: punctis dorsibus apiceque albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 26. mant. inf. 1. p. 99. n. 26.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 69. n. 5. t. 24. f. 2.*  
*Habitat in Angliæ equiseti arvensi.*

- Bufo. 129. *C. fuscus, elytris subreticulatis: fascia media alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 21. mant. inf. 1. p. 99. n. 27.*  
*Habitat in Sibiria.*

- atrirufus. 130. *C. cinereus, rostro arcuato atro. Fabr. sp. inf. 2. p. 499. mant. inf. 1. p. 99. n. 28.*  
*Habitat Lipsiæ, magnitudine & statura c. equiseti.*

- cupreus. 21. *C. obscure æneus subtus obscurior. Fn. suec. 593. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 26. mant. inf. 1. p. 608. n. 21.*  
*Habitat in Europa.*

- Tragiæ. 131. *C. æneus, rostro pedibusque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 27. mant. inf. 1. p. 100. n. 35.*  
*Habitat in Tragiæ volubilis seminibus e Brasilia allatis.*

- æneus. 132. *C. niger, elytris æneis. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 27. mant. inf. 1. p. 100. n. 36.*  
*Habitat in Angliæ nemoribus.*

- curvirof- 133. *C. ater nitidus, rostro arcuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 29. mant. inf. 1. p. 100. n. 37.*  
*Habitat in nova Hollandia, parvus.*

- scaber. 22. *C. cinereus, pedibus rufis, elytris scabris. Fn. suec. 592.*  
*Habitat in Europæ urticis.*

- T. album. 23. *C. ater, abdomine ad latera & posterius lacteo. Fn. suec. 594.\**  
*Habitat in Westerbothnia.*

- ruficollis. 24. *C. ferrugineus, elytris capitique basi atro-cæruleis. Fn. suec. 595.\**  
*Habitat in Europa.*

- Dryados. 134. *C. cinereus, thoracis dorso fusco, elytris testaceis cinereo-undatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 102. n. 67.*  
*Habitat in Sueciæ quercu, parvus.*

- futuralis*. 135. *C. ovatus fuscus*, linea longitudinali alba. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 68.  
*Habitat in Germaniæ salice.*
- crux*. 136. *C. ater*, thorace punctis duobus baseos, elytris futura punctisque sparvis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 52. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 69.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 4. p. 70. n. 14. t. 24. f. b. d.  
*Habitat Hamburgi.*
- exclamationis*. 137. *C. ater*, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 53. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 70.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- venustus*. 138. *C. fuscus*, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 54. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 71.  
*Habitat in Anglia, parvus.*
- plantaginis*. 139. *C. elytris cinereis*: macula media fusca. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 103. n. 72.  
*Habitat Halæ Saxonum, statura c. rumicis.*
- viscariae*. 27. *C. subrotundus cinereus*, thorace elytrisque cinereo-virentibus. *Fn. suec.* 598.\*  
*Habitat in lychnidis viscariae fructificationibus.*
- bipunctatus*. 28. *C. cinereus*, elytris macula nigra, tibiis flavescens. *Fn. suec.* 599.\*  
*Habitat in Europa.*
- quadrimaculatus*. 29. *C. nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. suec.* 600.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 169. n. 44. *mant. inf.* 1. p. 101. n. 58.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 287. n. 22. *Curculio cinereus*, &c.  
*Habitat in Europa.*
- unifasciatus*. 140. *C. supra fuscus*, fascia media cinerea. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 101. n. 59.  
*Habitat Halæ Saxonum, mediæ magnitudinis.*
- bifasciatus*. 141. *C. niger*, elytris fasciis duabus cinereis: baseos majore undata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 169. n. 45. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 60.  
*Habitat in Kilonii plantis.*

- lythri. 142. *C. ater*, elytris fascia media abbreviata punctoque posteriore albis, pedibus flavis. *Fabr mant. inf. I. p. 102. n. 61.*  
*Habitat in Uplandiæ floribus lythri, parvus.*
- quinque- 30. *C. griseus*, coleoptris maculis quinque albis. *Fabr mant. inf. I. p. 102. n. 61.*  
*maculatus. suec. 601.\**  
*Habitat in Europa.*
- pericar- 31. *C. subglobosus nebulosus* elytrorum sutura basi alba  
 pius. *Fabr. sp. inf. I. p. 167. n. 37. mant. inf. I. p. 101. n. 49.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 609. n. 31. Fn. suec. 602.\** *Curculio*  
*longirostris subglobosus, nebulosus, coleoptris maculis*  
*cordata alba.*  
*Habitat in scrophulariæ pericarpiis.*
- fisymbrii. 143. *C. albo fuscoque varius*, elytris puncto baseos ele-  
 vato atro, rostro nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 168. n. 38.*  
*mant. inf. I. p. 101. n. 50.*  
*Habitat Kilonii, in fisymbrio amphibio.*
- capreæ. 144. *C. coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 168. n. 39. mant. inf. I. p. 101. n. 51.*  
*Habitat in Angliæ salice caprea, parvus.*
- Rana. 145. *C. thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis*  
*fasciis tribus undatis cinereis. Fabr. mant. inf. I. p. 101. n. 52.*  
*Habitat Kilonii, parvus, gibbus.*
- paraplec- 34. *C. cylindricus subcinereus, elytris mucronatis.*  
 ticus. *suec. 604.\* Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 62. mant. inf. I. p. 103. n. 77.*  
*Fn. suec. 445. It. scan. 184. Curculio fuscus oblongus*  
*elytris rectis acuminatis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 279. Curculio oblongus, &c.*  
*Degeer inf. 5. p. 224. n. 18. t. 7. f. 8. Curculio phellandrii.*  
*Schreber Samml. II. p. 336. t. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 44. f. 1.*  
*Habitat in Europæ & Sibiræ umbellatis aquaticis*  
*præsertim phellandrio, larva intra caulem, sæpe sub*  
*aqua latente, & paraplegiæ, ut fertur, apud equos*  
*causæ, suis stercore antidoto.*

- umbellatarum. 146. *C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griseis.* Fabr. mant. inf. 1. p. 103. n. 78.  
*Habitat in Barbariæ umbellatis, statura fere paraplectici, at duplo fere minor.*
- filiformis. 147. *C. cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis.* Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 63. mant. inf. 1. p. 103. n. 79.  
*Habitat in Italia, statura paraplectici, at quadruplo minor.*
- cylindricus. 148. *C. cylindricus supra niger, elytris acuminatis: fascia pallida.* Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 64. mant. inf. 1. p. 103. n. 80.  
*Habitat in Sibiria, statura paraplectici, sed minor.*
- notatus. 149. *C. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis: fascia sesquialtera testacea.* Fabr. mant. inf. 1. p. 103. n. 81.  
*Habitat in Barbariæ plantis, cylindricus.*
- barbirostris. 150. *C. niger, rostro barbato, tibiis anterioribus tridentatis.* Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 65. mant. inf. 1. p. 104. n. 82.  
*Seb. mus. 4. t. 95. f. 5.*  
*Habitat in America australi, & India.*
- angustatus. 151. *C. cylindricus ater, elytris obtusis punctatis.* Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 66. mant. inf. 1. p. 104. n. 83.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 71. n. 18. t. 24. f. 7.*  
*Habitat rarior in Anglia.*
- bardanæ. 152. *C. cylindricus griseo tomentosus, pedibus anterioribus elongatis.* Fabr. mant. inf. 1. p. 104. n. 84.  
*Habitat Dresdæ in ardio lappa, statura & magnitudine paraplectici.*
- anguinus. 35. *C. cylindricus canus, fusco lineatus.*  
*Habitat in Germania, statura paraplectici, subtus pedibusque canus nigro punctatus; rostro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici serie punctorum excavatorum minutissimorum ornatis, apice mucronatis.*
- Ascanii. 36. *C. cylindricus ater, lateribus subcærulescentibus.* Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 67. mant. inf. 1. p. 104. n. 85.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 71. n. 19. t. 24. f. 8.*  
 β) *Curculio cylindricus.* Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 71. n. 20.



*Habitat in Europa australi, statura paraplectici, subtus canescens, elytris acutis. Ascanius.*

lineola. 153. *C. cylindricus niger, elytris vitta testacea. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 68. mant. inf. 1. p. 104. n. 86. Habitat in nova Hollandia.*

linearis. 154. *C. elongatus niger; antennis pedibusque piceis, rostro bali attenuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 69. mant. inf. 1. p. 104. n. 87. Habitat Argentorati, rarius totus ferrugineus. Hermann.*

crassipes. 155. *C. femoribus anterioribus subclavatis, corpore atro. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 70. mant. inf. 1. p. 104. n. 88. Habitat Argentorati. Hermann.*

atriplicis. 156. *elongatus ater, thorace nitido, elytris striatis obtusis. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 71. mant. inf. 1. p. 104. n. 89. Habitat in littoris Kiloniensis & Norwegici atriplicis littorali.*

Bacchus. 38. *C. cupreus, rostro plantisque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 22. mant. inf. 1. p. 99. n. 29. Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 4. Rhinomacer niger, &c. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 4. Schæff. ic. t. 37. f. 13. Habitat in Europæ magis australis vite, corylo, supra subvillosus.*

betulæ. 39. *C. corpore viridi-aurato, subtus concolore. Fn. succ. 605. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 165. mant. inf. 1. p. 99. n. 30. Degeer inf. 5. p. 248. n. 5. t. 7. f. 25. Curculio longirostris, antennis rectis nigris, &c. Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 2. Rhinomacer totus viridi-cæruleus. Frisch inf. 12. 17. t. 8. f. 2. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 5. Schæff. ic. t. 6. f. 4. Habitat in betula alba, & frequentissimus in vite, foliis contorquens, aliquando totus cæruleus, alterius sexus thorace antrorsum spinoso.*

populi. 40. *C. corpore viridi-ignito, subtus atro-cærulescente. Fn. succ. 606. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 24. Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 31.*

*Degeer inf. 5. p. 249. n. 37. Curculio longirostris, antennis rectis nigris, &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 3. Rhinomacer virid-auratus, subtus nigro-violaceus.*

*Habitat in betula, populo, alterius sexus thorace antrorsum spinoso.*

bicolor. 157. *C. niger, thorace elytrisque rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 25. mant. inf. 1. p. 99. n. 32.*

*Habitat in America.*

ceruleo- 158. *C. violaceus nitens, thorace elytrisque testaceis. cephalus. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 282. Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 33.*

*Habitat in Saxoniae cratægo, statura bicoloris.*

flavus. 159. *C. ovatus niger flavo irroratus. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 280.*

*Habitat Halæ Saxonum gregarius in urticis, c. jaceæ affinis, c. pini magis ovatus.*

parifinus. 160. *C. elytris thoraceque viridibus, rostro pedibusque nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 16. n. 27.*

*Habitat Lutetiis Parisiorum, pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.*

cylindroides. 161. *C. elongatus flavo irroratus, elytris punctato-striatis apice obtusiusculis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 1.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, paraplectico affinis.*

porifer. 162. *C. thorace subgloboso: spinulis brevioribus trifariis apice pertusis, elytrisque nigricantibus albo lineatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 2.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, subtus cinereo-pubescent.*

caffer. 163. *C. ater, thorace scabro, antennis utrinque cicatrice notato, elytris punctato-striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 39. n. 3.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, subtus griseo-pubescent, antennarum clava sericeo-argentea.*

armillatus. 164. *C. thorace utrinque subspinoso, femoribus ad apicem cingulo griseo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 40. n. 10.*

α) Curculio totus ex fusco cinereus.

β) Curculio elytris cinereo-nebulosis : maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

ulicis. 165. C. cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus & femoribus primi paris rufis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 31. n. 31.*

*Habitat in Anglia, in floribus ulicis europæi, primo vere conspicuus, vix pediculi magnitudine.*

latus. 166. C. ater depressus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transversa, elytris fulcatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 71. n. 21. t. 24. f. 9.*

*Habitat in Hungaria, c. Ascanii affinis.*

rumicis. 60. C. griseus nigro-nebulosus, antennis fuscis. *F. suec. 590. Fabr. sp. inf. 1. p. 170. n. 55. mant. inf. 1. p. 103. n. 73.*

*Degeer inf. 5. p. 231. n. 20. t. 7. f. 10. 11.*

*Raj. inf. 85. n. 36.*

*Habitat in Europæ rumice.*

ungaricus. 167. C. niger, thorace elytrisque purpureis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 71. n. 22. t. 24. f. 10.*

*Habitat in Hungaria, statura & magnitudine bacchi.*

cyanoccephalus. 168. C. niger villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris subspadiceis punctato-striatis, femoribus virecentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 72. n. 23. t. 24. f. 11.*

*Habitat frequens in Marchiæ betula, 2 lineas longus.*

striatus. 169. C. cinereo-pubescent, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 72. n. 25. t. 24. f. 13.*

*Habitat Berolini, rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.*

canus. 170. C. subglobosus cinereo-pubescent, elytris abbreviatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 73. n. 26. t. 24. f. 14. e.*

*Habitat Berolini.*

cruciger. 171. C. nigerrimus, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo maculatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 73. n. 27. t. 24. f. 15.*

*Habitat Berolini, 2 circiter lineas longus.*

172. C.

- Grus. 172. *C. niger*, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato striatis scabris, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 73. n. 28.*  
*Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus.*
- alandæ. 173. *C. cinereus*, subglobosus thoracis dorso fascia transversa maculisque nigris: pedibus fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*  
*Habitat in Pomerania.*
- urtica-  
rins. 174. *C. fuscus*: fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 74. n. 30.*  
*Habitat in Pomerania, vix pulicis magnitudine.*
- Punctum  
album. 175. *C. nigerrimus*, subtus & ad latera ochroleuco itroratus, antennis fulvis, elytrorum sutura puncto medio albo. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.*  
*Habitat in nymphææ luteæ floribus, magnitudine & structura c. jerosolitarie.*
- albovittatus. 176. *C. flavo-cinereus*, elytris vitta utrinque alba, rostris nigro. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 74. n. 32.*  
*Habitat in Marchia.*
- Lineola  
alba. 177. *C. convexus piceus*, elytris striatis albo villosis: suturæ linea alba abbreviata. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 74. n. 33.*  
*Habitat in Marchia, pulicis magnitudine.*
- versicolor. 178. *C. piceus albido-pubescent*, rostris nigro. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 75. n. 34.*  
*Habitat in Marchia, statura & magnitudine granari.*
- melas. 179. *C. angustus nigerrimus*, tenuissime punctatus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 166. n. 94.*  
*Habitat in Austria, vix sesquilineam longus.*
- rosarum. 180. *C. subglobosus niger albido-pubescent*, elytris striatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 167. n. 97.*  
*Habitat Berolini, sesquilineam longus.*
- quadri-  
punctatus. 181. *C. griseus*, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis. *Lepechin ii. 2. p. 204. t. 11. f. 23.*  
*Habitat in Russia australi.*

- varius. 182. *C. albo nigroque varius*, elytris apice acuminatis.  
*Lepech. it. 2. p. 204. t. 11. f. 33.*  
*Habitat in Russia australi.*
- piceus. 183. *C. piceus*, elytris abdomen æquantibus. *Pall. it. 1. app. n. 34. inf. mus. 1. p. 23. t. B. f. 3.*  
*Habitat in muria lacus Inderienfis, c. palmarum affinis, at quadruplo minor.*
- nomas. 184. *C. oblongus*, subtus albo-tomentosus, elytris canescentibus: striis punctato-sulcatis. *Pall. it. 1. app. n. 31.*  
*Habitat in Sibiria.*
- picatus. 185. *C. oblongus ex nigro piceus*, antennis fuscis. *Degeer inf. 5. p. 221. n. 14.*  
*Habitat - - - 4½ lineas longus.*
- gibbosus. 186. *C. ovatus niger*, elytris tuberculatis, posterius cinereis. *Degeer inf. 5. p. 224. n. 17.*  
*Habitat - - - 2½ lineas longus.*
- castaneus. 187. *C. oblongus castaneus*, subtus niger, elytris striato-punctatis gibbosis. *Degeer inf. 5. p. 231. n. 19.*  
*Habitat - - - 3½ lineas longus.*
- fasciatus. 188. *C. cinereus oblongus*, fasciis longitudinalibus dilutioribus. *Fn. succ. ed. 2. n. 2274. Degeer inf. 5. p. 234. n. 21.*  
*Habitat - - -*
- nævius. 189. *C. ovatus griseus*, thorace fasciis, elytris macula magna punctisque fuscis. *Degeer inf. 5. p. 237. n. 24. t. 7. f. 17. 18.*  
*Habitat in plantagine, Julii sine frequens.*
- rostratus. 190. *C. oblongus rufus*, capite elytrisque viridi-cæruleis nitidis. *Degeer inf. 5. p. 252. n. 42. t. 7. f. 27. 28.*  
*Habitat in Sueciæ hortis.*
- melanocephalus. 191. *C. subglobosus fuscus*, capite rostroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inf. 5. p. 272. n. 6. t. 15. f. 27.*  
*Habitat Surinami, 4. lineas longus.*
- frugilegus. 192. *C. oblongus castaneus coleoptris thoracem æquantibus: maculis quatuor rufis. Degeer inf. 5. p. 273. n. 7.*  
*Habitat Surinami & in Oriente, parvus, fruges consumens.*



- pulveru- 193. *C. fuscus*, thorace granulato, elytris transversim  
lentus. rugosis. *Scop. ent. carn. n. 75*.  
*Habitat in Carniola.*
- centau- 194. *C. ovatus fuscus subrufo-villosus*, rostro deflexo margi-  
reæ. nato : linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn.*  
*n. 76.*  
*Habitat in centaureis.*
- auratus. 195. *C. viridi-auratus*, antennis rostrique apice dilatato  
nigris. *Scop. ent. carn. n. 77.*  
*Habitat in Carniola.*
- icosan- 196. *C. atro-cæruleus*, rostro porrecto, elytris octo-striatis,  
driæ. *Scop. ent. carn. n. 87.*  
*Habitat in plantis icosandris.*
- oleraceus. 197. *C. globosus nigricans*, elytris puncto lunulaque  
apicis albis. *Scop. ent. carn. n. 88.*  
*Habitat in Carniola.*
- pellucens. 198. *C. flavicans*, oculis rostrique apice nigris. *Scop. ann.*  
*list. nat. 5. p. 90. n. 41.*  
*Habitat circa Schemnitz Hungariæ, vix 2 lineas longus.*
- gibbus. 199. *C. ovatus niger*, elytris violaceis fulcatis. *Müll. zool.*  
*dan. prodr. p. 90. n. 1014.*  
*Habitat in Dania.*
- similis. 200. *C. ater*, elytris ovatis punctato-striatis. *Müll. zool. dan,*  
*prodr. p. 90. n. 1015.*  
*Habitat in Dania.*
- nemora- 201. *C. niger*, oculis fuscis, elytris punctato-striatis. *Müll.*  
lis. *zool. dan. prodr. p. 90. n. 1016.*  
*Habitat in Daniæ nemoribus.*
- politus. 202. *C. niger*, elytris cyaneis striatis nitidis. *Müll. zool.*  
*dan. prodr. p. 90. n. 1017.*  
*Habitat in Dania.*
- ochropus. 203. *C. niger ovatus*, femoribus ex flavo rufis. *Müll. zool.*  
*dan. prodr. p. 90. n. 1018.*  
*Ad. Nidros. 4. 15.*  
*Habitat in Scandinavia.*
- griseus. 204. *C. oblongus cinereus*, antennis rufis. *Müll. zool. dan.*  
*prodr. p. 88. n. 974.*  
*Habitat in Dania.*



- nitens. 205. *C. oblongus* ex nigro violaceus, thorace elytrisque ex nigro virentibus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 88. n. 975.  
*Habitat in Dania.*
- arvensis. 206. *C. griseus*, thorace trilineato, elytris rufis obscure tessellatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 88. n. 978.  
*Habitat in Dania.*
- tubercu- 207. *C. niger*, thorace rugoso, elytris lineis tuberculisque  
latus. muricatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 88. 989.  
*Habitat in Dania.*
- glaucus. 208. *C. niger*, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis.  
Müll. *prodr. zool. dan.* p. 88. n. 989.  
*Habitat in Dania.*
- trifolii. 209. *C. niger*, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syst. nat.*  
XII. 3. add. p. 224.  
*Habitat in trifolii montani spicis, intra quas declaratur, pulicis magnitudine.*
- longus. 210. *C. angustus elongatus niger*, thorace fasciis quatuor  
albicantibus. Geoffr. *ins. par.* I. p. 269. n. 1.  
*Habitat in Gallia.*
- fuligino- 211. *C. ex atro fuscus glaber punctato-striatus.* Geoffr. *ins.*  
fus. *par.* I. p. 271. n. 6.  
*Habitat in Gallia.*
- teres. 212. *C. ex nigro viridescens oblongus striatus.* Geoffr. *ins.*  
*par.* I. p. 272. n. 7.  
*Habitat in Gallia.*
- Pulex. 213. *C. subglobosus villosus niger*, pedibus elytrisque rufis.  
Geoffr. *ins. par.* I. p. 272. n. 9.  
*Habitat in Gallia.*
- rugosus. 214. *C. totus fuscus rugosus.* Geoffr. *ins. par.* I. p. 278. n. 2.  
*Habitat in Gallia.*
- fulcatus. 215. *C. fusco-nebulosus*, thorace fulcato, elytris striatis.  
Geoffr. *ins. par.* I. p. 278. n. 3.  
*Habitat in Gallia.*
- carduelis. 216. *C. niger striatus*, maculis villoso-fuscis nebulosis.  
Geoffr. *ins. par.* I. p. 281. n. 8.  
*Habitat in Gallia carduis.*

- napo- 217. *C. ex atro cinereus*, capite globoso, rostro elytrisque  
brassicæ. nigris, antennis fuscis. *Bierkander nov. aſ. Stochk.*  
1780. 3. n. 4. p. 185.  
*Habitat in napobrassicæ caulibus, quos exedit, lineam lon-*  
*gus, an hujus ordinis?*
- erythro- 560. *C. griseus*, elytris striatis, rostro pedibusque nigris, ti-  
pus. biis apice incurvis plantisque rubris. *Mus. Lesk. p. 18.*  
*n. 385.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybeus. 561. *C. glaber nigro-cærulescens*, rostro arcuato, thorace  
punctato, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 388.*  
*Habitat in Europa.*
- crenula- 562. *C. niger glaber*, rostro longitudine corporis, elytris  
tus. striatis: striis profunde crenatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 390.*  
*Habitat - - -*
- foveola- 563. *C. viridi-aureus*, rostro pedibusque nigris, abdomine  
tus. violaceo elytris profunde punctatis, antennis inter ocu-  
losque fovea oblonga. *Mus. Lesk. p. 19. n. 391.*  
*Habitat in Europa.*
- virens. 564. *C. cylindricus viridis nitens*, rostro pedibusque cupreis.  
*Mus. Lesk. p. 19. n. 392.*  
*Habitat in Europa.*
- crassicor- 565. *C. niger*, rostro compresso, antennis non fractis apice  
nis. crassioribus, thorace elytrisque levissime punctatis. *Mus.*  
*Lesk. p. 19. n. 393.*  
*Habitat in Europa.*
- glabratus. 566. *C. niger glaber*, elytris nigro-æneis striatis. *Mus. Lesk.*  
*p. 19. n. 398.*  
*Habitat in Europa, statura c. alliarum.*
- atoma- 567. *C. fuscus*, elytris striatis: atomis griseis pilosis. *Mus.*  
rius. *Lesk. p. 19. n. 399.*  
*Habitat in Europa.*
- striatulus. 568. *C. niger*, elytris sulcatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 400.*  
*Habitat in Europa, statura acerrimi.*
- rugosus. 569. *C. fuscus*, elytris rugosis, tibis ferrugineis. *Mus. Lesk.*  
*p. 19. n. 405.*  
*Habitat in Europa.*

crinitus. 570. *C. niger* globosus griseo pilosus, rostro glabro incurvo, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 407.*  
*Habitat in Europa.*

hæruato- 571. *C. niger*, thorace punctato, elytris striis crenatis, antennis tibiisque sanguineis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 417.*  
 pus. *Habitat in Europa.*

†† femoribus posterioribus incrassatis, saltatorii.

quercus. 25. *C. pallide flavus*, oculis nigris. *Fn. succ. 596.\* Uddm. diff. 25.*

*Fabr. sp. inf. I. p. 184. n. 126. mant. inf. I. p. 110. n. 155.*

*Curculio (viminalis) longirostris*, femoribus saltatoriis, corpore testaceo.

*Degeer inf. 5. p. 260. n. 48. t. 8. f. 5. Curculio ulmi.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 286. n. 19. Curculio rufus.*

*Reaumur inf. 3. 31. t. 3. f. 17. 18.*

*Habitat in Europæ salicis, ulmi, quercus foliis, inter venas majores subcutaneus, folia maculans, magnitudine pediculi.*

multiden- 572. *C. rufus*, oculis nigris, pedibus posterioribus multi-  
 tatus. dentatis. *Mus. Lesk. p. 20. n. 441.*

meticulo- 218. *C. griseo-fuscus*, subtus elytrisque posterius albidus  
 fus. villosus, rostro inflexo nigro. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 8.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

pudicus. 219. *C. pallide griseus*, rostro inflexo sanguineo, capite pedibusque rubicundis, elytris striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 9.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

ilicis. 220. *C. nigricans*, elytris striatis cinereo-variis. *Fabr. mant. inf. I. p. 110. n. 156.*

*Habitat in Uplandiæ quercu, parvus, statura c. quercus.*

Iota. 221. *C. ater*, elytris striatis, suturâ basi alba. *Fabr. mant. inf. I. p. 110. n. 157.*

*Habitat in Uplandiâ, parvus.*

alati. 42. *C. niger*, elytris testaceis: maculis duabus obscuris. *Fr. succ. 608.\* Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 123. mant. inf. I. p. 110. n. 151.*

*Fn. suec.* 1. n. 473. *Curculio lividus*, coleoptris maculis quatuor obscuris.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 286. n. 20. *Curculio rufus*.

*Degeer inf.* 5. p. 262. n. 49. *Curculio alni saltator*.

*Habitat in Europæ alno.*

*pilosus.* 222. *C. niger*, cinereo variegatus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 183.

n. 124. *mant. inf.* 1. p. 110. n. 152.

*Habitat in Anglia, parvus.*

*Calcar.* 223. *C. niger*, femoribus unidentatis, antennis plantisque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 110. n. 153.

*Habitat in Kilonii, parvus.*

*falicis.* 43. *C. elytris atris*: fasciis duabus albis. *Fn. suec.* 610.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 183. n. 125. *mant. inf.* 1. p. 110. n. 154.

*Degeer inf.* 5. p. 264. n. 51.

*Habitat in falicis floribus.*

*fagi.* 44. *C. corpore atro*, femoribus pallidis. *Fn. suec.* 609. *It.*

*scan.* 111. *Scop. ent. carn.* 73. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 184.

n. 127. *mant. inf.* 1. p. 110. n. 158.

*Habitat in fagi silvaticæ foliis.*

*segetis.* 45. *C. corpore piceo*, elytris oblongis. *Fn. suec.* 611.

*Habitat in agris super spicas.*

*rhei.* 279. *C. ater opacus*, thorace subpunctato, elytris punctato-striatis, subtus albido-pubescentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 78. n. 50.

*Habitat Berolini, sine rostro 3 lineas longus.*

*thamni.* 280. *C. ater opacus*, rostro nitido, thorace grundato, elytris subfulcatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 78. n. 51.

*Habitat in Marchia, absque rostro 4 lineas longus, c. rhei similis.*

*curvirostris.* 282. *C. nigricans albido-pubescentis*, thorace punctato, elytris striatis, rostro incurvo, antennarum clavis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 78. n. 53.

*Habitat in Marchia, 1½ lineam longus.*

*Vanellus.* 283. *C. capite thoraceque subvillosa brevibus elytris striatis*, pedibus fuscescentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 79. n. 55. t. 24. f. 23. 1.

*Habitat Berolini, vix lineam superans.*

X x x x x 4.

- arator. 284. *C. subovatus*, thorace fusco: lineis tribus pallidis, elytrorum sutura nigro dentata, pedibus fuscis. *Mant. p. 53<sup>l</sup>*.  
*Habitat - - - cinicis magnitudine.*
- maricatus. 285. *C. ex fusco nigricans*, elytris verrucoso-striatis, femoribus unidentatis. *Drury inf. 2. t. 34. f. 4.*
- varicosus. 454. *C. elytris connatis fulcatis supra sextubereulatis, posterioribus bimucronatis. Pall. inf. Russ. I. p. 22. t. B. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali, inter maximos congenerum, vaginali affinis, ater.*
- rhynchoseros. 455. *C. elytris connatis tuberculatis mucronatis, rostro basi bicorni. Pall. inf. Russ. I. p. 23. t. B. f. 2.*  
*Habitat in America, varicoso paulo brevior & latior.*
- exesus. 456. *C. corpore nigro lutescente irrorato, thorace elytrisque maculis exetis albis. Pall. inf. Russ. I. p. 33. t. H. f. B. 15.*  
*Habitat Surinami, germano affinis, at major.*
- danubialis. 478. *C. elytris cervinis: punctis nigris sparsis.*  
*Habitat in insulis danubialibus Viennensibus in corticibus arborum, 2 lineas longus.*
- +++ femoribus dentatis.
- aterrimus. 10. *C. ater*, elytris nitidis. *Fn. suec. 582.\* Fabr. sp. inf. I. p. 179. n. 103. mant. inf. I. p. 108. n. 132.*  
*Habitat in Europæ plantis frequentissimus, statura & magnitudine ocelliaræ.*
- cerasæ. 11. *C. ater*, elytris opacis oblongis. *Fn. suec. 583. Scop. ent. carn. 84. Fabr. sp. inf. I. p. 179. n. 104. mant. inf. I. p. 108. n. 133.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 299. n. 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.*  
*Frisch inf. II. 31. t. 23. f. 1. 3.*  
*Habitat in cerasi pyrique foliis, epidermidem exedens, commaculans, 1750 in Suecia frequentissimus.*
- beccabunga. 41. *C. niger*, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inf. I. p. 108. n. 130.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 614. n. 41. Fn. suec. 607.\* Curculio fuscus, elytris subsanguineis: margine anoque fuscis?*  
*Habitat in Sueciæ beccabunga, magnitudine & statura cerasi.*

- Troglo-  
dytes. 224. *C. thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testa-*  
*ceis, pedibus fuscis. Fabr. mant. inf. 1. p. 108. n. 131.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- lapathi. 20. *C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis.*  
*Fn. suec. 591.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 176. n. 86. mant.*  
*inf. 1. p. 106. n. 109.*  
*Degeer inf. 5. p. 223. n. 16. t. 7. f. 1. 2. Curculio albi-*  
*caudis.*  
*Habitat in Europæ salicibus & rumicibus, pectoris lateribus*  
*elytrisque posterius albidis.*
- irrorat-  
tus. 225. *C. albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco an-*  
*nulatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 106. n. 110.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine c. lapathi.*
- sextigutta-  
tus. 226. *C. niger, elytris maculis tribus albis. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 176. n. 87. mant. inf. 1. p. 106. n. 111.*  
*Habitat in America.*
- luridus. 227. *C. ovatus obscure niger, elytris punctato-striatis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 176. n. 83. mant. inf. 1. p. 106. n. 112.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- flolidus. 228. *C. fuscus, tibiis posterioribus incurvis dentatis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 176. n. 89. mant. inf. 1. p. 106. n. 113.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*
- medita-  
bundus. 229. *C. elytris striatis, posterius acuminatis. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 176. n. 90. mant. inf. 1. p. 106. n. 114.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- stupidus. 230. *C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 177. n. 91. mant. inf. 1. p. 107. n. 115.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- mangife-  
ræ. 231. *C. griseus thorace linea punctisque duobus dorsalibus*  
*albis. Fabr. sp. inf. 177. n. 92. mant. inf. 1. p. 107.*  
*n. 116.*  
*Habitat in mangiferæ nucleis.*
- stultus. 232. *C. griseus, elytris macula communi lunata cinerea,*  
*rostri atro. Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 117.*  
*Habitat in Coronandel, c. mangiferæ minor.*



- isqualidus*. 233. *C. villosus-griseus*, rostro testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 177. n. 93. *mant. inf.* 1. p. 107. n. 118.  
*Habitat* Surinami, *mediæ magnitudinis*.
- pomorum*. 46. *C. femoribus anterioribus dentatis*, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec.* 612.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 181. n. 115.  
*mant. inf.* 1. p. 109. n. 145.  
*Frisch inf.* 1. p. 32. t. 8. *Curculio in floribus arborum*.  
*Habitat in pomorum floribus*.
- ovalis*. 47. *C. corpore ovato nigro albo maculato*. *Fn. suec.* 613.  
*Habitat in Europa*.
- carbonarius*. 48. *C. corpore nigro oblongo*, elytris striatis. *Fn. suec.* 614.  
*Scop. ent. carn.* 29.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 27. n. 47. t. 24. f. 26.  
*Habitat in Europa*. Solander.
- muco-reus*. 49. *C. femoribus quatuor anterioribus dentatis*, elytris poliline flavescens, supra apicem gibbosis. *Mus. Lud. Ulr.* 53.\* *Gron. mus.* 589.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 173. n. 74.  
*mant. inf.* 1. p. 104. n. 92.  
*Habitat in America australi & India*.
- jamaicensis*. 234. *C. obscurus scaber*, thorace utrinque fasciculato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 173. n. 73.  
*mant. inf.* 1. p. 104. n. 91.  
*Habitat in America meridionali, magnus*.
- bidens*. 235. *C. niger*, femoribus posterioribus dentatis, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 173. n. 72. *mant. inf.* 1. p. 104. n. 90.  
*Habitat in nova Seelandia*.
- pufio*. 50. *C. femoribus quatuor posterioribus dentatis*, elytris striatis nigris: linea repanda grisea. *Mus. Lud. Ulr.* 46.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 75. *mant. inf.* 1. p. 104. n. 93.  
*Habitat in America australi & India*, elytrorum linea longitudinali.
- vagina-lis*. 51. *C. elytris striatis: tuberculis sparsis*, juxta apicem mucronatis. *Mus. Lud. Ulr.* 47.\*  
*Habitat in America & Sibiria*.  
*Pro rostro fossula in thorace; elytrorum striæ ex punctis cavis villosis*.

- spinipes*. 236. *C. niger*, thorace lineis duabus, elytris fuscis quatuor albis, tibiis anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 76. *mant. inf.* 1. p. 104. n. 94.  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, magnus.*
- Bombina*. 237. *C. ferrugineo-fuscus*, elytris striatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 104. n. 95.  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- Scorpio*. 238. *C. ater*, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 105. n. 96.  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- Scaber*. 239. *C. thorace carinato*, elytris fulcatis tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 77. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 97.  
*Habitat in Cayenna.*
- trifasciatus*. 240. *C. thorace lineae laterali*, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 105. n. 98.  
*Habitat in Cayenna, testaceus c. abietis paulo major.*
- cylindricostis*. 241. *C. thorace scabro*, elytris posterius bituberculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 78. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 99.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- stigma*. 52. *C. elytris macula magna ferruginea*. *Mus. Lud. Utr.* 48.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 79. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 100.  
*Habitat in America australi & India.*
- hebes*. 242. *C. femoribus subdentatis*, thorace scabro, elytris fulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 80. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 101.  
*Habitat ad fluvium Senegal, mediae magnitudinis.*
- depressus*. 53. *C. thorace depresso*, lateribus obtuse angulatis. *Mus. Lud. Utr.* 49.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 181. n. 114. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 144.  
*Seb. mus.* 4. t. 95. f. 4.  
*Habitat in America meridionali, griseus: punctis nigris glabris prominulis.*
- annulatus*. 54. *C. pallidus*, thorace elytrisque strigis nigris. *Mus. Lud. Utr.* 51.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 175. n. 81. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 102.

*Habitat in America australi & India, thoracis striga  
elytrorum duabus.*

caligino- 243. *C. elytrorum striis punctatis approximatis. Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 82. mant. inf. I. p. 105. n. 103.*  
fus.  
*Habitat in Anglia, rarior.*

dubius. 244. *C. niger, thorace lævi, elytris striatis scabris. Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 104.*  
*Habitat - - - magnus.*

adsperfus. 245. *C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 105.*  
*Habitat in Cayenna, magnitudine & statura c. cynaræ.*

brunneus. 246. *C. brunneus, rostro fusco, elytris testaceis punctatis striatis. Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 83. mant. inf. I. p. 106. n. 106.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus.*

abietis. 57. *C. elytris fuscis : fasciis duabus linearibus interruptis  
bidis. Fn. suec. 615.\* Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 82.  
mant. inf. I. p. 106. n. 107.*  
*It. ocl. 26. Curculio subfuscus.*  
*Pet. gazoph. 14. c. 8. f. 9. Curculio norwegicus.*  
*Degeer inf. 5. p. 205. n. 1. t. 6. f. 11.*  
*Schaeff. ic. t. 25. f. 1.*  
*Habitat in pinis sylvestris cortice & resina ; an alter  
c. pini ?*

reticula- 247. *C. oblongus piceus, elytris reticulatis : fasciis obli-  
tus. pallidis, tibiis anterioribus spinosis. Fabr. sp. inf. I. p. 176. n. 85. mant. inf. I. p. 106. n. 108.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

gern- 58. *C. ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis. Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 94. mant. inf. I. p. 107. n. 109.*  
na-  
tus. *Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 58. Curculio longirostris, ely-  
moribus subdentatis, corpore ovato nigro, punctis  
taceis adperso.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 91. n. 44.*  
*Sulz. hist. inf. 39. t. 4. f. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 25. f. 2.*  
*Frisch inf. 13. p. 28. t. 26.*  
*Habitat in Europa, frequens in Germania, inter maxime  
europæos.*

- nucum. 59. C. corpore griseo longitudine rostri. *Fn. suec.* 616. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 179. n. 156. *mant. inf.* 1. p. 108. n. 135. *Uddm. diff.* 24. Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 295. n. 42.  
*Degeer inf.* 5. p. 205. n. 2. t. 6. f. 14-16.  
*Roes. inf.* 3. t. 67. f. 5. 6.  
*Scop. ent. carn.* 105.  
*Poda inf.* t. 1. f. 3.  
*Schaeff. el.* t. 55. f. 1.  
     *ic.* t. 50. f. 4.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 22.  
*Habitat in coryli avellanæ nucibus frequens.*
- Proboscideus. 248. C. griseus, rostro corpore duplo longiore. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 107. *mant. inf.* 1. p. 108. n. 136.  
*Habitat in America boreali, an varietas c. nucum?*
- varians. 249. C. griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 108. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 137.  
*Habitat in Cayenna.*
- cerasorum. 250. C. fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsoletis cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 109. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 138.  
*Habitat in Anglia, c. nucum triplo minor.*
- amœnus. 251. C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 110. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 139.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- bicornis. 252. C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 111. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 140.  
*Habitat in nova Seelandia, ex fusco & cinereo varius.*
- tennirostris. 253. C. niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 112. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 141.  
*Habitat in Anglia, statura c. cerasorum, at minor.*
- scrophulariæ. 61. C. coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. *Fn. suec.* 603. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 177. n. 95. *mant. inf.* 1. p. 107. n. 120.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 296. n. 44.  
*Degeer, inf.* 5. p. 208. n. 3. t. 6. f. 17-20.

*List. scar. angl. p. 395. n. 35.*

*Reaumur inf. 3. t. 2. f. 12.*

*Habitat in scrophulariis, quarum pericarpia exedit larva folliculos ovatos, operculatos, fuscis substituens.*

verbasci. 254. *C. niger, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 121.*

*Habitat Kilonii, an varietas c. scrophulariæ ?*

gravis. 255. *C. niger, elytris ferrugineo-variis, femoribus cancellulatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 96. mant. inf. 1. p. 107. n. 122.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

druparum. 62. *C. elytris testaceis, obsolete fasciatis. Fn. succ. 617. Fabr. sp. inf. 1. p. 181. n. 113. mant. inf. 1. p. 107. n. 142.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 296. n. 43.*

*Degeer inf. 5. p. 214. n. 7.*

*Schaeff. ic. t. 1. f. 11.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 21.*

*Habitat in cerasi padi nucleis.*

fraxini. 256. *C. fuscus, femoribus ferrugineis, capite dorsoque nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 109. n. 143.*

*Habitat in Sueciæ fraxino, magnitudine c. druparum.*

violaceus. 63. *C. totus violaceus. Fn. succ. 579. Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 105. mant. inf. 1. p. 108. n. 134.*

*Degeer inf. 5. p. 213. n. 5.*

*Bergstr. nomencl. 1. 16. 13. t. 2. f. 13.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 271. n. 5.*

*Habitat in Europæ pinetis, frequens in turionibus.*

quinque-punctatus. 64. *C. elytris sutura maculisque duabus albis. Fn. succ. 618. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 97. mant. inf. 1. p. 107. n. 123. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 75. n. 40. t. 24. f. 18. g.*

*Habitat in Europa boreali.*

guttula. 257. *C. niger, thorace tuberculato, elytris striatis: punctis posteriore albo. Fabr. mant. inf. 1. 1. p. 107. n. 124.*

*Habitat Halæ Saxonum, parvus.*

didymus. 258. *C. supra fuscus, elytris striatis: macula laterali transversa alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 98. mant. inf. 1. p. 108. n. 125.*

*Habitat in Germania, parvus.*

INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 1769

- hamor-  
rhoidalis. 259. *C. thorace fusco : lateribus cinerascens, elytrorum sutura apice ferruginea. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 99. mant. inf. 1. p. 108. n. 126.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- trimacu-  
latus. 260. *C. coleoptris nigris : maculis tribus cinereis ; posteriore communi lunata. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 100. mant. inf. 1. p. 108. n. 127.*  
*Habitat in Alsatia & Suecia. Hermann & Paikal.*
- Litura. 261. *C. albo nigroque varius , rostro vario. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 101. mant. inf. 1. p. 108. n. 128.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 262. *C. villosus griseus , scutello fasciaque elytrorum posteriore albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 102. mant. inf. 1. p. 108. n. 129. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 76. n. 41. t. 24. f. 19.*  
*Habitat in Germania.*
- hispidus. 65. *C. corpore fulcato , adperso squamis erectis. Fn. succ. 619.\**  
*Habitat in Europa.*
- pedicula-  
rius. 66. *C. corpore rubro , elytris albido subfasciatis. Fn. succ. 620.\**  
*Habitat in Europa.*
- Tortrix. 67. *C. corpore testaceo , pectore fusco. Fn. succ. 622.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 181. n. 116. mant. inf. 1. p. 109. n. 146. Geoffr. inf. par. 1. p. 300. n. 51. Degeer inf. 5. p. 214. n. 16.*  
*Habitat in populo tremula , folia contorquens.*
- tremulæ. 263. *C. nigricans, elytris striatis griseo irroratis. Fabr. mant. inf. 1. p. 109. n. 147.*  
*Habitat in Sueciæ populo , statura & magnitudine tortricis.*
- taeniatus. 264. *C. thorace nigro : margine anteriore & posteriore rufis, elytris pallidis nigro maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 181. n. 118. mant. inf. 1. p. 109. n. 148.*  
*Habitat in Anglia , tortrice minor.*
- quadri-  
pustulatus. 265. *C. niger , elytris maculis duabus ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 183. n. 121. mant. inf. 1. p. 109. n. 149.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei , statura brenti disparis.*



- elongatus. 266. *C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 122. mant. inf. I. p. 110. n. 150. Habitat in Jamaica.*
- byrrhinus. 267. *C. thorace elytrisque nigris margine ferrugineis pectore utrinque niveo. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 4. Habitat ad Caput bonæ spei, ater, ovatus.*
- strigifrons. 268. *C. thorace granulato, elytris punctato-striatis, rostro longitudinaliter utrinque sulcato. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 9. Habitat ad Caput bonæ spei, nunc totus nigricans, nunc, præter caput & thoracem, spadiceus.*
- laniger. 269. *C. elytris cicatrifato-reticulatis: posterius maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 6. Habitat ad Caput bonæ spei, supra niger, subtus rubicundo-lanuginosus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griseis.*
- tibialis. 270. *C. niger cinereo-nebulosus oblongus, thorace subgloboso, elytris striatis, rostro inflexo canali pectoris immerso, tibiis anterioribus intus barbatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 7. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- glyphicus. 271. *C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. Schall. Abh. der. hall. Gef. Naturf. Fr. I. p. 282. Habitat Halæ Saxonum, statura c. nucum, sed minor.*
- capucinus. 272. *C. elytris griseo-nebulosis, maculis posterius ad futuram oblongis punctisque binis albidis. Schall. Abh. der. hall. Naturf. Gef. I. p. 283. Habitat Halæ Saxonum, magnitudine fere nebulosi, et magis ovatus.*
- Forsteri. 273. *C. manibus longissimis. Forst. nov. inf. spec. I. p. 32. n. 32. Habitat in Anglia, oblongus, magnitudine c. pomorum, piceus, pilis cinereis tomentosus, antennis tarsisque tuis, elytris cinereis nigro-punctatis.*
274. *C.*

- pollinari- 274. *C. elytris depressis planis abbreviatis, ventre, elytrorum*  
cus. *marginē & pedibus polline aspersis. Forst. nov. inf. sp.*  
*1. p. 33. n. 33.*  
*Habitat in Angliæ plantis variis; præsertim urtica dioica,*  
*supra planus fuscus.*
- cinnamo- 275. *C. cinnamomeus, rostro antèrùs canaliculato ad mar-*  
mi. *ginem denticulato: apice erecto mucronato bifurco;*  
*posterius gibbo granulato. Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*5. p. 76. n. 45. t. 24. f. 20. h. i.*  
*Habitat in India, 10 lineas longus; elytris punctato-striatis:*  
*macula punctisque aurantilis; an brenti species?*
- affinis. 276. *C. niger, elytris cæruleis punctato-striatis. Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 5. p. 77. n. 48.*  
*Habitat Berolini, carbonarii statura & magnitudine.*
- glaber. 277. *C. ater nitidus, subtus punctatus. Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf. 5. p. 78. n. 49.*  
*Habitat Berolini, 2 fere lineas longus.*
- denigra- 278. *C. ater, thorace punctato, elytris punctato-striatis apice*  
tus. *subtus rubicundis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 78.*  
*n. 52.*  
*Habitat in Marchia, sine rostro lineam longus, aterrimo*  
*affinis.*
- cardui. 281. *C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato;*  
*elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto scutelloque*  
*flavis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 79. n. 54. t.*  
*24. f. 22. k.*  
*Habitat Berolini in carduis.*
- ireos. 286. *C. totus candidus. Pall. it. 2. app. n. 57:*  
*Habitat in Sibiria iride, c. scrophularia triplo major:*
- crucifer. 287. *C. fuscus, subtus ex flavo cinereus nitenti-tomentosus;*  
*elytris ad futuram cruce notatis. Pall. it. 1. app. n. 37:*  
*Habitat in Sibiria, c. scrophularia magnitudine.*
- albicans. 288. *C. thorace tuberculis quinque, elytris sex, ano albo*  
*Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 6.*  
*Habitat in Russia.*
- urticae. 289. *C. niger planiusculus, thorace utrinque dentato, elytris*  
*striatis posterius bipunctatis. Müll. zoöl. dan. præf.*  
*p. 88. n. 983.*  
*Habitat in urticis.*

- rufus. 290. *C. subglobosus rufus*, elytrorum lineis elevatis albo nigroque tessellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 89. n. 998.*  
*Habitat in Dania, c. scrophulariæ affinis.*
- tuberculosus. 291. *C. niger*, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum seriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n. 80.*  
*Habitat in Carniola.*
- cariosus. 292. *C. oblongus*, rostro nitidulo, elytris striatis, femoribus anterioribus crassioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n. 81.*  
*Habitat in Carniola.*
- syngenesiæ. 293. *C. cervinus*, brevissime villosus, rostro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n. 82.*  
*Habitat in Carniolæ syngenesiis.*
- fuscus. 294. *C. fuscus*, scutello puncto albo, elytris macula rubescente notatis. *Gcoffr. inf. par. 1. p. 300. n. 50.*  
*Habitat in Gallia.*
- Geerii. 295. *C. subglobosus griseus*, coleoptris macula magna fusca dorsali. *Degeer inf. 5. p. 212. n. 4.*  
*Habitat in fraxino.*
- ulmi. 296. *C. oblongus ex rufo fuscus*, proboscide nigra, elytris macula nigricante.  
*Degeer inf. 5. p. 215. n. 8. t. 6. f. 26. 27.*  
*Habitat in ulmo.*
- pulverulentus. 297. *C. oblongus niger*, elytris cinereo maculatis.  
*Degeer inf. 5. p. 268. n. 3. t. 15. f. 24.*  
*Habitat Surinami.*
- frigidus. 548. *C. fuscus*, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis.  
*Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*  
*Habitat in Amboina, mediæ magnitudinis.*
- bohemos. 552. *C. elytris griseis punctatis*, antennis pedibusque rufis.  
*Mayer Abh. der boehm. Ges. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiæ pomariis, pulicis magnitudine, celerissime currens.*
- reticulatus. 573. *C. oblongus niger*, elytris profunde punctatis reticulatisque : rugis transverse levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 20. n. 423.*  
*Habitat in Europa.*

- subfascia- 574. *C. ferrugineus*, elytris fulvo obsolete fasciatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 426.*  
tus. *Habitat in Europa.*
- tricolor. 575. *C. testaceus*, capite, thorace pedibusque rufis, elytris fasciis duabus dentatis ferrugineis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 427.*  
*Habitat in Europa.*
- dentatus. 576. *C. rufus*, femoribus dente valido armatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 431.*  
*Habitat in Europa.*
- acutus. 577. *C. rufus*, elytris striatis, femoribus acute dentatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 432.*  
*Habitat in Europa, an satis distincta species?*
- cineraf- 578. *C. niger* subtus cinerascens, elytris striatis, rostro  
cens. longitudine corporis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 434.*  
*Habitat in Europa.*
- murica- 579. *C. subglobosus niger*, elytris sulcatis pilosis cinereis,  
tus. posterius muricatis, tibiis tarsisque rufis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 435.*  
*Habitat in Europa.*
- cinereus. 580. *C. subglobosus cinereus*, antennis pedibusque rufescentibus. *Musf. Lesk. p. 20. n. 436.*  
*Habitat in Europa.*
- bipuncta- 581. *C. subglobosus cinereus*, thorace griseo: anterieus  
tus. tuberculis quatuor, elytris striatis: singulorum disco punctis duobus griseis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 439.*  
*Habitat in Europa.*
- Daviesii. 601. *C. albido griseus*, elytris anterieus angulatis: macula magna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 13. t. 8. f. 5.*  
*Habitat in Noveboraco, c. nucum duplo fere major.*
- zonatus. 602. *C. niger*, thorace lateribus elytrisque fasciis tribus distinctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh. 1787. 8. n. 3. 14.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis, subovatus.*

\*\* *Brevirostres.*† *femoribus dentatis.*

- spectabi- 298. *C. corpore viridi nigroque variegato. Fabr. sp. inf. I.*  
 lis. *p. 197. n. 208. mant. inf. I. p. 121. n. 269.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- pinguis. 299. *C. gibbus nigricans, femoribus posterioribus muticis,*  
*thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis*  
*flavescentibus. Fabr. mant. inf. I. p. 121. n. 270.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- videns. 300. *C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emar-*  
*ginatis. Fabr. mant. inf. I. p. 122. n. 271.*  
*Habitat in nova Seelandia, magnus.*
- fusco-ma- 301. *C. ater, femoribus subdentatis, thorace elytrisque*  
 culatus. *lævibus fusco maculatis. Fabr. mant. inf. I. p. 122.*  
*n. 272.*  
*Habitat in Germania, magnus, lævis.*
- ligustici. 68. *C. abdomine subovato murino. Fn. succ. 621.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 209. mant. inf. I. p. 122. n.*  
*273. Curculio brevirostris femoribus dentatis, cor-*  
*pore obscuro.*  
*Degeer inf. 5. p. 218. n. 10. Curculio apterus anten-*  
*nis fractis, &c.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 12.*  
*Bonsd. curc. Suec. 2. f. 33.*  
*Habitat in ligustico levistico.*
- nubilus. 302. *C. griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 210. mant. inf. I. p. 122.*  
*n. 274.*  
*Habitat Hamburgi.*
- nigrita. 303. *C. niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato-*  
*striatis. Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 211. mant. inf. I.*  
*p. 122. n. 275.*  
*Habitat in Italia, statura & magnitudine sulcati.*
- sulcatus. 304. *C. ater, elytris striatis ferrugineo maculatis. Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 197. n. 212. mant. inf. I. p. 122. n.*  
*276. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 35.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 85, n. 86, t. 24. f. 35?*  
*Habitat in Saxoniae nemoribus,*

- gemma- 305. *C. ater*, elytris punctis viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
tus. 197. n. 213. *mant. inf. 1. 122. n. 277. Scop. ent.*  
*carn. n. 90.*  
*Schulze Naturf. 6. t. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- picipes. 306. *C. griseus*, elytris nebulosis, femoribus posterioribus  
rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 214. mant. inf. 3.*  
*p. 122. n. 278.*  
*Habitat in Kilonii plantis.*  
*Elytra punctis subocularibus striata.*
- ovatus. 69. *C. abdomine ovato nigro*, pedibus antennisque rufis. *Fn.*  
*succ. 626. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 221. mant.*  
*inf. 1. p. 123. n. 287. Bonfd. curc. succ. 2. f. 26.*  
*Degeer inf. 5. p. 219. n. 11. Curculio rosæ.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 85. n. 90. t. 24. f. 36.*  
*Habitat in Europæ pomona.*
- attelaboi- 307. *C. rostro. elytrisque unituberculatis. Fabr. sp. inf. 1.*  
des. *p. 191. n. 222. mant. inf. 1. p. 123. n. 288.*  
*Habitat in brasilia.*
- oblongus. 71. *C. antennis*, elytris pedibusque ferrugineis. *Fn. succ.*  
*625. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 220. mant. inf. 1.*  
*p. 123. n. 286.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 294. n. 39. Curculio oblongus*  
*niger, elytris pedibusque testaceis.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 168. n. 102. t. 45.*  
*f. 9. e. f.*  
*Habitat in Europa.*
- pyri. 72. *C. æneo-fuscus. Fn. succ. 623. \* Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*198. n. 217. mant. inf. 1. p. 122. n. 281.*  
*It. scan. 355. Curculio viridis opacus*, pedibus anten-  
*nisque magis fuscis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 282. Curculio squamoso-viridis, &c.*  
*Degeer inf. 5. p. 246. n. 34.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 11.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 23.*  
*Habitat in pyri foliis larva, in hujus pruniquæ corollis*  
*imago.*
- mali. 308. *C. subpubescens fuscus*, femoribus acute dentatis, an-  
tennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 2. app. p.*  
*499. mant. inf. 1. p. 122. n. 282. Lesk. it. p. 47.*  
*t. A. f. 13.*  
*Habitat Lipsiæ, c. pyri proxime affinis. Leske.*  
*Y y y y 3.*



iborei. 309. *C. cinereus*, femoribus anterioribus dentatis, elytris punctato-striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 122. n. 283.*  
*Habitat in Cayenna, argentati magnitudine & statura.*

argenta- 73. *C. corpore viridi-argenteo. Fn. suec. 624. \*. Scop. ent. tns. cern. 91. Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 218. mant. inf. 1. p. 123. n. 284. Bonfd. curc. Suec. 2. f. 12. Fn. suec. 459. Curculio femoribus omnibus denticulotatis, corpore viridi oblongo. Geoffr. inf. par. 1. p. 293. n. 38. Curculio squamosus viridi-auratus. Degeer inf. 5. p. 219. n. 12. Curculio urticae. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 9. Habitat in Europæ urtica, betula, corylo, quercu.*

viridanus. 310. *C. viridis*, ore antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 219. mant. inf. 1. p. 123. n. 285.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

Morio. 311. *C. ater nitens*, elytris glabris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 215. mant. inf. 1. p. 122. n. 279. Bonfd. curc. Suec. 2. f. 29.*  
*Habitat in Germania, & Suecia magnus.*

bifulca- 312. *C. niger*, coleoptrorum limbo cinereo, rostro bifulcato- tus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 216. mant. inf. 1. p. 122. n. 280.*  
*Habitat in Italia, statura fulcati.*

ærugino- 313. *C. oblongus* totus viridis, femoribus ferrugineis, fus. antennis longioribus. *Bonfd. hist. curc. 2. p. 23. n. 7. f. 8.*  
*Habitat in Suecia, statura magis oblonga & antennis longioribus a c. pyri distinctus.*

erythro- 315. *C. oblongo ovatus niger*, antennis longioribus pedi- pus. busque rufis. *Bonfd. curc. 2. p. 25. n. 10. f. 10. Stroom afd. Hafn. 2. p. 57. n. 28. 29. Curculio falicis & dubius. Habitat in Scandinaviæ herbidis, frequentior; an a rufi- pede satis distinctus, cum femora non semper dentata?*

testulatus. 316. *C. ovatus niger*, elytris striatis: striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. *Bonfd. curc. 2. p. 38. n. 32. f. 32. Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 967.*  
*Habitat in Scandinavia, punctatulo affinis.*

- floricola*. 317. *C. niger*, elytris incanis, antennarum articulis mediis spadiceis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 86. n. 93.*  
*Habitat* - - - 3 lineas longus, c. pyri affinis.
- Fallo*. 318. *C. elytris nigris albo punctatis*. *Schranck enum. inf. Austr. p. 116. n. 221. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 86. n. 91. t. 24. f. 37.*  
*Habitat in Austriae plantis variis, praesertim arboribus, niger, 3½ lineas longus.*
- anthracinus*. 319. *C. niger*, elytris punctatim striatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n. 92.*  
*Habitat in Carniola.*
- lugubris*. 320. *C. fuscus*, elytris punctis scabris substriatis villosulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n. 93.*  
*Habitat in Carniola.*
- infidus*. 321. *C. obsolete cupreus, caerulefcenti-villosus*. *Scop. ent. carn. n. 94.*  
*Habitat in Carniola.*
- pruni*. 322. *C. niger*, subvillosus, antennis, elytris pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n. 95.*  
*Habitat in Carniola.*
- caelestinus*. 323. *C. caeruleus*, antennis pedibusque sanguineis. *Scop. ent. carn. n. 96.*  
*Habitat in Germania.*
- carniolinus*. 324. *C. fuscus*, glaucescenti-villosus, elytris sparsim punctatis. *Scop. ent. carn. n. 97.*  
*Habitat in Carniola.*
- Scopolii*. 325. *C. fuscus villosulus*, antennis pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n. 98.*  
*Habitat in Carniola, an distinctus ab ovato?*
- Roefelii*. 326. *C. thorace obscure viridi: linea longitudinali alba, elytris fusco-fulvis: lineis elevatis sulcatis*. *Roef. inf. 3. p. 391. t. 67. f. A. B. C. D.*  
*Habitat in Germania, rostro crasso.*
- Mülleri*. 327. *C. niger*, elytris substriatis, oculis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 963.*  
*Habitat in Danica leuigato.*

- danicus. 322. *C. ater*, elytris subsulcatis pallide punctatis, oculis rufis. *Müll. 700l. dan. prodr. p. 87. n. 964.*  
*Habitat in Dania.*
- squamifer. 323. *C. oblongus*, elytris griseo nigroque striatis. *Müll. 700l. dan. prodr. p. 87. n. 968.*  
*Habitat in Dania.*
- austriacus. 324. *C. cinereus apterus*, elytris lineis albidis nigro punctatis. *Schranck inf. Austr. p. 117. n. 222.*  
*Habitat in Austria.*
- religiosus. 325. *C. ater nitens*, elytris albo maculatis. *Schranck inf. Austr. p. 118. n. 225.*  
*Habitat in monte Austriae Oettcher ad cellas Marianas, 4 lineas longus, habitu germani.*
- coronatus. 326. *C. niger apterus*, thorace utrinque puncto duplici fulvo: basi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inf. par. 1. p. 291. n. 34.*  
*Habitat in Gallia.*
- Tigris. 327. *C. niger*, maculis flavo-villosis, elytris subrugosis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 292. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- corrugatus. 328. *C. fuscus apterus*, elytris rugoso-striatis. *Geoffr. inf. par. 1. 293. n. 37.*  
*Habitat in Gallia.*
- geographicus. 329. *C. subglobosus ex nigro fuscus*, squamosus, lineolis albis varius. *Geoffr. inf. par. 1. p. 294. n. 40.*  
*Habitat in Gallia.*
- fascialis. 330. *C. fuscus*, elytris striatis: macularum albarum fasciis triplici transversa. *Geoffr. inf. par. 1. p. 295. n. 41.*  
*Habitat in Gallia.*
- albo punctatus. 331. *C. subglobosus squamosus ex cinereo fuscus*, elytrorum maculis tribus & apice albis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 299. n. 47.*  
*Habitat in Gallia.*
- sericeus. 332. *C. obscurus rufus cinereus-villosus*, rostro thorace brevior. *Geoffr. inf. par. 1. p. 300. n. 52.*  
*Habitat in Gallia.*
- Virgo. 333. *C. oblongus cinereo-villosus*, rostro thoraci aequali. *Geoffr. inf. par. 1. p. 301. n. 53.*  
*Habitat in Gallia.*

- stritos. 334. *C. oblongus niger flavescente-punctatus*, antennis longis fractis. *Degeer inf.* 5. p. 217. n. 9.  
*Habitat - - - 2 lineas longus.*
- granulo- 601. *C. niger*, thorace varioloso, elytris punctis elevatis rugis : interstitiorum punctis minoribus. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 490.  
*Habitat in Europa.*
- leprofus. 602. *C. villosus ferrugineus albido-maculatus*, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-striatis. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 491.  
*Habitat in Europa.*
- fulcatus. 603. *C. fuscus* thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis : rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 492.  
*Habitat in Europa.*
- chryso- 604. *C. fuscus glaber*, thorace punctato, elytrorum fulcis crenatis maculisque tribus auro conspersis, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 493.  
*Habitat in Europa.*
- argenta- 605. *C. viridi-argenteus*, antennis tibiisque rufis, femoribus fuscis clavatis. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 500.  
*Habitat in Europa.*
- hamor- 606. *C. fuscus*, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fusco virefcentibus. *Mus. Lesk.* p. 23. n. 501.  
*Habitat in Europa.*
- †† femoribus muticis.
- polygoni. 26. *C. thorace lineato*, elytris cinereis : lineolis fuscis futuraque nigro-punctata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 188. n. 151. *mant. inf.* 1. p. 116. n. 200.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 609. n. 26. *Fn. suec.* 597. Curculio longirostris testaceus, coleoptorum futura nigra repanda.  
*Habitat in Europæ polygono, mediæ magnitudinis.*
- griseus. 335. *C. supra griseo fuscus*, subtus cinereus, rostro canaliculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 188. n. 152. *mant. inf.* 1. p. 116. n. 201.  
*Habitat in Anglia.*

1780

INSECTA COLEOPTERA. Curculio.

- trigutta- 336. *C. nigricans*, elytris griseis : maculis duabus albis  
tus. posteriori majori communi. *Fabr. sp. inf. 1. p. 188.*  
*n. 153. mant. inf. 1. p. 116. n. 202.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 11.*  
*Habitat in Anglia.*
- gemina- 337. *C. cinereus*, thorace trilineato, elytris striis numerosis  
tus. fuscis per paria approximatis. *Fabr. mant. inf. 1. p.*  
*116. n. 203.*  
*Habitat Kilonii, mediæ magnitudinis, fere globosus.*
- diadema. 338. *C. flavescenti-villosus*, rostro apice retuso atro. *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 116. n. 204.*  
*Habitat in Cayenna, statura c. coryli, at paulo major.*
- coryli. 339. *C. cinereo fuscoque varius*, elytrorum futura dimidiata  
atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 154. mant. inf. 1.*  
*p. 116. n. 205.*  
*Habitat in Angliæ corylo.*
- Spengleri. 32. *C. fuscus*, elytris flavis : lineis atris glaberrimis abbreviatis inæqualibus, pedibus ferrugineis: *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 191. n. 174. mant. inf. 1. p. 118. n. 229. Herbst.*  
*Besch. der. berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 7.*  
*Habitat in America, statura c. pini.*
- vittatus. 33. *C. ater*, elytris striis albis rubrisque abbreviatis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 191. n. 173. mant. inf. 1. p. 118. n. 228.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 610. n. 33. Curculio longirostris,*  
*elytris lineis albis luteisque.*  
*Sloan. jam. 2. p. 210. Scarabæus Curculio.*  
*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.*
- bivittatus. 340. *C. niger*, elytris punctato-striatis : vitta marginali dorsali  
que interrupta flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113.*  
*n. 230.*  
*Habitat in insula S. Thomæ, statura c. Spengleri.*
- lividus. 341. *C. griseus*, thorace elytris cinereo atroque maculatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 175. mant. inf. 1. p. 118.*  
*n. 231.*  
*Brown illustr. 129. t. 49. f. 8.*  
*Habitat in America meridionali, magnus.*
- pulcher. 342. *C. coleoptris atris* : striis sex dorsalibus approximatis  
abbreviatis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 176. mant.*  
*inf. 1. p. 118. n. 232.*  
*Brown illustr. 126. t. 49. f. 6.*  
*Habitat in Jamaica, statura vittati.*

- histrioni-  
cus. 343. *C. griseus*, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris  
albis : maculis atris fulvisque. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 192.  
n. 177. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 233. *Sparrni. nov.*  
*aed. Stockh.* 1785. 1. p. 44. n. 17. t. 2.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Rohrii. 344. *C. elytris acuminatis griseis* : baseos margine fla-  
vescente. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 192. n. 178. *mant. inf.*  
1. p. 118. n. 234.  
*Habitat in insulis, Americæ oppositis. v. Rohr.*
- impressus. 345. *C. niger*, thorace elytrisque punctis impressis albis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 192. n. 179. *mant. inf.* 1. p. 118.  
n. 235.  
*Habitat in Jamaica, statura pulchri.*
- cervinus. 70. *C. griseus*, antennis basi rufescentibus. *Fn. suec.* 627.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 190. n. 160. *mant. inf.* 1. p. 117.  
n. 213. *Bonfd. curc. Suec.* 2. f. 15.  
*Degeer inf.* 5. p. 220. n. 13. *Curculio griseo-æneus.*  
*Habitat in Europa, femoribus interdum dentatis.*
- striatus. 346. *C. fuscus*, elytris striis cinereis nigro punctatis. *Fabr.*  
*mant. inf.* 1. p. 117. n. 214.  
*Habitat in Africa, parvus.*
- Lacerta. 347. *C. griseus*, elytris striatis, antennis apice nigris. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 117. n. 214. *mant. inf.* 1. p. 117. n. 215.  
*Habitat in India, statura cervini, at triplo major.*
- velox. 348. *C. pilosus niger*, elytris margine, puncto baseos, fascia  
interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inf.*  
1. p. 117. n. 216.  
*Habitat in Cayenna, parvus.*
- argyreus. 74. *C. femoribus submuticis*, corpore toto viridi argenteo  
aureoque maculato. *Mus. Lud. Ulr.* 54.\* *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 184. n. 128. *mant. inf.* 1. p. 110. n. 159.  
*Habitat in America australi & India, facie argentati,*  
*femoribus primoribus spina obsoleta armatis.*
- imperia-  
lis. 349. *C. elytris striis elevatis atris sulcisque punctatis viridi-*  
*aureis alternis*, basi gibbis apice acuminatis. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 184. n. 129. *mant. inf.* 1. p. 110. n. 160.  
*Drury inf.* 2. t. 33. f. 1.  
*Lindenberg Naturf. X. p. 86. n. 4. t. 2. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali, maximus, insectorum*  
*facile pulcherrimum.*



- regalis. 75. *C. corpore viridi-sericeo : fasciis aureis repandis. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 130. mant. inf. 1. p. 111. n. 176. Habitat in America meridionali, magnitudine & statu germanici, femoribus fuscis; annulo aureo.*
- margina-350. *C. fuscus, elytrorum sutura abdominisque margini-  
tus. aureis. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 131. mant. inf. 1. p. 111. n. 162. Habitat in America.*
- 19-puncta-351. *C. canescens, thorace punctis nigris quatuor,   
tus. leoptis novemdecim. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 132. mant. inf. 1. p. 111. n. 163. Habitat in Cayenna.*
- viridis. 76. *C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 139. mant. inf. 1. p. 112. n. 177. Bonfd. curc. Succ. 2. f. 7. Syst. nat. XII. 2. p. 616. n. 76. Curculio brevirostris femoribus muticis, corpore viridi supra obscurius subtus flavidiere. Degeer inf. 5. p. 256. n. 45. Curculio flavo cinctus. Sulz. hist. inf. 1. 3. f. 24. Schaeff. elem. 1. 108. icon. 1. 53. f. 6. Habitat in Europæ pomona, magnitudine & statu pyri, antennis pedibusque nigris.*
- gibber. 352. *C. virefcenti-albus, elytris basi unidentatis posterioribus gibbosis. Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 32. t. B. f. 1. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 176. Habitat in Cayenna.*
- fulvus. 353. *C. fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 177. Habitat in Saxonia, parvus.*
- palliat. 354. *C. fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 178. Habitat in Germania, statura viridis, at paulo minor.*
- aurifer. 355. *C. corpore ferrugineo auro maculato. Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 140. mant. inf. 1. p. 113. n. 179. Drury inf. 1. t. 32. f. 1. Habitat in America, pedibus anterioribus elongatis.*

- cyanipes*. 356. *C. albus*, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 180.*  
*Habitat in Cayenna, antennis fuscis cyaneo-nitidis.*
- tamarisci*. 357. *C. viridi-nitens*, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereoque variis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 181.*  
*Habitat in Africae tamarisco, statura splendiduli, at duplo fere major.*
- splendulus*. 358. *C. viridi-nitens*, coleoptorum disco cinereo, cupreo nigroque fasciato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 141. mant. inf. 1. p. 113. n. 182.*  
*Habitat in Sibiria, statura argentati, at minor.*
- curvipes*. 359. *C. argenteo-squamosus*, tibiis posterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 183.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- speciosus*. 77. *C. corpore luteo viridi-nitente, elytris spinis sparsis.*  
*Mus. Lud. Ulr. 55.\**  
*Habitat in America australi & India, spinis elytri utriusque 5.*
- ruficornis*. 78. *C. corpore atro, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris.* *Fn. suec. 636.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 190. n. 162. mant. inf. 1. p. 117. n. 217. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- albinus*. 79. *C. niger, fronte anoque albis, thorace tuberculato.* *Fn. suec. 632. Scop. ent. carn. 66. Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 180. mant. inf. 1. p. 118. n. 236. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 255. n. 44. t. 8. f. 1. Curculio brevirostris, antennis longis rubris, &c.*  
*Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.*  
*Habitat in Europa, magis boreali, colore c. lapathi referens.*
- latirostris*. 360. *C. rostro latissimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 193. n. 181. mant. inf. 1. p. 118. n. 237. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 2. 3. Sulz. hist. inf. t. 2. f. 17. Silpha oblonga.*  
*Geoffr. inf. par. 1. t. 5. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 89. f. 6.*  
*Habitat in Europa, antennarum annulo rubro.*

- albirostris. 361. *C. rostrum latissimo plano elytrisque posterius albis nigro variis. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 287. Fabr. mant. inf. 1. p. 119. n. 238. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 80. n. 66. t. 24. f. 26. no. Habitat in Germaniæ inferioris betula, latirostri duplo major.*
- planirostris. 362. *C. nigro-æneus, rostrum latissimo plano pedibusque testaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 119. n. 239. Habitat Kilonii, parvus.*
- marginellus. 363. *C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. Fabr. sp. inf. 1. p. 193. n. 182. mant. inf. 1. p. 119. n. 240. Habitat in Africa, æquinoctiali statura verrucosi, et minor.*
- lineatus. 80. *C. fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. Fn. Suec. 630. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 155. mant. inf. 1. p. 116. n. 206. Bordsd. curc. Suec. 2. f. 16. 17. Degeer inf. 5. p. 247. n. 35. Curculio brevirostris, antennis fractis, &c. Geoffr. inf. par. 1. p. 283. Curculio rostrum thoracis longitudine, &c. Schaeff. ic. t. 103. f. 8. Habitat in Europæ salice putrida, plantisque variis.*
- lunatus. 364. *C. colcoptis elevato-striatis: fascia semicirculari maculaque posteriore albis; lunula nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 156. mant. inf. 1. p. 116. n. 207. Habitat in Anglia.*
- fulvipes. 365. *C. tomentoso-virescens, pedibus testaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 208. Habitat Halæ Saxonum, statura parva lineati.*
- ruficollis. 366. *C. testaceus, capite elytrisque striatis cinereo-fuscis. Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 209. Habitat Halæ Saxonum, parvus.*
- undatus. 367. *C. fuscus, elytris apice pallidis: striga undata fusca. Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 157. mant. inf. 1. p. 117. n. 210. Habitat in Germania, parvus, statura lunulati.*
- hispidulus. 368. *C. fuscus, thorace cinereo lineato, elytris hispidis: punctis obscurioribus striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 158. mant. inf. 1. p. 117. n. 211. Habitat Kilonii in plantis aquaticis.*

- scabricu-  
 lus. 369. *C. corpore cinereo hispido. Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 158. mant. inf. I. p. 117. n. 212. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 21. Mant. p. 531. Curculio brevirostris femoribus muticis, cinereus, elytris hispidis. Habitat in Sueciæ arenosis.*
- incanus. 81. *C. oblongus fuscus, thoracis dorso plano. Fabr. sp. inf. I. p. 187. n. 147. mant. inf. I. p. 115. n. 193. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 37. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 24. f. 24. Syst. nat. XII. 2. p. 616. n. 81. Fn. suec. 631.\* Curculio brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. Geoffr. inf. par. I. p. 282. n. 10. Curculio cinereo squamosus, &c. Degeer inf. 5. p. 242. n. 28. Curculio griseo apterus. List. scar. angl. p. 394. n. 30. Habitat in Europæ pinetis.*
- costatus. 370. *C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. Fabr. mant. inf. I. p. 115. n. 194. Habitat in Gallia australi, magnitudine incani.*
- interrup-  
 tus. 371. *C. obscurus, coleoptorum fascia interrupta alba. Fabr. sp. inf. I. p. 188. n. 148. mant. inf. I. p. 115. n. 195. Habitat in nova Hollandia, mediæ magnitudinis.*
- scutella-  
 ris. 372. *C. ater, elytris crenato-striatis, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. I. p. 115. n. 196. Habitat in terra van Diemen, magnus.*
- longima-  
 nus. 373. *C. fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. sp. inf. I. p. 188. n. 149. mant. inf. I. p. 115. n. 197. Habitat in Brasilia.*
- rufus. 374. *C. nigricans, elytris griseis cinereo punctatis. Fabr. sp. inf. I. p. 188. n. 150. mant. inf. I. p. 115. n. 198. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 82. n. 64. t. 24. f. 25. Habitat in Germania.*
- spinifex. 375. *C. cinereus fusco irroratus, thorace acute spinoso. Fabr. mant. inf. I. p. 115. n. 199. Habitat — — gibbus, mediæ magnitudinis.*

- chloro- 32. *C. niger*, antennis pedibusque rufis. *Fn. suec.* 635. \* *Fabr.*  
pus. *sp. inf.* 1. p. 190. n. 163. *mant. inf.* 1. p. 117. n. 218.  
*Bonsl. curc. Suec.* 2. f. 19.  
*Habitat in Europæ plantis, parvus, valde oblongus.*
- tristis. 376. *C. niger*, elytris striatis cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 190.  
n. 164. *mant. inf.* 1. p. 117. n. 219. *Bonsl. curc. Suec.*  
2. f. 28.  
*Habitat in Anglia, Suecia.*
- adpersus. 377. *C. ater*, elytris posterius albo maculatis. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 190. n. 165. *mant. inf.* 1. p. 117. n. 220.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- puncta- 378. *C. fuscus*, elytris punctis holosericeis elevatis margini-  
rus. que flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 190. n. 166. *mant. inf.*  
1. p. 117. n. 221.  
*Habitat in Europa boreali.*
- obscurus. 379. *C. ovatus ferrugineo-fuscus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 190.  
n. 167. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 222.  
*Habitat in Europa boreali.*
- niger. 380. *C. ovatus scaber niger*, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 191. n. 168. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 223.  
*Habitat in Germania.*
- variolo- 381. *C. niger*, thorace carinato varioloso, elytris striatis  
fus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 191. n. 169. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 224.  
*Habitat in Saxonizæ campis.*
- ficti- 382. *C. thorace elytrisque variolosis nigris albo punctatis.* *Fabr.*  
cus. *sp. inf.* 1. p. 191. n. 170. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 225.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- vulgus. 383. *C. ater nitens*, elytris punctato-striatis, femoribus  
annulo cinereo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 191. n. 171. *mant.*  
*inf.* 1. p. 118. n. 226.  
*Habitat in America meridionali.*
- succine- 384. *C. ater*, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr.*  
tus. *sp. inf.* 1. p. 191. n. 172. *mant. inf.* 1. p. 118. n. 227.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- rufipes. 83. *C. cinereus oblongus*, pedibus rufis. *Fn. suec.* 634. \*  
*Habitat in Europa.*

- nebulosus. 84. *C. canus*, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. suec.* 635.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 186. n. 142. *mant. inf.* p. 118.  
 n. 184. *Bonsd. curc. Suec.* 2. f. 4.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 278. n. 1. t. 4. f. 8.  
*Fn. suec.* 1. n. 448. Curculio albo nigroque varius, pro-  
 bosside planiuscula carinata thoracis longitudine.  
*Degeer inf.* 5. p. 241. n. 27. Curculio carinatus.  
*Frisch. inf.* 11. p. 32. t. 23. f. 5.  
*Schaeff. ic. t.* 25. f. 3. *Knoch Beytr.* 1. t. 6. f. 8.  
 β) Curculio nebulosus capensis. *Sparrm. nov. ad. Stockh.*  
 1785. 1. n. 4. p. 44. n. 18. t. 2.  
*Habitat in Europæ campis frequens*, β) duplo major ad  
 Caput bonæ spei.
- fulcicrostris. 85. *C. oblongus cinereus subnebulosus rostro trifurcato.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 187. n. 143. *mant. inf.* 1. p. 114.  
 n. 185. *Sparrm. nov. ad. Stockh.* 1785. 1. n. 4. p.  
 45. n. 19. t. 2. *Bonsdorf. curc. Suec.* 2. f. 5.  
*Habitat in Europæ plantis*, & ad Caput bonæ spei.  
*statura & magnitudine nebulosi.*
- emarginatus. 385. *C. oblongus fuscus*, coleopterorum dorso cinereo :  
 lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Fabr.*  
*mant. inf.* 1. p. 114. n. 186.  
*Habitat Halæ Saxonum*, *statura nebulosi*, *coleoptris*  
*apice emarginatis.*
- perlatus. 386. *C. niger*, abdomine albo : punctis elevatis glabris  
 atris, rostro fulcato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 114. n. 187.  
*Habitat in Sina*, *statura & magnitudine fulcicrostris.*
- glaucus. 387. *C. rostro carinato thoraceque inæquali obscuris*, ely-  
 tris glaucis : puncto posterius elevato. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 114. n. 188.  
*Habitat Kilonii*, *magnitudine & statura albini.*
- albidus. 388. *C. oblongus fuscus elytris albidis* : fascia media liti-  
 raque baseos apicisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. p.  
 114. n. 189.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 83. n. 75. t. 24.  
 f. 31. Curculio candidus.  
*Habitat in Germania*, *nebuloso minor.*
- lusitanicus. 389. *C. oblongus supra fuscus*, elytris macula baseos alba.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 187. n. 144. *mant. inf.* 1. p. 115.  
 n. 190.  
*Habitat in Lusitania*, *statura & magnitudine incani.*



- crenula- 390. *C. cinereus*, elytris lineis elevatis tribus crenulatis  
tus. atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 187. n. 145. mant. inf. I. p. 115. n. 191.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- punctatu- 391. *C. niger*, elytris punctis nigris albisque alternis  
lus. holosericeis striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 187. n. 146. mant. inf. I. p. 115. n. 192.*  
*Habitat in insula terræ novæ, magnitudine c. ligustici.*
- ater. 86. *C. oblongus ater*, antennis rufis. *Fn. suec. 637.\**  
*Bonsd. curc. Suec. 2. f. 20.*  
*Habitat in Europa, an mera varietas chloropodis?*
- emeritus. 87. *C. niger*, thorace elytrisque spinosis fronte excavata.  
*Mus. Lud. Utr. 56.\* Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 190. mant. inf. I. p. 120. n. 249.*  
*Habitat in America australi & India, aranei tristi facie.*  
*Elytra verrucis pilosis adpersa.*
- barbarus. 88. *C. thorace subspinoso*, elytris angulo duplici crispato.  
*Fabr. sp. inf. p. 194. n. 191. mant. inf. I. p. 120. n. 250.*  
*Habitat in Barbaria & Calabria, minor in Apulia, duplo minor in Gallia, punctis excavatis adpersus.*
- algius. 392. *C. cinereus*, thorace spinoso fulcato, elytris angulo duplici spinoso. *Fabr. mant. inf. I. p. 120. n. 251.*  
*Habitat in Africa & Calabria, barbaro triplo minor.*
- crispatus. 393. *C. thorace mutico scabro*, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 192. mant. inf. I. p. 120. n. 252.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- globosus. 394. *C. thorace spinoso quinquefulcato*, elytris lævibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 193. mant. inf. I. p. 120. n. 253. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 33.*  
*Drury inf. I. t. 32. f. 4.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, an vere distinctus ab obeso?*
- obesus. 395. *C. ater*, thorace spinoso inæquali, elytris rubris punctis nigris confertis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 194. mant. inf. I. p. 120. n. 254. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 32. t. 2.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

scalaris. 396. *C. ater*, thorace spinoso inæquali, elytris striis rufis denticulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 195. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 255.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

cultratus. 397. *C. cinereus*, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis posterius cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 196. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 256.

*Habitat in nova Hollandia.*

capensis. 89. *C. ater*, thorace elevato-punctato, elytris striato-crenatis. *Mus. Lud. Utr.* 59. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 193. n. 184. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 242. *Sparrm. nov. act. stockh.* 1785. 1. n. 4. p. 44. n. 16. t. 2.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

Vitulus. 398. *C. niger*, fronte bidentata, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 193. n. 185. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 243.

*Habitat in Tierra del Fuego.*

inæqualis. 399. *C. griseus*, thorace inæquali antèrius prominulo, Elytris fulcatis, posterius bidentatis, rostro rrisulcato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 193. n. 186. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 244.

*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*

rostratus. 400. *C. fuscus*, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris posterius spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 194. n. 187. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 245.

*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

Spec- 401. *C. thorace coleoptrisque globosis. Fabr. sp. inf.* 1. p. 194. n. 188. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 246.

*Habitat ad Caput bonæ spei, parvus, singularis stature.*

acuminatus. 402. *C. cylindricus fuscus*, elytris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 194. n. 189. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 247.

*Habitat in nova Seelandia.*

capistratus. 403. *C. fuscus*, elytris acuminatis crenato-striatis, rostro fulcato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 120. n. 248.

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus.*

verrucosus. 90. *C. æneo-niger*, elevato-punctatus, elytris posterius verrucosis. *Mus. Lud. Utr.* 60.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 193. n. 183. *mant. inf.* 1. p. 119. n. 241.

*Drury inf.* 1. 32. f. 5.

*Habitat in Æthiopia.*

- cornutus. 91. *C. cinereus*, thorace elytrisque subspinosis, capite spinis fasciculato-pilosis. *Mus. Lud. Ulr.* 57. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 197. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 257.  
*Bonfd. nov. ad. Stockh.* 1783. 1. n. 4. p. 46. n. 24. t. 2.  
*Habitat in nova Hollandia & ad Caput bonæ spei.*
- Tribulus. 404. *C. cinereus*, thorace scabro antèrius impresso, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 198. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 258.  
*Habitat in nova Hollandia, rostro thoracem fere æquante, apice incrassato.*
- retusus. 405. *C. griseo-fuscus*, elytris posterius retusis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 199. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 259.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura cornuti.*
- quadri- 406. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinosis: spinis quadens.  
 tuor; posterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 200. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 260.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- quadrispi- 407. *C. albidus*, elytris quadrispinosis, rostro fusco. *Fabr. nosus. sp. inf.* 1. p. 196. n. 201. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 261.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Clavus. 408. *C. albicans*, thorace canaliculato, coleopteris spinosis: lineolis tribus baseos rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 202. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 262.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nodule- 409. *C. thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis. Fabr. fus. sp. inf.* 1. p. 196. n. 203. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 263.  
*Sparrm. nov. ad. Stockh.* 1783. 1. n. 4. p. 42. n. 12.  
*Curculio nodulosus.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- rubifer. 410. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinis elevatis sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 204. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 264.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- globifer. 411. *C. thorace scabro, elytris spinosis posterius acuminatis. Fabr. sp. inf.* 1. p. 197. n. 206. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 265.  
*Habitat ad Caput bonæ spei,*

- pilularius. 412. *C. thorace utrinque spinoso noduloso, elytris tuberculato-striatis apice acuminatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 121. n. 266.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, globifero proxime affinis.*
- frontalis. 413. *C. arer, fronte retusa, thorace elytrisque tuberculato-striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 43. n. 14.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, præcedentibus affinis.*  
*Thorax tuberculorum lineis 4, elytra conicorum utrinque tribus aspera.*
- 16puncta-92. *C. cærulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris sedecim. Mus. Lud. Ulr. 58. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 133. mant. inf. 1. p. 111. n. 164.*  
*Habitat in Brasilia, crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.*
- decorus. 414. *C. supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 134. mant. inf. 1. p. 111. n. 165.*  
*Habitat in America meridionali.*
- nitidulus. 415. *C. viridi-squamosus, elytris punctatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 135. mant. inf. 1. p. 111. n. 166.*  
*Habitat in Cayenna, squamis cum ætate pereuntibus niger.*
- candidus. 416. *C. elytris spinosis albis: macula laterali fusca. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 136. mant. inf. 1. p. 111. n. 167.*  
*Habitat in Cayenna.*
- niveus. 417. *C. niveus, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. Fabr. mant. inf. 1. p. 111. n. 168.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi.*
- lacteus. 418. *C. albus auro nitidulus, elytris fulcatis acuminatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 137. mant. inf. 1. p. 111. n. 169.*  
*Habitat in Jamaica, mediæ magnitudinis, rostri apice bifido.*
- smaragdulus. 419. *C. virescens, elytris punctatis: spina anteriore posterioreque erecta valida. Fabr. mant. inf. 1. p. 111. n. 170.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi, at paulo minor.*
- 8-tubercu-420. *C. cinereo fuscoque varius, coleoptris punctatis, latus. posterius gibbis: tuberculis octo. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 171.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi.*

- Servus. 421. *C. capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 172.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine octotuberculati.*
- modestus. 422. *C. cinereus, thorace elytrisque fusco maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 138. mant. inf. 1. p. 112. n. 173.*  
*Habitat in nova Seelandia, mediæ magnitudinis.*
- flavescens. 423. *C. obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 174.*  
*Habitat in America meridionali, viridi affinis, ut paulo major.*
- granulatus. 93. *C. viridis striatus punctis nigris elevatis. Mus. Lud. Ulr. 61.\**  
*Habitat in America australi & India, magnitudine scarabæi stercorarii.*
- abbreviatus. 94. *C. subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. Mus. Lud. Ulr. 62.\* Gron. zooph. 597.\**  
*Habitat in Martinica.*
- apterus. 95. *C. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo punctatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 196. n. 206. mant. inf. 1. p. 121. n. 267.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 95. Curculio brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato.*  
*Degeer inf. 5. p. 275. t. 16. f. 1. Curculio cruciatus.*  
*Sparrm. nov. aḏ. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 49. n. 31. t. 2.*  
 β) *Curculio ornatus. Drury inf. 2. t. 34. f. 3.*  
*Habitat in India & ad Caput bonæ spei, maximus.*
- ocellatus. 424. *C. thorace spinoso anterieus excavato, elytris cinereis: punctis atris subocellatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 196. n. 207. mant. inf. 1. p. 121. n. 268.*  
*Habitat in Madagascar.*
- nivosus. 425. *C. thorace elytrisque seriatim tuberculatis niveo lineatis. Sparrm. nov. aḏ. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 41. n. 11.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, subtilius albedo & flavescente pruinosis vel minutim squamosus.*
- nycthemerus. 426. *C. albus, thorace elytrisque in parte summa atris, fasciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus.*



abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 41. p. 42. n. 12.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- Argus. 427. *C. tomentosus*, capite thoracisque margine anteriore griseo alboque punctatis, elytris striis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 43. n. 15.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- Porculus. 428. *C. cinereo-fuscus pilosus*, thorace lineis quinque, elytris posterius maculis duabus albis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 45. n. 20.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- Tottus. 429. *C. ex cinereo & fuscescente rufus*, rostro trifstriato, pedibus sæpe rufescentibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 45. n. 21.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- atratus. 430. *C. glabriusculus nigro-nitens*, elytris striatis: interstitiorum punctis impressis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 46. n. 22.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- cordiger. 431. *C. thorace subdidymocordato*, utrinque aculeato, elytris striatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 46. n. 23.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- Tauriculus. 432. *C. niger*, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato subcrispato scabro, elytris lineis quatuor: tuberculosis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 25.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

- Juventus. 433. *C. fronte excavato-retusa*, thorace scabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum serie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 26.

*Habitat ad Caput bonæ spei, tauriculo affinis, at quadruplo minor.*

- ephippia. 434. *C. thorace tuberculis rugisque scabro*, elytris utrinque serie sesquitercia spinularum: sutura spinulis conniventibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 27.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*



1794 INSECTA COLEOPTERA. Cursulio.

- cuculatus. 435. *C. fronte depressa scabra, thorace antèrius porrecto rostroque bifurcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 48. n. 28. Habitat ad Caput bonæ spei, griseus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.*
- Uva. 436. *C. ater, capite emarginato, thorace antèrius foveolato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula basæos thoracis utrinque supra & subtus femorumque ferruginea. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 29. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- biglobatus. 437. *C. niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 30. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- calvus. 438. *C. ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco læviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso-punctatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 34. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- senilis. 439. *C. fuscus griseo irroratus, thorace teretiusculo, elytris striis elevatis lævibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 35. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Platina. 440. *C. subtus lateribusque albo argenteo viridique auro splèndidus, supra pedibusque griseus, elytrorum fasciis longitudinalibus atris. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 36. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Gallina. 441. *C. griseus, subtus canis, thorace utrinque sulcis quinque subarcuatis obliquis, elytris leviter striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 37. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- argynellus. 442. *C. viridi-argenteus, oculis atris, rostro supra plano: linea longitudinali nigra impressa. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 39. Habitat ad Caput bonæ spei.*

- nigellus. 443. *C. nigricans*, subtus ex griseo rufescens, antennis rectis, thorace elytrisque spinulosis. *Sparren. nov. act. Stockh.* 1785. 1. n. 4. p. 52. n. 40.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura albin, sed minor.*
- Bonfdor- 444. *C. oblongus* albidissimus maculis quibusdam fasciæque  
fii. nigris, rostro bifurcato fusco. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 21.  
n. 5. f. 6.  
*Habitat in Sueciæ potissimum salicis, statura sulcirostris, at duplo minor.*
- tereticol- 445. *C. oblongo-ovatus*, capite & thorace cylindricis angus-  
lis. tis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 28. n. 14. f. 14. *Degeer inf.* 5. p. 246. n. 33.  
*Habitat in Sueciæ alnetis, non infrequens.*
- lineellus. 446. *C. oblongus* cinereo-fuscus, thorace striis tribus palli-  
dioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 30. n. 17. f. 18.  
*Fn. suec.* 1. n. 472. *Curculio* cinereus, fasciis longitudinalibus dilutioribus.  
*Habitat in Suecia, pediculi magnitudine, lineato affinis.*
- echinatus. 447. *C. ferrugineus*, abdomine globoso, elytris fetis erectis  
dense echinatis. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 33. n. 21. f. 22.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 86. n. 947. *Curculio* scaber?  
*Habitat in Suecia, subtus fuscus, ano rufo.*
- Truncu- 448. *C. ater*, abdomine subgloboso, rostro brevissimo, an-  
lus. tennis pedibusque rufis. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 33. n. 22. f. 23.  
*Habitat in Suecia.*
- capitatus. 449. *C. fusco-cinereus*, sutura elytrorum basi nigra, rostro  
brevissimo lato, abdomine subgloboso. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 33. n. 23. f. 24. *Degeer inf.* 5. p. 245. n. 32.  
*Habitat in Sueciæ pinetis, vulgatio, c. coryli proxime affinis.*
- asperatus. 450. *C. cinereus*, abdomine ovato, elytris fetis erectis brevif-  
simis exasperatis. *Bonfd. curc. Suec.* 2. p. 34. n. 24. f. 25.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 288. n. 23.  
*Habitat Upsaliæ in arbutis, primo vere sub siccis foliis conspicuus.*

- fuecicus. 451. *C. ovatus*, posterius obtusissimus obscurus, thorace carinulato, antennis & pedibus fuscis. *Bonfd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 29. f. 30.*  
*Habitat in Suecia.*
- murinus. 452. *C. ovatus* griseo-fuscus, elytris pallide maculatis, posterius fetosis, rostro sulcato. *Bonfd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 30. f. 31. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 943. f. Fridrichsd. n. 116.*  
*Habitat in Scandinaviæ plantis.*
- clavipes. 453. *C. oblongo-ovatus* gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis crassiss. *Bonfd. curc. Suec. 2. p. 40. n. 35. f. 36.*  
*Habitat in Hollandia Sueciæ.*
- inderien- 454. *C. apterus ovatus* opalino-albus, thorace utrinque mur-  
 fis. cronato, elytris excavato-punctatis. *Pall. inf. russ. 1. p. 26. t. B. f. 5. it. 1. app. p. 464. n. 36.*  
*Lepech. it. 1. p. 508. t. 16. f. 5.*  
*Habitat circa lacum salsum Inderiensem frequens, sub minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.*
- nomas. 455. *C. albus*, rostro crasso biporcato, thorace scaberrimo, elytris fusco oblique lituratis. *Pet. gaz. t. 23. f. 4. Pall. it. 1. app. p. 463. n. 31. inf. russ. 1. p. 27. t. B. f. 6.*  
*Habitat in aridissimis deserti caspici, frequens circa fontes lacusque salcos, habitu nebulosi, sed major, 10 lineas longus.*
- candida- 456. *C. albo-nebulosus*, rostro crasso: stria bifurca, thoracis dorso cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it. 1. app. p. 463. n. 32. inf. russ. 1. p. 28. t. B. f. 7.*  
*Habitat in aridis deserti caspici, frequentissimus circa lacum Inderiensem, sulcirostri paulo major, subtus candidissimus.*
- torridus. 457. *C. apterus* rufescente albus, supra litaris punctisque subverrucosis nigris, porco rostri crassi longitudinali. *Pall. inf. russ. 1. p. 28. t. B. f. 8.*  
*Habitat in salsis torridis deserti australis ad Volgam, circa salsoiarum & atriplicum radices, sulcirostris magnitudine, at crassior.*
- Cenchrus. 458. *C. dealbatus*, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, rostro crasso uniporcato. *Pall. inf. russ. 1. p. 29. t. B. f. 9.*

*Habitat in torridis & squalidis deserti Volgenſis rarior, fulciroſtri minor, magis teres.*

tetragram-  
mus. 459. *C. apterus cineraſcens, thorace fuſco: lineis quatuor lacteis, elytrorum lituris quatuor nigris, roſtro craſſo. Pall. inf. ruſſ. I. p. 29. t. B. f. 10.*

*Lepech. it. 2. app. p. 329. t. II. f. 28.*

*Habitat in ſqualidis aridiſſimis deſerti Volgenſis maxime auſtralis rarior, major, elegans.*

tribuloi-  
des. 460. *C. thorace bicriſtato ſcabro, elytris ſpinis conicis axillaribus poſterioribusque roſtro craſſo. Pall. inf. ruſſ. I. p. 30. t. B. f. 11.*

*Habitat in Rio Janeiro Americæ, habitu inderienſis, europæis omnibus major.*

nigrivit-  
tis. 461. *C. cylindricus dealbatus, capite thoraceque ſubcarinatis: fascia utrinque longitudinali fuſca. Pall. inf. ruſſ. I. p. 31. t. B. f. 12.*

*Habitat in aridis ſqualentibus deſerti caſpici, frequens, oſto lineas longus.*

Vibex. 462. *C. cylindricus albiſſimus, thorace elytrisque ſtriga utrinque nigra longitudinali. Pall. inf. ruſſ. I. p. 32. t. B. f. 13.*

*Habitat in arenosis ad Selengam, frequens.*

fenestra-  
tus. 463. *C. apterus albus, roſtro craſſo, elytrorum maculis ſex rhombeis fuſcis. Pall. inf. ruſſ. I. p. 33. t. H. f. B. 16.*

*Habitat in ſabuloſis ad Selengam, nebuloſo minor.*

flaviceps. 464. *C. apterus albatus, capite flaveſcente lateribus ruſo, roſtro craſſo, thorace elytrisque albo lineatis fuſco interruptis. Pall. inf. ruſſ. I. p. 34. t. B. f. 17.*

*Lepech. it. 2. app. p. 327. t. II. f. 27.*

*Habitat in arenosis ad Selengam & Chonem, rarior in Tartariæ deſertis, magnitudine ſeminis atri.*

pictus. 465. *C. albus, roſtro craſſo, thorace faſciis tribus longitudinalibus, elytrorum arcuata fuſcis. Pall. it. I. app. p. 463. n. 33. inf. ruſſ. I. p. 35. t. H. f. B. 18.*

*Habitat rarior in aridiſſimis ſaliſis deſerti caſpici, circa lacum quoque Inderienſem.*

hololeu-  
co. 466. *C. ſubcylindricus totus albus immaculatus, roſtro craſſo, oculis atris. Pall. inf. ruſſ. I. p. 35. t. H. f. B. 19.*

*Habitat in ſqualidis deſerti caſpici, ſub atriplicibus & ſaliſis.*

- tenebrioi-467. *C. apterus aterrimus glaber, elytris lævigatis.* *inf. russ. I. p. 36. t. B. f. 20.*  
*Frisch inf. 13. p. 28. t. 26?*  
*Schaeff. ic. t. 62. f. 11.*  
*Habitat rarior in deserti caspici aridis, hami tenebriones apteros.*
- albator. 468. *C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, posteriore compressis pubescentibus: fasciis lateralis niveis.* *Pall. inf. russ. I. p. 36. t. B. f. 21.*  
*Habitat in Brasilia, major.*
- noveboracensis. 469. *C. canus, elytris subfastigiatis: striis quinque albis nigro punctatis, scutello flavicante.* *Forst. nov. sp. I. p. 35. n. 35.*  
*Habitat in Noveboraco, 7 lineas longus.*
- melanogrammus. 470. *C. corpore cano, sutura elytrorum anterior nigra nitida, rostro brevissimo.* *Forst. nov. inf. sp. p. 36. n. 36.*  
*Habitat in Anglia, incano dimidio minor.*
- plagiatus. 471. *C. subglobosus, elytris punctis longitudinalibus pressis striisque e cinereo & fusco alternis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 284.*  
*Habitat in Marchia, statura c. coryli, at multoties major.*
- cinereus. 474. *C. oblongus cinereus, elytris albido nebulosis, posteriore fascia albida.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 285.*  
*Habitat, rarus, Halæ Saxonum, lineati statura.*
- sericeus. 473. *C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus subdentatis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 286.*  
*Habitat Halæ Saxonum in salice, æstate frequentissimus, argentato affinis, lineati statura & magnitudine.*
- tenebricosus. 474. *C. niger nitidus, oculis fuscis, elytris conacuminatis excavato-punctatis.* *Herbst apud Fuchs arch. inf. 5. p. 81. n. 67. t. 24. f. 27.*  
*Habitat Berolini, rarissimus, 5 lineas longus, tenebrioidi affinis.*



- Faber. 475. *C. niger*. rostro lato, antennis fuscis, elytris connatis: punctorum excavatorum seriebus octo. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 81. n. 68. t. 24. f. 28.*  
*Habitat in Marchia.*
- major. 476. *C. niger* albido villosus, thorace punctato rugoso rostrum æquante, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 81. n. 69. t. 24. f. 29.*  
*Habitat Berolini, germanorum maximus.*
- Linzenfis. 477. *C. apterus* fuscus, thoracis elytrorumque lateribus rufis. *Schranck enum. inf. austr. p. 123. n. 234.*  
*Habitat Linzii.*
- splendi- 479. *C. viridis* angustissimus, oculis fuscis, antennis pedibus-  
 dus. que fuscescentibus, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 82. n. 72. t. 24. f. 30.*  
*Habitat Berolini, 3 lineas longus.*
- trivialis. 480. *C. cinereus*, thorace lincis tribus exfoletis albis, elytris maculis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 82. n. 73.*  
*Habitat Berolini, 3 fere lineas longus, statura c. polygoni.*
- arenarius. 481. *C. capite* cano, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griseis punctato-striatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 22. n. 74.*  
*Habitat Berolini, statura c. ligustici, at dimidio minor.*
- beroli- 482. *C. albicans*, subtus varius, thorace rugoso nigro ad latera  
 nenfis. variegato, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.*  
*Habitat Berolini, frequens nebuloso affinis, at multo minor.*
- globatus. 483. *C. capite* thoraceque fuscescentibus subæneis, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine subglobofo, elytris connatis punctato-striatis: interstitiis fasciis alternis cinereis & fuscescentibus maculisque obfoletis albidis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 83. n. 76. t. 24. f. 32.*  
*Habitat Berolini frequens, variæ magnitudinis.*
- Viverra. 484. *C. fordide* cinereus, rostro lato, thorace scabro, antennis turgido, per mediam longitudinem sulcato, elytris



striatis : interstitiis scabris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 83. n. 77.*

*Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus, antennae fuscis.*

Herbstii. 485. *C. cinereus*, thorace subgloboso granulato, elytris rotundatis striatis : ocellis rubro-aureis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 84. n. 78.*

*Habitat Berolini, rarior.*

pyricola. 486. *C. angustus ater*, subtus antennisque spadiceus, thorace granulato, elytris sulcatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 84. n. 79.*

*Habitat in Pomerania, vix 2 lineas longus, rostro paulo longiore.*

granulatus. 487. *C. ovatus griseus*, supra granulatus : granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 84. n. 80. t. 24. f. 33.*

*Habitat in Marchia, 3 lineas longus.*

piniperda. 488. *C. spadiceus*, thorace elongato punctato, elytris punctato-striatis, femoribus subdentatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 84. n. 81.*

*Habitat in Marchia, 1½ lineam longus, facie bostrichi piniperdæ.*

futuralis. 489. *C. elongatus cinereus fusco subvarius*, subtus, lateribus futuraque albus, antennis oculisque nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 84. n. 82. t. 24. f. 34.*

*Habitat in Marchia, augustus, 3 lineas longus.*

Eremita. 490. *C. supra flavescens-pilosus*, rostro tenui thoraceque subpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-striatis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 85. n. 83.*

*Habitat in Marchia, 2 lineas longus.*

bruchoides. 491. *C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis & striatis.* *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 85. n. 84.*

*Habitat in Marchia, bruchus similis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, crassus rostro pendulo.*

singularis. 492. *C. subbrevisrostris cinereus*, elytris striis punctatis : punctis excavatis centro eminentibus, *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1066. n. 3.*

*Hab.* Lusitania, *mediæ magnitudinis*, *femoribus*  
*clavatis*.

- carinatus. 493. *C. abbreviatus niger*, thorace subcarinato, elytris angustatis tuberculatis. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066.  
*n.* 3.

*Habitat in Lusitania, barbaro similis, at quadruplo minor.*

- oedematus. 494. *C. niger glaber politus*, elytris rubris. *Sulz. hist. inf.*  
*fus.* *p.* 40. *t.* 4. *f.* 10.

*Habitat in Europa.*

- Cypri. 495. *C. fulcatus*, linea dorfi longitudinali atra. *Hasselt.*  
*it.* *p.* 449. *n.* 100.

*Habitat in Cypro.*

- albidus. 496. *C. apterus supra albicans*, subtus dilute roseus, thorace bicuspidato, elytris fulcatis: punctis canis.  
*Lepech. it.* I. *p.* 313. *t.* 17. *f.* 7.

*Habitat in Russia.*

- bipunctatus. 497. *C. thorace scabro*, elytris nebulosis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11.  
*f.* 25.

*Habitat in Sibiria.*

- guttatus. 498. *C. niger*, vellere rufescente nigro punctato: punctis in elytris transparentibus. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 30.

*Habitat in Sibiria.*

- popul-neus. 499. *C. ater*, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn.* *n.* 74.  
*Habitat in Carniola, c. fagi proxime affinis, at femoribus æqualibus.*

- piger. 500. *C. femoribus anterioribus clavatis*, rostro striis elevatis senis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn.* *n.* 65.

*Habitat in Carniola.*

- iners. 501. *C. rostro linea elevato unica*, elytris striis decem punctatis. *Scop. ent. carn.* *n.* 68.

*Habitat in Carniola.*

- resinosus. 502. *C. niger scaber*, abdomine subtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn.* *n.* 67.

*Habitat in Carniola.*

- piceus. 503. *C. piceus*, abdomine nigro, subtus albedo, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn.* *n.* 69.

*Habitat in Carniola.*

- erraticus. 504. *C. rostrum apice concavo, elytris subvillosis striatis: stria tertia tuberculata. Scop. ent. carn. n. 70.*  
*Habitat in Carniola.*
- C. album.* 505. *C. ex cupreo nigroque varius, elytris ad angulum basales externum linea arcuata alba. Scop. ent. carn. n. 99.*  
*Habitat in Carniola.*
- sensitivus. 506. *C. niger, femoribus fulvis apice nigris. Scop. ent. carn. n. 100.*  
*Habitat in Carniola.*
- nemoreus. 507. *C. apterus niger opacus, capite glabro, rostro bifido, thorace elytrisque scabris acuminatis. Scop. ent. carn. n. 101.*  
*Habitat in Carniola.*
- Momus. 508. *C. rostro supra bisulcato, abdomine posterioribus villosis, femoribus anterioribus crassioribus. Scop. ent. carn. n. 102.*  
*Habitat in Carniola.*
- Zoilus. 509. *C. rostro deflexo, elytris striatis nigro punctatis. Scop. ent. carn. Fn. 103.*  
*Habitat in Carniola.*
- quercinus. 510. *C. niger, scutello trilobo: lobo anteriore albo, elytris puncto albo. Scop. ent. carn. 106.*  
*Habitat in Carniolæ & Helvetiæ quercu.*
- carniolicus. 511. *C. niger, thorace albido, elytris striis quinque elevatis nigris albo punctatis. Scop. ent. carn. n. 107.*  
*Habitat in Carniola.*
- villosulus. 512. *C. rufus subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus obsoletis. Scop. ent. carn. n. 108.*  
*Habitat in Carniola.*
- præcox. 513. *C. ferrugineus, elytris striatis subvillosis. Scop. ent. carn. n. 109.*  
*Habitat in Carniola, sub finem Aprilis conspicuus.*
- tricolor. 514. *C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis: margine interiore albo, lineisque binis longitudinalibus flavis. Scop. ang. hist. nat. 5. p. 91. n. 45.*  
*Habitat - - -*

- dentirostris. 515. *C. ovatus niger*, rostro apice quadridentato. Müll. *zool. dan. prodr. p. 85. n. 941.*  
*Habitat in Dania.*
- tardus. 516. *C. nigricans*, thorace elytrisque utrinque rufis: macula apicis atra. Müll. *zool. dan. prodr. p. 86. n. 942.*  
*Habitat in Dania.*
- nodosus. 517. *C. canescens*, elytris nodulis minimis striatis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 86. n. 948.*  
*Oloff. it. isl. 1. p. 319: Silakkept:*  
*Habitat in Islandia.*
- longicor-nis. 518. *C. nigricans*; thorace hirta, elytris cinereis: maculis flavicantibus, pedibus antennisque rufis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 86. n. 949.*  
*Habitat in Dania.*
- opacus. 519. *C. totus griseus lævissimus.* Müll.; *zool. dan. prodr. p. 46. n. 950.*  
*Habitat in Dania:*
- bicolor. 520. *C. griseus*, antennis pedibusque rufescentibus. Müll. *zool. dan. prodr. p. 46. n. 951.*  
*Habitat in Dania:*
- maculofus. 521. *C. ovatus*, obscure flavicans, elytris luteo maculatis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 46. n. 952.*  
*Habitat in Dania.*
- futuratus. 522. *C. cervinus ovatus* elytris lineis tribus elevatis: futura posterius carinata. Müll. *zool. dan. prodr. p. 46. n. 955.*  
*Habitat in Dania.*
- terlineatus. 523. *C. elongatus cinereus*, thorace terlineato, antennis nigris. Müll. *zool. dan. prodr. p. 46. n. 956.*  
*Habitat in Dania.*
- mollis. 524. *C. griseo-auratus*, elytris mollibus. Müll. *zool. dan. prodr. p. 87. n. 960.*  
*Aa. Nidr. 4. p. 12. t. 16. f. 6.*  
*Habitat in Scandinavia.*
- undulatus. 525. *C. griseus nitens*, fasciis elytrorum undulatis ferrugineis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 87. n. 961.*  
*Aa. Nidr. 4. p. 13.*  
*Habitat in Scandinavia.*

- bispinus. 526. *C. cæruleus*, thorace utrinque spinoso, antennis nigris.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 91. n. 1023.*  
*Schaeff. ic. t. 6. f. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- inermis. 527. *C. violaceus*, thorace puncto utrinque impresso, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 91. n. 1025.*  
*Schaeff. ic. t. 56. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscatus. 528. *C. nigro-fuscus*, thorace utrinque fascia longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. *Geoffr. inf. par. 1. p. 280. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- simbria- 529. *C. niger*, thorace punctato, elytris alternatim striatis & punctatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 281. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- exaratus. 530. *C. oblongus totus niger*, thorace punctato, elytris sulcatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 282. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- squamo- 531. *C. squamis nitentibus*, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 284. n. 14.*  
*Habitat in Gallia.*
- Geoffroæi. 532. *C. rufus subvillosus*, capite nigricante. *Geoffr. inf. par. 1. p. 284. n. 15.*  
*Habitat in Gallia.*
- gramineus. 533. *C. cæruleo-viridis nitens*, thorace punctato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 284. n. 16.*  
*Pet. gazoph. p. 77. n. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- doloro- 534. *C. oblongus niger*, abdomine squamoso: lateribus albis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 285. n. 17.*  
*Habitat in Gallia.*
- denticula- 535. *C. ovatus ex nigro cinereus*, thorace utrinque denticulato. *Geoffr. inf. par. 1. p. 288. n. 24.*  
*Habitat in Gallia.*
- aculeatus. 536. *C. subrotundus niger squamosus*, elytris striatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 288. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*

- subglobo-  
sus. 537. *C. subglobosus* ex cinereo ater, striatus, rostro tho-  
racis longitudine. *Geoffr. inf. par. 1. p. 289. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- erythro-  
leucos. 538. *C. globosus* rufus, elytris striatis : fascia transversa  
alba. *Geoffr. inf. par. 1. p. 289. n. 27.*  
*Habitat in Gallia.*
- leucozo-  
nius. 539. *C. globosus* niger, elytris striatis : fascia transversa  
alba. *Geoffr. inf. par. 1. p. 289. n. 28.*  
*Habitat in Gallia.*
- spinosus. 540. *C. totus* fuscus spinosus, elytris striis elevatis villoso-  
spinosis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 412. n. 97.*  
*Habitat in Gallia.*
- arras. 541. *C. niger*, scutello albicante, elytrorum striis utrin-  
que denticulatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 290. n. 31.*  
*Habitat in Gallia.*
- marmora-  
tus. 542. *C. lividus*, coleoptris fasciis plurimis obscuris. *Geoffr.*  
*inf. par. 1. p. 291. n. 33.*  
*Habitat in Gallia.*
- bohemi-  
cus. 543. *C. corpore*, capite antennisque nigris, thorace papil-  
loso & elytris quatuor papillarum ordinibus insignitis  
cinereis incanis. *Richter Abn. Naturg. Boehm. p. 34.*  
*Habitat in districtu Bohemæ Reichenbergensi, subglo-  
bosus, magnitudine dermestis pellionis.*
- rotunda-  
tus. 544. *C. apterus*, corpore oblongo nitido nigro lævi. *Degeer*  
*inf. 5. p. 243. n. 29. t. 7. f. 22.*  
*Habitat in Europa, 3½ lineas longus.*
- multico-  
lor. 545. *C. corpore* subglobofo ex rufo fusco : punctis ex flavo  
griseis, elytris carinatis. *Degeer inf. 5. p. 244. n. 30.*  
*Habitat in alno, mediæ magnitudinis.*
- ochropus. 546. *C. corpore* oblongo viridi nitido, antennis pedibusque  
flavis. *Degeer inf. 5. p. 245. n. 31.*  
*Habitat in Europa, ultra 2 lineas longus.*
- fascicula-  
tus. 547. *C. corpore* ovato fusco : fasciculis pilosis griseis, an-  
tennis longis. *Degeer inf. 5. p. 276. n. 10. t. 16. f. 2.*  
*Habitat Surinami.*



- fulvirof- 549. *C. nigro-æneus*, rostro plano pedibusque flavescen-  
tris. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*  
*Habitat in Scania, parvus.*
- triangula- 551. *C. obscurus flavicans*, thoracis basi triangulari, ely-  
tris. tris striato-punctatis. *Petagn. inf. Calabr. p. 14. n. 71.*  
*Habitat Brancaleoni in Calabria, in carduorum floribus frequens.*
- formosus. 553. *C. corpore virescente*, antennis pedibusque rufis.  
*Mayer Abh. boeh. Ges. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiæ floribus cardui, magnitudine c. pyri.*
- carinatus. 582. *C. griseus oblongus*, rostro carinato : carina utrinque  
fuscata, thorace elytrisque punctatis : his polline griseo confertis : punctorum ordinibus decem, pedibus  
anticis longioribus : femoribus tibiisque fusco annu-  
latis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 445.*  
*Habitat extra Europam.*
- crassirof- 583. *C. griseus*, rostro crasso supra rugoso, thorace nigro  
tris. punctato, elytris obsolete rugosis : pilis erectis hispidis, abdomine fusco. *Mus. Lesk. p. 21. n. 449.*  
*Habitat in Europa.*
- dealbatus. 584. *C. oblongus variolosus niger*, polline albo confertus, elytris fasciis obliquis duabus maculisque  
tribus albis, abdomine nigro punctato. *Mus. Lesk. p. 21. n. 456.*  
*Habitat in Europa.*
- incinera- 585. *C. niger*, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis  
tus. quatuor punctisque sparsis cinereis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 450.*  
*Habitat in Europa.*
- planirof- 586. *C. subglobosus griseus*, rostro explanato, elytris  
tris. striatis erecto-pilosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 459.*  
*Habitat in Europa.*
- varius. 587. *C. elytris griseo fulvoque variis punctato-striatis* :  
punctis holosericeis fuscis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 461.*  
*Habitat in Europa.*
- nævius. 588. *C. nævius*, rostro crasso supra plano fusco, elytris  
rugosis : sutura elevata posteriorius carinata, femoribus  
fuscis, tibiis rufis griseo squamosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 463.*  
*Habitat in Europa.*

- coracinus. 589. *C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoraceque punctatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 465.*  
*Habitat in Europa.*
- latirostris. 590. *C. elytris punctato-striatis cinereo-pilosis, rostro brevi lato stria dorsali exarato. Mus. Lesk. p. 22. n. 466.*  
*Habitat in Europa.*
- hirtus. 591. *C. fuscus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hispidis punctato-striatis griseis: horum marginibus externis albidis. Mus. Lesk. p. 22. n. 467.*  
*Habitat in Europa.*
- rugatus. 592. *C. griseus, thoracis dorso elytrorumque rugosorum sutura ferrugineo-fusca, thoracis dorso utrinque puncto. Mus. Lesk. p. 22. n. 470.*  
*Habitat in Europa.*
- infuscatus. 593. *C. rostro thoraceque fuscis: hujus lineis tribus griseis, elytris tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 471.*  
*Habitat in Europa.*
- obsoletus. 594. *C. fusco-griseus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 472.*  
*Habitat in Europa.*
- subrufus. 595. *C. fulvo-griseus, antennis tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 473.*  
*Habitat in Europa.*
- clavipes. 596. *C. oblongus fuscus cinereo adpersus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 475.*  
*Habitat in Europa.*
- exoletus. 597. *C. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 478.*  
*Habitat in Europa.*
- nebulus. 598. *C. fuscus griseo-nebulosus, rostro lato plano, elytris striatis, apice obtusis. Mus. Lesk. p. 22. n. 479.*  
*Habitat in Europa, magnitudine pediculi, statura c. Albini.*
- tenebri-cosus. 599. *C. niger subæneus ovatus hirtus punctato-striatus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 481.*  
*Habitat in Europa.*
- lutosus. 600. *C. lutosus ovatus, antennis rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 482.*  
*Habitat in Europa.*

**RHINOMACER.** *Antennæ setaceæ, rostro insidentes*  
*Palpi quatuor extrorsum crassiores.*

curculioi- 1. Rh. villosus-griseus, antennis pedibusque nigris. *Fab.*  
*des. mant. inf. 1. p. 123. n. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 1. Rhinomacer curculioides.*  
*Habitat in Italia, statura curculionis, subtus cinereus,*  
*pedibus nigris.*

attelaboi- 2. Rh. villosus-piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fab.*  
*des. mant. inf. 1. p. 123. n. 2.*  
*Habitat in Sueciæ pineis, curculioide minor.*

cæruleus. 3. Rh. cærulescens subvillosus antennarum basi pedibusque  
*flavis. Petagn. inf. Calabr. p. 14. n. 72. f. XXXIV.*  
*Habitat ad littora Calabriae, Brancaloni; an forte Br.*  
*tellabi species?*

**ATTELABUS.** *Caput posterius acuminatum, inclinatum.*

*Antennæ moniliformes, apicem*  
*versus crassiores.*

\* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A niger, elytris rufis reticulatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 199.*  
*n. 1. mant. inf. 1. p. 124. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 1. Fn. succ. 638. Amm.*  
*acad. 5. t. 3. f. 171. Attelabus niger, elytris rubris*  
*It. oel. 153. Curculio niger, elytris rubris, capite postice*  
*elongato.*  
*Degeer inf. 5. p. 257. n. 46. t. 8. f. 3. Curculio excoriator*  
*ruber.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 273. n. 11.*  
*Pontopp. atl. Dan. p. 205. n. 1. t. 16.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 1.*  
*Schaeff. ic. t. 75. f. 8.*  
*Habitat in coryli foliis, quæ in cylindrum corollit, &*  
*utrinque claudit.*

- avellanæ. 2. *A. niger*, elytris, thorace pedibusque rubris.  
*Scop. ent. carn.* 71. *Curculio collaris*.  
*Schaeff. ic. t.* 56. *f.* 5. 6.  
*Habitat in Germaniæ corylis, a. coryli similis; an*  
*mera varietas?*
- bicolor. 32. *A. niger*, thorace elytrisque rufescentibus, scutello  
femorum tibiærumque basi & apice nigris. *Mus. Lesk.*  
*p.* 23. *n.* 504.  
*Habitat in Europa.*
- denigra- 33. *A. niger*, thorace elytrisque rubris, dorsi macula  
rus. tibiis femorumque basi & apice nigris. *Mus. Lesk.*  
*p.* 23. *n.* 505.  
*Habitat in Europa.*
- erythrop- 34. *A. niger*, elytris rubris lævissime striato-punctatis.  
terus. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 506.  
*Habitat in Europa.*
- hipustula- 11. *A. ater*, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf.* 1.  
rus. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 2.  
*Habitat in America septentrionali.*
- gemma- 14. *A. ferrugineus*, tuberculis nigris sparsis. *Thunb. nov.*  
tus. *inf. spec.* 3. *p.* 68. *f.* 80. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 4.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine & figura a.*  
*coryli.*
- indicus. 15. *A. ferrugineus*, capite, elytrorum basi fasciaque cyaneis.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 68. *f.* 81. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. *p.* 124. *n.* 5.  
*Habitat in India, statura & magnitudine melanuri.*
- curculio- 3. *A. niger*, thorace elytrisque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.*  
noides. 200. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 6.  
*Scop. ent. carn.* 72. *Curculio nitens*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 273. *n.* 10.  
*Sulz. hist. inf. t.* 4. *f.* 12.  
*Schaeff. ic. t.* 75. *f.* 8.  
*Habitat in Europæ corylo, salice, a. coryli. similis, sed*  
*minor.*
- surinamen- 4. *A. elytris apice bidentatis.*  
fis. *Habitat Surinami, pensylvanico similis, a. coryli*  
*minor, niger; elytris fuscis, pedibus ferrugineis,*  
*antennis albo nigroque annulatis.* Rolander.

pensylva- 5. *A. niger*, elytris rubris: fascia media apicisque nigra.  
nicus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 124. n. 3.*

*Habitat in America boreali, statura surinamensis, sed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtusis basi flavescens, thorace oblongo glabro.*

melanu- 6. *A. niger*, elytris testaceis apice nigris.  
ros.

*Habitat Upsaliæ, pensylvanico similis, sed major, antennarum abdominisque basi & elytris testaceis.*

angula- 16. *A. ferrugineus*, coleoptris angulatis: disco nigro.  
tus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 124. n. 7.*

*Habitat in Cayenna, statura a. coryli, antennis & pectore nigris.*

ruficollis. 17. *A. rufus*, capitis vertice nigro, elytris cæruleis nitidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 200. n. 4. mant. inf. 1. p. 124. n. 8.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 87. n. 3. t. 25. f. 1. a.*  
*Habitat in Sibiria, statura a. coryli, antennarum apice cæruleo.*

pubescens. 18. *A. violaceus hirtus*, rostro atro. *Fabr. inf. 1. p. 200. n. 5. mant. inf. 1. p. 124. n. 9.*

*Habitat in Germania, rostro longiori.*

betulæ. 7. *A. ater*, pedibus saltatoriis. *Fn. suec. 640.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 6. mant. inf. 1. p. 124. n. 10.*

*Degeer inf. 5. p. 259. n. 47. Curculio excoriato-niger.*  
*Habitat in betulæ foliis, quæ rodendo pulchre crispæ reddit, ocysime saliens.*

*\*\* maxilla unidentata.*

*† palpis posterioribus securiformibus, Cleri.*

mutilla- 19. *A. niger*, elytris fascia triplici alba basi rufis. *Fabr.*  
rius. *sp. inf. 1. p. 201. n. 1. mant. inf. 1. p. 125. n. 1.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 87. n. 1. t. 25. f. 2.*

*Schranck inf. austr. n. 34. Dermestes fornicarioides.*

*Habitat Halæ faxonum.*

dubius. 20. *A. rufus*, elytris nigris: fascia duplici alba basique rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 2. mant. inf. 1. p. 125. n. 2.*

*Habitat in America boreali.*



INSECTA COLEOPTERA. Attelabus. *Clerus*. 1811

- ichneumoni- 21. *A. capite thoraceque rufis, elytris nigris : fascia media rufa strigaeque apicis alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 3. mant. inf. 1. p. 125. n. 3.*  
*Habitat in America boreali.*
- formicarius- 8. *A. niger, thorace rufo, elytris fascia duplici alba basique rubris. Fn. suec. 641. Scop. ent. carn. 111. Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 4. mant. inf. 1. p. 125. n. 5. Degeer inf. 5. p. 160. n. 3. t. 5. f. 8. Clerus formicarius.*  
*Schranck inf. austr. p. 21. n. 31. Dermestes formicarius.*  
*Raj. inf. p. 103. n. 29.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 8.*  
*Habitat in Europa & boreali America, ptinum pertinacem devastans, larva inter cortices putridos.*
- sphageus. 22. *A. niger, fronte elytrorumque fascia cinereis. Fabr. mant. inf. 1. p. 125. n. 4.*  
*Habitat in America boreali, statura & magnitudine formicarii.*
- sexguttatus. 23. *A. niger, fronte cinerascens, elytris maculis tribus albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 5. mant. inf. 1. p. 125. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali.*
- quadrin- 24. *A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 288. Fabr. mant. inf. 1. p. 125. n. 7.*  
*Habitat in Halæ Saxonum pinetis, parvus.*
- unifascia- 25. *A. niger, elytris fascia alba basi rubris. Fabr. mant. inf. 1. p. 125. n. 8.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 13. Attelabus formicarius minor.*  
*Habitat in Helvetiæ & Africæ onopordo.*
- octopunctatus. 26. *A. cyaneus hirtus, elytris rufis : punctis quatuor nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 126. n. 9.*  
*Habitat in Hispaniæ umbellatis, statura formicarii.*
- tricolor. 27. *A. rufus, capite nigro, elytris basi cæruleis, medio rufis apice violaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 202. n. 6. mant. inf. 1. p. 126. n. 10.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, formicario minor.*
- bifasciatus. 28. *A. viridi-æneus pubescens, elytris cyaneis : fasciis duabus coccineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 202. n. 7. mant. inf. 1. p. 126. n. 11.*  
*Habitat in Sibiria, formicarii magnitudine.*



- 1812 INSECTA COLEOPTERA. *Attelabus. Clerus. Spondylis-*  
*tipylus.* 9. *A. viridis*, elytris fascia duplici flava interrupta, tho-  
 race hirsuto. *Mus. Lud. Ulr.* 63. \* *Fabr. sp. inf.* 1.  
*p.* 202. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 12.  
*Habitat in Africa, statura & magnitudine formicarii.*
- Ammios.* 29. *A. viridis hirtus*, elytris cyaneis: maculis tribus flavis;  
 posterioribus lunatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 13.  
*Habitat in Africæ ammi majori, statura & magnitudine*  
*apiarii.*
- apiarius.* 10. *A. cærulescens*, elytris rubris: fasciis tribus nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 14.  
*Clerus elytris rubris: fasciis tribus cærulescentibus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 304. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 4. *Clerus*  
*nigro-violaceus hirsutus, &c.*  
*Degeer inf.* 5. *p.* 157. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 3. *Clerus cæruleo-*  
*violaceus.*  
*Schranck inf. austr.* *p.* 21. *n.* 36. *Dermestes apiarius*  
*Swammerd. bibl. nat.* *t.* 26. *f.* 3.  
*Reaum. inf.* 6. *t.* 8. *f.* 10.  
*Sulz. hist. inf.* *t.* 4. *f.* 6. & 14.  
*Schæf. el.* *t.* 46.  
*ic.* *t.* 48. *f.* 11.  
*Habitat in Europa, America, Sibiria, larva frequens*  
*in alveariis, imago in floribus, formicario duplo*  
*major.*
- cyaneus.* 30. *A. cyaneus*, abdomine pedibusque testaceis. *Fabr.*  
*mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 15.  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*
- crabroni-* 31. *A. niger hirtus*, elytris rufis: fasciis tribus nigris;  
*formis.* *tertia terminali.* *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 16.  
*Habitat in Oriente, apiario major.*  
 †† *palpis quatuor subfiliformibus, Spondylides.*
- ceramboi-* 12. *A. ater*, elytris rugosis thorace latioribus. *Fn. suec.*  
*des.* 643. \* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inf.* 1.  
*p.* 127. *n.* 2.  
*Uddm. diff.* 26. *t.* 1. *f.* 1. *Curculio maximus ater oblon-*  
*gus, elytris irregulariter reticulatis.*  
*Degeer inf.* 5. *p.* 32. *n.* 2. *Tenebrio variolosus.*  
*Habitat in boleto fomentario; nonne potius tenebrio?*
- suprestoi-* 13. *A. ater*, elytris nervosis, thorace subgloboso. *Fn.*  
*des.* *suec.* 644. \* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inf.*  
*1. p.* 127. *n.* 1.

*Fn. suec.* 1. n. 554. *Buprestis ater.*

*Degeer inf.* 5. p. 84. n. 21. t. 3. f. 21. *Cerambyx maxillosus niger*, &c.

*Frisch inf.* 13. p. 23. t. 19. *Scarabæus arboreus*, collo crasso.

*Habitat in Europæ silvis.*

## NOTOXUS. *Antennæ filiformes.*

*Palpi quatuor securiformes.*

*Maxilla unidentata.*

porcatus. 1. *N. niger elytris porcatis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 127. n. 1.  
*Habitat in terra van Diemen, molli major.*

violaceus. 2. *N. pubescens niger violaceo-nitidus, elytris lævibus: punctis tribus flavis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 127. n. 2.  
*Habitat in nova Seelandia.*

mollis. 3. *N. pubescens, elytris nigris: fasciis tribus pallidis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 3.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 621. n. 11. *Fn. suec.* 642. *Attelabus griseus pubescens, elytris fasciis tribus pallidis.*  
*Uddm. diss.* 28. t. 1. f. 9. *Curculio oblongus ruber, elytris nigris fascia triplici albicante.*  
*Geoff. inf. par.* 1. p. 305. n. 3. *Clerus fuscus villosus, &c.*  
*Degeer inf.* 5. p. 159. n. 2. t. 5. f. 6. *Clerus fusco fasciatus.*  
*Schranck inf. austr.* p. 22. n. 37. *Dermestes mollis.*  
*Habitat in Europæ floribus.*

monoceros. 4. *N. thorace in cornu supra Caput protenso.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 4. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 83. n. 2. t. 25. f. 4.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 651. n. 14. *Meloë monoceros.*  
*Fn. suec.* 638. *Attelabus monoceros.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 356. n. 1. t. 6. f. 8. *Notoxus.*  
*Habitat in Europæ floribus.*

204. CERAMBYX. *Antennæ setaceæ.*

*Palpi quatuor.*

*Thorax spinosus aut gibbus.*

*Elytra linearia.*

\* *palpis quatuor æqualibus.*

† *filiformibus.*

‡ *maxilla cylindrica integra, Prioni.*

† *thorace spinis mobilibus.*

longima- 1. *C. elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis*  
nus. *longis. Mus. Lud. Ulr. 64.\* Gron. zooph. 522.\* Fabr.*

*sp. inf. 1. p. 204. n. 1. mant. inf. 1. p. 128. n. 1.*

*Grew mus. 163. t. 13. Nococonaca.*

*Degeer inf. 3. p. 102. n. 6.*

*Sloan. jam. 2. p. 209.*

*Merian. surin. t. 28.*

*Vinc. mus. t. 1. f. inf. med.*

*Roef. inf. 2. scar. 2. p. 11. t. 1. f. a.*

*Aubent. miscell. t. 64. f. 1.*

*Habitat in America meridionali, tibiis anterioribus in*  
*altero sexu longissimis.*

rochlea- 2. *C. elytris fusco canoque variis: punctis elevatis.*  
ris. *Habitat in India. Degeer.*

† † *thorace marginato.*

fuligino- 84. *C. ater, thorace crenato unidentato, elytris apice cre-*  
fus. *nato-dentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 204. n. 2. mant.*  
*inf. 1. p. 128. n. 2.*

*Habitat in America meridionali, antennis pedibusque*  
*interdum rufis.*

rostratus. 85. *C. thorace unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis,*  
*sterno spinoso. Fabr. mant. inf. 1. p. 128. n. 3.*

*Habitat in Siam, mediæ magnitudinis, capite atro,*  
*antennis piceis, elytris nigris, pedibus rufis.*

cervicor- 3. *C. thorace utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus*  
nis. *unispinosis, antennis brevibus. Mus. Lud. Ulr. 65.\**

*Gron. zooph. 523.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 8. mant.*  
*inf. 1. p. 129. n. 12.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Prionus.* 1815

*Degeer inf.* 5. p. 94. n. 1.

*Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 6.

*Merian. surin.* t. 48.

*Roes. inf.* 2. scar. 2. p. 12. t. 1. f. B.

*Brown. jam.* 429. t. 44. f. 8.

*Aubent. miscell.* t. 90. f. 3.

*Habitat larva in Americæ ligno bombacis, exemta edulis, incolis in deliciis.*

armilla-  
tus.

4. *C. thorace utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus posterioribus unidentatis. Gron. zooph.* 525. t. 15. f. 6. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 15.  
*Habitat in India, maximus.*

amicor-  
nis.

86. *C. thorace denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 16.  
*Mant.* 1. p. 532. *Cerambyx thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus introrsum bidentatis, antennis mediocribus.*  
*Degeer inf.* 5. p. 97. n. 2.  
*Drury inf.* 1. t. 37. f. 1.  
*Habitat in America meridionali, cujus incolis larva in deliciis.*

imbricor-  
nis.

5. *C. thorace bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato-imbricatis, brevioribus. Gron. mus.* 529.  
*Roes. inf.* 2. scar. 2. t. 1. f. 1.  
*Habitat in Carolina, statura coriarii, an mera hujus varietas?*

Faber.

6. *C. thorace utrinque unidentato rugoso, elytris piceis, antennis mediocribus. Fn. suec.* 646.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 204. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 128. n. 6.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 13. f. 1.  
*Frisch inf.* 13. p. 2. t. 17.  
*Schaeff. ic.* t. 72. f. 3.  
t. 111. f. 1.  
*Habitat in Europæ ligno rarior.*

coriarius.

7. *C. thorace tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis brevioribus. Fn. suec.* 647.\* *Scop. ent. carn.* 161. *Gron. zooph.* 528. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 206. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 7.

1816 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*. *Prionus*.

*Fn. suec.* 480. *Cerambyx niger*, thorace planiusculo, margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.

*Gadd sat.* 79. *Cerambyx cinereo-nigricans*, antennis & pedibus rufis.

*Degeer inf.* 5. p. 59. n. 1. t. 3. f. 5. *Cerambyx* *Prionus*.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 198. n. 1. t. 3. f. 9. *Prionus*.

*Raj. inf.* p. 95. n. 1.

*Frisch inf.* 13. t. 9.

*Sulz. hist. inf.* t. 4. f. 26.

*Roesel inf.* 2. scar. 2. t. 1. f. 1. 2.

*Schaeff. el.* t. 103.

ic. t. 67. f. 3.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 13. f. 3. 4. 5. 6.

*Voet coleoptr.* 2. t. 3. f. 9.

*Habitat in Europæ betulis putridis, ova magna, oblonga, flavescentia pariens.*

*giganteus.* 87. *C.* thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus. *Mant.* 1. p. 531. *Fabr.*

*sp. inf.* 1. p. 206. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 14.

*Aubent. misc.* t. 64. f. 2.

*Drury inf.* 3. t. 49. f. 1.

*Habitat in America meridionali, mandibulis bidentatis.*

*melano-* 8. *C.* thorace ferrulato, corpore nigro, antennis brevibus, *-pus.* elytris mucronatis.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 25.

*Prionus* thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.

*Gron. zooph.* 531.

*Merian. surin.* t. 24. f. 1.

*Drury inf.* 1. t. 38. f. 2.

*Habitat in America meridionali, coriario duplo major.*

*spinofus.* 88. *C.* thorace multidentato nigro, elytris unidentatis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 130. n. 26.

*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis.*

*barbatus.* 89. *C.* thorace integro, mandibulis ferrugineo-hirsutissimis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 27.

*Habitat in America meridionali, magnus.*

*Thomæ.* 9. *C.* thorace crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis; margine luteo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 15.



*mant. inf. p. 129. n. 19. Herbst Besch. der berl. naturf. Fr. 4. t. 7. f. 9.*

*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis, 2 pollices longus.*

bilineatus. 90. *C. thorace crenato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 16. mant. inf. 1. p. 129. n. 20.*

*Habitat in insulis Americæ oppositis.*

cinnamomeus. 10. *C. thorace denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. Mus. Lud. Utr. 66.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 19. mant. inf. 1. p. 130. n. 24.*

*Prionus thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.*

*Merian. surin. 24. t. 24.*

*Sulz. hist. inf. 1. f. 2.*

*Drury inf. 1. t. 40. f. 2.*

*Habitat in America meridionali, elytris cinnamomeis.*

depfarius. 12. *C. thorace submarginato unidentato pubescente, corpore nigricante, antennis brevibus nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 128. n. 7.*

*Habitat in Suecia, coriario minor, & dimidio angustior.*

mucronatus. 91. *C. thorace bidentato, elytris rufis mucronatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 5. mant. inf. 1. p. 129. n. 8.*

*Habitat in America meridionali.*

curvus. 92. *C. niger, thorace bidentato: dentibus arcuatis, elytris obtusis testaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 129. n. 9.*

*Habitat in terra van Diemen, mediæ magnitudinis.*

Luzonum. 93. *C. thorace multispinoso, mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 6. mant. inf. 1. p. 129. n. 10.*

*Petiv. gazoph. t. 47. f. 1.*

*Habitat in insulis Luzonum.*

ferripes. 94. *C. thorace multispinoso, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus spinoso-ferratis. Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 7. mant. inf. 1. p. 129. n. 11.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, c. luzonum proximæ affinis.*



attratus. 13. C. thorace utrinque bidentato, corpore atro, antennarum  
medlocris antrosum aculeato - ferratis. *Gronov.*  
*zooph. 524. t. 14. f. 9.*  
*Habitat in Zeylon.*

lineatus. 14. C. thorace ferrulato dentato, elytris nigris: linea alba,  
antennis compressis brevioribus.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 204. n. 3. mant. inf. 1. p. 128. n. 4.*  
Prionus thorace marginato crenato unidentato niger  
albo vittatus, elytris apice crenato-dentatis.  
*Sloan. jam. 2. p. 209. t. 237. f. 34.*  
*Brown jam. 430. t. 43. f. 7.*  
*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.*

nitidus. 95. C. thorace crenato unidentato, cyaneo-æneus, elytris  
cupreis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 128. n. 5.*  
*Habitat in Brasilia, coriario paulo minor.*

spinibar- 15. C. thorace subcrenulato, capite sub maxillis spinoso  
bis, scabro, antennis brevibus. *Mus. Lud. Ulr. 67.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 17. mant. inf. 1. p. 130. n. 21.*  
Prionus thorace marginato crenato, capite sub man-  
dibulis tridentatis.  
*Merian. surin. 24. t. 24.*  
*Habitat in America meridionali, niger.*

maxillo- 96. C. thorace crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis  
fus. quadridentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 18. mant.*  
*inf. 1. p. 130. n. 22.*  
*Drury inf. 1. t. 38. f. 3.*  
*Habitat in America meridionali, spinibarbi affinis.*

canalicu- 97. C. thorace crenato: canali dorsali villosa albo, anten-  
latus. nis brevibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 130. n. 23.*  
*Habitat in insulis Americæ oppositis, coriario minor.*

bifascia- 16. C. thorace denticulato, corpore nigro, elytris rubris;  
tus. fasciis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 207. n. 13. mant. inf. 1. p. 129. n. 17.*  
*Gron. zooph. p. 532. t. 14. f. 4.*  
*Habitat in America meridionali.*

cylindroi- 98. C. obscurus, thorace tridentato, pectore abdomineque  
des. ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 207.*  
*n. 41. mant. inf. 1. p. 129. n. 18.*  
*Habitat in America boreali, mediæ magnitudinis.*

planatus. 17. C. thorace scabro anterieus dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 645. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 257. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 156. n. 6. infusus flavipes. *Habitat in Europæ truncis decoratis, pediculo duplo major, antennis mediocribus, vix hujus generis.*

† † *maxilla obtusa unidentata, Cerambyces.*

barbicornis. 18. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo nigro variegato. *Mus. Lud. Ulr.* 68. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 214. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 134. n. 34. *Habitat in Asia.*

Ammiralis. 19. C. thorace subspinoso, antennarum quarto articulo barbato, secundo spinoso. *Habitat Surinami, niger, elytrorum basi, thoracisque lateribus rufis.*

Batus. 20. C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. *Mus. Lud. Ulr.* 69. *Mus. Peirap.* 652. n. 154. Capricornus niger cornutus. *Habitat in America australi & India.*

araneiformis. 21. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, antennis longis: articulo quinto barbato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 209. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 131. n. 3. *Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 24. *Drury inf.* 1. p. t. 35. f. 4. *Habitat in America meridionali, griseus, ædili duplo major.*

nodosus. 99. G. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 209. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 131. n. 4. *Habitat in Marilendia.*

cancriformis. 100. C. thorace multidentato: dorso plano, elytris tibiisque anterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 131. n. 5. *Drury inf.* 2. t. 35. f. 1. *Cerambyx pustulatus.* *Habitat in America meridionali.*

tuberculatus. 101. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris punctatis spinosisque, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 131. n. 6. *Habitat in Jamaica, statura cancriformis.*

hebræus. 102. *C. thorace acute dentato : dorso bicarinato , elytris cinereis fusco striatis maculatisque. Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 5. mant. inf. 1. p. 131. n. 7.*

*Habitat in America meridionali , cinereus.*

Scorpio. 103. *C. thorace quadrispinoso , elytris tuberculato-granulatis , tibiis anterioribus apice dilatatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 6. mant. inf. 1. p. 131. n. 8.*

*Habitat in America meridionali , cinereus.*

Sentis. 23. *C. thorace spinoso lævi , elytris fastigiatis biguttatis , antennis subius aculeatis longioribus.*

*Habitat in India , griseus , linea alba ab antennis per latera thoracis & abdominis ducta , antennis corpore sesquialongioribus.*

farinosus. 24. *C. piceus , thorace spinoso , elytris punctis albis farinosis sparsis , antennis longis. Fabr. sp. inf. 1. p. 214. n. 25. mant. inf. 1. p. 134. n. 55.*

*Degeer inf. 5. p. 108. n. 9. t. 13. f. 17. Cerambyx niger, &c. Forster nov. inf. sp. 1. p. 39. n. 39. Cerambyx chinensis. Merian. surin. 1. 24. f. inf.*

*Drury inf. 2. t. 31. f. 4.*

*Habitat in argemones mexicanæ radice , larva albicans , capite caudaque nigris , imago lineolis duabus elytrorum mediis approximatis glabris.*

ferrugineus. 25. *C. thorace spinoso rugoso , elytris fastigiatis subferrugineis , antennis longis. Mus. Lud. Ulr. 70.\*.*

*Habitat in India.*

depressus. 26. *C. depressus niger , cinereo variegatus , thorace multispinoso , elytris acuminatis , antennis longis. Fabr. sp. inf. 1. p. 214. n. 22. mant. inf. 1. p. 134. n. 32.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 626. n. 26? Cerambyx thorace quadrispinoso : dorso depressio , elytris fastigiatis nebulosis : antennis punctis elevatis sparsis , antennis longis.*

*Schreb. inf. 8. f. 10? Cerambyx lepturoides , thorace mucronato , elytris apice emarginatis , punctis elevatis scabris.*

*Habitat in insulis , Americæ meridionali oppositis , succinidi magnitudine.*

---

*Cerambycen larvæ cortices & ligna rodunt , perforant , penetrant , extrahuntur a picis.*

- fasciatus. 104. *C. cyaneus*, thorace spinoso, elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 214. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 134. n. 33.  
*Pall. ic. inf. russ.* 2. t. F. f. 4.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 25. f. 5.  
*Habitat* Tranquebariæ.
- glaucus. 28. *C. glaucus*, thorace quinquespinoso, elytris muricatis: latere fasciaque nigris, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 210. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 131. n. 9.  
*Degeer inf.* 5. p. 111. n. 13. t. 14. f. 4. *Cerambyx tuberculatus*.  
*Habitat in America meridionali, subtus fuscus.* Rolander.
- bidentatus. 105. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis scabris cinereofuscis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 210. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 131. n. 10.  
*Habitat in America meridionali.*
- nebulosus. 29. *C. thorace spinoso, elytris fastigiatis: punctis fasciisque nigris, antennis longioribus.* *Fn. suec.* 650. *Il. gotl.* 173.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 215. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 134. n. 36.  
*Scop. ent. carn.* n. 173.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 204. n. 7.  
*Voet coleopt.* 2. t. 4. f. 4.  
*Degeer inf.* 5. p. 71. n. 8.  
*Sulz. hist. inf.* t. 4. f. 7.  
*Habitat in abietum truncis, quas librum desiruendo necat.*
- fasciculatus. 106. *C. thorace spinoso, elytris integris: punctis tribus hispidis, antennis mediocribus hirtis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 134. n. 37.  
*Habitat in Germania, medius quasi inter nebulosum & hispidum.*
- hispidus. 30. *C. thorace spinoso, elytris anterieus albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 215. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 134. n. 37.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 215. n. 27. *Fn. suec.* 651. *Cerambyx thorace spinoso, elytris subpræmortalis punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.*  
*Fn. suec.* 1. n. 484. t. 1. *Cerambyx cinereus, elytris præmortalis nigris fasciaque alba, antennis sesquilongioribus.*  
*Degeer inf.* 5. p. 71. n. 9. t. 3. f. 17. *Cerambyx fasciculatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 206. n. 9.  
*Raj. inf.* p. 97. n. 4.

*Schaeff. ic. t. 14. f. 9.*

*Frisch inf. 13. p. 22. t. 16.*

*Habitat in Europa.*

*pilosus*. 107. *C. thorace bispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. Fabr. mant. inf. 1. p. 134. n. 39.*

*Habitat Halæ Saxonum, statura hispidi, sed minor, griseus.*

*rugicollis*. 108. *C. niger, thorace inermi rugosissimo, antennis mediocribus pedibusque piceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 135. n. 40.*

*Habitat Tranquebariæ.*

*longicollis*. 109. *C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco griseoque vario, antennis longissimis. Fabr. sp. inf. 1. p. 235. n. 28. mant. inf. 1. p. 135. n. 41.*

*Habitat in Coromandel, mediæ magnitudinis.*

*marginata*. 110. *C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omninigro. Fabr. sp. inf. 1. p. 215. n. 29. mant. inf. 1. p. 135. n. 42.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

*brevicollis*. 111. *C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis brevibus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 30. mant. inf. 1. p. 135. n. 43.*

*Habitat in Sierra Leon Africæ.*

*desertus*. 31. *C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albofasciatis, antennis longioribus. Mus. Lud. Ulr. 71.\**

*Habitat in America.*

*succineus*. 32. *C. thorace bispinoso rugoso, elytris fascia flava antennis longioribus compressis. Mus. Lud. Ulr. 72. Gron. zooph. 535. Fabr. sp. inf. 1. p. 213. n. 21. mant. inf. 1. p. 133. n. 27.*

*Degeer inf. 5. p. 113. n. 14. t. 14. f. 5. Cerambyx fusco castaneus.*

*Marcgr. bras. 254. Quici.*

*Drury inf. 1. t. 39. f. 2.*

*Habitat in America, præsertim Brasilia.*

*fuliginosus*. 112. *C. ferrugineus, thorace bispinoso rugoso, elytris flavo striatis, antennis longis. Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 28.*

*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine succinctorum, antennarum corpore duplo longiorum, femorumque apice nigro.*



- rufipes. 113. C. thorace bispinoso rufo, elytris lævibus nigris, antennis longis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 29.*  
*Habitat in America meridionali, statura et magnitudine stigmaris.*
- dimidiatus. 114. C. thorace bispinoso rugoso, flavus nigro punctatus, elytris nigris basi flavis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 30.*  
*Habitat in Cayenna, succincto paulo minor.*
- bicolor. 115. C. ferrugineus, thorace bispinoso tuberculatoque, elytris ultra dimidium abdomineque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 134. n. 31.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine rufipedis.*
- virens. 33. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi femoribus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 10. mant. inf. 1. p. 131. n. 12. Syst. nat. XII. 2. p. 627. n. 33.* Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis.  
*Drury inf. 1. t. 40. f. 1.*  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 39. 40.*  
*Brown jam. 430. t. 43. f. 8.*  
*Habitat in insulis Americæ oppositis, antennis nunc longioribus, nunc brevioribus, femoribus nunc muticis, nunc dentatis.*
- nitens. 116. C. viridi-nitens, thorace-rotundato subspinoso, femoribus clavatis: clava anteriorum rufa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 11. mant. inf. 1. p. 131. n. 13.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, virenti affinis.*
- afer. 117. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. *Mant. p. 532. Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 12. mant. inf. 1. p. 132. n. 14.*  
*Drury inf. 1. t. 39. f. 4.*  
*Habitat in Africa.*
- festus. 118. C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 13. mant. inf. 1. p. 132. n. 15.*  
*Habitat ad fluvium Gaboon Africæ.*
- virgatus. 119. C. viridis nitens, thorace spinoso, elytrisque nigro lineatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 14. mant. inf. 1. p. 132. n. 16.*  
*Habitat in Brasilia.*



*velutinus*. 120. *C. thorace spinoso niger: vitta atra. Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 15. mant. inf. 1. p. 132. n. 17.*

*Habitat in America meridionali, virenti proxime affinis.*

*futuratus*. 121. *C. ater, thorace spinoso, elytris futura vittaque media aureis. Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 16. mant. inf. 1. 132. n. 18.*

*Habitat in America meridionali, velutino proxime affinis.*

*torridus*. 122. *C. niger, thorace subspinoso, elytris viridibus apice spinosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 213. n. 17. mant. inf. 1. p. 132. n. 19.*

*Habitat in Sierra Leon Africa.*

*Gigas*. 123. *C. niger, thorace rugoso acuteque spinoso, elytris ferrugineis, antennis longis. Fabr. mant. inf. 1. p. 132. n. 20.*

*Habitat in India, maximus hujus tribus.*

*moschatus*. 34. *C. viridis nitens, thorace spinoso, antennis cyaneis mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 9. mant. inf. 1. p. 131. n. 11.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 627. n. 34. Fn. suec. 652.\* Scop. ent. carn. 165. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.*

*Fn. suec. 1. n. 478. Cerambyx viridi-cærulefcens, antennæ corpus subæquantibus.*

*Degeer inf. 5. p. 64. n. 2. Cerambyx odoratus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 203. n. 5. Cerambyx viridi-cærulefcens.*

*Mouff. inf. 149. f. ult. Cerambyx tertius.*

*Raj. inf. p. 81. n. 17.*

*Lister scar. p. 384. n. 11.*

*Frisch inf. 13. t. 11.*

*Anmir. inf. t. 33.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. e.*

*Schæff. ic. t. 11. f. 7. & t. 55. f. 1.*

*Bergstr. nomencl. 1. p. 13. n. 2. t. 2. f. 2.*

*Habitat in Europæ salice, antennis pedibusque nunc cyaneis, nunc fuscis, vivus odorem gratum & soporiferum spirans, ova pariens candida, sapida.*

*urpinus*. 35. *C. thorace spinoso, coleoptris fascia, maculisque quatuor atris, antennis longis. Fn. suec. 654. Scop. ent. carn. 166. Fabr. sp. inf. 1. p. 213. n. 19. mant. inf. 1. p. 132. n. 23.*

*It. scan.* 260. *Cerambyx subcærulefcens*, fascia maculifque 4 nigris.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 202. n. 4. t. 3. f. 6.

*Scheuchz. it. alp.* 1. t. 1. f. 5.

*Jonst. inf. t.* 15. f. 3.

*Mouff. inf.* 150. f. 2.

*Rob. ic.* 8.

*Sulz. hist. inf. t.* 4. f. d.

*Schæff. ic. t.* 123. f. 1.

*Drury inf.* 2. t. 31. f. 5.

*Habitat in Europæ montosis.*

*scalatus.* 124. *C. fuscus*: linea longitudinali alba, thorace spinoso, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 213. n. 20.  
*mant. inf.* 1. p. 132. n. 24.

*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.*

*cafer.* 125. *C. viridi-æneus*, thorace spinoso, elytris testaceis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 132. n. 25.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*

*Morio.* 126. *C. ater*, thorace bispinoso rugoso, antennis longioribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 133. n. 26.  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine succindæ.*

*ædilis.* 37. *C. thorace spinoso*: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis. *Fr. succ.* 653.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 209. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 1.  
*It. oel.* *Cerambyx nebulosus*, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.  
*Petiv. gaz. t.* 8. f. 8. *Capricornus ruficus.*  
*Degeer inf.* 5. p. 66. n. 5. t. 4. f. 1. 2.  
*Mouff. inf.* 151. f. 2.  
*Aët. nidr.* 4. t. 16. f. 8.  
*Frisch inf.* 13. t. 12.  
*Sulz. hist. inf. t.* 4. f. 27.  
*Schæff. ic. t.* 14. f. 7.  
*Bergstr. nomencl.* 1. 3. 5. t. 1. f. 5. 6. t. 2. f. 1.  
*Habitat in Europæ borealis arborum truncis, antennis pro sexu diversis.*

*varius.* 127. *C. thorace spinoso tuberculatoque*, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 130. n. 2.  
*Habitat in Austria, ædili minor.*

Cerdo.

39. *C. thorace spinoso rugoso niger, antennis longis. Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 18. mant. inf. 1. p. 132. n. 21. Syst. nat. XII. 2. p. 629. n. 39. Scop. ent. carn. 162.*  
*Cerambyx thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis. Geoffr. inf. par. 1. p. 201. n. 2.*  
*Mouff. inf. 149. f. 1.*  
*Frish inf. 13. t. 8.*  
*Drury inf. 1. t. 39. f. 1.*  
*Schaeff. ic. t. 14. f. 8.*  
*Bergstr. nomencl. 1. 8. 10. t. 1. f. 10. & t. 2. f. 3.*  
 β) *Cerambyx Heros. Scop. ent. carn. 163.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 200.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 11. f. 5. 6.*  
*Habitat in Europæ ligno, β) major.*

Heros.

128. *C. niger, thorace spinoso rugoso, elytris apice subspinosis testaceis, antennis longis. Fabr. mant. inf. 1. p. 132. n. 22.*  
*Schaeff. ic. t. 24. f. 3.*  
*Habitat in Europæ quercu, cerdoni affinis.*

auricomus.

40. *C. thorace quadrispinoso ater, elytris tæniis geminis aureis, pedibus posterioribus latissimis compressis. Gron. zooph. 534. t. 16. f. 1.\**  
*Habitat in America meridionali, antennis corpore paulo longioribus.*

uvencus.

53. *C. thorace inermi rugoso, elytris acuminatis nigris, lanuginoso-canescens, antennis longissimis. Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 31. mant. inf. 1. p. 135. n. 44.*  
*Habitat in America meridionali ferrugineus, carchariae magnitudine.*

holosericeus.

129. *C. thorace inermi rugoso, griseus, elytris unidentatis holosericeis fusco cinereoque micantibus, antennis mediocribus. Fabr. mant. inf. 1. p. 135. n. 45.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

longicollis.

130. *C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus, antennis longissimis. Fabr. mant. inf. 1. p. 135. n. 46.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis, capite fusco.*

- Herbstii.* 131. *C. niger*, thorace rugoso utrinque unispinoso, elytris supra viridi-aureis : margine ad apicem fasciisque duabus rubris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 168. n. 11. t. 45. f. 10.*  
*Voet coleoptr. 2. t. 8. f. 26?*  
*Habitat in America.*
- platypus.* 132. *C. cæsius*, subtus, antennis pedibusque cæruleus, elytris ex purpureo viridi-aureis : lineis duabus elevatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 169. n. 12. t. 45. f. 11.*  
*Degeer inf. 7. t. 49. f. 3.*  
*Habitat in India, statura moschati.*
- lufinatus.* 133. *C. thorace spinoso*, corpore toto testaceo, elytris fascia undulata pallida. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 5.*  
*Habitat in Lusitania, culicis magnitudine, antennis ferrugineis, an hujus tribus?*
- balteus.* 134. *C. thorace spinoso*, corpore ferrugineo, abdomine ovato, elytris fascia nigricante. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 6.*  
*Habitat in Lusitania, culicis magnitudine, antennis corpore vix longioribus, an ad hanc tribum spectat?*
- smirnen-  
fis.* 135. *C. thorace teretiusculo subconvexo ad latera utrinque mucronato.* *Hasselt. it. pal. p. 451.*  
*Habitat in Syria; an huic tribui adscribendus?*
- +++ maxilla bifida.  
 † cornea, Lamix.
- Tribulus.* 136. *C. thorace quadrispinoso*, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 1. mant. inf. 1. p. 136. n. 1.*  
*Habitat ad fluvium Gaboon Africae.*
- fronticor-  
nis.* 137. *C. thorace spinoso*, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 2. mant. inf. 1. p. 136. n. 2.*  
*Drury inf. 2. t. 31. f. 2. Cerambyx bipunctatus.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, fuscus.*
- pelicor-  
nis.* 138. *C. thorace elytrisque spinosis*, femoribus anterioribus cornutis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 3. mant. inf. 1. p. 136. n. 3.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

1828 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*. *Lamia*.

Hystrix. 139. *C. thorace quinquespinoso, elytris fasciculato-pilosis, antennis mediocribus serratis. Fabr. sp. inf. I. p. 216. n. 4. mant. inf. I. p. 136. n. 4.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

Crista. 140. *C. griseus, thorace acute spinoso, elytris basi tuberculo compresso tridentato. Fabr. sp. inf. I. p. 216. n. 5. mant. inf. I. p. 136. n. 5.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

ambulator. 141. *C. thorace antierius utrinque bispinoso, corpore nullo. Fabr. sp. inf. I. p. 216. n. 6. mant. inf. I. p. 136. n. 6.*  
*Habitat in insulis Luzonum.*

Rubus. 21. *C. thorace spinoso himaculato, elytris bidentatis biseabris mucronatis. Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 44. mant. inf. I. p. 142. n. 59.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 625. n. 21. Cerambyx thorace spinoso, antennis subtus hispidis longis, elytris bidentatis basique mucronatis albo himaculatis.*  
*Degeer inf. 5. p. 106. n. 7. t. 13. f. 16. Cerambyx albo fasciatus.*  
*Habitat in India.*

spinicornis. 142. *C. thorace spinoso rugoso, elytris griseis truncatis, antennis compressis, articulis apice spinosis. Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 45. mant. inf. I. p. 142. n. 60.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, rubo minor.*

brunneus. 143. *C. brunneus, thorace trispinoso, elytris obtusifris duabus elevatis obscuris, antennis compressis brevioribus. Forst. nov. inf. sp. I. p. 37. n. 37.*  
*Degeer inf. 5. p. 99. n. 3. t. 13. f. 13. Cerambyx pennsylvanicus.*  
*Drury inf. I. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in America septentrionali, moschato major, propria species huc spectans?*

scabrator. 144. *C. subtestaceus, thorace spinoso, elytris punctatis baseos scabris. Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 46. mant. inf. I. p. 142. n. 61.*  
*Habitat in India.*

Spengleri. 145. *C. cinereus, thorace spinoso tuberculato, elytris scabris: maculis duabus lateralibus atris. Fabr. sp. I. p. 225. n. 47. mant. inf. I. p. 142. n. 62.*  
*Habitat in America meridionali.*



bidens. 146. *C. griseus*, thorace acute spinoso, elytris apice bidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 225. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 142. n. 63.

*Habitat in nova Hollandia.*

Cantor. 147. *C. thorace mutico cinereo nigro-punctato*, elytris pallide testaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 142. n. 64.

*Habitat in Sina, mediæ magnitudinis, niger, cinereo-villosus.*

Solandri. 148. *C. niger*, thorace subspinoso, elytris bidentatis fuscis cinereo irroratis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 225. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 142. n. 65.

*Habitat in nova Hollandia.*

cornutus. 149. *C. thorace obtuse spinoso*, mandibulis basi cornutis antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 225. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 142. n. 66.

*Habitat in America.*

leprofus. 150. *C. thorace spinoso*, elytris basi variolosis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 225. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 142. n. 67.

*Habitat in America.*

capensis. 36. *C. niger*, thorace bispinoso, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 220. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 138. n. 25.

*Poda mus.* 32. n. 3.

*Petiv. gazoph.* t. 3. f. 8.

*Drury inf.* 1. t. 39. f. 3.

*Voet coleopt.* 2. t. 8. f. 26.

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

hottentotus. 151. *C. thorace spinoso rufo*, elytris nigris: fascia maculisque duabus marginalibus sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 220. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 138. n. 26.

*Brown ill.* 113. t. 49. f. 1. *cerambyx punctatus.*

*Voet coleopt.* 2. t. 8. f. 26.

ferrugatus. 152. *C. obscure ferrugineus*, thorace spinoso, elytris obscure virescentibus: striga interrupta sanguinea, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 138. n. 27.

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus.*



1830 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Lamia.*

- humera- 153. *C. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis antennis*  
lis. mucronatis. *Fabr. sp. sp. inf. 1. p. 220. n. 23. mant.*  
*inf. 1. p. 138. n. 128.*  
*Habitat - - -*
- trifascia- 154. *C. ater, thorace subspinoso, elytris fasciis tribus flavis*  
tus. antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 220. n. 24.*  
*mant. inf. 1. p. 138. n. 29.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- jamaicen- 155. *C. thorace spinoso posterius sinuato : elytris flavis*  
fis. fasciis duabus maculaque rhombea cyanea. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 220. n. 25. mant. inf. 1. p. 138. n. 30.*  
*Habitat in Jamaica.*
- nobilis. 156. *C. thorace spinoso atro : margine flavo, elytris atris*  
fasciis tribus flavis punctisque duobus albis. *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 138. n. 31.*  
*Habitat in Cayenna, statura bifasciati.*
- aethiops. 157. *C. ater thorace spinoso, elytris fasciis duabus punctisque*  
apicis luteis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 220. n. 26. mant. inf. 1. p. 139. n. 32.*  
*Habitat ad Caput bonae spei.*
- variega- 158. *C. thorace spinoso cinereo elytris fusco variis*  
tor. antennis longis. *Fab. sp. inf. 1. p. 221. n. 27. mant.*  
*inf. 1. p. 139. n. 33.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*
- Sutor. 38. *C. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis*  
scutello luteo, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 218. n. 15. mant. inf. 1. p. 137. n. 17.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 628. n. 38. Fn. suec. 655. \* Scop. ent.*  
*carn. 162. Cerambyx thorace spinoso, elytris obrutis*  
atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis.  
*Fn. suec. 1. n. 482. Cerambyx ater, elytris punctatis*  
maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus,  
thorace spinoso.  
*Gadd diff. 27. Cerambyx nigro nebulosus, scutello*  
pallido, elytris fusco æneis.  
*Degeer inf. 5. p. 65. n. 4. Cerambyx atomarius.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 4.*  
*Schoeff. ic. t. 65. f. 1.*  
*Habitat in Europæ silvis.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Lamia.* 1831

- Sartor. 159. *C. niger*, thorace spinoso, scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 137. n. 18.  
*Habitat* Dresdæ, an major varietas futoris?
- reticulato- 160. *C. niger*, thorace spinoso nigro-lineato, elytrisque  
 tor. reticulatis fulvis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 219. n. 16. *mant.*  
*inf.* 1. p. 137. n. 19.  
*Habitat* in India, futoris magnitudine.
- molator. 161. *C. obscurus cinereus fusco-maculatus*, thorace spinoso,  
 elytris apice rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 137. n. 20.  
*Habitat* in Cayenna, mediæ magnitudinis.
- titillator. 162. *C. thorace spinoso*, elytris cinereo fusco glaucoque  
 nebulosis, antennis longissimis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 219. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 137. n. 21.  
*Habitat* in Carolina.
- vittator. 163. *C. thorace spinoso*, elytris cinereo pulverulentis: vittis  
 duabus flavis nigro marginatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 219. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 137. n. 22.  
*Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 38. n. 38. *Cerambyx incanus.*  
*Periv. gazoph. t.* 24. f. 6.  
*Habitat* ad Sinus Campechienfis littora.
- oculator. 164. *C. niger*, thorace spinoso, elytris maculis quatuor  
 flavis subocellaribus, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 219. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 138. n. 123.  
*Degeer inf.* 7. t. 49. f. 1. *Cerambyx ocellatus.*  
*Voet coleopt.* 2. t. 7. f. 21.  
*Habitat* ad Caput bonæ spei.
- Textor. 41. *C. thorace spinoso*, elytris convexis atris, antennis mediocri-  
 bus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 217. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 136. n. 7.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 629. n. 41. *Fn. succ.* 656.\* *Scop. ent.*  
*carn.* 164. *Cerambyx thorace spinoso*, elytris obtusis  
 convexis atris punctatis, antennis mediocribus.  
*Uddm. diff.* n. 29. *Cerambyx sordide niger*, punctis  
 elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem  
 subæquantibus.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 201. n. 3.  
*Degeer inf.* 5. p. 64. n. 3.  
*Schæff. ic. t.* 10. f. 1.  
*Bergstr. nomencl.* 1. 5.-8. t. 1. f. 8.  
*Habitat* in Europæ truncis arborum.

1832 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Lamia.*

- vaginator. 165. *C. niger*, thorace spinoso rugoso, elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 136. n. 8.*  
*Habitat in India, magnus.*
- pulcher. 166. *C. niger*, anterieus fasciis, posterius punctis viridibus, thorace spinoso, elytris basi mucronatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 217. n. 8. mant. inf. 1. p. 136. n. 9.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 6.*  
*Habitat in Africa.*
- regalis. 167. *C. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi irroratis, maculis tribus fulvis. Fabr. sp. inf. 1. p. 217. n. 9. mant. inf. 1. p. 136. n. 10.*  
*Brown illustr. t. 50. f. 1.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura pulchri.*
- nigricornis. 168. *C. griseus*, thorace mutico, elytris dorso planis, antennis brevibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 10. mant. inf. 1. p. 136. n. 11.*  
*Habitat in Coromandel.*
- grifator. 169. *C. griseus*, thorace mutico, elytris basi tuberculis duobus apice spinosis, antennis brevibus villosis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 136. n. 12.*  
*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis.*
- sternutator. 170. *C. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 11. mant. inf. 1. p. 137. n. 13.*  
*Habitat in insula Barbados.*
- gutturator. 171. *C. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis: basi punctis elevatis glabris. Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 12. mant. inf. 1. p. 137. n. 14.*  
*Habitat in Africa.*
- nubilus. 172. *C. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 13. mant. inf. 1. p. 137. n. 15.*  
*Habitat in Germania, mediæ magnitudinis.*
- ariolator. 173. *C. thorace spinoso lineato, elytris fuscis: linea semicirculari alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 14. mant. inf. 1. p. 137. n. 16.*  
*Habitat in India.*

- tristis*. 42. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 139. n. 37. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 95. n. 54. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 90. n. 6. t. 25. f. 7. *Habitat in ligno cupressi Europæ australis, antennis interdum corpore duplo longioribus.*
- lanestus*. 174. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris lævibus: maculis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 139. n. 38. *Habitat frequens in Galliæ sambuco, tristi proxime affinis, at duplo minor.*
- punctator*. 175. *C. ater*, thorace spinoso, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 39. *Forster nov. inf. sp.* 1. p. 39. n. 39. *Cerambyx chinensis. Drury inf.* 2. t. 31. f. 4. *Cerambyx farinosus. Habitat in Sina.*
- crispus*. 175. *C. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo. Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 40. *Habitat ad Caput bonæ spei.*
- rotator*. 176. *C. cinereus*, thorace spinoso, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 41. *Habitat in India.*
- glycyrhizæ*. 177. *C. niger*, thorace spinoso, elytris albolineatis bica-rinatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 42. *Pall. it.* 2. p. 723. n. 60. *Sulz. hist. inf. t.* 5. f. 9. *Cerambyx ovatus? Habitat in Sibiria, fuliginatore triplo major.*
- cruciat*. 178. *C. niger*, thorace spinoso, coleoptris cruce media alba. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 140. n. 43. *Pall. ic. inf. Ruff.* 2. t. F. f. 5. *Lepechin it.* 2. p. 198. t. 10. f. 8. *Cerambyx crucifer. Habitat in Russia magis australi, statura fuliginatoris, at paulo major.*

1834 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*. *Lamia*.

- fuliginator. 43. *C. niger*, thorace subspinoso, elytris cinerascens, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 44.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 205. n. 8.  
*Degeer inf.* 5. p. 70. n. 7.  
*Frisch inf.* 13. t. 19.  
*Voet coleoptr.* 2. t. 8. f. 30.  
*Habitat in Europa australi, ætate totus niger, lanugine darsa.*
- cinerarius. 179. *C. cinerascens*, thorace spinoso, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 140. n. 45.  
*Pall. ic. inf. russ.* 2. t. F. f. 11.  
*Habitat in Russia meridionali, statura fuliginatoris, colore proxime affinis.*
- carinatus. 180. *C. niger*, thorace spinoso, elytris piceis: carina laterali elevata albidâ, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 46.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 91. n. 8. t. 25. f. 8.  
*Habitat in Sibiria, statura & magnitudine fuliginatoris.*
- coquus. 44. *C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis fulcatis, aris anterieus ferrugineis, antennis mediocribus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 47.  
*Habitat in America boreali, thoracis spinis minutis.*
- rufipator. 181. *C. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fulcis cinereo variegatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 48.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*
- tornator. 182. *C. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antennis brevibus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 141. n. 59.  
*Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 41. n. 41. *Cerambyx tetrophthalmus.*  
*Habitat in America boreali.*
- Bankii. 183. *C. griseus*, thorace subspinoso, elytris ferrugineo irroratis: fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 141. n. 50.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- faltator. 184. *C. griseus*, thorace inermi, elytris fasciis duabus macularibus abbreviatis strigæque posteriore punctata niveis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 141. n. 51.  
*Habitat - - - parvus,*



- testator. 185. *C. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 223. n. 40. mant. inf. I. p. 141. n. 52.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus, brevis, villosus.*
- Köhleri. 50. *C. niger, thorace spinoso elytrisque sanguineis: macula nigra. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 96. n. 56. Fabr. sp. inf. I. p. 219. n. 20. mant. inf. I. p. 138. n. 24.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 204. n. 6.*  
*Schaeff. ic. t. I. f. 1.*  
 β) *Cerambyx ungarica. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 90. n. 4. t. 25. f. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 153. f. 4.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- pedestris. 51. *C. ater, vitta integra alba, thorace spinoso, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. I. p. 223. n. 41. mant. inf. I. p. 141. n. 53.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 631. n. 51. Cerambyx thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosis atris: sutura alba, antennis mediocribus.*  
*Poda inf. p. 34. n. 9. Cerambyx pedestris.*  
*Scop. ent. carn. n. 168. Cerambyx arenarius.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 3. p. 91. n. 9. t. 25. f. 9.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- Scopoli. 186. *C. niger, thorace spinoso, elytris unicoloribus, antennis brevibus. Fabr. mant. inf. I. p. 141. n. 54.*  
*Scop. ent. carn. n. 169. Cerambyx æthiops.*  
*Habitat in Germania australi, pedestris proxime affinis, at paulo minor, elytris nunc nigris, nunc testaceis.*
- Germanicus. 187. *C. ater, thorace spinoso, elytris marginibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis. Fabr. mant. inf. I. p. 141. n. 55.*  
*Habitat in Germania, statura & magnitudine pedestris.*
- molitor. 188. *C. fuscus, vittis tribus integris albis, thorace subspinoso, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 42. mant. inf. I. p. 142. n. 56.*  
*Habitat in India, an varietas pedestris?*
- tuberculator. 189. *C. griseus, thorace mutico, coleoptris basi bituberculatis: maculis duabus communibus albis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 43. mant. inf. I. p. 142. n. 57.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parvus.*



1836 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*. *Lamid.*

- mutator. 190. *C. villosus*, thorace mutico lineato cinereo, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 142. n. 58.  
*Habitat in Tahiti, tuberculatoris magnitudine.*
- curculio- 64. *C. fuscus*, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris.  
noides. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 139. n. 34.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 634. n. 64. *Cerambyx* thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesqui-  
altero, antennis longis.  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 101. n. 75. *Leptura curculio-*  
*noides.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 210. n. 5.  
*Schaeff. ic. t.* 39. f. 1. & t. 155. f. 5.  
*Habitat in Europa magis australi.*
- fuscus. 191. *C. niger ferrugineo irroratus*, thorace spinoso rugoso, elytris basi macula ocellari atra, antennis longioribus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 139. n. 35.  
*Habitat in Siam, tristi paulo major.*
- notatus. 192. *C. obscurus* thorace spinoso, elytris punctis duobus approximatis atris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 139. n. 36.  
*Habitat in Cayenna, statura curculionoidis.*
- fulvus. 193. *C. apterus niger*, thorace spinoso, elytris rubris, abdomine brevioribus. *Schranck inf. austr.* p. 139. n. 263. *Scop. ent. carn.* n. 170.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 25. f. 10.  
*Habitat in Austria.*
- ungaricus. 194. *C. niger*, capite thoraceque spinoso linea longitudinali, elytris futura lineisque tribus albis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 91. n. 12. t. 25. f. 11.  
*Habitat in Ungaria.*
- trifascia- 366. *C. thorace spinoso, elytris convexis nigris: fasciis*  
tus. *tribus coccineis interruptis; apicis angustiore, antennis corpore longioribus.* *Mus. Lesk. p.* 24. n. 534.  
*Habitat extra Europam.*
- luteus. 367. *C. oblongus*, thorace quadrispinoso capite antennarum nigrarum basi pedibusque luteis, dorso lineis tribus fuscis, elytris apice bispinosis flavescens: rugis duabus margineque fuscis. *Mus. Lesk. p.* 24. n. 535.  
*Habitat extra Europam.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Saperda.* 1837

- Daviesii. 377. *C. ater*, thorace spinoso, punctis maculisque plurimis fulvis, elytris subtriangularibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. n. 3. 3. 15. t. 8. f. 6.  
*Habitat in sinu Hinduras Americæ, curculionoide paulo major.*

† † membranacea, Saperdæ.

- Carcharias. 52. *C. thorace mutico cylindrico*, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 660. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 230. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 1.  
*Degeer inf.* 5. p. 73. n. 10. t. 3. f. 19. *Cerambyx punctatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 208. n. 1.  
*Pet. gar.* 5. t. 2. f. 1.  
*Goed. inf.* 2. t. 51.  
*List. goed.* f. 106.  
*Schaeff. ic.* 1. 38. f. 4. & t. 152. f. 4.  
*Drury inf.* 1. t. 41. f. 5.  
*Bergstr. nomencl.* 1. 5. 7. t. 1. f. 7.  
 p) *Cerambyx villosus.* *Lepech. it.* 2. t. 11. f. 13?  
*Habitat in Europæ, β) Sibiria silvis.*

- confluens. 368. *C. niger*, thorace cylindrico, antennis mediocribus, elytris punctis confluentibus. *Mus. Lesk.* p. 26. n. 557.  
*Habitat in Europa.*

- fuscicornis. 369. *C. testaceus*, thorace longo utrinque tuberculato, femoribus clavis ferrugineis, antennis fuscis. *Mus. Lesk.* p. 26. n. 558.  
*Habitat in Europa.*

- furinamus. 54. *C. thorace mutico subcylindrico*, corpore subferrugineo, elytris litura una alterave fusca, antennis mediocribus.  
*Habitat Surinami, mediæ magnitudinis, elytris spina acutissima terminatis.*

- scalaris. 55. *C. thorace mutico subcylindrico*, coleoptris linea suturali dentata, punctisque flavis, antennis mediocribus. *Fn. succ.* 697. \* *Scop. ent. carn.* n. 175. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 231. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 2.  
*Degeer inf.* 5. p. 77. n. 14. *Cerambyx flavo-viridis.*  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 102. n. 77. *Leptura scalaris.*  
*Frisch inf.* 12. p. 29. t. 3. f. 3.  
*Schaeff. ic.* 1. 38. f. 5.  
*Hufn. inf.* t. 7.  
*Habitat in Europæ populo,*

1838 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Saperda.*

candidus. 195. *C. albus*, thorace coleoptrisque fuscis : vittis duabus albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 147. n. 3.*  
*Habitat - - - statura & magnitudine scalaris.*

roridus. 169. *C. ater*, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 147. n. 4.*  
*Habitat in Africæ plantis, oculati magnitudine.*

modestus. 197. *C. niger*, capite, thorace anoque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 231. n. 3. mant. inf. 1. p. 147. n. 5.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura & magnitudine oculati.*

cardui. 56. *C. fuscus*, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 16. mant. inf. 1. p. 149. n. 23. Herby apud Fuesli arch. inf. 5. p. 94. n. 5. t. 26. f. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 632. n. 56. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 101. n. 74. Cerambyx thorace mutico cylindrico, corpore fusco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.*  
*Habitat in Europæ magis australis carduis, quos maia devastat, statura populnei.*

melano- 198. *C. cinereus*, thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, ceras, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. 1. p. 149. n. 24.*  
*Habitat Lipsiæ, statura c. cardui, at paulo minor.*

fulvralis. 199. *C. virescens*, thorace rotundato lineato, elytris acuminatis : sutura alba. *Fabr. mant. inf. 1. p. 149. n. 25.*  
*Habitat in Africæ plantis, statura c. cardui.*

mœstus. 200. *C. thorace quadrispinoso, corpore fusco.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 17. mant. inf. 1. p. 149. n. 26.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

popul- 57. *C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.* *Fn. suec. 661. Fabr. sp. inf. 1. p. 234 n. 18, mant. inf. 1. p. 149. n. 27.*  
*Gadd sat. 79. Cerambyx fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.*  
*Degeer inf. 5. p. 78. n. 15. Cerambyx decempunctatus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 208. n. 3. Leptura nigra, &c.*  
*Schæff. ic. t. 48. f. 5.*

g) *Bergst. nomencl. 1. t. 2. f. 4?*

*Habitat in Europæ & Americæ populetis, β) triplo minor.*

- tremulus. 201. *C. viridis*, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 234. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 149. n. 28.  
*Schæff. ic. t.* 101. f. 1.  
*Habitat* Halæ Saxonum ; *an varietas punctati?*
- punctatus. 202. *C. thorace mutico subcylindrico totus viridis* : punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *Syst. nat.* XII. 2. add, p. 1067. n. 7. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 234. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 150. n. 29.  
*Sulz. hist. inf. t.* 5. f. 10.  
*Habitat in Europa magis australi, antennis pedibusque nigris,*
- virescens. 203. *C. thorace villosa cinereo, elytris subattenuatis viridibus.*  
*Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 499. *mant. inf.* 1. p. 150. n. 30.  
*Habitat in Italia & Gallia sambuco, statura punctati.*
- macroceras. 204. *C. fuscus*, thorace cylindrico, pedibus testaceis, antennis longissimis nigris : annulo albo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 234. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 150. n. 31.  
*Habitat in Africa æquinoctiali. parvus.*
- volvulus. 205. *C. supra niger, thorace cylindrico elytrisque margine cinereis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 150. n. 33.  
*Habitat in Cayenna, statura cylindrici, at paulo minor.*
- linearis. 58. *C. niger*, thorace mutico cylindrico, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 663. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 232. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 148. n. 9.  
*Scop. ent. carn. n.* 153. *Leptura parallela.*  
*Schæff. ic. t.* 55. f. 6.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 26. f. 1.  
*Habitat in Europæ silvis.*
- cylindricus. 59. *C. cylindricus niger*, pedibus anterioribus luteis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 232. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 148. n. 10. *Syst. nat.* XII. 2. p. 633. n. 59. *Fn. suec.* 662. *Cerambyx* thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris fastigiatas nigris, pedibus anticis pallidis.  
*Degeer inf.* 5. p. 75. n. 12. *Cerambyx cinereus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 208. n. 2. *Leptura tota cæruleo-nigra.*  
*Scopol. ent. carn. n.* 157. *Leptura cylindrica.*  
*Roes. inf.* 2. scar. 2. t. 3.  
*Habitat in pyri prunique ramis.*

1840 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Saperda.*

melano- 206. *C. thorace cylindrico pedibusque rufis, corpore nigro-*  
*cephalus. Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 11.*  
*Habitat in Africa, statura & magnitudine cylindrici.*

pilicor- 207. *C. violaceus, thorace rotundato, antennarum articulo*  
*nis. primo secundoque clavato pilosis. Fabr. mant. inf. I.*  
*p. 148. n. 12.*  
*Pall. inf. ruff. 2. t. F. f. 14.*  
*Rozier Journ. de phys. I. t. I. f. B?*  
*Habitat in America meridionali, cylindrico paulo major.*

erythro- 208. *C. rufus, thorace rotundato villosus, antennis, pectore*  
*cephalus. elytrisque nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 13.*  
*Schrank inf. austr. n. 270.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 3.*  
*Habitat in Germania, cylindrici statura & magnitudine.*

fibricus. 209. *C. cyaneus, thorace suspinosis, elytris fasciis duabus*  
*flavis. Fabr. sp. inf. I. p. 232. n. 8. mant. inf. I. p.*  
*148. n. 14.*  
*Habitat in Sibiria, statura clavicornis, at paulo minor.*

clavicor- 210. *C. viridis, thorace rotundato, elytris maculis tribus fla-*  
*nis. vis. Fabr. sp. inf. I. p. 232. n. 9. mant. inf. I. p. 148. n. 15.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

longipes. 211. *C. violaceus, thorace subgloboso, antennis longioribus,*  
*femoribus clavatis. Fabr. f. inf. I. p. 233. n. 10. mant.*  
*inf. I. p. 148. n. 16.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

latipes. 212. *C. niger, thorace subgloboso, femoribus clavatis apice*  
*violaceis, tibiis posterioribus compressis, antennis lon-*  
*gioribus. Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 17.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis. Leske.*

trilinea- 213. *C. griseus, vittis tribus dentatis albis, antennis longis.*  
*tus. Fabr. sp. inf. I. p. 233. n. 11. mant. inf. I. p. 149. n. 18.*  
*Mant. p. 532. Cerambyx thorace cylindrico, corpore fer-*  
*rugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis,*  
*antennis longissimis.*

---

*Antennæ breves, quæ corpore breviores, mediocres, quæ longitudine corporis,*  
*longæ, quæ corpore longiores sunt.*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 226. n. 7. *Stenocorus trilineatus.*

*Drury inf.* 1. t. 41. f. 1.

*Habitat in insulis Americæ oppositis.*

lateralis. 214. *C. niger*, thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 233. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 149. n. 19.

*Habitat in America boreali.*

lynceus. 215. *C. thorace atro* : puncto utrinque ferrugineo, elytris griseis acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 233. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 149. n. 20.

*Habitat in nova Seelandia.*

griseus. 216. *C. griseus*, scutello margine, elytris lineolis flavescens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 233. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 149. n. 21.

*Habitat in nova Seelandia.*

analis. 217. *C. testaceus*, elytrorum apicibus anoque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 233. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 149. n. 22.

*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

oculatus. 60. *C. thorace mutico cylindrico luteo* : punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris. *Fn. suec.* 664.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 231. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 6.

*Uddm. diff.* 31. *Cerambyx ferrugineo-rufus*, elytris nigro-cinereis punctis excavatis nigris.

*Degeer inf.* 5. p. 74. n. 11. t. 3. f. 20.

*Scop. ent. carn.* n. 152. *Leptura oculata.*

*Schaeff. ic.* t. 128. f. 4.

*Huffn. inf.* t. 13.

*Habitat in Europæ silvis.*

hirtus. 218. *C. ferrugineus griseo-villosus*, scutello orbitaque oculorum fulvis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 232. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 7.

*Habitat in nova Seelandia.*

unicolor. 219. *C. testaceus*, thorace rotundato punctato, antennis longis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 147. n. 8.

*Habitat in insula Amsterdam oceani australis, hirtio minor.*

cantharinus. 82. *C. ferrugineus*, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 235. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 150. n. 33.



*Syst. nat.* XII. 2. p. 637. n. 82. *Cerambyx* thorace submutico, corpore rufo, oculis femoribusque nigricantibus, elytris mollibus, antennis longioribus.

*Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 500. *Callidium* thorace rotundato subspinoso rufum, antennis pedibusque nigricantibus.

*Habitat in Germania, mediæ magnitudinis.*

teutonicus. 220. *C. niger*, thorace cylindrico, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 23. *mant. inf.* I. p. 150. n. 34.

*Habitat in Germania, ætatura cantharini.*

janthinus. 221. *C. thorace cylindrico*, corpore violaceo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 24. *mant. inf.* I. p. 150. n. 35.

*Habitat in terra Pedemontana.*

monspeliensis. 222. *C. niger*, thorace cylindrico subspinoso, antennisque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 150. n. 36.

*Habitat Monspeli, præusto major.*

præustus. 223. *C. niger*, elytris flavis apice nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 25. *mant. inf.* I. p. 150. n. 37.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 641. n. 24. *Fn. suec.* 506. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 103. n. 80. *Leptura* (præusta) thorace subglobofo fusco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 209. n. 4.

*Schæff. ic. t.* 52. f. 8.

*Habitat in Europæ silvis.*

lineola. 224. *C. niger*, thoracis linea dorsali femoribusque apice rufis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 26. *mant. inf.* I. p. 150. n. 38.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 26. f. 4.

*Habitat in Italia, parvus.*

minutus. 225. *C. fuscus*, thorace cylindrico, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 27. *mant. inf.* I. p. 150. n. 39.

*Habitat in Anglia, parvus.*

cærulef-cens. 226. *C. thorace mutico cylindrico*, albo-cæruleus, thoracis lineis tribus scutelloque pallidioribus. *Schrank inf. austr.* p. 144. n. 271.

*Scop. enc. carn.* n. 160. *Leptura cærulef-cens.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 26. f. 5.

*Habitat in Germania, Calabria, 5 fere lineas longus.*

- ferreus. 227. *C. plumbeo-niger immaculatus*, thorace cylindrico inermi, scutello albidō. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 272. Beytr. zur Naturg. p. 66. §. 11.*  
*Habitat in Austria, 4½ lineas longus.*
- pustulatus. 228. *C. niger*, thorace inermi cylindrico : macula media fulva. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 273. Beytr. zur Naturg. p. 66. §. 10.*  
*Habitat in Austria floribus.*
- sphoides. 229. *C. niger*, thorace mutico cylindrico, elytris lineis sub tribus elevatis, femoribus tibiisque anterioribus medio fulvis. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 274.*  
*Habitat Viennæ, ad Maii finem conspicuus.*
- lividus. 230. *C. niger*, thorace dilute ferrugineo : punctis nigris elevatis, elytris flavescenribus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 95. t. 26. f. 7.*  
*Habitat Berolini, cantharino affinis.*
- cyaneus. 231. *C. cæruleus* : punctis elevatis, thorace cylindrico ; antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 95. n. 13. t. 26. f. 6.*  
*Habitat in Pomerania, 3 circiter lineas longus.*
- cinctor-nis. 232. *C.* thorace cylindrico : lineis sex longitudinalibus albis, elytris dentatis fuscis albo irroratis, antennis longis medio albo annulatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 290. t. 1. f. 3.*  
*Habitat - - - statura populnei, longicorni affinis.*
- M-nigrum. 233. *C.* thorace mutico cylindrico, elytris griseo-nebulosis : macula albida M nigro notata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 291.*  
*Schaeff. ic. t. 55. f. 4?*  
*Habitat, rarior, Halæ Saxonum,*
- istericus. 234. *C.* thorace mutico cylindrico : linea lutea, elytris fuscis, scutello pedibusque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 292.*  
*Habitat, rarior, Halæ Saxonum, in floribus, cylindrico affinis.*
- vulneratus. 235. *C.* thorace mutico cylindrico : tuberculo carinato luteo, elytris nigricantibus, pedibus luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 293.*  
*Habitat in lapideanis Giebachensteinibus, pustulato affinis.*

1844 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Rhagium.*

tripunctatus. 378. *C. thorace flavo : punctis tribus nigris, elytris nigris medio longitudinaliter albidis. Swederus nov. act.*

*Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 17.*

*Habitat in Noveboraco, cylindrici facie, at minor.*

†† *palpis capitatis, Rhagia.*

cursor. 45. *C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis: futura lineaque nigris, antennis mediocribus. Fn. suec. 658. Scop. ent. carn. 167. Fabr. sp. inf. 1. p. 229. n. 2. mant. inf. 1. p. 146. n. 4.*

*Fn. suec. 1. n. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.*

*Degeer inf. 5. p. 127. n. 3. Leptura cursor.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 7.*

*Habitat in Europa boreali.*

cinctus. 236. *C. niger, thorace spinoso, elytris subferrugineis: fascia flava, femoribus posterioribus unidentatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 146. n. 5.*

*Habitat in Austria, magnitudine & statura cursoris.*

noctis. 48. *C. niger, thorace spinoso, antennarum basi ferruginea. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 3. mant. inf. 1. p. 146. n. 6. Habitat in Europa boreali, cursori proxime affinis, ejus varietas?*

anglicus. 237. *C. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 4. mant. inf. 1. p. 146. n. 7. Fn. succ. 1. n. 486. Cerambyx cinereus, coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*

*Degeer inf. 5. p. 124. n. 1. t. 4. f. 6. Leptura mordax.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 222. n. 1. Stenocorus glaber, &c.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 8.*

*Schaeff. elem. t. 118. f. 1.*

*ic. t. 8. f. 1. 3.*

*Habitat in Anglia, Gallia.*

ornatus. 238. *C. niger, thorace spinoso, elytris fascia lata flava. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 5. mant. inf. 1. p. 146. n. 8. Habitat in Pennsylvania.*

exilis. 239. *C. thorace spinoso, elytris elevato-striatis cinereis nigroundatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 146. n. 9.*

indagator. 240. *C. cinereus*, thorace spinoso, elytris striatis: atomis fasciisque duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 145. n. 3.  
*Habitat in Germania.*

inquisitor. 49. *C. niger*, thorace spinoso, elytris nebulosis testaceo subfasciatis, antennis brevioribus. *Fn. suec.* 659.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 229. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 145. n. 2.  
*Fn. suec.* 1. n. 485.\* *Cerambyx cinereus nigro-nebulosus*, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.  
*Degeer inf.* 5. p. 126. n. 2. t. 4. f. 1. *Leptura inquisitor*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 223. n. 2. *Stenocorus niger*, &c.  
*Frisch inf.* 13. t. 14.  
*Schaeff. ic.* t. 2. f. 10.  
*Sulz. hist. inf.* t. 5. f. 7.

*Habitat in Europæ truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique corneis fuscis, dorso canaliculato.*

mordax. 241. *C. griseus*, thorace spinoso, elytris nebulosis, testaceo subfasciatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 145. n. 1.  
*Schaeff. ic.* t. 8. f. 2.  
*Habitat in Germania, inquisitori affinis, at paulo major.*

elegans. 242. *C. ater*, thorace utrinque unispinoso, elytris castaneis: basi, sutura maculaque communi nigris; fasciis duabus flavis. *Schranck inf. austr.* p. 133. n. 253.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 170. n. 6. t. 45. f. 12.  
*Rhagium elegans.*  
*Habitat in Bavaria, & Calabria.*

lycophanta. 243. *C. nigro ferrugineoque varius*, thorace spinoso, elytris fasciis tribus obscurioribus lineisque duabus elevatis, antennis brevibus. *Schranck inf. austr.* p. 137. n. 260.  
*Habitat Vindobonæ.*

niger. 365. *C. thorace ovato: margine posteriori scutelloque flavo, elytris fastigiatis, antennis brevibus.* *Petagn. inf. Calab.* p. 17. n. 83. f. XXXVI.  
*Habitat in Calabria, totus niger, an hujus tribus?*

⊥ ⊥ ⊥ *palpis clavatis, Callidia.*

rusticus. 67. *C. thorace nudo, corpore lurido, antennis sabulatis brevioribus.* *Fn. suec.* 666.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 238. n. 10.  
*mant. inf.* 1. p. 152. n. 15.  
*Fn. suec.* 492. *Cerambyx fuscus*, punctis thoracinis impressis.

1846 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*. *Callidium*.

*Degeer inf. 5. p. 83. n. 20. Cerambyx griseo-fuscus*, &c.  
*Salz. hist. inf. t. 4. f. 20.*

*Schaeff. elem. t. 13. f. 1. & t. 76. f. 14.*  
*icon. t. 63. f. 6.*

*Habitat in Europæ silvis.*

agrestis. 244. *C. niger*, thorace nudo, elytris striatis fuscis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 152. n. 16.*

*Habitat Halæ Saxonum, statura rustici, at duplo minor.*

dichrous. 370. *C. niger*; thorace rotundato, elytris striatis, tibiis plav-  
tisque brunneis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 570.*

*Habitat in Europa.*

læviga- 371. *C. niger opacus*, thorace elytrisq. lævibus, antennis  
tus. mediocribus, femoribus rubris compressis, tibiis ferru-  
gineis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 573.*

*Habitat in Europa.*

viridans. 372. *C. thorace rotundato viridi*: fovea utrinque impressa,  
elytris testaceo-viridibus rugoso-reticulatis, antennis  
pedibusque fusco-testaceis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 574.*

*Habitat in Europa.*

cyano- 373. *C. violaceus pubescens*, antennis apice fuscis, femorum  
chrysos. piceorum basi tibiisque luteis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 575.*

*Habitat in Europa.*

ostonota- 374. *C. capite nigro fulvo piloso furca glabra antrorsum nota-*  
tus. to, thorace rotundato maculis punctisque quatuor fulvis  
pilosis, elytris fuscis bifasciatis quadripunctatis, abdomi-  
ne pedibusque fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 580.*

*Habitat in Europa.*

leucozo- 375. *C. niger*, abdominis segmentorum trium priorum mar-  
nias. gine externo & pectore canis, elytris fasciis duabus  
linearibus deorsum arcuatis albis & apice cinereo. *Mus.*  
*Lesk. p. 27. n. 588.*

*Habitat in Europa.*

luridus. 68. *C. thorace subtuberculato nudo, niger*, elytris testaceis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 239. n. 18. mant. inf. 1. p. 154. n. 29.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 68. Cerambyx thorace mu-*  
tico subrotundo, corpore nigro, elytris luridis.  
*Habitat in Europæ borealis pinetis, bajulo similis, at*  
*triplo minor.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.* 1847

- fuscus. 245. *C. niger*, thorace subtuberculato canaliculato nudo, elytris striatis obscure testaceis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 154. n. 30.  
*Habitat* Halæ Saxonum, *statura & magnitudine luridi.*
- legubris. 246. *C. thorace* subtuberculato nudo, elytris substriatis, corpore lurido immaculato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 154. n. 31.  
*Habitat* Halæ Saxonum, *rufico proxime affinis, at triplo minor.*
- raucus. 247. *C. thorace lævi* obscure ferrugineo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 239. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 154. n. 32.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura luridi.*
- hafnien- 248. *C. thorace* subvilloso nigro: lineis quatuor albis, inter-  
fis. mediis abbreviatis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 239. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 154. n. 33.  
*Habitat* Hafniæ.
- aulicus. 249. *C. thorace lævi* nitido, corpore nigro opaco, elytris lævibus, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 239. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 154. n. 34.  
*Habitat* Hafniæ.
- erythro- 250. *C. thorace lævi* nitido, elytris violaceis, tibiis rufis,  
pus. antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 240. n. 22.  
*mant. inf.* 1. p. 154. n. 35.  
*Habitat in Germania boreali.*
- femora- 251. *C. thorace* nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris,  
rus. antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 237. n. 6.  
*mant. inf.* 1. p. 153. n. 9.  
*Degeer inf.* 5. p. 93. n. 31.  
*Schæff. ic. t. 55. f. 7.*  
*Habitat in Germania, statura violacei, at dimidio minor, angustior.*
- occidenta- 252. *C. ater*, thorace pubescente, elytris fasciis duabus  
lis. rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 152. n. 10.  
*Habitat in America occidentali, magnitudine & statura violacei; loco fasciæ posterioris macula interdum marginalis.*
- acumina- 252. *C. thorace* verrucoso nigricante, elytris acuminatis viri-  
tus. dibus: futura cyanea. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 237. n. 7.  
*mant. inf.* 1. p. 152. n. 11.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*



1848 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.*

rufificus. 253. *C. niger*, thorace verrucofo, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 8.*  
*mant. inf. I. p. 152. n. 12.*  
*Habitat in Ruffiæ filvis.*

violaceus. 70. *C. thorace subpubefcente*, corpore violaceo, antennis brevibus. *Fn. succ. 667. Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 5.*  
*mant. inf. I. p. 152. n. 8.*  
*Degeer inf. 5. p. 88. n. 24. Cerambyx violaceus.*  
*Scop. ann. hift. nat. 5. p. 97. n. 39. Stenocorus violaceus.*  
*Gadd diff. 28. Cantharis nigra*, thorace rotundato, elytris cærulefcenribus.  
*Friſch inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 1.*  
*Herbft apud Fueſſi arch. inf. 5. t. 26. f. 10.*  
*Habitat in Europa boreali, frequens.*

auratus. 71. *C. thorace dente laterali depreſſo*, viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus poſterioribus cæruleis.  
*Habitat in America, violaceo ſimilis, pedibus purpureis, an hujus tribus?*

Stigma. 72. *C. thorace punctato*, corpore atro, elytris lævibus: ſtigmate albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 11. mant. inf. I. p. 152. n. 17.*  
*Degeer inf. 5. p. 119. n. 22. t. 14. f. 13. Cerambyx niger, &c.*  
*Habitat in America, totus niger.*

equeſtris. 254. *C. ater nitidus*, thorace nudo, coleoptris fascia interrupta nuda. *Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 18.*  
*Habitat in Cayenna, ſtatura ſtigmatidis, at minor.*

hirtus. 255. *C. thorace hirtio*, elytris acuminatis pallide teſtaceis.  
*Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 19.*  
*Habitat ad Caput bonæ ſpei, magnus.*

tranque- 256. *C. thorace ſubtus utrinque macula tomentofa ferruginea,*  
 baricus. *antennis longioribus barbatis. Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 12. mant. inf. I. p. 153. n. 20.*  
*Habitat Tranquebariæ.*

compref- 257. *C. obſcure niger*, thorace lævi, antennis longis pedi-  
 fus. *busque teſtaceis: femoribus comprefſis. Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 21.*  
*Habitat in Siam, barbato minor.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.* 1849

- variegatus. 258. *C. thoracis* dorso glabro atro : lineis quatuor albis , elytris flavo irroratis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 238. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 153. n. 22.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- australis. 259. *C. thoracis* lineis duabus , elytris quatuor albis ; mediis coeuntibus abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 238. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 153. n. 23.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- fulcatus. 260. *C. thorace* tomentoso cinereo , elytris albo nigroque striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 238. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 153. n. 24.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- striatus. 73. *C. thorace* glabro , corpore nigro , elytris striatis , antennis brevibus. *Fn. succ.* 668. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 240. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 154. n. 36.  
*Degeer inf.* 5. p. 90. n. 26. *Cerambyx niger nitidus*, &c. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 26. f. 13.  
*Habitat in Europæ silvis.*
- lynceus. 261. *C. thorace* subspinoso villoso niger , elytris macula subdidyma fulva. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 240. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 154. n. 37.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- salicis. 262. *C. rufus* , thorace tuberculato spinosoque , pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 154. n. 38.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 92. n. 3. t. 25. f. 13. *Stenocorus ruficollis.*  
*Habitat in Lipsiæ salicibus : an hujus tribus ?*
- pufillus. 263. *C. niger* , antennis tibiisque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 155. n. 39.  
*Habitat in Germania , parvus.*
- bimaculatus. 264. *C. fuscus* , thorace villoso , elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 240. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 155. n. 40.  
*Habitat ad Caput bonæ spei , mediæ magnitudinis.*
- flavus. 265. *C. corpore* flavo , femoribus clavatis , antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 240. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 155. n. 41.  
*Habitat in insulis , Americæ meridionali oppositis.*

- variabilis. 74. *C. thorace glabro, corpore fusco-æneo, antennis pedibusque fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 237. n. 9. mant. inf. 1. p. 152. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 635. n. 74. Fn. suec. 669. Cerambyx thorace mutico subrotundo inæquali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis.*  
*Poda mus. p. 36. Cerambyx scaber.*  
*Frish inf. 12. p. 345. t. 6. f. 3. 4.*  
*Schaeff. ic. t. 4. f. 12.*  
*Habitat in Europæ borealis pinetis.*
- sericeus. 266. *C. thorace holosericeo cinereo, elytris testaceis punctis elevatis rubris. Fabr. mant. inf. 1. p. 152. n. 14.*  
*Habitat in Barbaria, rustico major.*
- testaceus. 75. *C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 239. n. 17. mant. inf. 1. p. 153. n. 26.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 635. n. 75. Fn. suec. 670. Cerambyx thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo antennis mediocribus.*  
*Degecr inf. 5. p. 93. n. 30. Cerambyx testaceus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 218. n. 18. Leptura testacea, thorace glabro.*  
*Schaeff. ic. t. 64. f. 6.*  
*Habitat in Europæ silvis.*
- deustus. 267. *C. testaceus, thorace subtuberculato, elytris apice violaceis. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. mant. inf. 1. p. 153. n. 27.*  
*Habitat in Italia, testaceo proxime affinis, an varietas?*
- ligneus. 268. *C. niger, thorace tuberculato villosus, elytris rubris macula apiceque violaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 153. n. 28.*  
*Habitat - - - mediæ magnitudinis.*
- portitor. 269. *C. niger, thorace transversim oblongo: maculis duabus nitentibus, elytris ex nigro rubescentibus, antennis longis. Schranck Schr. der berl. Ges. nat. Fr. 2. p. 312.*  
*Frish inf. 13. t. 2. f. 17.*  
*Habitat in Baviaræ pinetis, bajulo affinis, punctis excavatis inæqualis, mordax.*
270. *C.*

obscurus. 270. *C. thorace subvillosa fusca elytris testaceo cinereoque variis, antennis mediocribus. Fabr. mant. inf. 1. p. 151. n. 1.*

*Habitat in terra van Diemen, bajulo major.*

Bajulus. 76. *C. thorace villosa, tuberculis duobus, corpore fusco. Fabr. sp. inf. 1. p. 236. n. 1. mant. inf. 1. p. 151. n. 2. Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 76. Fn. succ. 672. Mus. Lud. Ulr. 76. Cerambyx thorace mutico subrotundo villosa, tuberculis duobus, antennis brevibus. Degger inf. 5. p. 86. n. 82. Cerambyx caudatus. Scop. ent. carn. n. 156. Leptura Bajula. Fn. succ. 1. n. 489. Cerambyx nigricans, thorace villosa cinereo, punctis duobus glabris. Frisch. inf. 13. t. 10. Sulz. hist. inf. 1. 4. f. 29. Schaeff. el. t. 76. f. 4. icon. t. 64. f. 4. 5.*

β) *Fn. succ. 1. n. 490. Cerambyx testaceus, thorace villosa cinereo, lineolis duabus glabris.*

γ) *Cerambyx saxonicus duplo minor. Fabr. mant. inf. 1. p. 151.*

*Habitat in Europæ borealis arborum truncis, ligna, parietes, asseres e pino desumpta perforans.*

fennicus. 77. *C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 236. n. 2. mant. inf. 1. p. 151. n. 3. Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 77. Fn. succ. 674. Cerambyx thorace mutico subrotundo: tuberculis subferrugineo-obsolete, elytris violaceis, antennis longiusculis. Uddm. diff. 33. Cerambyx elytris nigro-cæruleis, apice abdominis ferrugineo. Geoffr. inf. par. 1. p. 219. n. 19. Leptura atra. Schaeff. ic. t. 4. f. 12. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 8. Habitat in Europæ pinetis.*

italicus. 271. *C. thorace subcylindrico hirto rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus piceis, pedibus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 236. n. 3. mant. inf. 1. p. 151. n. 4. Habitat in Italia, fennico minor.*

liciatu. 78. *C. niger cinereo-nebulosus, antennis brevibus. Habitat in Europa, bajuli magnitudine.*

*Elytra strigis duabus undulatis cinerascens obsolete.*

undatus. 79. *C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus undatis albis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 240. n. 27. mant. inf. 1. p. 155. n. 42. Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 79. Fn. suec. 675.\** *Cerambyx thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus. Degeer inf. 5. p. 91. n. 28. Cerambyx nigro-fuscus. Schaeff. ic. t. 68. f. 1. Habitat in Europa boreali.*

colonus. 272. *C. elytris lividis: fasciis tribus fuscis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 28. mant. inf. 1. p. 155. n. 43. Habitat in Carolina.*

versicolor. 273. *C. thorace rufo, elytris nigris basi rufis: fasciis duabus albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 29. mant. inf. 1. p. 155. n. 44. Habitat in America boreali.*

sexuosus. 274. *C. thorace flavo-fasciato, elytris fasciis septem flavis: anterioribus antrosum, posterioribus retrorsum arcuatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 30. mant. inf. 1. p. 155. n. 45. Drury inf. 1. t. 41. f. 2. Cerambyx pictus. Forst. nov. inf. cent. 1. p. 43. n. 43. Leptura Robiniae. Pet. gar. t. 27. f. 3?*

β) *Callidium (angulatum) thorace globoso nigro flavo fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 32. Habitat in Americæ robinia.*

exiguus. 275. *C. testaceus, elytris fascia abbreviata alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 31. mant. inf. 1. p. 155. n. 46. Habitat in nova Seelandia, femoribus valde clavatis basi albis.*

lunatus. 276. *C. thorace globoso nigro flavo-fasciato, elytris atris: fasciis quinque flavis: baseos maculari. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. mant. inf. 1. p. 155. n. 47. Habitat in insulis Americæ oppositis, major.*

floralis. 277. *C. thorace globoso albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 33. mant. inf. 1. p. 155. n. 48. Pall. it. 2. p. 724. n. 63. Habitat in Italia, statura exigui.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.* 1853

fulmi-  
nans.

278. *C. thorace globoso maculato, elytris nigris : fasciis undato-angulatis albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 34. mant. inf. 1. p. 155. n. 49.*

*Habitat - - -*

arcuatus.

279. *C. elytris fasciis quatuor flavis : prima interrupta ; reliquis retrorsum arcuatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 35. mant. inf. 1. p. 155. n. 50.*

*Uddm. diff. 20. Leche nov. sp. 30. Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 21. Fn. suec. 696. Leptura (arcuata) thorace, globoso nigro, elytris fasciis linearibus flavis, tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis.*

*Geoff. inf. par. 1. p. 212. n. 10.*

*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1.*

*Raj. inf. p. 83. n. 23.*

*Pet. gazoph. t. 63. f. 7.*

*Schaeff. ic. t. 38. f. 6. et t. 107. f. 2. 3.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 14.*

*Habitat in Europæ hortis.*

arietis.

280. *C. thorace nigro, elytris nigris : fasciis flavis, secunda antrosum arcuata, pedibus ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 242. n. 36. mant. inf. 1. p. 155. n. 51.*

*Degeer. inf. 5. p. 81. n. 18. Cerambyx quadrifasciatus.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 23. Fn. suec. 795. Leptura arietis.*

*Fn. suec. 1. n. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis.*

*Geoff. inf. par. 1. p. 214. n. 11. Leptura nigra, &c.*

*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 96. n. 57. Stenocorus arietis.*

*Raj. inf. p. 82. n. 22.*

*List. scar. p. 385. n. 14.*

*Pet. gazoph. t. 63. f. 6.*

*Frisch. inf. 12. p. 32. t. 3. f. 5.*

*Schaeff. ic. t. 38. f. 7.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 15.*

β) *Bergstr. nomencl. 1. 9. 12. t. 1. f. 12.*

*Habitat in Europæ hortis.*

plebeius.

281. *C. thorace globoso immaculato, elytris nigris : fasciis linearibus albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 37. mant. inf. 1. p. 156. n. 52.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 17. Fn. suec. 692. Leptura (rustica) thorace globoso tomentoso, elytris cinereis : fasciis linearibus albidis undatis.*



*Geoffr. inf. par. 1. p. 215. n. 12. Leptura nigra, &c.*  
*Raj. inf. p. 83. n. 25.*  
*Petiv. gazoph. t. 63. f. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in Europæ hortis.*

maculo- 282. *C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris : strigis*  
 fus. *tribus arcuatis flavis, basi ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 243. n. 38. mant. inf. 1. p. 156. n. 53.*  
*Habitat in America.*

america- 283. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis fuscis : strigis*  
 nus. *quatuor flavis, femoribus clavatis compressis. Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 156. n. 54.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 39. Callidium acuminatum.*  
*Habitat in America boreali.*

detritus. 284. *C. thorace flavo-fasciato, elytris nigris : fasciis quin-*  
*que flavis, pedibus ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 243.*  
*n. 40. mant. inf. 1. p. 156. n. 55.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 20. Fn. suec. 694. Leptura*  
*( detrita ) thorace globoso nigricante, elytris fuscis :*  
*fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 216. Leptura nigra, &c.*  
*Schaeff. elem. t. 76. f. 2.*  
*icon. t. 38. f. 9. & t. 64. f. 3.*  
*Habitat in Europæ hortis.*

indus. 285. *C. niger, elytris glaucis basi nigro maculatis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 243. n. 41. mant. inf. 1. p. 156. n. 56.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis, pube glaucescente*  
*nitidus.*

portugal- 286. *C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris : fasciis*  
 lus. *tribus atris; primo annulari. Fabr. sp. inf. 1. p. 244.*  
*n. 42. mant. inf. 1. p. 156. n. 57.*  
*Habitat in Lusitania, statura c. verbasci.*

verbasci. 287. *C. thorace nigro-maculato, elytris subvirescentibus :*  
*fasciis tribus nigris; prima lunari. Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*244. n. 43. mant. inf. 1. p. 156. n. 58.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 22. Leptura ( verbasci )*  
*thorace subovato nigro, elytris fasciis tribus nigris :*  
*prima semi-annulata.*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.* 1855

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 12.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 19.*

*Habitat in Europæ magis australis verbasco.*

annularis. 288. *C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis subvirescentibus : fasciis tribus nigris, prima annulari. Fabr. mant. inf. 1. n. 156. n. 59.*

*Habitat in Siam, c. verbasci proxime affinis.*

ægyptia- 289. *C. thorace ferrugineo, elytris cinerascens. tribus fuscis ; prima annulari. Fabr. sp. inf. 1. p. 244. n. 44. mant. inf. 1. p. 156. n. 60.*

*Habitat in Oriente.*

mysticus. 290. *C. elytris fuscis : fasciis apiceque cinereis basi rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 244. n. 45. mant. inf. 1. p. 156. n. 61.*

*Degeer inf. 5. p. 82. n. 19. Cerambyx albo fasciatus.*

*Scop. ent. carn. 177. Cerambyx quadricolor.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 18. Fn. suec. 693. \* Leptura (mystica) thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis : fasciis linearibus arcuatis lataque canis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 215. n. 17. Leptura nigra, &c.*

*Raj. inf. p. 83. n. 26.*

*Schæff. ic. t. 2. f. 9.*

*Habitat in Europa.*

gibbosus. 291. *C. niger, elytris cinereo fasciatis basi bituberculatis apice acuminatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 156. n. 62.*

*Habitat Kilonii, statura & magnitudine mystici.*

picipes. 292. *C. ater, thorace globoso, elytris striga obliqua albæ Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 63.*

*Habitat - - - c. alni paulo major.*

alni. 293. *C. niger, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennæ tibiisque ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 245. mant. inf. 1. p. 157. n. 64.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 19. Leptura alni.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 21.*

*Habitat in Europa, mystico affinis, sed odies minor.*

sanguineus. 294. *C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennæ mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 238. n. 16. mant. inf. 1. p. 153. n. 25.*

*Raj. inf. p. 97. n. 3. Cerambyx minor.*

*Degeer inf. 5. p. 92. n. 29.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 220. n. 22.*

*Schaeff. ic. t. 64. f. 1.*

*Habitat in Europæ silvis, Upsaliæ in parietibus.*

castaneus. 81. *C. niger*, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. *Fn. suec. 676.*

*Habitat in Europæ cortice abiegno.*

*Thoracis latera inferiora linea rubra longitudinali.*

ebulipus. 83. *C. niger*, thorace tuberculato, elytris violaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 151. n. 5.*

*Sist. nat. XII. 2. p. 637. n. 83. Cerambyx* thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-cæruleis, antennis medio-cribus.

*Habitat in Africæ plantis, statura italici.*

æneus. 294. *C. fuscus*, thorace elytrisque viridi-æneis, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 151. n. 6.*

*Habitat in Africa, statura italici.*

clavipes. 295. *C. niger opacus*, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 236. n. 4. mant. inf. 1. p. 152. n. 7.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 9.*

*Habitat in Germania.*

pannonicus. 296. *C. niger*, thorace margine subæneo, medio elevato, elytris viridi-cæruleis, femoribus clavatis. *Herbst apud*

*Fuesli arch. inf. 5. p. 96. n. 6. t. 26. f. 11.*

*Habitat in Ungaria, 8 lineas longus.*

æneus. 297. *C. viridi-æneus*, subtus, antennis pedibusque fasciis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 96. n. 7. t. 26. f. 12.*

*Habitat Berolini.*

venustus. 298. *C. thorace flavo*: fascia nigra, elytris nigris: fasciis tribus latis ex viridi flavis, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 98. n. 16. t. 26. f. 16.*

*Habitat in India.*

indicus. 299. *C. niger* subtus flavus, frontis maculis, thoracis fasciis duabus, elytrorum quinque flavis, antennis pedibusque rubris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 98. n. 17. t. 26. f. 17.*

*Habitat in India.*

INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. *Callidium*. 1857

- confusus. 300. *C. niger pubescens*, thoracis punctis obsoletis sex, elytrorum fasciis undatis albidis quatuor, antennis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 98. n. 18. t. 26. f. 18.*  
*Habitat Berolini in salicibus.*
- litteratus. 301. *C. elytris nigris*: fasciis apiceque cinereis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 99. n. 22. t. 26. f. 20.*  
*Schranck inf. austr. n. 306? Leptura figurata.*  
*Habitat in Germania.*
- hispidus. 302. *C. thorace globofo ferrugineo*, corpore testaceo, capite nigro, femoribus clavatis ustulatis, antennis hispidis mediocribus. *Forster nov. inf. 1. p. 42. n. 42.*  
*Habitat in America septentrionali, mystici magnitudine.*
- viridis. 303. *C. thorace tuberculato violaceo*, elytris viridibus punctato-friatis, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 95. n. 1067. Fn. Fridrichsd. p. 14. n. 134.*  
*Habitat in Dania.*
- multicolor. 304. *C. thorace nigro ovato villo ex griseo flavo pubescente*, elytris ex griseo flavoque variis. *Drury inf. 1. t. 41. f. 6.*  
*Habitat in Noveboraco.*
- pulverulentus. 306. *C. thorace convexo nigro-fusco*, elytris castaneis griseo-villofis apice bidentatis. *Degeer inf. 5. p. 118. n. 21. t. 14. f. 12.*  
*Habitat in Pensylvania, pollicem fere longus.*
- nigricans. 307. *C. niger depressus*, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. *Degeer inf. 5. p. 88. n. 23.*  
*Hufn. inf. t. 16.*  
*Habitat in conclavibus Sueciæ, 7 lineas longus.*
- aurichalcus. 308. *C. fusco-æneus nitidus*, thorace depresso, antennis pedibusque nigris. *Degeer inf. 5. p. 89. n. 25.*  
*Habitat - - - dimidium pollicem longus.*
- lucidus. 309. *C. niger*, elytris fusco-castaneis lucidis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98.*  
*Habitat in Carniola.*
- rufus. 310. *C. niger thorace villoso*, antennis rufis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 61.*  
*Habitat in Carniola.*

1858 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Callidium.*

- carniolicus. 311. *C. thorace subbituberculato, abdominisque apice rufis, elytris atro-violaceis.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 63. Stenocorus fenicus.*  
*Habitat in Carniola.*
- fuliginosus. 312. *C. totus ater opacus, antennis mediocribus.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 62.*  
*Habitat in Carniola.*
- calcaratus. 313. *C. nigro-violaceus, femoribus rufis posterioribus dentatis.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 64.*  
*Habitat in Carniola.*
- caraboides. 314. *C. rufus, elytris atro-violaceis.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 99. n. 65.*  
*Habitat in Ungariæ & Carniolæ collibus, statura carabi minoris.*
- ater. 315. *C. niger, elytris truncatis, antennis mediocribus.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 69.*  
*Habitat in Carniola.*
- braccatus. 316. *C. niger, antennis pedibusque rufis: femoribus posterioribus crassis spina armatis.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 70.*  
*Habitat in Carniola.*
- tenuis. 317. *C. niger nitens, elytris attenuatis, antennis mediocribus.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 71.*  
*Habitat in Carniolæ floribus umbellatarum.*
- octopunctatus. 318. *C. viridis, thorace tereti, elytris punctis octo nigris.*  
*Schranck inf. austr. p. 142. n. 267. Beytr. 2. Naturg. p. 65. §. 9.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 101. n. 73. Leptura octopunctata.*  
*Habitat rarius in Austriæ viliis.*
- glaucopterus. 319. *C. ferrugineus, thorace quadriverrucoso, oculis pectoreque nigris.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 294. t. 1. f. 4.*  
*Habitat rarius Halæ Saxonum, variabili affinis, at dimidio major.*
- viridescens. 320. *C. corpore lineari viridi-æneo, antennis longis.*  
*Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 295.*  
*Habitat - - - magnitudine circiter variabilis, statura moschati.*



*\*\* palpis inæqualibus, anterioribus 2 filiformibus, posterioribus clavatis: Stenocori Fabricii.*

- festivus. II. *C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus: linea laterali lutea. Fabr. sp. inf. I. p. 226. n. 5. mant. inf. I. p. 143. n. 5.*  
*Degeer inf. 5. p. 100. n. 4. t. 13. f. 14. Cerambyx spinosus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 6. Cerambyx fulcatus.*  
*Gron. zooph. 541. t. 16. f. 5.*  
*Drury inf. I. t. 37. f. 5.*  
*Herbst. apud Fuessli arch. inf. 5. t. 25. f. 12.*  
*Habitat in insulis Americæ oppositis.*
- marilandi- 321. *C. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatus. fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. I. p. 226. n. 6. mant. inf. I. p. 143. n. 6.*  
*Habitat in Marilandia.*
- insularis. 321. *C. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 8. mant. inf. I. p. 143. n. 7.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis, ex testaceo & cinereo varius.*
- bispin- 322. *C. thorace inermi subtuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. Fabr. mant. inf. I. p. 143. n. 8.*  
*Habitat in America meridionali, statura insularis, at minor.*
- semipunc- 323. *C. thorace spinoso inæquali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris. Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 5. mant. inf. I. p. 143. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- quadrima- 27. *C. rufescens thorace scabro spinoso, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris. Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 12. mant. inf. I. p. 143. n. 12. Gron. zooph. 542\*. Sloan. jam. 2. t. 237. f. 21.*  
*Drury inf. I. t. 37. f. 3.*  
*Habitat in America meridionali, femoribus 4 posterioribus apice spinosis.*
- gemina- 324. *C. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, tus. elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longissimis. Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 13.*



1860 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Stenocorus* s.

*Habitat in Sierra Leon Africæ, congeneribus hujus tribus minor & brevior.*

- africanus. 325. *C. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis apice atris: fascia pallida. Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 13. mant. inf. I. p. 144. n. 14.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, antennis longitudine corporis, nigris.*
- circum- 326. *C. ferrugineus, thorace mutico, elytris unidentatis flexus. testaceis: striga undata punctisque duobus fuscis. Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- annula- 327. *C. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 14. mant. inf. I. p. 144. n. 16.*  
*Habitat - - -*
- decem- 328. *C. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatus. tatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 15. mant. inf. I. p. 144. n. 17.*  
*Habitat in America.*
- brasilia- 329. *C. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatis testaceis: lineolis tribus glabris flavis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 16. mant. inf. I. p. 144. n. 18.*  
*Habitat in Brasilia, annulato minor.*
- cayennensis. 330. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo fusco flavoque variis: angulo baseos compresso. Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 19.*  
*Habitat in Cayenna, parvus cinereus.*
- Druryi. 331. *C. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 17. mant. inf. I. p. 145. n. 20.*  
*Habitat in America meridionali.*
- undulatus. 332. *C. cinereus, thorace spinoso, elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 18. mant. inf. I. p. 145. n. 21.*  
*Habitat - - -*
- ruricola. 333. *C. fuscus, thorace spinoso ferrugineo, elytris bidentatis pallidioribus antennis, longis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 19. mant. inf. I. p. 145. n. 22.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

- garganicus.* 334. *C. thorace spinoso, elytris bidentatis testaceis: macula pallida, antennis longis. Fabr. sp. inf. 1. p. 226. n. 4. mant. inf. 1. p. 143. n. 4. Habitat in Marilandia.*
- Lamed.* 46. *C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis: tænia obscura longitudinali sinuata, antennis brevibus. Fn. succ. 649. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 226. n. 3. mant. inf. 1. p. 143. n. 3. Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 6. Stenocorus niger, &c. Habitat in Europa.*
- cyaneus.* 335. *C. cyaneus, thorace spinoso, elytris basi flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 226. n. 2. mant. inf. 1. p. 143. n. 2. Forster nov. inf. 1. p. 40. n. 40. Cerambyx palliatus. Fabr. syst. entom. p. 182. n. 2. Calopus blandus.*
- meridiana.* 47. *C. thorace subspinoso, elytris fastigiatis fuscis antèrius testaceis, pectore nitente. Fn. succ. 648. Fabr. sp. inf. 1. p. 225. n. 1. mant. inf. 1. p. 143. n. 1. Syst. nat. X. 1. p. 398. n. 7. Leptura meridiana. Degeer inf. 5. p. 305. Leptura fusca cinerea. Schaeff. ic. t. 3. f. 13. t. 79. f. 7. t. 82. f. 4. t. 279. f. 3. Raj. inf. p. 96. n. 1. Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria, mas testaceus, femina nigricans, larva subterranea, pedibus longissimis.*
- quadri-oculatus.* 336. *C. thorace subspinoso: punctis septem nigris, corpore testaceo, elytris apice dentatis: lineis longitudinalibus curvatis fuscis, antennis longis. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 289. t. 1. f. 2. Habitat - - - magnitudine meridiani; an hujus tribus?*
- ramphigeus.* 61. *C. thorace mutico subcylindrico bipunctato, corpore livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis. Habitat in America, festivi magnitudine; an hujus tribus?*
- zonarius.* 63. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis longioribus, elytris obtusis fuscis: fascia lineari albida. Mus. Lud. Ulr. 75. \*. Marcgr. bras. 254. Quici. Habitat in America, an ad hanc tribum?*
- irroratus.* 62. *C. thorace mutico cylindrico inæquali, elytris apice bidentatis albo irroratis; antennis longioribus aculeatis. Drury inf. 1. t. 33. f. 3.*

1862 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Stenocorus.*

*Habitat in Americæ meridionali oppositis insulis, inquisitionis magnitudine.*

glabratus. 337. *C. thorace mutico cinereo : linea glabra fusca, elytris bidentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 227. n. 11. mant. inf. 1. p. 143. n. 11.*

*Habitat in insula S. Crucis, Oceani americani.*

suaveolens. 305. *C. thorace spinoso cærulescenti aureo, corpore viridi, elytris cyaneis, antennis mediocribus pedibusque nigris, abdomine tibiisque ferrugineis, posterioribus longioribus compressis. Mant. p. 532.*

*Habitat in Jamaica & Carolina.*

scabricor-nis. 338. *C. ferrugineus thorace subcylindrico, antennis nitidis, intus denticulatis scabris. Fuesli Verh. schw. inf. p. 13. n. 241. f. 3. a. b.*

*Scop. ent. carn. n. 174.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 210. n. 6.*

*Habitat in Europa.*

asper. 339. *C. ater, asper, rigidus, thorace bispinoso, elytris in medio tuberculatis. Sulz. hist. inf. p. 44. t. 5. f. 3.*

*Habitat in Italia.*

brevis. 340. *C. nigricans, thorace spinoso, femoribus rotundatis brevibus, tarsis anterioribus lobatis perhirsutis. Sulz. hist. inf. p. 45. t. 5. f. 5.*

*Habitat in Surinamo.*

halodendri. 341. *C. ater, punctis excavatis, thorace albido villosus, elytris margine maculaque baseos rubris. Pallas it. 2. app. n. 62.*

*Habitat in Sibiriaë robinia halodendro, c. Kaehlerii affinis, an hujus tribus?*

badius. 342. *C. badius, thorace elytrisque striatis. Lepech. it. 1. t. 16. f. 3.*

*Habitat in Sibiria, an ex hac tribu?*

ruber. 343. *C. elytris rubris: apicem macula oblonga nigra, thorace nigro: maculis duabus rubris. Lepech. it. 1. t. 16. f. 3.*

*Habitat in Sibiriaë glycyrrhiza echinata.*

imbriatus. 344. *C. ater, margine albo, thorace bispinoso. Lepech. it. 2. p. 198. t. 10. f. 8.*

*Habitat in montis Ural larice; an huc spectat?*

INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx Stenocorus*. 1863

- tanaiatus*. 345. *C. thorace spinoso, elytris nigricantibus: fasciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. Lepech. it. 2. p. 299. t. II. f. 32.*  
*Habitat in Sibiria petrarum fissuris.*
- aculeatus*. 346. *C. nigricans antennis longissimis: spinis tribus introrsum armatis. Rozier journ. de phys. 1. p. 26. t. 1. f. C.*  
*Habitat in America.*
- arenarius*. 347. *C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. Scop. ent. carn. n. 168.*  
*Pod. mus. græc. p. 34. Cerambyx pedestris.*  
*Habitat in Carniola.*
- timidus*. 348. *C. niger, elytris flavescentibus: maculis binis atris. Scop. ent. carn. n. 171. ann. hist. nat. 5. p. 99. n. 67.*  
*Habitat in Carniola, e longinquo hostem fugiens, & sub umbella se recipiens.*
- adsperfus*. 349. *C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 95. n. 55.*  
*Habitat in Carniola, tristi affinis, sed minor.*
- ovalis*. 350. *C. ovatus fuscus, elytris integris. Geoffr. inf. par. 1. p. 206. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- cruentatus*. 351. *C. griseus, thorace spinoso, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis, antennis longis aculeatis. Degeer. inf. 5. p. 107. n. 8.*  
*Habitat in India, rubo affinis, an hujus tribus?*
- sinensis*. 352. *C. niger, thorace spinoso, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. Degeer inf. 5. p. 109. n. 10.*  
*Habitat in Sina, tres lineas ultra pollicem longus.*
- tigrinus*. 353. *C. ex fusco griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctisque fulcis sparsis, antennis longioribus. Degeer inf. 5. p. 114. n. 15. t. 14. f. 6.*  
*Habitat in Pennsylvania, 11. lineas longus.*
- pennsylvanicus*. 354. *C. thorace subspinoso, elytris truncatis ex flavo griseis: fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. Degeer inf. 5. p. 114. n. 16. t. 14. f. 7.*  
*Habitat in Pennsylvania, dimidium pollicem longus.*

1864 INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Stenocorus.*

- hirsutus. 355. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris hirsutis striato-punctatis, antennis mediocribus maculatis. *Degeer inf.* 5. p. 115. n. 17. t. 14. f. 8.  
*Habitat in Surinamo, 4 lineas longus.*
- gibbus. 356. *C. fuscus cinereo-maculatus*, thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. *Degeer inf.* 5. p. 116. n. 18. t. 14. f. 9.  
*Habitat in Surinamo, hirsuto brevior, at latior & crassior.*
- hirtipes. 357. *C. fuscus*, thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anterioribus hirsutis, antennis longioribus: media macula alba. *Degeer inf.* 5. p. 116. n. 19. t. 14. f. 10.  
*Habitat in India, 8½ lineas longus.*
- viridescens. 358. *C. ex flavo viridis*, thorace mutico cylindrico: fasciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro cinereoque maculatis. *Degeer inf.* 5. p. 76. n. 13.  
*Habitat in Europa, mediæ magnitudinis.*
- hieroglyphicus. 359. *C. subtus canus*, capite thoraceque lanuginosis: area nigra, elytris nigris glabris: sutura utrinque ramosa punctisque quinque ex cærulescente albidis. *Pall. it.* 2. app. n. 59.  
*Habitat. in Sibirix borealis silvis.*
- perforatus. 360. *C. supra pulvere albidus*, subtus lanugine flavescens, elytris punctis quinque dorsalibus mediis nigerrimis. *Pall. it.* 2. app. n. 60.  
*Habitat cum hieroglyphico, cui proxime affinis.*  
*Elytrorum puncta quasi perforata.*
- ferruginosus. 361. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, antennis introrsum spinosis. *Rozier journ. de phys.* p. 27. t. 1. f. D.  
*Habitat in America.*
- carbonarius. 362. *C. niger opacus*, antennis brevibus. *Scop. ent. carn.* p. 55. n. 178.  
*Habitat in Carniola, an propria species?*
- lunulatus. 363. *C. ex fusco obscure rufescens*, thorace subcylindrico mutico, elytris rubescentibus: lunulis quatuor fuscis apice dentatis. *Drury inf.* 1. t. 37. f. 4.  
*Habitat in Jamaica.*  
*Elytrorum sutura prope thoracem cor fuscum refert.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx. Stenocorus. Calopus.* 186  
minimus. 364. *C. minutissimus. Seeligm. av. 4. t. 108. f. 4.*  
*Habitat - - - - - cutem penetrans.*

vittatus. 378. *C. thorace spinoso pubescente, elytris subfastigiatis testaceis, futura vitraque fuscis. Mus. Lesk. p. 25. n. 540.*  
*Habitat in Europa.*

quadri- 379. *C. pallide testaceus, thorace subspinoso, elytris bis-*  
guttatus. *spinosis: maculis duabus flavis, femoribus clavatis muticis. Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. n. 3. 3. 16. t. 8. f. 7.*  
*Habitat in Honduras Americæ, quadrimaculato duplo minor, subdepressus.*

CALOPUS. *Antennæ filiformes.*

*Palpi quatuor; anteriores clavati, posteriores filiformes.*

*Thorax gibbus.*

*Elytra linearia.*

ferraticornis. 1. *C. fuscus, antennis compressis. Fabr. sp. inf. 1. p. 228. n. 1. mant. inf. 1. p. 145. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 65. Fn. suec. 665. Cerambyx ferraticornis, thorace mutico subovali, corpore lurido fusco, antennis compressis antice ferratis mediocribus.*  
*Degeer inf. 5. p. 79. n. 6.*  
*Habitat in Europa boreali, statura oleri, elongatus, cylindricus.*

hispidicornis. 2. *C. subfuscus, antennarum articulis posterius spina minutissima armatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 66. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore subfusco, elytris fastigiatis bidentatis, antennis mediocribus postice dentatis.*  
*Habitat in America, cerambyci rustico similis, at duplo major; an hujus generis?*

pygmæus. 3. *C. minutissimus fuscus, antennis ferratis pilosis.*  
*Degeer inf. 5. p. 80. n. 17. t. 4. f. 5. Cerambyx pygmæus.*  
*Habitat in Suecia, pulicis magnitudine.*



205. LEPTURA. *Antennæ setaceæ.**Palpi quatuor filiformes.**Elytra apicem versus attenuatâ.**Thorax teretiusculus.*\* *labio integro*, Donaciæ Fabricii.

- aquatica. 1. *L. aurata*, femoribus posterioribus clavatis dentatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 245. n. 1. mant. inf. 1. p. 157. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 637. n. 1. Fn. suec. 677.\* Scop. ent.*  
*carn. 147. Leptura deaurata, antennis nigris, femo-*  
*ribus posticis dentatis.*  
*Degeer inf. 5. p. 140. n. 80. t. 4. f. 14. 15. Leptura*  
*aquatica spinosa.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 229. n. 12.*  
*Raj. inf. p. 100. n. 1.*  
*Frisch inf. 12. p. 33. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in plantis aquaticis, nymphæis, cavicibus, phel-*  
*landrio, cujus radici intra globum brunneum adheret*  
*pupa.*  
*Femora posteriora rarius muticæ.*
- simplex. 17. *L. aurata*, femoribus simplicibus. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*245. n. 2. mant. inf. 1. p. 157. n. 2.*  
*Degeer inf. 5. p. 142. n. 19? Leptura aquatica muticæ.*  
*Habitat in Anglia & Germania.*
- fasciata. 18. *L. deaurata*, elytris fascia longitudinali purpurea.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 100. n. 3.*  
*Degeer inf. 5. p. n. 20. Leptura aquatica fasciata.*  
*Habitat in Europæ aquis, femoribus posterioribus, nunc*  
*muticis, nunc dentatis.*
- holoferi- 19. *L. viridi-nitens*, antennis pedibusque ex atro fulcis,  
 cea. femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf. 5. p. 100. n. 4.*  
*Habitat in Marchiæ pratis humidis.*
- palustris. 20. *L. ex nigricante violacea*, antennis pedibusque spadiceis,  
 femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 5. p. 100. n. 5.*  
*Habitat in Pomeraniæ paludibus.*

- cinerea. 21. *L. cinerea* cupreo irrorata, pedibus posterioribus muricis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 100. n. 6.  
*Habitat in Pomerania.*
- violacea. 58. *L. ex atro subænea*, elytris obscure violaceis, abdomine sanguineo. *Pall. it.* 2. n. 64.  
*Habitat in Sibiria, magnitudine aquaticæ.*
- bicolor. 84. *L. aurea*, thorace supra elytrisque viridibus, his striato-punctatis hinc inde impressis, femoribus clavatis: posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 589.  
*Habitat in Europa.*
- crassipes. 85. *L. viridi-ænea*, subtus cinereo-ænea, elytris striato-punctatis transverse lineolis substriatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus crassis: posterioribus muricis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 590.  
*Habitat in Europa.*
- fulca. 86. *L. fusca*, elytris punctato-striatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus dente valido armatis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 591.  
*Habitat in Europa.*
- ænea. 87. *L. rufo-ænea*, subtus cinereo-ænea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 592.  
*Habitat in Europa.*
- nitida. 88. *L. nitida* viridi-aurea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata purpureo-ænea, abdomine antennis pedibusque auratis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 593.  
*Habitat in Europa.*
- vulgaris. 89. *L. viridi-argentea*, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata communi viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 594.  
*Habitat in Europa.*
- cærulea. 90. *L. cærulea*, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, antennis æneis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. n. 595.  
*Habitat in Europa.*

\*\* labio bifido, Lepturae Fabricii.

† thorace antrorsum oblongiusculo angustiore, elytris apice truncatis.

- unipunctata. 22. *L. nigra*, elytris rufis : puncto medio nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 1.*  
*Habitat* Dresdæ, *statura bipunctatæ.*
- hastata. 23. *L. atra*, elytris rubris : apice futuraque media nigris.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 2. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 11.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 6. Stenocorus niger, &c.*  
*Habitat in Europa magis australi, melanuræ affinis ;*  
*mas minor, abdomine rufescente.*
- carbonaria. 91. *L. nigra*, elytris testaceis apice fuscis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 612.*  
*Habitat in Europa, an hujus familiæ ?*
- nigella. 92. *L. nigra*, elytris testaceis, tibiis anticis rufis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 614.*  
*Habitat in Europa, an hujus familiæ ?*
- erythropus. 93. *L. nigra*, pedibus rubris, femorum basi tibiæ apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p. 28. n. 606.*  
*Habitat in Europa.*
- quinque-maculata. 94. *L. nigra*, antennis nigro annulatis, pedibus elytrisque testaceis : his maculis quinque fuscisque tribus nigris.  
*Mus. Lesk. p. 28. n. 600.*  
*Habitat in Europa.*
- fusca. 95. *L. fusca* aureo pubescens, antennarum basi testacea, femoribus tibiisque anticis testaceis : illis supra fasciis, quatuor posterioribus basi testaceis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 617.*  
*Habitat in Europa.*
- bipunctata. 24. *L. nigra* villosa, elytris lividis : sutura puncto medio apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 245. n. 1. mant. inf. 1. p. 158. n. 3.*  
*Habitat in Sibiria, melanuræ valde affinis, elytris apice rotundatis.*
- melanura. 2. *L. nigra*, elytris rubescentibus lividisve : sutura apiceque nigris. *Fn. succ. 678.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 245. n. 2. mant. inf. 1. p. 158. n. 4.*  
*Gaid. diss. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obsistere sordideque flavescens.*

*Degeer inf. 5. p. 137. n. 14. Leptura variabilis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 7. t. 4. f. 1.*

*Raj. inf. p. 97. n. 6.*

*Petiv. gaz. t. 30. f. 5.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 4.*

β) *Leptura minor. Fabr. mant. 1. p. 158.*

*Habitat frequens in Europæ floribus, mas elytris apice nigris, femina unicoloribus, β) duplo minor.*

livida. 26. *L. nigra, elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 3. mant. inf. 1. p. 158. n. 5.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 23.*

β) *Leptura major. Fabr. mant. inf. 1. p. 158.*

*Habitat in Germaniæ floribus, β) duplo major.*

rubra. 3. *L. nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. Fn. succ. 500. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 6. mant. inf. 1. p. 158. n. 6.*

*Degeer inf. 5. p. 132. n. 7.*

*Frisch inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 30.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 2.*

*Habitat in Europæ floribus.*

emarginata. 27. *L. atra, elytris purpureis apice emarginatis nigris.*

*Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 6.*

*Habitat in Cayenna, rubra major, immaculata.*

villica. 28. *L. ferruginea, antennis, elytris pectoreque fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 5. mant. inf. 1. p. 158. n. 8.*

*Habitat in Anglia.*

sanguinolenta. 4. *L. nigra, elytris sanguineis. Fn. succ. 679.\* Scop. ent. carn. 150. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 4. mant. inf. 1. p. 158. n. 7.*

*Scop. ent. carn. p. 47. n. 151? Leptura dubia.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 9.*

testacea. 5. *L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace posterius rotundato. Fn. succ. 680.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 7. mant. inf. 1. p. 158. n. 10.*

*Degeer inf. 5. p. 135. n. 11.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 3.*

*Habitat in Europa boreali; an mas rubræ, cui sæpe copula juncta?*

- revestita. 6. *L. testacea*, elytris, pectore antennisque atris.  
*Habitat in Germania, statura testaceæ. Schreber.*
- pubescens. 29. *L. nigra cinereo-villosa*: costa alarum basi testacea.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 11.*  
*Habitat in Suecia, testaceæ affinis.*
- virens. 7. *L. sericeo-virescens*, antennis fusco viridique variis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 8. mant. inf. 1. p. 158. n. 12.*  
*Syst. nar. XII. 2. p. 638. n. 7. Fn. suec. 682.\* Leptura*  
*viridi-flava, antennis luteo viridique variis.*  
*Degeer inf. 5. p. 131. n. 6. Leptura flavo-viridis.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- atra. 30. *L. corpore toto nigro. Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 9. mant.*  
*inf. 1. p. 158. n. 13.*  
*Pod. nuss. gr. p. 28. Leptura æthiops.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 228. n. 10. Stenocorus totus niger.*  
*Habitat in Europa magis australi, pedibus interdum testaceis.*
- humera- 31. *L. nigra*, humeris abdomineque ferrugineis. *Fabr. mant.*  
lis. *inf. 1. p. 158. n. 14.*  
*Habitat in Germania, statura quadriguttatæ, at duplo*  
*fere major.*
- futuralis. 32. *L. cinerea*, elytris testaceis: futura nigra. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 159. n. 15.*  
*Habitat Halæ Saxonum, atra paulo major.*
- scutellata. 33. *L. nigra*, scutello albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 10.*  
*mant. inf. 1. p. 159. n. 16.*  
*Habitat in Italia, atra major.*
- femorata. 34. *L. nigricans*, femoribus basi rufis. *Fabr. mant. inf. 1.*  
*p. 159. n. 17.*  
*Scop. ent. carn. p. 47. n. 155? Leptura ruficrus.*  
*Habitat Halæ Saxonum, statura & magnitudine nigra.*
- ruficor- 35. *L. nigra*, antennis pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
nis. *147. n. 11. mant. inf. 1. p. 159. n. 18.*  
*Habitat in Italia, femoribus interdum apice nigris.*
- marginata. 36. *L. nigra*, elytrorum margine tibiisque posterioribus  
rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 12. mant. inf. 1. p.*  
*159. n. 19.*  
*Habitat in Norwegia, statura nigra.*

- sericea. 8. *L. viridi-cærulea*, elytris subfastigiatis. *Fn. suec.* 683.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 32.  
*Schæff. ic.* t. 84. f. 1.  
*Habitat in Europa boreali.*
- quadrimaculata. 9. *L. nigra*, elytris lividis : maculis quatuor nigris. *Fn. suec.* 684. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 25.  
*Schæff. elem.* t. 118. f. 2.  
*ic.* t. 1. f. 7.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- interrogationis. 10. *L. nigra*, elytris lividis : fascia longitudinali arcuata maculisque quatuor nigris. *Fn. suec.* 685.  
*Uddm. diff.* 35. t. 1. f. 2. *Leptura nigra*, elytris fusco-flavis : maculis octo nigris.  
*Habitat in Europa.*
- sexmaculata. 11. *L. nigra*, coleoptris testaceis : maculis sex nigris margine connexis. *Fn. suec.* 686.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 26.  
*Degeer inf.* 5. p. 133. n. 9. *Leptura testaceo maculata.*  
*Raj. inf.* p. 81. n. 18.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- 12-maculata. 37. *L. nigra*, elytris flavis : maculis sex nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 27.  
*Habitat in Sibiria, statura sexmaculata, at paulo major.*
- quadrifasciata. 12. *L. nigra*, elytris testaceis : fasciis quatuor nigris. *Fn. suec.* 687.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 29.  
*Degeer inf.* 5. p. 132. n. 8. t. 4. f. 11. *Leptura octomaculata.*  
*Scop. ent. carn.* n. 172. *Cerambyx fasciatus.*  
*Schæff. ic.* t. 59. f. 6.  
*Habitat in Europa, attenuata affinis, an femina?*
- attenuata. 13. *L. elytris attenuatis flavis : fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis.* *Fn. suec.* 688.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 28.  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 99. n. 66. *Prionus attenuatus.*  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 93. n. 1046? *Leptura fasciata.*  
*Schæff. ic.* t. 39. f. 6.  
*Habitat in Europa.*  
*Femora posteriora apice nigra.*



- dubia. 38. *L. nigra* subvillosa, elytris testaceis nigro-punctatis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 30.  
*Habitat in Sibiria, attenuata nimis affinis.*
- sexguttata. 39. *L. nigra*, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 31.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 102. n. 13. t. 26. f. 25.  
*Habitat in Germania.*
- nigra. 14. *L. elytris* attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine rufescente. *Fn. succ.* 689.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 247. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 159. n. 20. *Degeer inf.* 5. p. 144. n. 24. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 227. n. 9. *Stenocorus niger* nitidus, abdomine fusco-rubente.  
*Schaeff. ic. t.* 39. f. 7.  
*Habitat in Europæ floribus.*
- adultæ. 40. *L. aureo-pubescens*, capite elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 159. n. 21.  
*Habitat Halæ Saxonum, nigra paulo minor, pedibus rubris.*
- 4-guttata. 41. *L. fusca*, elytris nigris, punctis duobus bascos ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 159. n. 22.  
*Habitat Halæ Saxonum, magnitudine & statura nigra.*
- rostrata. 42. *L. obscure anea*, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 159. n. 23.  
*Habitat in Africæ ammi majori, nigra minor.*
- similis. 43. *L. nigra*, elytris spadiceis: apice fasciæque suturali nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 101. n. 2. t. 26. f. 22.  
*Habitat rarior Berolini, melanura perquam similis.*
- armata. 44. *L. thorace* nigro spinoso, antennis pedibusque ferrugineis, elytris flavis: punctis duobus, macula cordata, fasciisque tribus nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 101. n. 11. t. 26. f. 24.  
*Habitat Berolini, attenuata affinis, antennarum articulis apice, capite, tarsis, & posterioribus femoribus tibiisque nigris, pedum posteriorum apice in altero sexu lobato.*

---

*Huic tribui adscribenda quoque videntur 4 sp. c. a Schaeffero delineata, affinis*  
*ic. t.* 101. f. 5. *figurata ic. t.* 151. f. 7. *clavata ic. t.* 103. f. 6. & t. 108.  
*f. 1. & aneo-punctata ic. t.* 201. f. 6.

- ceramby- 45. *L. nigra*, elytris flavis : fasciis tribus nigris ; prima ex  
ciformis. punctis transversim posit. *Schrank inf. austr. p. 154.*  
*n. 290.*  
*Scop. ent. carn. n. 154.* *Leptura quadrimaculata.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 102. n. 16. t. 26. f. 26.*  
*Habitat in Ungaria & Austria, 4½ lineas longa.*
- russica. 46. *L. nigra albido-villosa*, elytris flavescens : maculis  
quinque lineaque media nigris. *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf. 5. p. 102. n. 17. t. 26. f. 27.*  
*Habitat in Russia.*
- lævis. 47. *L. nigra*, subtus villosa-sericea, antennis ex luteo  
fuscis, pedibus anterioribus ferrugineis. *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 5. p. 103. n. 18.*  
*Habitat in Pomerania, nigra dimidio minor.*
- solstitialis. 48. *L. nigra*, antennis basi ferrugineis, pedibus elytrisque  
luteis : his margine nigris. *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf. 5. p. 103. n. 19.*  
*Habitat Berolini, vix 3 lineas longa.*
- splendida. 49. *L. nigra flavo-villosa*, elytris apice glabris, pedibus  
fulvis, antennis fuscis, basi ferrugineis. *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 5. p. 103. n. 20.*  
*Habitat in Marchia, 2½ lineas longa, ad necydalin*  
*accedens.*
- quadrino- 50. *L. nigra flavicanti-subtus albido-villosa*, antennis basi  
tata. fuscis, femoribus basi ferrugineis, elytris punctatis :  
maculis duabus aurantiis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*7. p. 171. n. 22. t. 45. f. 13.*  
*Habitat Berolini.*
- plumipes. 51. *L. fusca punctata*, femoribus subclavatis, pedibus pos-  
tremis longissimis : tibiis apice floccosis. *Pall. spic.*  
*zool. 9. p. 4. t. 1. ff. 2. 2.*  
*Habitat - - - melanura minor, gracillima.*  
*Tarsi sparsa lanugine villosi ; floccus in apice tibiae*  
*postremarum e villis nigris sericeis, in septem versus*  
*per longitudinem dispositis constat.*
- rufipes. 52. *L. nigra*, pedibus rufis : femoribus basi nigris. *Schaller*  
*Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 298.*  
*Schaeff. it. t. 55. f. 7.*  
*Habitat in rhamni cathartici, corni sanguineae, cratagi*  
*oxyacanthae floribus, Maio frequens.*

- octomaculata. 53. *L. nigra*, elytris testaceis : maculis sex apicibusque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 299. Schaeff. ic. t. 6. f. 9. Habitat in Saxonia.*
- Schalleri. 54. *L. fusca*, elytrorum basi maculis quatuor rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 299. Schaeff. ic. t. 182. f. 4. Habitat, rarior, in rhamni cathartici, pruni spinosæ floribus.*
- ustulata. 55. *L. nigra*, thorace elytrisque testaceis, apice nigris, pedibus testaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 298. Habitat, rarior, in floribus Halensis, Junio conspicua, cerambycis præusti statura & magnitudine.*
- pumila. 56. *L. fusca*, pedibus anterioribus testaceis : femoribus superne nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 299. Habitat Halæ Saxonum, in floribus, cerambycis præusti magnitudine.*
- parisina. 56. *L. tota nigra*, femorum antennarumque basi rufescente. *Thunb. nov. ad. Ups. 4. p. 16. n. 28. Habitat Lutetiis, melanura duplo minor, oblonga, angusta.*
- bipustulata. 57. *L. elytris nigris striato-punctatis : maculis duabus testaceis. Thunb. nov. ad. Ups. 4. p. 17. n. 29. Habitat Upsalia, magnitudine melanuræ ; an prisnæ tribus ?*
- Scopolii. 58. *L. abdominis thoracisque margine posteriore rubro, elytris testaceis pellucidis attenuatis : apice & margine infra medium nigro. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 72. Habitat in Carniola.*
- verna. 59. *L. nigra*, tibiis anterioribus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 94. n. 1055. Schaeff. ic. t. 55. f. 9. Habitat in Dania.*
- nigripes. 60. *L. nigra*, elytricis obscure flavo-testaceis, pedibus nigris. *Degeer inf. 5. p. 136. n. 12. Habitat. - - - 7 lineas longa.*
- maculosa. 61. *L. nigra*, elytris testaceo-lividis, antennis flavo-maculatis. *Degeer inf. 5. p. 139. n. 16. Habitat - - - 4 lineas longa.*

- lunulata. 96. *L. nigra*, thorace posterius fascia angusta flava, elytris lunulis duabus ferrugineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 18.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, melanuræ facie, at paulo major.*
- bicolor. 97. *L. pallide ferruginea*, oculis, elytris, alis & ano supra nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 19.  
*Habitat in America septentrionali, attenuatæ simillima, at paulo minor.*
- vittata. 98. *L. pallide testacea*, antennis fusco annulatis, elytris nigris punctatis: vittis quatuor flavis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 20.  
*Habitat in America septentrionali, facie & magnitudine sexmaculatæ.*  
 †† thorace subgloboso nec anterieus attenuato, elytris apice obtusis nec truncatis.
- virginea. 15. *L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomine rufo.* *Fn. suec.* 690. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 34.  
*Degeer inf.* 5. p. 144. n. 23. *Leptura violacea.*  
*Gadd diff.* 26. *Leptura nigra*, elytris cærulefcentibus, toto abdomine rubro.  
*Schaeff. ic. t.* 58. f. 8.  
*Habitat in Europa boreali.*
- collaris. 16. *L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris.* *Fn. suec.* 691. *Scop. ent. carn.* 159. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 33.  
*Degeer inf.* 5. p. 143. n. 22. *Leptura ruficollis.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 228. n. 11. *Stenocorus niger*, thorace rubro.  
*Schaeff. ic. t.* 58. f. 9.  
*Habitat in Europa.*
- decem- 62. *L. atra*, thorace subgloboso, elytris decempunctatis.  
 punctata. *Lepechin it.* 2. t. 10. f. 2.  
*Habitat in monte Ural.*
- varia. 63. *L. villosa cana*, thorace subgloboso, elytris nigris: punctis octo & fasciis interruptis quatuor albis. *Lepechin it.* 2. t. 10. f. 4.  
*Habitat in monte Ural.*

- viridis. 64. *L. viridiuscula*, thorace subovato: lineolis longitudinalibus obscurioribus, dorso nigro. *Lepet. it.* 2. t. 10. f. 11.  
*Habitat in Sibiria.*
- linearis. 25. *L. thorace ovato*, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 77.\*  
*Habitat in India, femoribus nunc clavatis, nunc linearibus.*
- maffiliensis. 65. *L. nigra*, thorace subgloboso, elytris fasciis subribis albis introrsum fractis. *Syst. nat.* XII. add. p. 1067. n. 8.  
*Habitat in Lusitania, & Maffilia, facie cerambycis mystici, sed triplo minor; an cerambyx?*
- pilosa. 66. *L. nigra cinereo-pubescentis*, thorace globoso, elytris fascigiatis. *Forst. nov. inf.* 1. p. 44. n. 44.  
*Habitat in Hispania ad calpen freti Gaditani: magnitudine circiter cerambycis mystici.*
- nitens. 67. *L. thorace globoso & abdomine nigris flavescenti-tomentosis nitentibus*, elytris atris: fasciis quatuor latis transversis flavis, pedibus ferrugineis. *Forst. nov. inf.* 1. p. 45. n. 45.  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine melanurae.*
- bilineata. 68. *L. fusco-nigricans*, thorace lineis binis, elytris punctis sparsis flavescens. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 102. n. 76.  
*Habitat in Carniola, habitu cerambycis cardui, nonne cerambyx?*
- cærulea. 69. *L. cærulea*, tibiis anterioribus rufis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 102. n. 78.  
*Habitat in Carniola.*
- fqualida. 70. *L. nigra*, elytris basi & margine interiori testaceis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 102. n. 79.  
*Habitat in Carniola, antennis brevibus.*
- bipartita. 71. *L. nigra*, thorace ferrugineo: linea nigra longitudinali, elytris macula communi ferruginea. *Schranck Beyr. Naturg.* p. 68. §. 15.  
*Habitat in Germana superiori.*
- ferruginea. 72. *L. nigra*, elytris ferrugineis, extrorsum late nigris. *Schranck Beyr. Naturg.* p. 68. §. 14. t. 3. f. 14.  
*Habitat in Germania.*

- Lamda. 73. *L. nigro*, elytris fasciis tribus albis. *Schranck Beytr.* 1. *Naturg.* p. 67. §. 13. t. 3. f. 13.  
Habitat in Germania.
- aurea. 74. *L. viridi-aurea*, thorace spinoso, elytris fasciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rufis. *Degeer inf.* 5. p. 145. n. 1.  
Habitat - - - -  $8\frac{1}{2}$  lineas longa.
- Genii. 75. *L. nigra*, elytris fusco-testaceis apice nigris, pedibus flavis. *Degeer inf.* 5. p. 139. n. 17.  
*Schaeff. icon.* t. 39. f. 5.  
Habitat in Europa, tabaci colore,  $3\frac{1}{2}$  lineas longa.
- maculata. 76. *L. nigra*, maculis villoso-flavis, thorace globofo, antennis corpore dimidio brevioribus. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 211. n. 7.  
Habitat in Gallia.
- navia. 77. *L. nigra villoso-flava*, elytris maculis duabus glabris nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 211. n. 8.  
Habitat in Gallia.
- punctulata. 78. *L. nigricans*, capite thoraceque rubro nigro-punctato. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 212. n. 9.  
Habitat in Gallia.
- strigosa. 79. *L. villoso flava*, elytris lineis tribus transversis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 216. n. 14.  
Habitat in Gallia.
- gallica. 80. *L. cærulea*, tibiis rufis, thorace subglobofo. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 217. n. 16.  
Habitat in Gallia.
- crassipes. 81. *L. atra*, femoribus crassis rufis. *Geoffr. inf.* 1. par. 5. p. 219. n. 20.  
Habitat in Gallia.
- himaculata. 82. *L. rufa*, thorace cylindrico, elytris punctatis: macula & striga undulata albis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 95. n. 1073.  
*Schaeff. ic.* t. 158. f. 1.  
Habitat in Europa.
- villosa. 83. *L. nigra villosa*, thorace cylindrico: linea longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 95. n. 1072.  
Habitat in Dania.\*



206. NECYDALIS. *Antennæ setaceæ vel filiformes*  
*Palpi quatuor filiformes.*  
*Elytra alis minora, breviora*  
*vel angustiora.*  
*Cauda simplex.*

\* *antennis setaceis, elytris ala & abdomine brevioribus, Lepturæ Fabricii.*

- major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus. *Fn. suec.* 838.\*  
*Degeer inf. 5. p. 148. n. 1. t. 5. f. 1. Necydalis ichneumonæa.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 25. mant. inf. 1. p. 160. n. 30.*  
*Leptura abbreviata.*  
*Schaeff. monogr. 1753. f. 1. 2. Musca Cerambyx major elem. t. 13. f. 2.*  
*ic. t. 10. f. 10. 11.*  
*Habitat in Europa.*

- variegata. 12. N. abdomine atro : fasciis fulvis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 26. mant. inf. 1. p. 160. n. 31.*  
*Leptura variegata.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

- minor. 2. N. elytris testaceis : apice lineola alba, antennis brevioribus. *Fn. suec.* 837.\* *Scop. ent. carn.* 179.  
*It. oeland. 74. Necydalis elytris flavis lineola alba.*  
*Degeer inf. 5. p. 151. n. 2. Necydalis ceramboides.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 27. mant. inf. 1. p. 160. n. 32.*  
*Leptura dimidiata.*  
*Schaeff. monogr. 1753. f. 6. 7. Musca Cerambyx minima icon. t. 95. f. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 51.*  
*Habitat in Europa, imprimis boreali.*

- umbellatarum. 3. N. elytris testaceis immaculatis, antennis longioribus.  
*Schreb. inf. 4. Necydalis elytris apice nigris.*  
*Scop. ent. carn. 180. Necydalis minima.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 28. Leptura umbellatarum.*  
*Schaeff. ic. t. 95. f. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 1.*  
*Habitat in Germaniæ umbellatis.*

\* \* *antennis filiformibus, elytris subulatis longitudine abdominis.*

- viridissima*. 13. *N. thorace teretiufculo, corpore viridi.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 263. n. 1. *mant. inf.* I. p. 170. n. 1. *Syst. nat.* XII. 2. p. 650. n. 23. *Fn. succ.* 717. *Cantharis viridissima.*  
*Degeer inf.* 5. p. 15. n. 3. t. 1. f. 13. *Cantharis viridænea nitida.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 177. n. 14. *Cicindela viridi-cærulea.*  
*Habitat in Europæ hortis frequens.*
- cærulescens*. 14. *N. thorace teretiufculo, corpore cæruleo subopaco.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 263. n. 2. *mant. inf.* I. p. 170. n. 2. *Syst. nat.* XII. 2. p. 650. n. 22. *Cantharis cærulea.*  
*Degeer inf.* 4. p. 76. n. 8. *Telephorus villosus violaceo-cæruleus.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- languinicolis.* 15. *N. thorace teretiufculo rufo, corpore fusco.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 170. n. 3.  
*Habitat Halæ Saxonum, magnitudine & statura cærulescentis.*
- ruficollis.* 16. *N. thorace teretiufculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-æneis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 263. n. 3. *mant. inf.* I. p. 170. n. 4.  
*Habitat in Italia, statura & magnitudine cærulescentis.*
- cærulea.* 4. *N. cærulea, femoribus posterioribus clavatis arcuatis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 264. n. 7. *mant. inf.* I. p. 171. n. 11. *Forst. nov. inf.* I. p. 47. n. 47. *Necydalis ceramboides.*  
*Scop. ent. carn.* 145. *Cantharis nobilis.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 342. n. 3. *Cantharis viridi-cærulea.*  
*Sulz. hist. inf.* 48. t. 6. f. 2.  
*Schacff. ic. t.* 94. f. 7.  
*Habitat in Europa magis australi & Oriente, pedibus interdum simplicibus.*
- tristis.* 17. *N. nigra, thorace teretiufculo femorumque basi rufis.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 170. n. 5.  
*Habitat in terra van Diemen, statura atræ.*
- atra.* 5. *N. nigra, femoribus omnibus clavatis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 263. *mant. inf.* I. p. 170. n. 6.

- Habitat in Europa australi, femoribus in altero sem-  
simplicibus. Afcanius.*
- humeralis. 18. *N. elytris nigris basi flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 263.  
n. 5. mant. inf. 1. p. 170. n. 7.  
Forst. nov. inf. sp. 1. p. 48. n. 48. Necydalis (muralis)  
elytris subulatis fusca, humeris flavis, pedibus simplicibus.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 342. n. 2. Cantharis nigra, &c.  
Habitat in Anglia.*
- ustulata. 19. *N. nigra, elytris basi futuraque lata testaceis. Fabr.  
mant. inf. 1. p. 170. n. 8. Schranck inf. austr. n. 319.  
Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 109. n. 8.  
Habitat in Germaniæ plantis, statura humeralis.  
Femina major, thorace fulvo.*
- melanura. 20. *N. nigra, thorace elytrisque testaceis: his apice  
nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 170. n. 9.  
Habitat in Hispaniæ plantis, statura & magnitudine  
rusicollis.*
- rufa. 6. *N. nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque  
rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 263. n. 6. mant. inf. 1. p. 171. n. 10.  
Geoffr. inf. par. 2. p. 220. n. 22. Leptura nigra, &c.  
Schaeff. ic. t. 94. f. 8.  
Habitat in Europa.*
- glaucescens. 7. *N. elytris glaucis, corpore nigro, abdominis inclisum  
albis. Fabr. mant. inf. 1. p. 171. n. 13.  
Syst. nat. XII. 2. p. 642. n. 7. Necydalis elytris glaucis  
flavescentibus, femoribus clavatis.  
Syst. nat. X. p. 399. n. 17. Leptura necydalea.  
Schaeff. ic. t. 94. f. 6.  
Habitat in Europa magis australi.*
- flavescens. 8. *N. elytris testaceis, corpore nigro, femoribus posterio-  
rioribus clavatis arcuatis.  
Scop. ent. carn. 1-5. Cantharis femorata.  
Schaeff. ic. t. 85. f. 7.  
Habitat in Europa; an mera n. podagrariæ varietas?*
- podagrariæ. 9. *N. elytris testaceis, corpore nigro, femoribus posteriori-  
bus clavatis basi testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 264.  
n. 8. mant. inf. 1. p. 171. n. 12.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 343. n. 4. Cantharis nigra, &c.*

*Habitat in ægopodio podagraria, elytrorum apice nigro, antennarum basi, palpis, & pedibus quatuor anterioribus testaceis. Schreber.*

- simplex.* 10. *N. elytris testaceis, pedibus simplicibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 264. n. 9. mant. inf. 1. p. 171. n. 14. Scop. ent. carn. 144. Cantharis plathyfica. Habitat in Europa, an forsan n. podagrariæ varietas?*
- brevicornis.* 11. *N. elytris minutissimis, capite thoraceque fuscis: linea longitudinali flava, antennis brevissimis crassiusculis. Habitat in Guinea, majoris magnitudine, elongata, elytris ex nubo fuscis, pedibus testaceis.*
- striata.* 21. *N. virescens, elytris lineis quatuor elevatis. Herbst apud Fuesli arch. 5. p. 109. n. 5. Habitat Berolini.*
- melanocephala.* 22. *N. elytris testaceis, capite epigastrio alisque nigris, antennis fuscis. Scha'll. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 300. Habitat Halæ Saxonum in umbellatis.*
- glauca.* 23. *N. nigra, thorace elytrisque cyaneis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 109. n. 6. Habitat rarior Berolini, 5 lineas longa.*
- collaris.* 24. *N. atra, thorace bipunctato testaceo, pedibus simplicibus. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 46. n. 46. Habitat in America septentrionali, cæruleæ magnitudine.*
- exusta.* 25. *N. fusca, elytris subulatis testaceis margine exustis, pedibus simplicibus. Mus. Lesk. p. 31. n. 664. Habitat in Europa.*
- clavipes.* 26. *N. nigra, elytris subulatis testaceis margine exteriora fuscis, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. Mus. Lesk. p. 31. n. 665. Habitat in Europa.*

207. LAMPYRIS. *Antennæ filiformes.**Palpi quatuor.**Elytra flexilia.**Thorax planus, semiorbicularis, caput subtus occultans cingensque.**Abdominis latera plicato-pillosa.**Femina aptera plerisque, latvæ phytiphagæ similis.*\* *palpis subclavatis.*

- noctiluca. 1. *L. oblonga fusca, clypeo cinereo. Fn. suec. 699. Fabr. sp. inf. 1. p. 251. n. 1. mant. inf. 1. p. 161. n. 1. Degeer inf. 4. p. 31. n. 1. t. 1. f. 19. 20. Lampyris noctiluca communis. Leche nov. sp. 23. n. 47. Cantharis mas coleopteris. Geoffr. inf. par. 1. p. 167. t. 2. f. 7. Habitat in Europæ borealis juniperetis graminosis, etiam in Calabria.*
- corusca. 2. *L. obscure nigra, clypeo utrinque lunula rosea. Fabr. sp. inf. 1. p. 251. n. 3. mant. inf. 1. p. 161. n. 3. Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 2. Uddm. diff. 47. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo utrinque intra marginem fulvo. Habitat in America boreali.*
- splendidula. 3. *L. oblonga fusca, clypeo apice hyalino. Fabr. sp. inf. 1. p. 251. n. 2. mant. inf. 1. p. 161. n. 2. Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 3. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo supra oculos fenestrato. Geoffr. inf. par. 1. p. 166. n. 1. Lampyris femina aptera Scop. ent. carn. n. 118. Cassida noctiluca. Poda inf. 39. Cantharis noctiluca. Raj. inf. p. 78. n. 15. Guen. de Montbeill. nov. act. Divion. 1782. sem. 2. Column. ephr. 1. 38. t. 36. Aldr. inf. 492. Mouff. inf. p. 109. f. 1. & 2.*

*Jonst. inf. t. 14. f. 2.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 3. A. B.*

*Schaeff. elem. t. 74.*

*Habitat in Europæ silvaticis, an a noctiluca satis distincta, tempestate imprimis pluvia lucem spargens, femina majorem, gravida maximam, in aëre vitali adhuc majorem.*

obscura. 19. *L. nigra*, clypeo utrinque macula rufa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 251. n. 4. mant. inf. 1. p. 161. n. 4.*  
*Habitat in tierra del Fuego.*

Pyralis. 4. *L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris : marginibus abdomineque albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 251. n. 5. mant. inf. 1. p. 161. n. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 4. Mus. Lud. Ulr. 78. \**  
*Lampyris oblongiuscula fusca, elytris margine rufescentibus, clypeo intra marginem purpurascente. }*  
*Degeer inf. 4. p. 52. n. 7. t. 17. f. 7. Lampyris oblonga.*  
*Habitat in America meridionali.*

cincta. 20. *L. fusca*, thorace elytrorum margine omni abdominisque apice fulvis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 161. n. 6.*  
*Habitat in Pulicander, pyralidi proxime affinis.*

marginata. 5. *L. oblonga nigra, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque posteriore flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 6. mant. inf. 1. p. 161. n. 7.*  
*Habitat in America meridionali, magnitudine noctilucae. }*

Hespera. 6. *L. ovata, elytris fuscis : macula marginali triangulari flava. Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 9. mant. inf. 1. p. 161. n. 10.*  
*Degeer inf. 4. p. 48. n. 1. t. 17. f. 1. Lampyris furinamenfis.*  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*

ignita. 7. *L. ovata, elytris fuscis : macula marginali ovata lutea. Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 10. mant. inf. 1. p. 161. n. 11.*  
*Degeer inf. 4. p. 49. n. 2. t. 17. f. 2. Lampyris ovata.*  
*Habitat in America meridionali, fusca, subius flava, alie nigris. Rolander.*

lucida. 8. *L. oblonga, elytris fuscis : margine exteriori luteo, abdomine flavo. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 11. mant. inf. 1. p. 161. n. 12.*  
*Degeer inf. 4. p. 51. n. 5. t. 17. f. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 22.*



*Habitat in America meridionali, noctiluca similis, sed pallidior, capite antennisque nigris.*

- nitidula. 21. *L. oblonga fusca, thorace flavescente: macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 12. mant. inf. 1. p. 161. n. 13. Habitat in Africa æquinoctiali.*
- phosphorea. 9. *L. oblonga subtestacea, abdomine atro: posterius flavifimo. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 13. mant. inf. 1. p. 161. n. 14. Degeer inf. 4. p. 51. n. 6. t. 17. f. 6. Lampyris oblonga, &c. Habitat in America meridionali, antennis nigris. Rolander.*
- japonica. 22. *L. flava, segmento abdominis antepenultimo nigro. Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 79. Fabr. mant. inf. 1. p. 162. n. 16. Habitat in Japonia, Maio & Junio copiosissima, vesperi lucem egregiam e vesiculis binis caudalibus aëre repletis spargens, oculis, antennis alisque nigris.*
- compressa. 23. *L. testacea, antennis pedibusque compressis. Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 80. Habitat in India, oblonga, linearis, glabra, abdomine cærulescente, capite, pectore, pedibus antennisque nigris.*
- capensis. 24. *L. livida, thorace flavescente, abdomine posterius brevissimo. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 14. mant. inf. 1. p. 162. n. 16. Habitat ad Caput bonæ spei.*
- australis. 25. *L. flavicans, capite elytrisque fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 15. mant. inf. 1. p. 162. n. 17. Habitat in nova Hollandia.*
- mauritana. 10. *L. elytris lividis, corpore flavo. Fabr. sp. inf. 1. p. 254. n. 17. mant. inf. 1. p. 162. n. 18. Habitat in Africa plantis, splendidula duplo, femina triplo major.*
- depressa. 26. *L. fusca, clypei elytrorumque margine dilatato plano. Fabr. sp. inf. 1. p. 254. n. 18. mant. inf. 1. p. 162. n. 19. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 171. n. 2. t. 46. f. 7. Habitat in Coromandel, magna.*
- italica. 11. *L. elytris fuscis, thorace transverso rufo. Fabr. sp. inf. 1. p. 253. n. 16. Syst. nat. XII. 2. p. 645. n. 11. Lampyris elytris fuscis: clypeo antice transverso rufo medio nigro.*

INSECTA COLEOPTERA. Lampyris. Pyrochroæ. 1885

*Degeer inf. 4. p. 53. n. 9. t. 17. f. 9. 10. Lampyris oblonga, &c.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Italiæ & Helvetiæ arboribus, congeneribus minor, fusca, abdominis segmentis 2 ultimis flavis, pectore pedibusque luteis; femina nigra.*

chinensis. 12. *L. elytris testaceis apice nigris. Osb. it. 224.\**  
*Habitat in Asia.*

minuta. 13. *L. testacea, abdomine alisque nigricantibus.*  
*Habitat in Europa, vix pediculo major, ex ovali oblonga.*

pectinata. 27. *L. atra, clypei lateribus basi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 7. mant. inf. 1. p. 161. n. 8.*  
*Degeer inf. 4. p. 57. n. 11. t. 17. f. 13. Lampyris atra, &c.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 649. n. 17. Cantharis pectinata.*  
*Habitat in America meridionali.*

flabellicornis. 28. *L. nigra, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baseos abdomineque apice albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 8. mant. inf. 1. p. 161. n. 9.*  
*Habitat in Brasilia, magna.*

pilosa. 29. *L. oblonga nigra, thorace sanguineo: lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 49. n. 49.*  
*Habitat in America septentrionali, noctiluxæ fere magnitudine; an ex hac tribu?*

*\*\* pulpis subfiliformibus, Pyrochroæ Fabricii.*

fasciata. 30. *L. atra, thoracis margine flavescente, elytris fascia lata alba. Fabr. mant. inf. 1. p. 163. n. 9.*  
*Habitat in Cayenna, statura reticulatæ.*

reticulata. 31. *L. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis: fascia apiceque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 4. mant. inf. 1. p. 163. n. 8.*  
*Habitat in America boreali.*

bicolor. 16. *L. sanguinea, elytris posterius violaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 3. mant. inf. 1. p. 163. n. 7.*  
*Amœn. acad. 6. p. 395. n. 21. Cantharis bicolor.*  
*Habitat in Africa, antennis compressis.*

1886 INSECTA COLEOPTERA. *Lampyris. Pyrochroa.*

- pufilla. 32. *L. atra*, antennarum apicibus elytrisque sanguineis.  
*Fabr. mant. inf. I. p. 163. n. 6.*  
*Degeer inf. 4. p. 36. n. 3.* *Lampyris nigro-rubra.*  
*Habitat in Norwegia, sanguinea duplo major.*
- nigripes. 33. *L. sanguinea*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 163. n. 5.*  
*Habitat in Siam, statura & magnitudine sanguinea.*
- sanguinea. 17. *L. nigra*, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Fn. suec. 704.\* Fabr. sp. inf. I. p. 254. n. 2. mant. inf. I. p. 163. n. 4.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 168. n. 3.* *Lampyris*, elytris rubris.  
*Degeer inf. 4. p. 452. t. 2. f. 1.* *Lampyris sanguinea.*  
*Scop. ent. carn. 119.* *Cassida sanguinea.*  
*Raj. inf. p. 101. n. 4.*  
*Frisch inf. 12. p. 40. n. 3. t. 7. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 7. f. 1.*  
*Habitat in Europæ lapidosis.*
- pectinicornis. 34. *L. atra*, thorace elytrisque testaceis, antennis pectinatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 162. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 650. n. 20. Fn. suec. 715.* *Cantharis pectinicornis.*  
*Habitat in Germania, coccinea major.*
- rubens. 35. *L. nigra*, capite, thorace elytrisque rubris, antennis pectinatis.  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 301.* *Schranck inf. austr. p. 174. n. 324.* *Pyrochroa Satrapa.*  
*Habitat Halæ Saxonum, Maio & Junio conspicua, statura coccineæ, at dimidio minor.*
- stabilata. 36. *L. coccinea*, antennis elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 162. n. 2.*  
*Habitat in America, statura & magnitudine coccineæ, antennis serratis.*
- coccinea. 18. *L. nigra*, thorace elytrisque sanguineis immaculatis.  
*Fn. suec. 705.\* Fabr. sp. inf. I. p. 254. n. 1. mant. inf. I. p. 163. n. 1.*  
*Degeer inf. 4. p. 47. n. 4.* *Lampyris villosa.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 338. n. 1. t. 6. f. 4.* *Pyrochroa.*  
*Schaeff. ic. t. 90. f. 4.*

*Habitat in Europæ sepibus, capite aliquando rufo, elytris interdum striatis.*

Aurora. 37. *L. nigra*, thorace rubro cancellato, elytris spadiceis: lineis quatuor elevatis; interstitiis seriatim punctatis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 105. n. 4.*  
*Habitat in Pomerania.*

nirens. 38. *L. oblonga*, elytris fuscescentibus: macula marginali oblonga fusca, abdomine subtus rufo, posterius flavo: segmento unico nigro. *Degeer inf. 4. p. 50. n. 3. (t. 17. f. 3.*  
*Habitat in Surinamo, 4½ lineas longa.*

maculata. 39. *L. ovata* testacea, thorace fascia elytrisque macula nigris. *Degeer inf. 4. p. 50. n. 4. t. 17. f. 4.*  
*Habitat - - - sex lineas longa.*

pen-sylva-nica. 40. *L. oblonga*, elytris pallide ex griseo testaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rufis.  
*Degeer inf. 4. p. 52. n. 8. t. 17. f. 8.*  
*Brown jan. p. 431. t. 44. f. 9. a. b. Pyralis minor subcinerea longa, alis & oculis nigricantibus?*  
*Habitat in Pennsylvania.*

\*\*\* *palpis articulo ultimo crassiori truncato; Lyci Fabricii.*

latissima. 14. *L. flava*, elytris macula marginali posteriusque nigris, margine laterali maximo dilatato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 5. mant. inf. 1. p. 163. n. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, statura & magnitudine Ælphæ cujusdam minoris, antrosum angusta, retrorsum latissima, antennis serratis.*

palliat. 41. *L. elytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 6. mant. inf. 1. p. 163. n. 2.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

rostrata. 16. *L. nigra*, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis anterieus posteriusque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 7. mant. inf. 1. p. 163. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 646. n. 15. Mus. Lud. Ulr. 78. Lampyris elytris testaceis antice posticeque nigris.*  
*Degeer inf. 7. p. 622. n. 19. t. 46. f. 11.*  
*Habitat in Africæ planis.*

- probosci- 42. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, posterius  
dea. nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 255. n. 8. *mant. inf.* 1. p.  
164. n. 4.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, rostratæ proxime affinis.*
- ferrati- 43. L. nigra, thorace elytrisque rufescentibus, elytris apice  
cornis. nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 256. n. 9. *mant. inf.* 1. p.  
164. n. 5.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- atra. 44. L. atra, thorace orbiculato elytrisque rubris, dorsa  
macula impressa nigra. *Mus. Lesk. p.* 29. n. 626.  
*Habitat in Europa.*

## HORIA. *Antennæ moniliformes.*

*Palpi quatuor extrorsum crassiores.*

*Labium lineare, apice rotundatum.*

- testacea. 1. H. rufa, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1.  
p. 164. n. 1.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 256. n. 1. *Lymexylon testaceum.*  
*Habitat Tranquebariæ.*  
*Mari femora posteriora incrassata, subtus canaliculata*  
*dentata.*
- dermestoi- 2. H. testacea, oculis, alis pectoreque nigris. *Fabr. mant.*  
des. *inf.* 1. p. 164. n. 2.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 650. n. 25. *Fn. suec.* 702.  
*Cantharis testacea, oculis, alis pectoreque nigris,*  
*antennis longitudine thoracis.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 256. n. 2. *Lymexylon dermestoides.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 145. n. 5. t. 30. f.  
4. *Lytta francfurtana.*  
*Habitat in Europa media.*

CUCUJUS. *Antennæ filiformes.**Palpi* quatuor æquales : articulo ultimo truncato, crassiori.*Labium* breve, bifidum : laciniis linearibus, distantibus.*Corpus* depressum.

- monilis. 1. *C. supra niger, thorace quadrato mutico margine, elytris macula ferruginea. Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 9.*  
*Habitat in Germania, antennis moniliformibus ad horiam accedens, vix hujus generis.*
- muticus. 2. *C. thorace mutico nigro : puncto utrinque impresso, elytris striatis fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 5.*  
*mant. inf. 1. p. 166. n. 8.*  
*Habitat in Germania, niger.*
- testaceus. 3. *C. testaceus, thorace subquadrato mutico, femoribus compressis. Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 7.*  
*Habitat sub betulæ cortice.*
- dubius. 4. *C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 3.*  
*mant. inf. 1. p. 166. n. 5.*  
*Habitat in America boreali.*
- clavipes. 5. *C. ruber, thorace fulcato, femoribus clavatis rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 2.*  
*mant. inf. 1. p. 166. n. 4.*  
*Habitat in America boreali.*
- cæruleus. 6. *C. niger, thorace fulcato, elytris striatis cæruleis, abdomine rufo. Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 3.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 2. p. 6. n. 2. t. 1. f. 5. 6.*  
*Habitat in Germania, depressio major.*
- fulcatus. 7. *C. niger, thorace fulcato, elytris crenato-striatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 165. n. 2.*  
*Habitat in Croatia ligno putrescente, elongatus, mediæ magnitudinis.*
- depressus. 8. *C. thorace denticulato elytris rufis, pedibus simplicibus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 1.*  
*mant. inf. 1. p. 165. n. 1.*



*Syst. nat.* XII. 2. p. 647. n. 1. *Cantharis* (sanguinolenta)  
supra rubra, elytris bimarginatis.

*Frisch inf.* 13, c. 24. 3. t. 7. f. 1.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 2. p. 4. n. 1. t. 1. f. 1-4.

*Habitat in Germania & Russia, lampyridi sanguinea affinis.*

quadratus. 9. *C. niger*, thorace quadrato posteriore dentato, medio tuberculato, margine externo rugoso, anterieus elevato, antennis fuscis, pedibus simplicibus elytrisq. testaceis.  
*Mus. Lesk. p.* 29. n. 629. b.

*Habitat in Europa.*

rufus. 10. *C. rufescens*, mandibulis validis, antennis, palpis pedibusq. nigris, capite gibboso, elytris molliusculis.  
*Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 21.

*Habitat in Sumatra.*

maculatus. 11. *C. fordide flavus*, thorace quadrangulo inæquali, mandibulis validis, pedibus, elytrorumq. maculis subquadratis nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 22. t. 8. f. 8.

*Habitat in Noveboraco, congenerum maximus, subdepressus.*

## 208. CANTHARIS. *Antennæ filiformes.*

*Thorax* (plerisque) marginatus, capite brevior.

*Elytra* flexilia.

*Abdominis* latera plicato-papillosa.

\* *palpis quatuor securiformibus.*

viridescens. 1. *C. thorace testaceo*: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusq. testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 167. n. 3.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magna, capite nigro, pectore fusco, abdomine testaceo.*

fusca. 2. *C. thorace rubro*: macula nigra, elytris fuscis. *Fn. suec.* 700.\* *It. oel.* 38. *Scop. ent. carn.* 120. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 257. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 1.

*Cantharides declaratæ alitis victitant insectis, sola lymexyli tribus, tum larvæ tum imago, ligno recentî,*

*Raj. inf. p. 84. n. 29. & p. 101. n. 2. Cantharis sepiarius major, elytris nigricantibus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 170. n. 1. t. 2. f. 8. Cicindela elytris nigricantibus, &c.*

*Degeer inf. 4. p. 60. n. 1. t. 2. f. 12. Telephorus fuscus.*

*Poda inf. 40. n. 4.*

*Frisch inf. 12. 3. t. 6. f. 5.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 33.*

*Schaeff. elem. t. 123. f. 1. 2.*

*ic. t. 16. f. 10. & t. 26. f. 9-12.*

*Habitat frequens in Europæ sepibus, rapacissima, in propriam speciem sæviens.*

*marginella.* 73. *C. testacea, abdomine nigro marginato capite posteriori pectore oculisque flavis. Mus. Lesk. p. 29. n. 631.*

*Habitat in Europa.*

*media.* 74. *C. fusca, thorace, capite, antennarum basi, abdominis margine & apice pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 29. n. 632.*

*Habitat in Europa.*

*hamatof-toma.* 75. *C. nigra, ore abdomineque rufo. Mus. Lesk. p. 29. n. 633.*

*Habitat in Europa.*

*punctata.* 76. *C. livida, oculis truncoque fuscis, abdominis segmentis utrinque puncto fusco. Mus. Lesk. p. 29. n. 638.*

*Habitat in Europa.*

*dichroa.* 77. *C. nigra, fronte, thorace, abdomine pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 29. n. 639.*

*Habitat in Europa.*

*multicolor.* 78. *C. capite nigro, fronte thoraceque luteis, elytris fuscis, abdomine pedibusque lividis. Mus. Lesk. p. 29. n. 640.*

*Habitat in Europa.*

*livens.* 79. *C. thoracis macula nigra posteriori triloba, utrinque punctis duobus impressis fuscis, capite posteriori nigro, elytris fuscis. Mus. Lesk. p. 30. n. 642.*

*Habitat extra Europam.*

*distincta.* 80. *C. nigra, maxillis thoracis abdominisque marginibus externis lividis. Mus. Lesk. p. 30. n. 643.*

*Habitat in Europa.*

*exusta.* 81. *C. fusca, capite thoraceque nigris, elytris testaceis apice exustis, antennis pedibusque luteis. Mus. Lesk. p. 30. n. 644.*

*Habitat in Europa.*

- livida.** 3. *C. tota testacea. Fn. succ. 701.\* Scop. ent. carn. 122. Fabr. sp. inf. 1. p. 258. n. 2. mant. inf. p. 167. n. 2. Raj. inf. p. 84. n. 28. Cantharis sepiarius major e rufo flavicans. Geoffr. inf. par. 1. p. 171. n. 2. Cicindela thorace rubro immaculato, &c. Degeer inf. 4. p. 70. n. 2. Thelephorus flavus. Habitat in Europa & boreali America.*
- rufa.** 4. *C. tota rufa, epigastrio alisque nigris. Fn. succ. 703.\* Habitat in Europa.*
- obscura.** 5. *C. thoracis marginibus rubris, corpore nigro. Fn. succ. 706. Ail. nadros. 3. p. 396. t. 6. f. 3. Fabr. sp. inf. 1. p. 258. n. 3. mant. inf. 1. p. 167. n. 4. Schaeff. ic. t. 16. f. 8. Habitat in Europa, thoracis margine aliquando fuscescente, pedibus interdum rubris, fuscae similis, at duplo minor.*
- limbata.** 20. *C. fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro. Fabr. sp. inf. 1. p. 258. n. 4. mant. inf. 1. p. 167. n. 5. Habitat in Jamaica, mediæ magnitudinis.*
- lateralis.** 6. *C. thorace rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescentibus. Fn. succ. 707.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 258. n. 5. mant. inf. 1. p. 167. n. 6. Habitat in Europa boreali.*
- emeraldula.** 22. *C. thorace flavo: macula viridi, elytris viridibus nitidis. Fabr. sp. inf. 1. p. 259. n. 6. Habitat in Brasilia, mediæ magnitudinis.*
- biguttata.** 11. *C. thorace medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis. Fn. succ. 712.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 261. n. 20. mant. inf. 1. p. 168. n. 24. Geoffr. inf. par. 1. p. 176. n. 11. Cicindela fusca, elytris apice flavis, thorace fusco. Degeer inf. 4. p. 77. n. 10. Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis. Habitat in Europæ nemoribus, hortis.*
- minima.** 12. *C. thorace rufo: macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis. Fn. succ. 713.\* Scop. ent. carn. 128. Fabr. sp. inf. 1. p. 260. n. 18. mant. inf. 1. p. 168. n. 22. Lesk. it. p. 47. t. A. f. 14.*

INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 1893

*Fn. suec.* 598. \* *Necydalis elytris* apice puncto flavo.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 176. n. 10. & p. 372. 1. 7. f. 2.  
*Necydalis elytris* puncto flavo.  
*Habitat in Europæ hortis.*

cardiacæ. 13. *C. thorace submarginato*, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto sanguineo. *Fn. suec.* 720.\*  
*Habitat in Europæ leonuro cardiaca.*

albicans. 14. *C. thorace orbiculato*, margine luteo, corpore nigro, fronte flava.  
*Habitat in Germania, statura c. cardiacæ, magnitudine pediculi, tibiis anterioribus antèrius flavis.* Forskähl.

testacea. 15. *C. thorace flavo*: macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis. *Fn. suec.* 714.\* *Scop. ent. carn.* 123. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 261. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 23.  
*Fn. suec.* 593. *Cantharis nigra*, elytris lividis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 173. n. 6. b. *Cicindela nigra*; thoracis margine flavo, &c.  
*Degeer inf.* 4. p. 71. n. 4. *Thelephorus niger*, thorace rufescente, &c.  
*Schaeff. ic.* 1. 52. f. 8.  
*Habitat in Europæ hortis.*

atra. 16. *C. corpore toto atro.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 7.  
*mant. inf.* 1. p. 167. n. 8.  
*Habitat in Europa boreali.*

marginata. 23. *C. nigra*, thoracis elytrorumque marginibus rubris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 9.  
*Habitat in America.*

bimaculata. 25. *C. thorace ferrugineo*: macula nigra, elytris testaceis: macula apicis nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 9.  
*mant. inf.* 1. p. 167. n. 10.  
*Habitat in America septentrionali, nigra.*

pallipes. 28. *C. atra*, elytris pallidis apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 11.  
*Habitat in Germania, statura atræ.*

pallida. 29. *C. atra*, elytris pedibusque pallide testaces. *För.*  
*mant. inf.* 1. p. 167. n. 12.  
*Habitat Kilonii, parva.*

- ruficollis. 30. *C. atra*, thorace abdomineque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 13.  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Anglia.*
- flavipes. 31. *C. testacea*, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato-nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 14.  
*Habitat in Sina, magna.*
- melanocephala. 32. *C. testacea*, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 260. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 15.  
*Habitat in Coromandel, magna.*
- bipunctata. 33. *C. thorace punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 260. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 16.  
*Habitat Lipsiæ.*
- angulata. 34. *C. testacea*, thorace angulato spinoso, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 168. n. 17.  
*Habitat in oceani australis insula Amsterdam, statura & magnitudine melanuræ.*
- nigra. 35. *C. pubescens*, corpore nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 168. n. 20.  
*Scop. ent. carn.* 131. *Cantharis pilosa.*  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 564. n. 28. *Fn. suec.* 439. *Dermeestes (niger) oblongus pilosus niger, elytris molliusculis.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 71. n. 5. *Anobium nigrum.*  
*Habitat frequens in Europæ floribus.*
- pulicaria. 36. *C. thorace rufo : macula nigra, elytris atris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 260. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 21.  
*Habitat in Germania, atra.*
- canescens. 37. *C. thorace luteo, epigastrio elytrisque obscure cinereis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 302.  
*Habitat gregaria Halæ Saxonum, in betulis, quercubus, Maio & Junio conspicua, fuscæ affinis.*
- coccinea. 38. *C. thorace rubro : macula nigra, corpore nigro, elytris sanguineis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 303.  
*Habitat, rarior, Hallæ Saxonum, bipustulata affinis.*

- bicolor. 39. *C. lutea*, elytris dimidiato-cæruleis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glaberrima, statura & magnitudine melanuræ.*
- bilineata. 40. *C. thorace flavo*: macula punctisque quatuor fuscis, elytris flavis: linea fusca. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine testaceæ.*
- trilineata. 41. *C. thorace flavo*: maculis duabus nigris, elytris flavis: linea suturaque nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 82.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine testaceæ.*
- Altica. 42. *C. thorace rufo*, elytris violaceis immaculatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 82.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine & statura pulicariæ, glaberrima, violacea, pedibus rufescentibus.*
- oculata. 43. *C. thorace flavo*: punctis duobus nigris, elytris corporeque cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - bipustulata paulo minor, capite pedibusque flavis, elytris interdum violaceis.*
- collaris. 44. *C. thorace sanguineo*: macula nigra, elytris cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nigra.*
- cuprea. 45. *C. subtus cyanea*, supra ænea. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nitida, pilosa.*
- argentea. 46. *C. thorace plano elytrisque viridibus*, abdomine sericeo-argenteo. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 84.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine & facie fusca, capite nigro, ano pedibusque luteis, tarsis fuscis.*
- janthina. 47. *C. thorace flavo*: macula punctisque quatuor fuscis, elytris viridibus. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 84.*  
 β) *Cantharis antennis flavis*: extremis tribus articulis fuscis.  
 γ) *Cantharis thoracis macula fusca*, posterius bifida, punctum nigrum includente.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine & facie fusca, pedore oculisque nigris, capite, antennis, abdomine pedibusque flavis.*
- americana. 48. *C. thorace flavo*: macula nigra, elytris flavis: macula apicis trientali oblonga nigra. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 50. n. 50.*  
*Habitat in Noveboraco, fusca magnitudine, nigra, antennis fuscis.*



- rufipes. 49. *C. capite thoraceque rubris immaculatis, pedibus fulvis: posterioribus apice nigris. Herbſt apud Fuesſli arch. inf. 5. p. 107. n. 2.*  
*Habitat Berolini, fuscæ affinis, ſed minor.*
- berolinen-ſis. 50. *C. nigra, antennis baſi elytrisſque flaveſcentibus: his apice nigris, pedibus ferrugineis. Herbſt apud Fuesſli arch. inf. 5. p. 108. n. 10.*  
*Habitat Berolini, lividæ affinis, ſed minor.*
- fulva. 51. *C. fulva, capite, elytris & antennis dimidiato-nigris. Herbſt apud Fuesſli arch. inf. 5. p. 108. n. 11.*  
*Habitat Berolini, fuscæ ſimilis, ſed quadruplo minor.*
- ferrata. 18. *C. flaveſcens, elytris ſtriatis: faſciis tribus nigris, antennis ferratis.*  
*Habitat in America, antennis nigris, longitudine corporis; an hujus generis?*
- tropica. 19. *C. thorace lateribus rubro, elytris nigris: faſcia alba, antennis peſtinatis. Muſ. Lud. Ulr. 80. \* Gron. zooph. 515. t. 14. f. 7.*  
*Habitat in America aſtrali, an hujus generis?*
- ſonchi. 52. *C. atra, elytris fimbria lineaque longitudinali intermedia albis. Lepechin it. 1. p. 264.*  
*Habitat in Sibiricæ ſoncho; an hujus tribus?*
- caſpica. 53. *C. viridis, elytris maculis duabus apicis flavis rhombeis. Lepechin it. 1. t. 16. f. 11.*  
*Habitat ad mare caſpium, parva; an huc referenda?*
- flaveola. 54. *C. ſubtus flava, capite antennisſque nigris, thorace ferrugineo: maculis duabus fuscis, elytris ex luteo fuscis apice flavis. Herbſt apud Fuesſli arch. inf. 7. p. 171. n. 12.*  
*Habitat Berolini, biguttatæ affinis.*
- violacea. 21. *C. violacea, thorace teretiſculo, antennis peſtinatis, femoribus anterioribus craſſiſſimis dentatis.*  
*Habitat in Guinea, dermeſtis magnitudine, ano pedibuſque ferrugineis.*
- vireſcens. 24. *C. thorace teretiſculo, corpore vireſcenti-fulco, femoribus poſterioribus clavatis.*  
*Habitat in Europa, antennis nigris, clytris trilineatis.*

- lepturoi-  
des. 55. *C. lutea*, thorace convexo, elytrorum apice corporeque  
nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, melanuræ affinis, magnitudine*  
*lividæ.*
- nigripes. 56. *C. lutea*, thorace rotundato, abdomine, pedibus ely-  
trorumque apicibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 260. n.*  
*15. mant. inf. 1. p. 168. n. 18.*  
*Habitat in Europa boreali, etiam Calabria, melanuræ pro-*  
*xime affinis, an satis a lepturoide distincta?*
- melanura. 27. *C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris.*  
*Fn. suec. 719. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 260. n. 16. mant. inf.*  
*1. p. 168. n. 19.*  
*Raj. inf. p. 84. n. 27. Cantharis sepiarius, elytrorum api-*  
*cibus nigris.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 1773. n. 5. Cicindela rubra, &c.*  
*Schæff. ic. t. 16. f. 14.*  
*Habitat in Europæ hortis.*
- Histrio. 82. *C. nigra*, thorace, antennarum basi, abdominis seg-  
mentorum basi posteriori pedibusque luteis, thoracis  
macula fusca. *Mus. Lesk. p. 30. n. 645.*  
*Habitat in Europa.*
- picea. 83. *C. picea*, thorace posterius utrinque puncto rubro, an-  
tennarum basi pedibusque luteis, femoribus basi atris.  
*Mus. Lesk. p. 30. n. 646.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybea. 84. *C. nigro-violacea pubescens. Mus. Lesk. p. 30. n. 648.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 85. *C. nigra*, elytris dimidio nigris, apicem versus albis,  
summo apice geniculisque luteis. *Mus. Lesk. p. 30.*  
*n. 649.*  
*Habitat in Europa.*
- ænea. \*\* *palpis filiformibus: articulo ultimo setaceo, Malachii.*
7. *C. corpore viridi-æneo, elytris extrorsum undique rubris.*  
*Fn. suec. 708. \* Scop. ent. carn. n. 126. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 261. n. 1. mant. inf. 1. p. 169. n. 1.*  
*Degeer inf. 4. p. 73. n. 6. t. 2. f. 16. 17. Thelephorus*  
*æneus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 174. n. 7. Cicindela viridi-ænea,*  
*elytris extrorsum rubris.*

*Raj. inf. p. 77. n. 12.*

*Schaeff. monogr. 1754. t. 2. f. 10. 11.*

*icon. t. 18. f. 12. 13.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 5.*

*Habitat in Europæ plantis, tentaculis duobus obtusis sanguineis basi connatis ad basin abdominis aliisque duobus ad apicem thoracis exserendis instructa, aliquando minor, elytris totis sanguineis.*

bipustulata. 8. *C. æneo-viridis, elytris apice rubris. It. oel. 127. Fn. suec. 709. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 2. mant. inf. 1. p. 169. n. 2. Scop. ent. carn. n. 127.*

*Raj. inf. p. 101. n. 8. Cantharis vix  $\frac{1}{3}$  unciae longa.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 175. n. 8. Cicindela æneo-viridis, elytris apice rubris.*

*Degeer inf. 4. p. 75. n. 7. Thelephorus viridi-æneus nitidus.*

*Schaeff. ic. t. 18. f. 10. 11. t. 19. f. 14.*

*Habitat in Europa frequens.*

hæmorrhoidalis. 86. *C. nigra, thorace elytrorumque apicibus rubris. Masf. Lesk. p. 30. n. 660.*

*Habitat in Europa.*

viridis. 57. *C. æneo-viridis, ore flavescente. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 3.*

*Habitat in Scania, statura & magnitudine bipustulata.*

sanguinolenta. 58. *C. nigro-ænea, thoracis margine elytrisque sanguineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 4.*

*Habitat Kilonii, statura æneæ, sed duplo minor.*

cyanea. 59. *C. cyanea, thorace abdomineque rubris. Fabr. mant. 1. p. 169. n. 5.*

*Habitat in Hispaniæ umbellatis, statura sanguinolenta.*

pedicularia. 9. *C. atra, elytris apice rubris. Fn. suec. 710. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 3. mant. inf. 1. p. 169. n. 6.*

*Habitat in Europæ hortis, pediculo paulo major.*

nemorialis. 60. *C. nigra, thorace margine, elytris apice rubris. Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 4. mant. inf. 1. p. 169. n. 7.*

*Habitat Kilonii in nemoribus.*

INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. *Malachius*. 1898

- fasciata. 10. *C. thorace subrotundo virescente, elytris nigris: fasciis duabus rubris. Fa. suec. 711.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 5. mant. inf. 1. p. 169. n. 8. Raj. inf. p. 102. n. 22. Cantharis valde exigua. Geoffr. inf. par. 1. p. 177. n. 12. Cicindela elytris nigris: fasciis duabus rubris. Degeer inf. 4. p. 76. n. 9. Schaeff. ic. t. 189. f. 3. Habitat in Europæ muscis.*
- equa. 61. *C. viridi-ænea, elytris rubris: fascia viridi-ænea. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. n. 6. mant. inf. 1. p. 169. n. 9: Habitat in Italia, statura & magnitudine fasciata.*
- ochropus. 62. *C. nigra, antennarum basi tibiisque flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 10. Habitat Halæ Saxonum, parva nitida.*
- chryso-  
meloides. 63. *C. thorace rubro immarginato, elytris cyaneis lævibus, antennis pedibusque nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 17. n. 30. Habitat Luteriis, magnitudine pediculi majore, tacta sub pedore caput & corpus contrahens & libera celerrime fugiens.*
- cæruleo-  
cephala. 64. *C. thorace rubro, immarginato, elytris fuscis, capite antè rubro, postè ex cæruleo nigro. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 18. n. 31. Habitat circa Holmiam, magnitudine testaceæ, lateralitè similis, sed angustior & minor.*
- fuscica. 65. *C. thorace flavo immarginato: punctis duobus nigris, elytris flavescens apice nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 18. n. 32. Habitat in Suecia, melanuræ affinis, lividæ magnitudine; statura lepturæ; an cum 63 & 64 hujus tribus?*
- Herbstii. 66. *C. elytris rubris: macula nigricante. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 108. n. 4. Habitat Berolini, fasciata magnitudine.*
- erythro-  
melas. 67. *C. nigra, thoracis margine elytrisque rubris, segmentis abdominis tribus margine fulvis. Herbst apud Fuesli arch. 5. p. 108. n. 5. Habitat Berolini, 3. fere lineas longa.*

1900 INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. *Lymexylon*

\*\*\* *palpis anterioribus porrectis: articulo penultimo appendice magna ovata fissâ aucto, ultimo arcuato acuto, Lymexyla.*

abbreviata. 68. *C. nigra, thoracis linea dorsali, elytris brevissimis fornicatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 164. n. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, speciebus hujus tribus major, elongata.*

probosci-dea. 69. *C. nigra, elytris testaceis apice nigris, palpis hamatirregularibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 256. n. 4. mant. inf. 1. p. 165. n. 2.*  
*Habitat in Germaniæ lignis.*

barbata. 70. *C. fusca, antennis tibiisque piceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 165. n. 3.*  
*Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 322. t. 1. f. 7.*  
*Mordella (barbata) fusca, palpis ensiformibus trilobis: lobis lateralibus latissimis.*  
*Schaeff. ic. t. 279. f. 7. a. b.*  
*Habitat in Germaniæ lignis, proboscideæ affinis, tomento aureo fugaci nitens.*

navalis. 26. *C. thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. Fn suec. 718. \* It. wgoth. 153. t. 2. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 256. n. 3. mant. inf. 1. p. 165. n. 4.*  
*Frisch inf. 13. p. 24. t. 20.*  
*Schaeff. ic. t. 59. f. 1.*  
*Habitat in ligno querno, quod destruit.*

saxonica. 71. *C. nigro, elytris basi, abdomine apice pedibusque flavis. Fabr. mant. 1. p. 165. n. 5.*  
*Habitat in Saxoniz ligno, statura & magnitudine navalis.*

morio. 72. *C. nigra, pedibus anterioribus flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 165. n. 6.*  
*Habitat in Saxoniz lignis, saxonica duplo major.*

SERROPALPUS. *Antennæ fetaceæ.*

*Palpi* quatuor inæquales; anteriores longiores profunde serrati: articulis quatuor; ultimo maximo, truncato, compresso apice patelliformi; posteriores subclavati.

*Thorax* marginatus, antèrius caput excipiens: angulo utrinque prominente.

*Caput* deflexum.

*Pedes* fossorii.

striatus. 1. *S. corpore fusco, elytris striatis. Hellenius nov. act. Stockh. 1786. 4. p. 273. t. 8. f. 3-5.*  
*Habitat in insulæ Runsalæ ædificiis ligneis vetustis, autumno vespere ad parietes conspicuus, elatere atterimo vix major.*

lævigatus. 2. *S. corpore atro, elytris lævibus. Hellenius act. Stockh. 1786. 4. p. 280.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 656. n. 37. Fn. suec. 742.\* Elater (buprestoides) thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 175. n. 55. Elater (buprestoides) cylindricus niger immaculatus, capite retracto.*  
*Habitat in Europa.*

209. ELATER. *Antennæ filiformes.*

*Palpi* quatuor securiformes.

*Corpus* dorso impositum exsiliens mucrone pectoris e foramine abdominis resiliente.

flabelliformis. 1. *El. fuscus, antennarum fasciculo flabelliformi. Fabr. sp. inf. p. 651. n. I. mant. inf. I. p. 171. n. I.*  
*Drury inf. 3. t. 47. f. I.*



*Habitat in India, inter maximos hujus generis, antennis brevibus, a tertio inde articulo ingenti ex 8 lamellis conflato flabello ornatis.*

fascicula- 37. El. thorace murino, elytris pallidis fusco undatis,  
ris. antennarum fasciculo flabellicorni. *Fabr. mant. inf. 1. p. 171. n. 2.*

*Habitat in America, æneo paulo major, murinus, antennis nigris.*

speciosus. 2. El. albus, lineis punctis maculisque nigris.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 2. mant. inf. 1. p. 171. n. 3.*

*Elater albus nigro maculatus.*

*Habitat in India, noctiluco major. Brüniche.*

luridus. 39. El. cinereo-tomentosus, elytris substriatis, plantis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 3. mant. inf. 1. p. 171. n. 4.*  
*Habitat in Coromandel, magnus.*

oculatus. 3. El. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore nigricante. *Mus. Lud. Ulr. 81.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 4. mant. inf. 1. p. 171. n. 5.*

*Elater thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo-maculato.*

*Degger inf. 4. p. 159. n. 1. t. 17. f. 28. Elater niger, thorace maculis binis ovatis villosis aterrimis.*

*Periv. gaz. t. 10. f. 4. Scarabæus elasticus major, capite bimaculato.*

*Aët. angl. 246. p. 396. n. 13. & 271. p. 842. n. 32.*

*Habitat in America meridionali.*

fuscus. 40. El. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immaculato.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 5. mant. inf. 1. p. 171. n. 6.*

*Habitat in America.*

cæcus. 41. El. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris strigis duabus arcuatis punctoque posteriore ferrugineis.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 6. mant. inf. 1. p. 172. n. 7.*

*Habitat in Africa.*

noctilucus. 4. El. thoracis lateribus macula flava glabra. *Mus. Lud. Ulr. 82.\**

*Gron. zooph. 474.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 7. mant. inf. 1. p. 172. n. 8.*

*Degger inf. 4. p. 160. n. 2. t. 18. f. 1. Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida.*

*Brown. jam. 432. t. 44. f. 10. Elater major fuscus phœphericus.*

*Sloan. jam. 2. p. 206. t. 237. f. 1. Scarabæus medius fuscus, &c.*

*Mouff. inf. 112. Cocujus.*

*Habitat in America meridionali, thoracis ocellis lampyridum & fulgorarum more, noctu, ut fertur, pro bitrio lucem tantam spargens, ut lectulo sufficiat; abdomen diffractum intus lucet.*

phosphoreus. 5. *El. fuscus, thorace posteriorius maculis duabus flavis glabris. Fabr. sp. inf. 1. p. 266. n. 8. mant. inf. 1. p. 172. n. 9. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 110. n. 1. t. 27. f. 2. Degeer inf. 4. p. 161. n. 3. t. 18. f. 2. Elater fusco-castaneus.*

*Habitat in America meridionali, noctiluco affinis, at duplo minor, quamvis europæis speciebus multo major; thoracis maculis noctu pariter lucentibus.*

ignitus. 42. *El. fuscus, thorace nigro: margine flavo. Fabr. mant. inf. 1. p. 172. n. 10.*

*Habitat in Cayenna, phosphoreo minor.*

fuscipes. 43. *El. ater, antennis pedibusque fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 266. n. 9. mant. inf. 1. p. 172. n. 11.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 110. n. 3. t. 27. f. 4.*

β) *Elater elytris crenato-striatis. Mus. Lesk. p. 31. n. 584.*

*Habitat in India, β) in Europa.*

umbiginosus. 44. *El. nigricans griseo maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. Fabr. mant. inf. 1. p. 172. n. 12.*

*Habitat in Sierra Leon Africæ, magnus.*

porcatus. 6. *El. viridi-æneus, elytris sulcatis: sulcis villosis-albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 266. n. 12. mant. inf. 1. p. 172. n. 15. Syst. nat. XII. 2. p. 652. n. 6. Elater fuscus elytris nigris porcatis: sulcis elevatis glabris.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 7.*

*Drury inf. 3. t. 47. f. 6.*

*Habitat in America meridionali, europæis speciebus major, pectoris sutura atra nitida.*

ligneus. 7. *El. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. Amæn. acad. 6. p. 395. n. 24. Fabr. sp. inf. 1. p. 266. n. 10. mant. inf. 1. p. 172. n. 13.*

*Gron. zooph. 477? Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris postice acuminatis.*

*Habitat in America meridionali.*

fulcatus. 45. *El. villosus*-albidus, elytris striis tribus elevatis glabris atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 266. n. 13. mant. inf. I. p. 172. n. 16.*

*Habitat in America meridionali.*

virens. 46. *El. villosus*-viridis, antennis ferratis nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 172. n. 17.*

*Habitat in insulis Americæ oppositis, statura porcati.*

striatus. 8. *El. niger* opacus, elytris striatis: striis subpubescentibus, ano villosus.

*Gron. zooph. 475. Elater virens, elytris atris sulcis albis striatis, ano barbato.*

*Habitat Surinami, magnitudine fere oculati.*

bipustulatus. 9. *El. niger* nitidus, elytris puncto baseos nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 243. n. 47. mant. inf. I. p. 175. n. 59.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 136. n. 15. Elater niger, elytrorum basi maculis rubris.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 27. f. 8.*

*Habitat in Germaniæ graminosis, mediæ magnitudinis.*

brunneus. 10. *El. thorace* rufo medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. *Fn. suec. 721. Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 34. mant. inf. I. p. 173. n. 38.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 112. n. 17. t. 27. f. 6.*

*Habitat in Europæ hortis.*

syriacus. 11. *El. thorace* rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro. *Mus. Lud. Ulr. 83. \* Fabr. sp. inf. I. p. 269. n. 22. mant. inf. I. p. 173. n. 26.*

*Habitat in Oriente. Hasselquist.*

cruciatus. 12. *El. thorace* nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis, cruce margineque nigris. *Fn. suec. 722. \* Gadd sat. 27. Fabr. sp. inf. I. p. 268. n. 21. mant. inf. I. p. 173. n. 25.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 133. n. 6.*

*Degger inf. 4. p. 149. n. 9.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 10.*

*Habitat in Europæ graminosis.*

linearis. 13. *El. thorace* rufo medio fusco, elytris testaceis linearibus. *Fn. suec. 723. \* Fabr. sp. inf. I. p. 269. n. 28. mant. inf. I. p. 173. n. 29.*

*Fn. suec. I. n. 582. Elater thorace rubro, elytris griseis. Uddm. diff. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuscis striatis.*

*Degeer inf.* 4. p. 154. n. 17.

*Pontopp. atl. dan. t.* 16.

*Habitat in Europa boreali.*

fuscicollis. 14. *El. niger*, thorace posterius rubro nitido. *Fn. suec.* 724. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 270. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 173. n. 37.

*Fn. suec.* 576. *Elater niger*, thorace rubro.

*Scop. ent. carn.* 290. *Elater gramineus.*

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 132. n. 5.

*Degeer inf.* 4. p. 153. n. 16.

*Raj. inf.* p. 92. n. 8.

*Schaeff. ic. t.* 31. f. 3.

*Habitat in Europæ graminosis.*

lineatus. 15. *El. niger*, elytris obscure lividis sulco sublineatis. *Habitat in Germania, mediæ magnitudinis, antennis subferrugineis.*

mesomelas. 16. *El. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris.* *Fn. suec.* 725.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 270. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 173. n. 33. *Habitat in Europa boreali, lineato paulo major, larva hexapus filiformis duriuscula, caudæ scuto corneo lateribus deniato, subtus tuberculo conico pediformi tubuloso, in ligno putrescente.*

thoracicus. 47. *El. niger*, thorace toto rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 270. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 173. n. 36. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 132. n. 5. *Elater niger*, thorace rufo. *Habitat prope Hemly Anglorum, ruficollis affinis.*

aterimus. 17. *El. thorace atro nitido, elytris striatis nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 267. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 172. n. 18. *Syst. nat.* XII. 2. p. 653. n. 17. *Fn. suec.* 726.\* *Uddm. diff.* 45. *Elater ater*, thorace opaco punctato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 136. n. 13. *Elater totus niger nitidus.* *Habitat in Europa boreali.*

castaneus. 18. *El. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore atro.* *Fn. suec.* 727.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 269. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 173. n. 27. *Degeer inf.* 4. p. 153. n. 15. *Elater flavo-pect. nicornis.* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 132. n. 4. *Raj. inf.* p. 192. n. 6.

*List. loqu.* 387.

*Schaeff. ic. t. II. f. 9. & t. 31. f. 4.*

*Habitat in Europæ campis.*

virescens. 48. El. thorace viridi : sulco medio , elytris flavis mucronatis : apice macula virescenti-nigra oblonga. *Schranck Schr. der berl. Naturf. Fr. 2. p. 317.*

*Scop. ent. carn. n. 286. Schranck inf. austr. n. 237.*

*Elater castaneus.*

*Poda mus. p. 41. n. 1. Elater pectinicornis.*

*Habitat in Austria & Carniola, viridi-æneus.*

livens. 19. El. niger, thorace glaberrimo rubro , elytris testaceis. *Fn. suec. 728.\* Fabr. sp. inf. I. p. 269. n. 24. mant. inf. I. p. 173. n. 28.*

*Schaeff. ic. t. II. f. 8.*

*Habitat in Europa boreali.*

ferrugineus. 20. El. thorace elytrisque ferrugineis , corpore thoracisque margine posteriore nigris. *Fn. suec. 729.\* Fabr. sp. inf. I. p. 266. n. 11. mant. inf. I. p. 172. n. 14. Geoffr. inf. par. I. p. 130. n. 1. t. 2. f. 4. Elater thorace elytrisque rubris.*

*Schaeff. ic. t. 19. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

hemato- 48. El. niger , thorace pubescente fulvo , elytris sanguineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 35. mant. inf. I. p. 173. n. 39.*

des.

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 9. Elater sanguineus.*

β) *Elater thorace nigro. Schaeff. ic. t. 2. f. 6.*

*Habitat in Germania & Calabria.*

sanguineus. 21. El. ater , elytris sanguineis. *Fn. suec. 731. Scop. ent. carn. 287. Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 36. mant. inf. I. p. 173. n. 40.*

*Geoffr. inf. p. r. I. p. 131. n. 2. Degeer inf. 4. p. 151. n. 13. Elater niger , elytris rubris.*

*Schaeff. el. t. 60. f. 2.*

*ic. t. 31. f. 7.*

*Bergstr. nomencl. t. 10. f. 10.*

*Habitat in Europæ graminosis , elytrorum summo apice nigro,*

palustris. 22. El. niger , elytris anterieus dimidiatis. *Fn. suec. 732. Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 37. mant. inf. I. p. 174. n. 41.*

*Degeer inf. 4. p. 152. n. 14.*

*Raj. inf. p. 78. n. 23.*

*Schaeff. ic. t. 77. f. 2.*

*Habitat in Europæ arvis.*

elongatus. 49. El. ater, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 42.*

*Habitat in Aultria, balteato proxime affinis.*

melanocephalus. 50. El. sanguineus, capite, thoracis linea dorsali elytrorumque apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 38. mant. inf. 1. p. 174. n. 43. Thunberg nov. inf. sp. 3.*  
*Habitat in Coromandel & ad Caput bonæ spei, balteato paulo minor, ceterum ejusdem staturæ.*

marginatus. 23. El. thorace subfusco, elytris testaceis: margine undique nigro. *Fn. succ. 733. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 30. mant. inf. 1. p. 173. n. 34.*  
*Act. nidros. 3. p. 16. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Europa boreali.*

sputator. 24. El. thorace fusco nitido, elytris testaceis, corpore nigro. *Fn. succ. 734. \* Scop. ent. carn. 285. Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 39. mant. inf. 1. p. 174. n. 44.*  
*Degeer inf. 4. p. 151. n. 11. Elater fuscus flavipes.*  
*Schaeff. ic. t. 19. f. 11.*  
*Habitat in Europa boreali.*

pilosus. 51. El. fuscus cinereo-subvillosus, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 45. Lesk. it. 1. p. 11. n. 1. t. A. f. 1.*  
*Habitat in Lusatix montibus, parvus.*

pallipes. 52. El. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 172. n. 46.*  
*Habitat Tranquebarix, parvus.*

succicus. 53. El. niger, elytris lineatis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 40. mant. inf. 1. p. 174. n. 47.*  
*Habitat in Succix graminosis.*

minutus. 34. El. thorace atro nitido, elytris nigris. *Fn. succ. 744. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 41. mant. inf. 1. p. 174. n. 48.*  
*Habitat in Europæ plantis, parvus, niger, imbricatus.*

limbatus. 54. El. thorace atro nitido, elytris testaceis limbo nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 42. mant. inf. 1. p. 174. n. 49. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 64.*  
*Habitat Kilonii & ad Caput bonæ spei.*



- advena. 55. El. ater, elytris striatis pedibusque obscure cinereis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 50.*  
*Habitat prope Bisertam Hispaniæ, parvus.*
- marginel-  
 lus. 56. El. thorace nigro : margine ferrugineo, elytris testaceis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 372. n. 43. mant. inf. 1. p. 174. n. 51.*  
*Habitat in Germania, limbato simillimus, at paulo major.*
- obscurus. 25. El. piceus thorace elytrisque obscure nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 269. n. 26. mant. inf. 1. p. 173. n. 30.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 655. n. 25. Fn. suec. 735. Elater thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis.*  
*Habitat frequens in Europæ borealis plantis.*
- flavipes. 57. El. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 27. mant. inf. 1. p. 173. n. 31.*  
*Habitat in insulis Americæ oppositis.*
- filiformis. 58. El. ex cinereo fuscus immaculatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 28. mant. inf. 1. p. 173. n. 32.*  
*Habitat in Italia, filiformis, obscuro duplo minor.*
- tristis. 26. El. thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriori lividis. *Fn. suec. 736. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 29. mant. inf. 1. p. 173. n. 33.*  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 1.*  
*Habitat in Europæ ligno putrescente.*
- fasciatus. 27. El. thorace nigro pallideque vario, elytris nigricantibus : fascia alba undulata. *Fn. suec. 737. \* Scop. ent. carn. 281. Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 17. mant. inf. 1. p. 173. n. 21.*  
*Habitat in Europæ hortis.*
- murinus. 28. El. thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebulosis, plantis rufis. *Fn. suec. 738. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 15. mant. inf. 1. p. 172. n. 19.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 135. n. 10. Elater niger, elytris villoso-murinis.*  
*Degeer inf. 4. p. 150. n. 10. Elater rufipes.*  
*Schaeff. ic. t. 4. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- tessellatus. 29. El. thorace obscure æneo, elytris æneis : maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fn. suec. 739. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 16. mant. inf. 1. p. 173. n. 20.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 135. n. 9.* Elater niger villosus-undatus.

*Degeer inf. 4. p. 148. n. 7.* Elater rufo-unguiculatus.

*Scop. ent. carn. 282.* Elater thoracicus.

*Gadd sat. 80.* Elater niger, pilis minimis flavo-æneis junctim intermixtis.

*Schaeff. ic. t. 4. f. 7.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. III. n. 7. t. 22. f. 5.*

*Habitat in Europæ hortis, scutello pallido.*

germanus. 30. El. thorace elytrisque atro-caeruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. suec. 730.\**

*Scop. ent. carn. 279. Schranck inf. austr. p. 183. n. 340?*  
Elater nitens.

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 8.* Elater latus.

*Habitat in Europa, an mera ænei varietas?*

æneus. 31. El. thorace elytrisque æneis, antennis nigris simplicibus. *Fn. suec. 740.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 18. mant. inf. 1. p. 173. n. 22.*

*Fn. suec. 578.* Elater viridi-æneus, pedibus fulvis.

*Degeer inf. 4. p. 149. n. 8.* Elater æneus rufipes.

*Ad. Nidros. 3. t. 4. f. 6.*

β) Elater fuscus latior. *Mus. Lesk. p. 31. n. 681.*  
*Habitat in Europæ nemoribus.*

pectinicornis. 32. El. thorace elytrisque æneis, antennis maris pectinatis. *Fn. suec. 741. Fabr. sp. inf. 1. p. 268. n. 19. mant. inf. 1. p. 173. n. 23. Scop. ent. carn. 278.*

*Fn. suec. 575. Geoffr. inf. par. 1. p. 133. n. 7.* Elater fusco-æneus.

*Degeer inf. 4. p. 145. n. 2. t. 5. f. 3.* Elater æneo-pectinicornis.

*Raj. inf. p. 92. n. 7.*

*List. angl. p. 387. n. 19.*

*Poda inf. t. 1. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 36.*

*Schaeff. el. t. 11. f. 1. & t. 60. f. 3. ic. t. 2. f. 4.*

*Bergstr. nor. encl. 1. t. 13. f. 11.*

*Habitat in Europæ nemoribus.*

cupreus. 39. El. cupreus, elytris dimidiato-flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 268. n. 20. mant. inf. 1. p. 173. n. 24.*  
*Schaeff. ic. 1. t. 38. f. 2.*

*Habitat in Anglia, antennis nigris pedinatis, variis simplicibus.*

- niger. 33. El. thorace lævi, elytris pedibus corporeque nigris.  
*Fn. suec. 743. \**  
*Fn. suec. 577. Elater totus nigro-fuscus.*  
*List. mut. t. 17. f. 14.*  
*Raj. inf. p. 92. n. 1. 2. 3.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 134. n. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 174. f. 4.*  
 β) Elater nigricans. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 33.*  
*Habitat in Europa, β) dimidio minor.*
- niditulus. 60. El. ater, elytris striatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 52.*  
*Habitat in Cayenna, pulchello triplo minor.*
- pulchellus. 35. El. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Fn. suec. 745. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 44. mant. inf. 1. p. 175. n. 53.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 112. n. 22. t. 27. f. 7. a.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- sextgutatus. 61. El. lævis ater, elytris punctis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 65. f. 75. Fabr. mant. inf. 1. p. 175. n. 54.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, minimus, nitidus.*
- tetrastichon. 36. El. niger luteo maculatus, elytris maculis confluentibus, abdomine quadrisariam punctato.  
*Habitat in Africa, mediæ magnitudinis.*
- dermestoides. 38. El. subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 175. n. 56.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 656. n. 38. Elater subpubescens subfuscus, antennis subclavatis.*  
*Habitat in Suecia, dermestis facie, parvus.*
- notatus. 62. El. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, apice nigris: maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 45. mant. inf. 1. p. 175. n. 57.*  
*Habitat in Coromandel, parvus, statura pulchelli.*
- festivus. 63. El. thorace ferrugineo, elytris atris: fasciis duabus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 46. mant. inf. 1. p. 175. n. 58. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 64. f. 74.*  
*Habitat in Africa, magnitudine balicati.*

64. *El. testaceus*, linea thoracis elytrorumque posterius  
ramosa nigra. *Thunb. nov. inf. spec.* 3. p. 64.  
*Habitat in Zeylona, melanocephalo duplo minor, tenuis-*  
*sime pubescens.*
65. *El. viridis*, antennis clavatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3.  
p. 65.  
*Habitat in India, pedinicorni major, glaberrimus, ni-*  
*tens, an hujus generis?*
66. *El. niger*, elytris testaceis posterius fuscescentibus,  
antennis pedibusque castaneis. *Schall. Abh. der hall.*  
*Naturf. Ges.* 1. p. 303.  
*Schaeff. ic.* t. 199. f. 8.  
*Habitat - - - magnitudine castanei, facie balteati.*
67. *El. depressus*, elytris viridi-æneis: macula flava,  
pectore abdomineque flavis. *Schall. Abh. der hall.*  
*Naturf. Ges.* 1. p. 304. t. 1. f. 5.  
*Habitat in America buprestis facie.*
68. *El. niger*, thorace convexo punctato: margine fulvo,  
medio sinuato, elytris atris punctato-striatis. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 110. n. 2. t. 27. f. 3.  
*Habitat in America, phosphoreo minor, & angustior.*
69. *El. ater atro-farinosus*: punctis minutissimis albis  
interjectis, antennis ferratis. *Schranck inf. austr.* p.  
184. n. 343.  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr.* 4. t. 7. f. 1. *Elater*  
*punctatus.*  
*Habitat in Germania.*
70. *El. niger flavo undulatus pubescenti-nitens.* *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 111. n. 8.  
*Schaeff. ic.* t. 4. f. 7.  
*Habitat in Germania.*
71. *El. chalybeus*, antennis nigris simplicibus, pedibus ex  
atro fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 111. n. 10.  
*Habitat Berolini, æneo proxime affinis.*
72. *El. ater*, elytris sanguineis: margine interiori macula  
magna ovata atra communi. *Schranck Beytr. zur Naturg.*  
p. 69. §. 16. t. 3. f. 15. *inf. austr.* p. 184. n. 341. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 112. n. 24. t. 27. f. 9.  
*Habitat in Germania, an mera sanguinei varietas?*

- purpureus. 73. El. niger, thorace atro, vellere raro purpureo, elytris purpureis: lineis duabus elevatis. *Schrank inf. austr. p. 187. n. 350.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 113. n. 25. t. 27. f. 10.*  
*Habitat in Austria, sanguineo affinis, et magis depressus.*
- quercinus. 74. El. fuscus, capite thoraceque granulatis: vellis flavis undulatis, elytris fascia flavo-villosa. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 113. n. 26. t. 27. f. 11.*  
*Habitat in Ungaria & Germania, in quercu.*
- erythro- 75. El. niger, elytris flavicanti-villosis, punctato-striatis, pedibus antennarumque articulis margine spadiceis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 113. n. 28. t. 27. f. 12.*  
*Habitat Berolini.*
- hirtus. 76. El. nitenti-niger pubescens, thorace punctato, elytris striatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 30.*  
*Habitat Berolini, magnitudine erythropodis, at paulo latior.*
- vulgaris. 77. El. niger, elytris fuscis punctato-striatis: sutura nigra, pedibus pallidis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 32.*  
*Habitat Berolini.*
- griseus. 78. El. obscure griseus, thorace convexo, elytris punctato-striatis, subtus nigris, antennis pedibusque fuscis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 34.*  
*Habitat Berolini.*
- cinereus. 79. El. niger pubescenti-canus, thorace convexo, tarsis ferrugineis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 35.*  
*Habitat Berolini, magnitudine & statura grisei.*
- equiseti. 80. El. niger, thorace convexo, elytris striatis, pedibus flavescens. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 114. n. 36.*  
*Habitat Berolini, 3 lineas longus, statura cinerei.*
- pulveru- 81. El. niger virescenti-aureo irroratus, elytris striatis, lentus. tibiis intus crispo-pilosis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 172. n. 38. t. 48. f. 1.*  
*Habitat in America, inter maximos hujus generis.*
- socialis. 82. El. fuscus, antennis elytrorumque marginibus ferrugineis. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 9.*  
*Habitat in Lusitania, magnitudine pectinicornis.*

- ferraticor- 83. *El. fuscus*, abdomine supra pedibusque fulvis. *Scop.*  
nis. *ent. carn. n. 280.*  
*Habitat in Carniola.*
- monta- 84. *El. villosulus niger nitens*, antennis basi tibiisque fulvis.  
nus. *Scop. ent. carn. n. 283.*  
*Fuesli Verz. schw. Inf. p. 17. n. 334.*  
*Habitat in Carniolæ & Helvetiæ montibus.*
- degener. 85. *El. niger aureo punctatus variegatus*, thorace posterius  
dentato. *Scop. ent. carn. n. 292.*  
*Habitat in Carniola.*
- subfuscus. 86. *El. niger*, elytris fuscis, abdomine rubro. *Müll. 1001.*  
*dan. prodr. p. 59. n. 538.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 169.*  
*Habitat in Dania.*
- seelandi- 87. *El. ex purpureo æneus griseo-villosus*, elytris striato-  
cus. punctatis nebulosis. *Müll. 1001. dan. prodr. p. 61. n. 550.*  
*Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 170.*  
*Habitat in Seelandia Daniæ.*
- sexmacu- 88. *El. niger griseo-villosus*, thoracis margine elytrisque tes-  
latus. taceis: maculis sex subfuscis glabris. *Müll. Fn. Fridrichsd.*  
*p. 17. n. 171. 1001. dan. prodr. p. 60. n. 544.*  
*Habitat in Dania.*
- obtusus. 89. *El. corpore obtuso subtus nigro*, thorace nigro, elytris  
fuscis griseo-villosis, antennis rufis. *Degeer inf. 4. p.*  
*147. n. 5. t. 5. f. 19.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 172. 1001. dan. prodr.*  
*p. 60. n. 540. Elater badius.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- pullus. 90. *El. niger nitidus pubescens*, elytris punctatis, pedibus  
brunneis. *Müll. 1001. dan. prodr. p. 59. n. 537.*  
*Habitat in Dania.*
- chryso- 91. *El. niger*, thorace rubro sulcato, elytris tarsisque flavis.  
melinus. *Müll. 1001. dan. prodr. p. 60. n. 539.*  
*Habitat in Dania.*
- ingukris 92. *El. supra ater, opacus*, subtus niger. *Müll. 1001. dan.*  
*prodr. p. 60. n. 545.*  
*Habitat in Dania.*



- Mülleri. 93. *El. rufus pubescens*, pedibus luteis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 61. n. 551.  
*Habitat in Dania.*
- tubercula- 94. *El. niger opacius*, thorace bituberculato, elytris lævis-  
tus. sime striatis, punctis ferrugineis. *Pontopp. hist. nat. Dan.* p. 208. n. 13. t. 16.  
*Habitat in Dania, magnitudine pedinicornis.*
- gracilis. 95. *El. testaceus*, capite thoraceque linea longitudinali,  
macula laterali atra, elytris lævissimis, margine atro.  
*Gron. mus.* 1. p. 153. n. 478.  
*Habitat in America.*
- guineen- 96. *El. viridi-æneus*, thorace subpubescente, antennis  
fis. nigris, elytris striatis. *Gron. mus.* 2. p. 153. n. 476.  
*Habitat in Guinea.*
- simbria- 97. *El. niger*, thoracis margine rubro, elytris ad suturam  
tus. lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis. *Lep- chin it.* 1. p. 311. t. 16. f. 12.  
*Habitat in deserto Sibiriae Uralensi.*
- auratus. 98. *El. viridi-aureus*, pedibus nigris. *Drury inf.* 2. p. 63.  
t. 35. f. 3.  
*Habitat in Sina.*
- histrio. 99. *El. niger*, elytris flavis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 131. n. 3. *Elater nigro-flavus.*  
*Habitat in Gallia.*
- vittatus. 100. *El. niger*, elytris fuscis: fascia longitudinali fulva.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 135. n. 11. *Elater bicolor.*  
*Rav. inf.* p. 78. n. 13.  
*Habitat in Gallia.*
- fuscatus. 101. *El. niger*, elytris fuscis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 136. n. 12. *Elater bicolor.*  
*Habitat in Gallia.*
- discolor. 102. *El. niger*, pedibus rufis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 136. n. 14. *Elater rufipes.*  
*Habitat in Gallia.*
- mela- 103. *El. rufus*, oculis nigris. *Degeer inf.* 4. p. 144. n. 1.  
nophthal- t. 5. f. 18.  
mos. *Habitat in Suecia, pollicem longus.*

- major. 104. El. nigro-fuscus nitidus, pedibus fusco-castaneis, abdomine supra rubente. *Degeer inf. 4. p. 146. n. 3.*  
*Habitat in Europa, magnus.*
- minor. 105. El. elongatus capite thoraceque nigris, elytris antennisque pedibusque fuscis. *Degeer inf. 4. p. 147. n. 4.*  
*Habitat in Europa, inter minores.*
- inæqualis. 106. El. niger : maculis villosis griseis, elytris scabris, thorace cavitatibus imprellis. *Degeer inf. 4. p. 148. n. 6.*  
*Habitat in Europæ arboribus, magnus.*
- undatus. 107. El. griseo-marinus villosus, elytris fasciis tribus undulatis, transversis nigris. *Degeer inf. 4. p. 155. n. 18. t. 5. f. 26.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- maculosus. 108. El. capite nigro, thorace rufo : maculis tribus oblongis nigris, elytris fuscescentibus. *Degeer inf. 4. p. 158. n. 19.*  
*Habitat in Europa, minor.*
- nitidus. 109. El. nigro-viridi-æneus nitidus, pedibus nigris. *Degeer inf. 4. p. 159. n. 21.*  
*Habitat in Europa, pusillus.*
- piceus. 110. El. totus ater nitidus, elytris lævissimis. *Degeer inf. 4. p. 162. n. 4. t. 18. f. 3.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*
- lividus. 111. El. pallide fusco-rufescens antennis rufis, pedibus flavo-testaceis. *Degeer inf. 4. p. 162. n. 5. t. 18. f. 4.*  
*Habitat in Pennsylvania, dimidium pollicem longus.*
- ochropus. 112. El. nigro-fuscus, pedibus antennisque flavo-testaceis. *Degeer inf. 4. p. 163. n. 6. t. 18. f. 5.*  
*Habitat Surinami, 4½ lineas longus.*
- maculatus. 113. El. obscure testaceus, thorace anterieus nigro, elytris maculis binis irregularibus nigris. *Degeer inf. 4. p. 163. n. 7. t. 18. f. 6.*  
*Habitat Surinami, 3 modo lineas longus.*
- segetis. 114. El. niger, antennis tarsisque fuscis, elytris lineis longitudinalibus nigris fuscisque. *Bierkand act. Holm. 1779. 4. n. 4. p. 254. t. 10. f. 1-3.*  
*Habitat in Sueciæ segetis radicibus, agros larva devastante, præsertim siccos, tandem subeunte metamorphosin.*  
 H h h h h

- dubius. 115. *El. viridi-æneus*, thorace pedibusque nigris. *Mayer Abh. boehm. Ges. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiæ pratis, granitorixæ magnitudine, an propria species?*
- punctatus. 116. *El. elongatus fuscus*, thorace punctato, elytris crenato-striatis, ore pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 671.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 117. *El. niger*, thorace linea longitudinali, elytris basi fulcatis apicem versus complanatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 673.*  
*Habitat in Europa.*
- pubescens. 118. *El. piceus pubescens*, elytris striatis, plantis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 674.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 119. *El. fuscus cinereo-villosus*, elytris lævissime striatis, antennis pedibusque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 31. n. 682.*  
*Habitat in Europa.*
- crenatus. 120. *El. niger*, elytris crenato-striatis punctatisque, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 683.*  
*Habitat in Europa.*
- ambiguus. 121. *El. niger*, elytris rufo-testaceis striatis, plantis testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 688.*  
*Habitat - - -*
- lineolatus. 122. *El. niger*, thoracis linea longitudinali, elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 689.*  
*Habitat in Europa.*
- longicornis. 123. *El. niger*, elytris obsolete striatis, antennis longis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 690.*  
*Habitat in Europa.*
- concolor. 124. *El. fuscus*, thorace punctato, elytris levissime striatis, antennis pedibusque rufo-fuscis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 691.*  
*Habitat in Europa.*
- variabilis. 125. *El. fuscus flavo-villosus*, pedibus rufis, elytris levissime striatis: maculis fuscis incerta directione lucis inconspicuis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 693.*  
*Habitat in Europa.*

- tubigi- 126. El. ferrugineus, thorace fusco punctato, elytris crenato-  
neus. striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 694.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 127. El. fusco-ferrugineus griseo-villosus, thorace pectoreque  
fuscis, elytris levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 695.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 128. El. ferrugineus, capite thoraceque fusco, hujus margini-  
bus externis, elytris punctato-striatis, antennis pedi-  
busque testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 696.*  
*Habitat in Europa.*
- hamop- 129. El. niger, elytris sanguineis: suturae macula communi  
terus. oblonga picea. *Mus. Lesk. p. 32. n. 697.*  
*Habitat in Europa.*
- crassipes. 130. El. niger, elytris levissime striatis, femoribus crassis.  
*Mus. Lesk. p. 32. n. 699.*  
*Habitat in Europa.*
- acupunc- 131. El. testaceus, thoracis dorso fuscescente, elytris striatis:  
tatus. striis punctis distinctis impressis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 701.*
- gibbus. 132. El. fuscus griseo-villosus, elytris levissime striatis thora-  
ceque gibbis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis.  
*Mus. Lesk. p. 32. n. 698.*  
*Habitat in Europa.*
- pubes. 133. El. ater pubescens, elytris striatis. *Mus. [Lesk. p. 32. n. 702. 703.]*  
*Habitat in Europa.*
- cineras- 134. El. testaceus cinereo-villosus, thorace fuscescente, pe-  
dens. dibus rufis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 704.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 135. El. fusco-ferrugineus, capite thoraceque fuscis, elytris  
striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 705.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrisul- 136. El. niger, elytris obsolete striatis, basi fulcis quatuor  
eus. impressis, antennis longis tibiis plantisque anticis fusco-  
ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 706.*  
*Habitat in Europa.*

- strigofus. 137. El. testaceo-fuscus, elytris striatis, pedibus testaceis.  
*Mus. Lesk. p. 32. n. 708.*  
 β) Elater elytris fuscescentibus versus apicem, elytris totis  
 testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 707.*  
*Habitat in Europa.*
- lunulatus. 138. El. fuscus, thoracis margine ferrugineo, elytris testa-  
 ceis: sutura fusca. *Mus. Lesk. p. 33. n. 711.*  
*Habitat in Europa.*
- dentatus. 139. El. thorace atro: macula utrinque dentibusque rubris,  
 elytris testaceis: marginibus externis nigris. *Mus.*  
*Lesk. p. 33. n. 713.*  
*Habitat in Europa.*
- capuci- 140. El. niger, elytris pedibus anticis tibiisque testaceis.  
 nus. *Mus. Lesk. p. 33. n. 718.*  
 β) Elater elytris apice fuscescentibus pedibus testaceis. *Mus.*  
*Lesk. p. 33. n. 714.*  
*Habitat in Europa.*
- gibbosus. 141. El. testaceus, thorace gibbofo obscuro, elytris striatis.  
*Mus. Lesk. p. 33. n. 720.*  
*Habitat in Europa.*
- foricinus. 142. El. murinus, thorace gibbo, elytris testaceis, antennarum  
 pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 721.*  
*Habitat in Europa.*
- rufipes. 143. El. niger, elytris striatis, tibiis rufis. *Mus. Lesk. p.*  
*33. n. 723.*  
 β) Elater elytris tibiisque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 33.*  
*n. 722.*  
*Habitat in Europa.*
- funereus. 144. El. testaceus, elytris striatis, capite fusco. *Mus.*  
*Lesk. p. 33. n. 724.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybe- 145. El. nigro-æneus nitidus, femorum anticorum basi  
 us. tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 725.*  
*Habitat in Europa.*
- obscurus. 146. El. ferrugineus, capite thoraceque fuscis, hoc posterius,  
 elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 726.*  
*Habitat in Europa.*

fuliginosus. 147. El. piceus subpubescens, antennis, pedibus elytrisque testaceis: his margine fuscis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 728.*  
*Habitat in Europa.*

pufillus. 148. El. brunneus, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris levissime striatis pubescentibus. *Mus. Lesk. p. 33. n. 730.*  
*Habitat in Europa, statura dermestoidis, magnitudine pediculi.*

Limbellus. 149. El. thorace sordide flavo: disco fusco, elytris striatis nigro-fuscis: margine omni flavescente. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 23.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, inter minores.*

## 210. CICINDELA. Antennæ setaceæ.

*Palpi sex filiformes: posteriores pilosi.*

*Mandibula prominens, multidentata.*

*Oculi prominuli.*

*Thorax rotundato-marginatus.*

\* *labio. tridentato.*

longicollis. 15. C. cyanea, thorace elongato cylindrico, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. I. p. 185. n. 1.*  
*Habitat in Siam, magna, elongata.*

grossa. 16. C. nigra, elytris acuminatis: maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 282. n. 1. mant. inf. I. p. 185. n. 2.*  
*Habitat in Coromandel, maxima.*

cyanea. 17. C. cyanea nitida, ore testaceo. *Fabr. mant. inf. I. p. 285. n. 3.*  
*Habitat in India, subius nitidior, antennis fuscis.*

bicolor. 18. C. viridis nitida, elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 283. n. 2. mant. inf. I. p. 185. n. 4.*  
*Habitat in Italia, magnitudine & statura campestris.*



- campestris. 1. *C. viridis*, elytris punctis quinque albis. *Fn. suec.* 746.\*  
*Scop. ent. carn.* 181. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 283. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 185. n. 5.  
*Degeer inf.* 4. p. 113. n. 1. t. 4. f. 1. *Cicindela viridis*  
*nitida.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 153. n. 27. *Buprestis inauratus*  
*supra viridis, &c.*  
*Mouss. inf.* 145. f. *infim.* *Cantharis quarta.*  
*Jorst. inf. t.* 15. *Cantharis Mouffeti minor quarta.*  
*Lf. log.* 385. *mut. t.* 17. f. 12. *Scarabæus viridis, &c.*  
*Sulz. hist. inf. t.* 5. f. 37.  
*Schæff. ic. t.* 34. f. 8. 9. & t. 228. f. 3.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 15. n. 8-11. t. 2. f. 8-11.  
*Habuat in Europæ campis arenosis.*
- hybrida. 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis.  
*Fn. suec.* 747.\* *Scop. ent. carn.* 183. *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 283. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 185. n. 6.  
*Degeer inf.* 4. p. 115. n. 3. t. 4. f. 8. *Cicindela maculata,*  
*Schæff. elem. t.* 43.  
*icon. t.* 35. f. 10.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 26. t. 4. f. 5.  
*Habitat in Europæ sabulosis.*
- sapensis. 3. *C. subænea*, elytris albis : linea fusca triramosa. *Muf.*  
*Lud. Ulr.* 84.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 285. n. 10. *mant.*  
*inf.* 1. p. 186. n. 14.  
*Degeer inf.* 7. t. 47. f. 3.  
*Vact. colcopt. t.* 40. f. 5.  
*Sulz. hist. inf. t.* 6. f. 11.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 27. f. 14?  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in Calabria.*
- germanica. 4. *C. cuprea*, elytris viridibus puncto lunulaque apicum albis.  
*Scop. ent. carn.* 182. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 285. n. 11.  
*mant. inf.* 1. p. 186. n. 15.  
*Schreb. inf.* 10. n. 5. *Cicindela obscurior viridis*, elytris  
punctis quatuor lineolaque albis.

*Cicindela* in locis petrosis, aridis, præsertim arenosis, habitant, insectarium  
gloriosa, larvarum quoque, etiam hirsutarum tigrides : larva mollis, alba,  
longa, hexapus, in soluminibus cylindricis sub terra latet, samelia prodians  
insulis prætereuntibus inhians, mandibula forcipata arripiens, et in foream  
ingressus, in qua etiam declaratur.

- Geoffr. inf. par. 1. p. 155. n. 29. Buprestis inauratus*  
*supra fusco-viridis, coleoptis punctis sex albis.*  
*Poda inf. 42. n. 3.*  
*Gron. zooph. 167.*  
*Habitat in Germaniæ arenosis, campestri simillima, sed*  
*triplo minor, colore viridi, nigro & cæruleo variata.*
- tubercu- 19. *C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco viridique*  
 lata, *variis: margine tridentato albo. Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*285. n. 12. mant. inf. 1. p. 186. n. 16.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- unipunc- 20. *C. subpurpurascens, labio elytrisque puncto albo.*  
 tata, *Fabr. sp. inf. 1. p. 285. n. 13. mant. inf. 1. p. 186.*  
*n. 17.*  
*Habitat in America.*
- sexpunc- 21. *C. viridi-ænea, elytrorum disco obscuriore: punctis*  
 tata, *tribus albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 285. n. 14. mant. inf.*  
*1. p. 186. n. 18.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. t. 46. f. 1.*  
*Habitat ad litus Malabaricum.*
- Quadrili- 22. *viridi-ænea, elytris obscuris: margine lineaque media,*  
 neata, *albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 285. n. 15. mant. inf. 1. p.*  
*186. n. 19.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 27. f. 15.*  
*Habitat in India, magnitudine sexpunctata.*
- biramosa, 23. *C. obscure ænea, elytrorum margine biramoso albo.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 286. n. 16. mant. inf. 1. p. 186.*  
*n. 20.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 26. f. 40. Cicindela (tridentata)*  
*purpurascenti-ænea, elytris linea marginali tridentata.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 115. n. 7. t. 27. f. 16.*  
*Habitat in India.*
- sextiguttata. 24. *C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus*  
*albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 286. n. 17. mant. inf. 1. p.*  
*186. n. 21.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 27. f. 17.*  
*Habitat in Virginia, labio superiori flavo.*
- Catena. 25. *C. viridi-ænea, elytris albidis: punctis sex viridibus*  
*concatenatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 286. n. 18. mant.*  
*inf. 1. p. 187. n. 22.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. t. 1. f. 41-43. Cicindela viridi-*  
*ænea, elytris linea flava triramosa.*  
*Habitat in India.*

- marginata. 26. *C. viridis*, elytris margine fascia undata punctisque duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 23.  
*Habitat in Virginia.*
- octogutta- 27. *C. obscura*, elytris punctis quatuor disci lunulisque  
ta. duabus marginalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 187. n. 24.  
*Habitat in America, parva.*
- trifasciata. 28. *C. obscura*, elytris strigis tribus albis: secunda flexuosa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 25.  
*Habitat in America, parva, subtus ænea nitida.*
- virginata. 5. *C. nitida*, ore antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 27.  
*Habitat in Virginia, carolinæ similis, violacea.*
- carolina. 6. *C. viridis nitida*, elytrorum apicibus, ore, antennarum pedibusque flavis. *Amæn. ac.* 6. p. 395. n. 23. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 26.  
*Gron. zooph.* 576.\*  
*Degeer inf.* 4. p. 120. n. 2. t. 17. f. 24.  
*Habitat in Carolina.*
- cayennensis. 29. *C. supra fusca*, subtus cyanea, ano tibiisque posterioribus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 187. n. 28.  
*Habitat in Cayenna, magnitudine carolinæ.*
- æquinoccialis. 7. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris latis. *Amæn. ac.* 6. p. 395. n. 6. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 287. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 29.  
*Habitat in Surinamo.*
- silvatica. 8. *C. nigra*, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Fn. succ.* 748.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 185. n. 7.  
*Fn. succ.* 1. n. 549. *Cicindela atra*, coleoptris maculis sex fasciisque albis.  
*Degeer inf.* 4. p. 114. t. 4. f. 7. *Cicindela supra nigra*, subtus viridis nitida, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 155. n. 28. *Buprestis inauratus* supra fusco-viridis, &c.  
*Petiv. gazoph.* t. 50. f. 5.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 27. f. 13.  
*Habitat in Europæ pinetis.*

- littoralis.* 30. obscure ænea, elytris nigricantibus: punctis sex albidis; baseos lunato medio transverso. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 185. n. 8.  
*Habitat ad Barbariæ littora, statura silvaticæ.*
- tristis.* 31. *C. nigra*, elytris macula media flava. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 186. n. 9.  
*Habitat - - -*
- interrupta.* 32. *C. elytris fuscis*: puncto baseos fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 186. n. 10.  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*
- lunulata.* 33. *C. nigra*, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis: anteriore transversa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 186. n. 11.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine & statura hybridæ.*
- lurida.* 34. *C. obscura*, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis: intermedia flexuosa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 186. n. 12.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- flexuosa.* 35. *C. obscura*, elytris punctis quatuor lunulisque tribus albis: intermedia flexuosa. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 186. n. 13.  
*Habitat ad Hispaniæ littora, luridæ proximè affinis.*
- maura.* 9. *C. nigra*, elytris punctis sex albis: tertio & quarto parallelo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 287. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 30.  
*Habitat in Oriente, statura campestris, fronte alba.*
- japonica.* 36. *C. violacea*, elytris basi, apice fasciæque cupreis: punctis duobus fasciæque luteis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 25. f. 39.  
*Habitat in Japonia, magnitudine silvaticæ, subius e cyaneo & violaceo nitens.*
- sexnotata.* 37. *C. capite virescente*, thorace rubro, elytris testaceis: maculis sex nigris. *Lepeck. ii.* 2. p. 203. t. 10. f. 12.  
*Habitat in Sibiria juveniorum arena.*
- austriaca.* 38. *C. pectoris* abdominisque basi subtris rubromargine aureo tenuissimo: punctis albis. *Lepeck. Beyr. zur Naturg.* p. 69. §. 17.

- litterata. 39. *C. metallica albo-villosa*, elytris cupreis : punctis caeruleis striisque argenteis litteras æquantibus. *Sulz. Hist. inf. p. 55. t. 6. f. 12.*  
*Fuesli Verz. schw. Inf. p. 17. n. 338.* Cicindela arenaria.  
*Habitat in Helvetiæ arena.*
- danica. 40. *C. nigra supra fusco-ænea*, elytris striis lateralibus remotis : dorso speculifero. *Müll. zool. dan. prodr. p. 80. n. 865.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. n. 178.* Cicindela ornithogallica, dorso speculifero.  
*Habitat in Dania.*
- punctata. 41. *C. nigra*, supra subænea, elytris striatis : punctis impressis quatuor, pedibus flavo-fuscis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 80. n. 867.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. n. 179.*  
*Habitat in Dania.*
- chinensis. 42. *C. subtus cæruleo-violacea nitida*, elytris viridibus : maculis nigris punctisque quatuor albis. *Degeer Hist. nat. 4. p. 119. n. 1. t. 17. f. 23.*  
*Habitat in Sina.*
- cærulea. 43. *C. cærulea nitens*, ore albo. *Pall. it. 2. app. n. 64.*  
*Habitat in desertis arenosis australibus ad Irtim. Sibiria positis, fugacissima.*
- gracilis. 44. *C. nigro-ænea*, elytris punctis duobus marginalibus albis : disco posterius rubente. *Pall. it. 2. app. n. 65.*  
*Habitat in Sibiria arena ad Sohulbam sita, congenerebus gracilior, pedibus longissimis tenuissimis.*
- ferruginea. 49. *C. ferruginea*, pedibus elytris, capite thoraceque testaceis, hoc utroque posterius, elytrorum fascia undata futuraque viridibus. *Mus. Lesk. p. 34. n. 762.*  
*Habitat in Europæ aquis, coccinella statura, capite posterius bilobo, labio albo, maxillis nigris, thorace anterieus exciso, scutello nullo, elythro utroque striis punctatis 15, basi maculis 3 margine antico contiguis.*  
*\*\* labio rotundato acuminato integro, Elaphri Fabricii*
- atrata. 45. *C. tota atra opaca.* *Pall. it. 1. app. n. 42.*  
*Habitat in Sibiria lacu Inderienti, magnitudine & forma germanica; an ex hac tribu?*

lateola.

46. *C. elytris ex fusco viridi-aureis* : margine laterali undique late lacteo. *Pall. it. 2. app. n. 41.*  
*Habitat in lacu Sibiriae Inderienfi; an huic tribui accensenda?*

tiparia.

10. *C. viridi-ænea*, elytris punctis latis excavatis. *Fn. suec. 741.\* It. oel. 38. 121. Fabr. sp. inf. 1. p. 287. n. 1. mant. inf. 1. 187. u. 1.*  
*Degeer inf. 4. p. 117. n. 4. t. 4. f. 9.* *Cicindela viridi-ænea* maculis rotundis excavatis griseo-viridibus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 156. n. 30.* *Buprestis viridi-æneus, &c. List. loqu. 385.* *Scarabæus parvus inauratus. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 13.*  
*Schaeff. ic. t. 86. f. 4.*  
*Habitat in Europæ humentibus, colore sæpius varians.*

flavipes.

11. *C. obscure ænea*, elytris subnebulosis, pedibus luteis. *Fn. suec. 750.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 287. n. 2. mant. inf. 1. p. 287. n. 2.*  
*Degeer inf. 4. p. 119. n. 6.* *Cicindela flavipes.*  
*Habitat in Europæ borealis ripis, elytris punctatis.*

rupestris.

12. *C. nigra*, coleoptris punctis duobus fasciæque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. p. 287. n. 3. mant. inf. 1. p. 188. n. 3.*  
*Habitat in Sueciæ rupibus, frequentius sub lichenibus, pediculi majoris magnitudine.*

quadrimaculata.

13. *C. nigra*, elytris fuscis: maculis duabus pallidis, tibiis rufis. *Fn. suec. 751.\**  
*Habitat in Europæ.*

aquatica.

14. *C. ænea nitida*, capite striato. *Fn. suec. 752.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 4. mant. inf. 1. p. 188. n. 4.*  
*Schreb. inf. 6.* *Cicindela pusilla.*  
*Geoffr. inf. par. 1. 157. n. 31.* *Buprestis fusco-æneus. List. mut. t. 31. f. 13.*  
*Habitat ad Europæ aquas, frequens.*

semipunctata.

47. *C. ænea nitida*, elytris punctatis, dorso glaberrimo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 5. mant. inf. 1. p. 188. n. 5.*  
*Degeer inf. 4. p. 118. n. 5.* *Cicindela striata.*  
*Habitat Halæ Saxonum & Berolini.*

biguttata.

48. *C. ænea*, elytris nitidis apice flavescens. *Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 6. mant. inf. 1. p. 188. n. 6.*  
*Habitat ad Norwegiæ aquas.*



211. BUPRESTIS. *Antennæ* filiformes, serratæ,  
longitudine thoracis.

*Palpi* quatuor filiformes: articulo ultimo obtuso truncato.

*Caput* dimidium intra thoracem retractum.

unidentata. 31. *B. elytris unidentatis æneis*: margine aureo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 273. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 175. n. 1.  
*Habitat* - - -

bicolor. 32. *B. elytris acuminatis viridi-æneis*: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 273. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 175. n. 2.  
*Habitat in America meridionali.*

gigantea. 1. *B. elytris bidentatis rugosis*, thorace lævi, corpore inaurato. *Mus. Lud. Ulr.* 85.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 273. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 176. n. 3.  
*Degeer inf.* 4. p. 134. n. 1. *Buprestis gigantea.*  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 108. n. 84. *Mordella gigantea.*  
*Sloan. jam.* 2. p. 210. t. 236. f. 1. 2. *Cantharis maxima*,  
*elytris cuprei coloris sulcatis.*  
*Grew mus.* 165. t. 13. *Cerambyx Indiæ orientalis maximus.*  
*Petiv. gaz.* t. 147. t. 16. 17.  
*Merian. surin.* t. 50. f. infim.  
*Seb. mus.* 3. t. 84. f. 12.  
*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 38.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 1.  
*Habitat in America & Asia.*

vittata. 33. *B. elytris bidentatis punctatis*: lineis elevatis quatuor, viridi-ænea: vitta lata aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 274. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 176. n. 4.  
*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 14.  
*Habitat in India.*

fastuosa. 34. *B. elytris truncatis bidentatis punctato-striatis viridibus*, dorso aureo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 274. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 176. n. 5.  
*Habitat in America septentrionali.*

- punctatiffi-  
ma. 35. *B. elytris bidentatis cupreis: punctis violaceis numero-*  
*fis. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 6. mant. inf. 1. p. 176. n. 6.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*
- berolinen-  
sis. 36. *B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano triden-*  
*tato. Fabr. mant. inf. 1. p. 176. n. 7.*  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 5. & apud*  
*Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 5.*  
*Pall. ic. inf. ruff. 2. t. D. f. 10.*  
*Habitat in Germania, statura & magnitudine obscuræ.*
- coruscæ. 37. *B. ænea nitidissima, elytris bidentatis apice abdomine-*  
*que aureis. Fabr. mant. inf. 1. p. 176. n. 8.*  
*Habitat in Jamaica, vittata minor, antennis cyaneis.*
- decora. 38. *B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta cærulef-*  
*cente marginibusque aureis. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n.*  
*7. mant. inf. 1. p. 176. n. 9.*  
*Habitat in America.*
- lurida. 39. *B. obscura, elytris bidentatis, ano tridentato. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 274. n. 8. mant. inf. 1. p. 176. n. 10.*  
*Habitat in America.*
- obscura. 40. *B. obscure ænea: punctis elevatis obscurioribus, elytris*  
*bidentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 9. mant. inf.*  
*1. p. 176. n. 11.*  
*Habitat in America boreali; parva, subtus nitida, cuprea.*
- punctata. 41. *B. ænea, capite abdomineque testaceo-maculatis, elytris*  
*subbidentatis striatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 176. n. 12.*  
*Habitat in Barbaria, mediæ magnitudinis.*
- fasciata. 42. *B. elytris bidentatis viridi-æneis apice cyaneis: fasciis*  
*duabus ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 177. n. 13.*  
*Habitat in America boreali, magnitudine punctatæ, viridi-*  
*ænea, antennis nigris.*
- rauca. 43. *B. obscure ænea immaculata, elytris bidentatis substriatis.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 177. n. 14.*  
*Habitat in Barbaria, parva.*
- striata. 44. *B. elytris truncatis subbidentatis cupreis: lineis elevatis*  
*quatuor. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 10. mant. inf. 1.*  
*p. 177. n. 15.*  
*Habitat in Pennsylvania.*

- rutilans. 45. *B. elytris tridentatis viridibus nigro-maculatis : margine aureo.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 274. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 16.  
*Jacquini miscell. austr.* 2. t. 23. f. 2. *Buprestis fastuosa.*  
*Habitat in Austria.*
- octoguttata. 2. *B. elytris fastigiatis muticis : maculis quatuor albis, corpore cæruleo.* *Fn. succ.* 753. *it. scan.* 23. *Uddm. diff.* 42.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 278. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 180. n. 43.  
*Buprestis elytris integris : maculis quatuor albis, corpore cæruleo.*  
*Degeer inf.* 4. p. 132. n. 5. t. 4. f. 20. *Buprestis alba punctata.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 126. n. 2. *Cucujus viridi-æneus : punctis quatuor impressis.*  
*Schæff. ic. t.* 31. f. 1. & t. 204. f. 4.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 7. a. b.  
 β) *Buprestis sexpunctata?* *Lepeck. it.* 2. t. 10. f. 10.  
*Habitat in Europæ nemoribus, β) in arena fluviorum Sibiriae.*
- ignita. 3. *B. elytris ferratis, thorace impresso, corpore inaurato tibiis teretibus.* *Mus. Lud. Ulr.* 86.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 274. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 17.  
*Buprestis elytris dentatis, thorace impresso, corpore inaurato.*  
*Grew mus.* 166. t. 13. *Beetle.*  
*Kaempf. jap.* 1. p. 132. t. 10. f. 7.  
*Pet. gaz.* t. 20. f. 8.  
*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 14.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 3.  
*Habitat in America australi, India & Sina.*
- lineata. 46. *B. elytris truncatis subtridentatis nigro-æneis : vittis duabus fulvis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 18.  
*Habitat in America meridionali.*
- ocellata. 47. *B. viridi-nitens, elytris tridentatis : maculis duabus aureis ocellarique flava.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 19.  
*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 15.  
*Habitat in America australi & India.*
- ærosa. 48. *B. elytris tridentatis, corpore æneo immaculato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 20.  
*Habitat in Coromandel, minor.*

- maculata. 49. *B. elytris tridentatis cyaneis flavo-maculatis*. *Fabr. sp. inf. I. p. 275. n. 16. mant. inf. I. p. 177. n. 21.*  
*Habitat in Sibiria, mediæ magnitudinis, subtus ænea, capite cyaneo.*
- maculosa. 50. *B. elytris truncatis striatis dentatis nigris: maculis quatuor flavis*. *Fabr. mant. inf. I. p. 177. n. 22.*  
*Degeer inf. 4. p. 137. n. 6. & Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 118. n. 8. t. 28. f. 8.* *Buprestis flavo-punctata.*  
*Habitat in Suecia, mediæ magnitudinis; capite & abdomine æneo-nigro; pedibus & thorace nigris, hujus margine flavo.*
- stricta. 4. *B. elytris ferratis fulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro*. *Mus. Lud. Ulr. 87.\**  
*Habitat in America australi, & India.*
- sternicornis. 5. *B. elytri, ferrato-tridentatis, thorace punctato, sterno porrecto, corpore inaurato*. *Mus. Lud. Ulr. 88.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 275. n. 17. mant. inf. I. p. 178. n. 23.*  
*Buprestis elytris ferrato-tridentatis viridibus: punctis cinereis impressis, sterno porrecto conico.*  
*Grew mus. 167. t. 13. Carabus orientalis crassus.*  
*Mouff. inf. 160. f. inf.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. t. 46. f. 2.*  
*Habitat in India & America.*
- Chrysis. 51. *B. elytris ferrato-tridentatis castaneis, sterno conico porrecto*. *Fabr. sp. inf. I. p. 275. n. 18. mant. inf. I. p. 178. n. 24.*  
*Degeer inf. 4. p. 136. n. 2. t. 17. f. 25.* *Buprestis viridaurata, &c.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 2.*  
*Schroet. Abh. t. 2. f. 3.* *Buprestis splendida.*  
*Habitat in India, Sina, an satis distincta a sternicorni?*
- violacea. 52. *B. elytris, truncato-quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo*. *Fabr. mant. inf. I. p. 178. n. 25.*  
*Habitat in Sierra Leon Africa, immaculata.*
- ægyptiaca. 53. *B. elytris ferratis fulcatis, corpore depresso obscuro*.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 276. n. 19. mant. inf. I. p. 178. n. 26.*  
*Habitat in Ægypto.*
- mariana. 6. *B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace fulcato*. *Mus. Lud. Ulr. 89.\* Fn.*

*Succ.* 754.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 276. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 27.

*Fn. succ.* 557. *Buprestis æneo-nitida* supra cinerea, corleoptris apice attenuatis.

*Degeer inf.* 4. p. 128. n. 1. t. 4. f. 18. *Buprestis nitida* supra fulco-ænea, subtus rubro-cuprea; &c.

*Pet. gaz.* t. 2. f. 2. *Cantharis marianus*.

*Schæff. ic.* t. 49. f. 1.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 4.

*Habitat in Europa, & boreali America.*

*farinosa.* 54. *B. elytris ferratis viridibus: fulco abbreviato suturali impresso.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 276. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 28.  
*Habitat in nova Hollandia.*

*fulminans.* 55. *B. æneo nitidissima, elytris ferratis apice aureis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 178. n. 29.  
*Habitat in India, magna.*

*cyanipes.* 56. *B. elytris ferratis striatis viridi-æneis, thorace plano caruleo.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 178. n. 30.  
*Habitat in America meridionali, marianæ magnitudine.*

*modesta.* 57. *B. elytris ferratis corpore obscurioribus: maculis tribus impressis aureis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 276. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 31.  
*Habitat in Brasilia, farinosæ magnitudine.*

*blanda.* 58. *B. elytris attenuatis ferratis sulcatis viridi-æneis: sulcis cupreis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 276. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 32.  
*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.*

*aurata.* 59. *B. aurea, elytris ferratis, thorace æneo.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 178. n. 33.  
*Habitat in America, magna.*

*tripunctata.* 60. *B. elytris ferratis striatis cupreis punctis tribus impressis aureis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 179. n. 39.  
*Habitat in America meridionali, statura blandæ.*

*elegans.* 61. *B. ænea nitida, elytris ferratis, thoracis lineis duabus elytrorumque unica aureis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 277. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 179. n. 35.  
*Habitat ad Caput bonæ spei,*

chrysof-  
stigma.

7. *B. elytris ferratis longitudinaliter sulcatis: maculis duabus aureis impressis, thorace punctato. Fn. suec. 755.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 277. n. 26. mant. inf. 1. p. 179. n. 39.*

*Fn. suec. 1. n. 556. Buprestis fusco-ænea, elytris maculis æneis impressis.*

*Degeer inf. 4. p. 129. n. 3. Buprestis fusca.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 135. n. 1. Cucujus aureus.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 39.*

*Schaeff. elem. t. 31. f. 2.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 6.*

*Habitat in Europa.*

dorsata.

62. *B. obscure ænea, elytris ferratis, abdominis dorso aureo, ano bidentato. Fabr. mant. inf. 1. p. 179. n. 38.*

*Habitat in America meridionali, chrysofistigmate minor.*

impressa.

63. *B. elytris ferratis lævibus æneis: punctis tribus impressis.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 277. n. 27. mant. inf. 1. p. 179. n. 40.*

*Habitat in America australi & India, modestæ affinis, at duplo minor.*

ornata.

64. *B. elytris ferratis obscuris albo-maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 277. n. 28. mant. inf. 1. p. 180. n. 41.*

*Habitat in Pennsylvania.*

tæniata.

65. *B. cinereo-villosa, elytris ferratis nigris: fasciis duabus ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 180. n. 32.*

*Habitat in Europa magis australi, parva, antennis nigris.*

cayennensis.

66. *B. viridi-ænea, elytris ferratis atris: fasciis tribus lineo-laqueæpicis viridibus, capite thoraceque fusco maculatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 180. n. 43.*

*Habitat in Cayenna, parva, antennis nigris.*

cylindrica.

67. *B. elytris ferratis striatis, thorace villoso, corpore cylindrico nigro. Fabr. sp. inf. 1. p. 277. n. 29. mant. inf. 1. p. 180. n. 44.*

*Habitat in Oriente.*

scabra.

68. *B. elytris integris, fronte sulcata; corpore scabro aureo. Fabr. sp. inf. 1. p. 277. n. 30. mant. inf. 1. p. 180. n. 45.*

*Habitat in America australi & India.*

Trochilus.

69. *B. aurea nitidissima, dorso elytris integris pedibusque viridibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 278. n. 31. mant. inf. 1. p. 180. n. 46.*

*Habitat in Austria.*



- decastig- 70. *B. elytris integris elevato-striatis fuscis: punctis quinque*  
ma. flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 180. n. 47.*  
*Habitat in Austria, statura chrysosigmatis.*
- russica. 8. *B. elytris striatis fastigiatis, thorace punctato. Fn. suec. 756.*  
*Fn. suec. 1. n. 555. Buprestis viridi-ænea immaculata.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 40. mant. inf. 1. p. 181. n. 57.*  
*Buprestis elytris emarginatis striatis obscure æneis.*  
*Degeer inf. 4. p. 130. n. 4. t. 4. f. 10. Buprestis violacea.*  
*Scop. ent. carn. n. 188. Mordella rustica.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 126. n. 3. Cucujus viridi-auratus*  
*oblongus.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 1.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 174. n. 28.*  
*Habitat in Europæ nemoribus.*
- canalicu- 71. *B. obscura, elytris integris, abdomine subtus canalicu-*  
lata. lato: ano quadridentato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 181. n. 58.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnitudine rustica.*
- acuminata. 72. *B. elytris integris attenuato-acuminatis obscuris,*  
corpore cupreo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 181. n. 59.*  
*Pall. ic. inf. russ. 2. t. D. f. 10.*  
*Habitat in Russia meridionali, statura rustica.*
- plebeia. 73. *B. elytris emarginatis cupreis fusco maculatis. Fabr. sp.*  
*inf. p. 280. n. 41. mant. inf. 1. p. 182. n. 60.*  
*Habitat in India.*
- tranqueba- 74. *B. nigra obscura, elytris integerrimis, thorace macula*  
rica. baseos utrinque impressa. *Fabr. mant. inf. 1. p. 182. n. 61.*  
*Habitat Tranquebariæ, statura rustica.*
- lugubris. 75. *B. elytris integris obscuris nigro-scabris, corpore subtus*  
cupreo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 42. mant. inf. 1. p.*  
*182. n. 62.*  
*Pall. ic. inf. russ. 2. t. D. f. 11. Buprestis oxyptera.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 14.*  
*Habitat in Austria & Ungaria.*  
*Femina aculeus brevis ferratus ani.*
- cariosa. 76. *B. atra, elytris integris: atomis albis, thorace varioloso.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 182. n. 63. Pall. it. 3. app. P. 703.*  
*n. 52. ic. inf. russ. 2. t. D. f. 6.*  
*Habitat in Russia magis australi, statura b. tenebrionis,*  
*at duplo major.*

- undata. 77. *B. viridi-ænea*, elytris integris apice obscuris : strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 181. n. 64.*  
*Habitat in Germania, b. rubi major.*
- austriaca. 9. *B. elytris striatis æneis bidentatis*, capite thoraceque viridibus, abdomine violaceo.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 36. mant. inf. 1. p. 181. n. 53.* Buprestis elytris integris fulcatis æneis, capite thoraceque viridibus.  
*Scop. ent. carn. n. 187. Mordella gigantea.*  
*Habitat Idriæ, magnitudine rusticæ.*
- sibirica. 78. *B. elytris integerrimis atris : vittis duabus cinereo-tomentosis impressis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 37. mant. inf. 1. p. 181. n. 54.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 11.*  
*Habitat in Sibiria, mediæ magnitudinis, latiuscula, scabra, subtus cinereo-villosa.*
- splendens. 79. *B. elytris integris viridibus : margine omni aureo lineisque tribus elevatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 37. mant. inf. 1. p. 181. n. 55.*  
*Habitat in Sina.*
- fusca. 80. *B. subtus ænea, elytris integris obscure fuscis, abdomine punctis lateralibus fulvis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 38. mant. inf. 1. p. 181. n. 56.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, fusca, magnitudine & statura splendentis.*
- aurulenta. 10. *B. elytris fastigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace subpunctato.*  
*Habitat in Carolina, oblonga, angusta.*
- Tenebrio-  
nis. 11. *B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace varioloso dilatato.* *Fn. suec. 761.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 43. mant. inf. 1. p. 182. n. 65.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 16.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 15.*  
*Habitat in Europa, Africa.*
- fascicularis. 12. *B. elytris integerrimis striatis : punctis fasciculato-villosis, corpore inaurato hirsuto.* *Mus. Lud. Ulr. 90.\* Gron. zooph. 493.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 278. n. 33. mant. inf. 1. p. 180. n. 49.*

*Seb. mus.* 2. p. 22. t. 20. f. 5. *Scarabæus amboinenfis.*  
*Pet. gaz.* 4. t. 13. f. 5. *Scarabæus viridis aureus*, pu-  
 pillis pilis albis obtusis undique hirtus.

*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 4.

*Degeer inf. p.* 7. t. 47. f. 6.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 9.

*Habitat ad Caput bonæ spei, rarius nigra, fasciculis pi-  
 lorum nunc flavis, nunc fulvis.*

variolaris. 81. *B. elytris integris obscuris : punctis impressis nume-  
 rosis, thorace carinato. Pall. it.* 1. p. 464. n. 37. *ic. inf.*  
*russ.* 2. t. D. f. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 278. n. 34.  
*mant. inf.* 1. p. 181. n. 50.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 10.

*Habitat in Russiæ onoporde & echinopode, scabra, nigra,  
 subtus hirta, magnitudine & statura fascicularis.*

Onopordi. 82. *B. elytris integris cupreis : sulcis punctisque numeros  
 albo-villosis, thorace scabro. Fabr. mant. inf.* 1. p.  
 181. n. 51.

*Habitat in Hispaniæ onopordo, ænea, nitida, albo-ru-  
 losa, fasciculari paulo minor.*

hirta. 13. *B. hirta, elytris integerrimis, pedibus ferrugineis.  
 Mus. Lud. Ulr.* 91.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 278. n. 35.  
*mant. inf.* 1. p. 181. n. 52.

*Habitat in Africa, colore varians.*

rubi. 14. *B. cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis undulatis.  
 Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 44. *mant. inf.* 1. p. 182.  
 n. 66.

*Habitat in Europæ magis australis rubo, cichoreo.*

deaurata. 83. *B. supra obscure viridis, elytrorum margine aureo.  
 Fabr. mant. inf.* 1. p. 182. n. 67.

*Habitat Halæ Saxonum, mediæ magnitudinis, cuprea,  
 antennis nigris.*

nitidula. 15. *B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque de-  
 presso, corpore viridi nitido. Fn. suec.* 757.\* *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 282. n. 58. *mant. inf.* 1. p. 184. n. 57.

*Schæff. ic.* 1. 50. f. 7.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 20.

*Habitat in Europa boreali.*

- lata. 84. *B. elytris integris viridibus*, capite thoraceque aureis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 59. mant. inf. 1. p. 184. n. 88.*  
*Habitat Halæ Saxonum, an varietas nidulæ?*
- salicis. 85. *B. viridis nitens, elytris integerrimis aureis basi viridibus.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 60. mant. inf. 1. p. 184. n. 89.*  
*Schranck inf. austr. p. 195. n. 365. Buprestis elegantulus.*  
*Schaeff. ic. t. 31. f. 12.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. t. 46. f. 5. a. b.*  
*Habitat in Germaniæ salice.*
- cyanea. 86. *B. elytris integerrimis rugosis, corpore cyaneo.* *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 282. n. 61. mant. inf. 1. p. 184. n. 91.*  
*Habitat Halæ Saxonum & Berolini.*
- discoidea. 87. *B. ænea villosa, elytris integris: disco testaceo.* *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 184. n. 90.*  
*Habitat in Barbariæ umbellatis, parva.*
- bimaculata. 16. *B. elytris integerrimis striatis: macula rubra, corpore fusco-viridi.* *Mus. Lud. Ulr. 92.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 45. mant. inf. 1. p. 182. n. 68.*  
*Sulz. hist. inf. p. 17. t. 6. f. 15.*  
*Habitat in India.*
- quadrimaculata. 88. *B. viridis, thorace posterius, elytrisque integris maculis duabus aureis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 46. mant. inf. 1. p. 181. n. 69.*  
*Habitat in India.*
- novemmaculata. 17. *B. elytris integerrimis: maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 62. Buprestis elytris integerrimis nigris, maculis tribus flavis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 16. f. 17?*  
*Habitat in Barbaria, Calabria, nigra, oblonga, mediæ magnitudinis.*
- tristis. 18. *B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdominis punctis decem nigris.* *Mus. Lud. Ulr. 93.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 47. mant. inf. 1. p. 183. n. 70.*  
*Habitat in America australi & India.*
- ænea. 19. *B. elytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus apice striatis.* *Fa. juv. 758.\**  
*Habitat in Europa.*

- cuprea. 20. *B. elytris integerrimis*, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreo lævi. *Mus. Lud. Ulr.* 94. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 71.  
*Habitat in America.*
- nobilis. 21. *B. elytris integerrimis*: strigis duabus undatis inauratis, corpore fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 72.  
*Habitat in America australi & India.*
- barbarica. 89. *B. supra ænea*, subtus cuprea, elytris integerrimis substriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 73.  
*Habitat in Barbaria, parva.*
- umbellatarum. 90. *B. elytris integerrimis lævibus*, corpore obscure cupreo immaculato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 74.  
*Habitat in Barbariæ umbellatis, statura & magnitudine quadripunctatæ.*
- quadripunctata. 22. *B. elytris integerrimis punctatis*, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Fn. suec.* 759. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 75. *Degeer inf.* 4. p. 134. n. 8. *Buprestis subviridi-nigra*, thorace punctis quatuor impressis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 17.  
*Habitat in Europæ floribus, frequens in caltha palustri.*
- cruciata. 91. *B. coleoptris integerrimis aureis*: punctis duobus cruceque posteriore nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 76.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- manca. 23. *B. aurata*, thoracis lineis duabus, elytrisque fuscis. *Syst. nat.* XII. 2. *add.* p. 1067. n. 10.  
*Fabr. syst. ent.* p. 222. n. 37. *Buprestis bistriata.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 52. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 77. *Buprestis elytris integris obscuris*, thorace aureo: striis duabus nigris.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 127. n. 4. *Cucujus æneus*, &c.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 28. f. 18.  
*Habitat in Gallia & Germania.*
- pygmæa. 92. *B. elytris integris cyaneis*, capite thoraceque æneis nitidis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 78.  
*Habitat in Barbariæ umbellatis, statura & magnitudine minutæ.*



- minuta. 24. *B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtri-  
lobo lævi, corpore ovato nigro. Fn. succ. 760.\* Fabr.  
sp. inf. 1. p. 281. n. 53. mant. inf. 1. p. 183. n. 79.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 128. n. 6. Cucujus fusco-cupreus  
triangularis, &c.  
Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 19.  
Habitat in Europa.*
- medita- 93. *B. elytris integerrimis fusco-nidis, capite thoraceque cu-  
bunda. preis, corpore æneo. Fabr. mant. inf. 1. p. 183. n. 80.  
Habitat in America boreali, statura viridis, at paulo major.*
- viridis. 25. *B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace  
deflexo, corpore viridi elongato. Fn. succ. 762.\* Fabr.  
sp. inf. 1. p. 281. n. 54. mant. inf. 1. p. 184. n. 81.  
Degeer inf. 4. p. 133. n. 6. t. 5. f. 1. Buprestis viridis.  
Geoff. inf. par. 1. p. 127. n. 5. Cucujus viridi-cupreus  
oblongus.  
Scop. ent. carn. 190. Mordella ferraticornis.  
Schaeff. ic. t. 76. f. 9.  
Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 21.  
Habitat in Europæ betula alba, foliorum margines ex-  
dens, corpore obscuriori & cupreo varians,*
- bigut- 94. *B. elytris integerrimis linearibus viridibus: puncto albo,  
tata. abdomine cyaneo: punctis tribus albis. Fabr. sp. inf. 1.  
p. 281. n. 55. mant. inf. 1. p. 184. n. 82.  
Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 22.  
Habitat in Angliæ plantis.*
- atra. 26. *B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace  
deflexo, corpore atro elongato. Fabr. sp. inf. 1. p. 282.  
n. 56. mant. inf. 1. p. 184. n. 83.  
Habitat in Germania, viridi proxime affinis. Schreber.*
- elata. 95. *B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo  
nitido. Fabr. mant. inf. 1. p. 184. n. 84.  
Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr. 1. p. 99. n. 12? Bu-  
prestis elongata.  
Habitat Berolini & Halæ Saxonum, statura atræ, at minor.*
- rusicol- 96. *B. nigra, elytris integerrimis linearibus, thorace cupreo.  
lis. Fabr. mant. inf. 1. p. 184. n. 85.  
Habitat in America, parva, statura elatæ.*



- festiva. 27. *B. elytris integerrimis*: maculis sex cæruleis, corpore elongato viridissimo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 282. n. 54.  
*mant. inf.* I. p. 184. n. 86.  
*Habitat in Africa, viridis magnitudine.*
- linearis. 28. *B. linearioblonga murino-ænea*, thorace posteriore trilobo.  
*Habitat in America.* Rolander.
- granu- 29. *B. æneo-nebulosa*, antennis clavatis. *Fn. suec.* 763.\*  
 laris. *Habitat in Europa, an hujus generis?*
- depressa. 30. *B. elytris subferratis æneo-ferrugineis nervoso-punctatis*, thorace depresso. *Mant.* 2. p. 533.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 277. n. 25. *mant. inf.* I. p. 179. n. 37.  
*Buprestis (porcata) elytris ferratis porcatis, thorace angulato, corpore fusco nitido.*  
*Habitat in Oriente.*
- calca- 97. *B. elytris bidentatis substriatis*, tibiis intermediis dentatis,  
 rata. corpore cupreo. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* I. p. 310.  
*Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* I. p. 91. n. 2. *Buprestis æruginea.*  
*Schaeff. ic. t. 35. f. 7.*  
*elem. t. 31. f. II.*  
*Habitat in Germania, statura & magnitudine rustica, rarior; elytrorum striis quatuor, thoracis unica media ex atro cærulea.*
- fuligi- 98. *B. elytris integerrimis sublinearibus glabris pilosis*, thorace  
 nosa. deflexo, corpore fuliginoso. *Forst. nov. inf. sp.* I. p. 51. n. 51.  
*Habitat in Anglia, lecta in floribus cratægi oxyacanthæ, magnitudine cantharidis testaceæ, antennis moniliformibus, an hujus generis?*
- hemor- 99. *B. æneo-nitens*, elytris subtridentatis novemfulcatis. ab-  
 rhoidalis, dominis annulo ultimo maculis duabus fulvis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* I. p. 97. & apud *Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 12.  
*Habitat Berolini in sepibus, octoguttatæ affinis.*
- quercus. 100. *B. viridi-nitens*, thorace orbiculato: puncto impresso, elytris truncatis costatis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* I. p. 90. n. 1. & apud *Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 13.  
*Schaeff. ic. t. 35. f. 6?*

INSECTA COLEOPTERA. Buprestis. 1939

*Habitat in Germaniæ ligno querno, pollicem fere longa, pedibus cæruleis, antennis nigricantibus.*

hirfuta. 101. *B. atra, villosa, elytris fasciculis sparsis villosis flavis, marginalibus rubris. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. t. 46. f. 4.*  
*Habitat in America, fasciculari affinis.*

II-maculata. 102. *B. cylindrica nigra nitens, frontis macula, thoracis quatuor, elytrorum tribus flavis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 23.*  
*Habitat in Ungaria.*

sexmaculata. 103. *B. cylindrica nigra nitens, capite thoraceque immaculatis, elytrorum maculis tribus flavis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 121. n. 24.*  
*Habitat in Ungaria, an vere distincta ab II-maculata?*

varicornis. 104. *B. nigricans villosa, thorace utrinque lobato, elytris acutis. Müll. zool. dan. prodr. p. 59. n. 530.*  
*Habitat in Dania.*

acuta. 105. *B. nigra, elytris punctatis pone acuminatis, thorace lævi. Degeer inf. 4. p. 133. n. 7.*  
*Habitat in Europa, 4 modo lineas longa.*

navia. 106. *B. atra, thorace albo nigroque vario. Lepechin it. 1. p. 232. t. 17. f. 7.*  
*Habitat in Russiæ regno, rusticæ affinis.*

picta. 107. *B. ænea nitens, elytris violaceo-nigris: maculis symmetricis flavescentibus. Pall. it. 2. app. n. 46.*  
*Habitat in regionibus Uralensibus magis australibus, octoguttatæ fere magnitudine.*

inaurata. 108. *B. viridi-aurea nitidissima, elytris obtusis integerrimis decemstriatis æncis. Pall. it. 2. app. n. 45.*  
*Habitat rarior in regionibus australibus, fluvii Ural & Volgæ finitimis, ignita magnitudine, sed latior.*

tatarica. 109. *B. nigra, subtus ænea, elytris lævibus aureis: vitta marginali lineaque margini parallela impressis tomentosis. Pall. it. 1. app. n. 10.*  
*Habitat in Tataria, marianæ magnitudine, at brevior, æffior, & congeneribus magis obtusa.*

- virginica. 110. *B. thorace lato fusco : punctis cupreis, elytris ferratis atris : maculis cupreis futuraque metallica.* *Drury inf. 1. p. 66. t. 30. f. 3.*  
*Habitat in Virginia.*
- nana. 111. *B. nigra nitida, elytris cæruleo-violaceis nitidissimis.*  
*Degeer inf. 4. p. 137. n. 4. t. 17. f. 27.*  
*Habitat in Surinamo, pulice vix major.*
- margi- 112. *B. elytris integerrimis nigris : margine flavo.* *Müll. Fn.*  
 nata. *Fridrichsd. p. 18. n. 182.*  
*Habitat in Dania, an distincta species?*
- nigra. 113. *B. thorace elytrisque nigris, abdomine subtus albo-tomentoso.* *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. n. 183.*  
*Habitat in Dania.*
- rofacea. 114. *B. thorace pone marginato, elytris marginatis apice rotundatis, abdomine supra æneo fusco.*  
*Scop. ent. carn. n. 190. Mordella rofacea.*  
*Habitat in Carniolæ floribus.*
- ungarica. 115. *B. viridissima, subtus fronte & thoracis lateribus rubro-aureis.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 104. n. 85. Mordella hungarica.*  
*Habitat in Ungaria, rustica paulo minor, elytris apice rotundatis.*
- nebulosa. 116. *B. supra nigra, subtus albicans, elytris integerrimis striis tenuissimis punctatisque albidis nebulosis.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 104. n. 86. Mordella nebulosa.*  
*Habitat in Ungaria, pedibus nigris.*
- bruttia. 117. *B. nigra albido punctata, thorace varioloso dilatato albidiores : maculis quinque nitidis nigris.*  
*Petagn. inf. Calabr. p. 22. n. 108. f. XX.*  
*Habitat in Calabria lentisco.*
- Stepha- 118. *B. viridi-aurea nitens, thorace lineis duabus fuscis,*  
 nelli. *elytris integris.* *Petagn. inf. Calabr. p. 23. n. 110.*  
*Habitat in Calabria monte tre pizzi, minor.*
- rugosa. 119. *B. ænea punctata, thorace scabro : sulco obliquo utrinque impresso, elytris striatis fuscis apice truncatis : rugis impressis interruptis.* *Mus. Lesk. p. 34. n. 739.*  
*Habitat - - -*

coccinea. 120. B. fusco-ænea punctata, thorace fulcato, elytris integris coccineis: rugis quatuor nigris, internis ad futuram ramosis. *Mus. Lesk.* p. 34. n. 744.

*Habitat extra Europam, thoracis sulcis striis villosis griseis repletis, clytris spatio rugis interjecto punctis concatenatis duplici serie striatis.*

HYDROPHILUS. *Antennæ clavatæ: clava perfoliata.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Pedes posteriores villosi, natatorii, submutici.*

piceus. 1. H. niger, sterno canaliculato posterius spinoso. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 288. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 1. *Degeer inf.* 4. p. 371. n. 1. t. 14. f. 1. 2. Hydrophilus ruficornis.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 182. n. 1. t. 3. f. 1. Hydrophilus niger, elytris fulcatis, antennis fuscis.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 1. *En. suec.* 764.\* *Scop. ent. carn.* 293. Dytiscus antennis perfoliatis, corpore lævi, sterno carinato postice spinoso.

*Herbst Besch. der naturf. Berl. Fr.* 4. t. 7. f. 2. Dytiscus hastatus.

*Lyonn. Less.* t. 1. f. 15-17.

*Frisch inf.* 2. t. 6.

*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 8.

*Schaeff. el.* t. 71.

ic. t. 33. f. 1. 2.

*Bergstr. nomencl.* 1. 7. 6. f. 3. & t. 8. f. 1. & t. 9. f. 1.

*Habitat in Europa, nido eminenter mucronato natante.*

olivaceus. 6. H. olivaceus, sterno canaliculato posterius spinoso, coleoptris emarginatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 289. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 2.

*Habitat in Coromandel, piceo paulo minor.*

caraboides. 2. H. niger nitidus, elytris substriatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 289. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 3.

*Degeer inf.* 4. p. 516. n. 2. Hydrophilus nigricornis.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 183. n. 2. Hydrophilus niger. elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 2. *Fn. suec.* 765.\* *Dytiscus* antennis perfoliatis, corpore glabro, striis aliquot recurvis.

*Raj. inf.* p. 95. n. 7. *Hydrocantharus niger subrotundus*

*Frisch inf.* 13. p. 24. t. 21.

*Roef. inf.* 2. *aquat.* 1. t. 4. f. 1. 2.

*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 41.

*Schaeff. ic.* t. 53. f. 10.

*Berzstr. nomencl.* 1. t. 5. f. 8: 9. & (larv. pupp.) t. 7. f. 8. 9.

*Habitat in Europa.*

lateralis.

7. *H. niger nitidus*, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 289. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 4.

*Habitat in insulis Americae oppositis.*

feara-  
baoides.

3. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 289. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 5.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 3. *Dytiscus ovalis convexus* ater laevissimus, antennis filiformibus triarticulatis.

*Syst. nat.* X. n. 56. *Scarabaeus* (aquaticus) muticus piceus, elytris striatis, antennis flavescens filiformibus.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 85. *Scarabaeus piceus*.

*Habitat in Europa, palpis, non antennis, filiformibus.*

picipes.

8. *H. niger*, pedibus piceis, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 188. n. 6.

*Habitat in Germania, utrum hujus an insequentis max generis?*

orbicularis.

9. *H. subrotundus* corpore glabro atro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 290. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 188. n. 7.

*Habitat in Germania.*

collaris.

10. *H. niger*, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* p. 290. n. 7. *mant. inf.* p. 188. n. 8.

*Habitat in America.*

fuscipes.

4. *H. thorace atro*: margine griseo, elytris fuscis: margine punctoque posteriore albidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 290. n. 10. *mant.* 1. p. 189. n. 12.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 4. *Fn. suec.* 766. *Dytiscus* antennis perfoliatis, elytris striatis margine lividis, pedibus fuscis.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 184. n. 4. *Hydrophilus*.

*Habitat Upsaliae, elytrorum punctis interdum obsoletis.*



INSECTA COLEOPTERA. *Hydrophilus*. 1943

5. *H. elytris strians*, corpore cinereo fusco. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 290. n. 8. *mant. inf.* I. p. 188. n. 9.

*Degeer* in 7. 4. p. 478. n. 4. t. 15. f. 1. 2. *Hydrophilus fuscus*.

*Syst. nat.* X. 1. p. 665. n. 5. *Fn. suec.* 767.\* *Dytiscus* antennis penicillatis luridus, elytris punctis tribus fusciscentibus, thorace lateribus flavicante.

*Habitat in Europa.*

11. *H. ovatus niger*, elytris pedibusque griseis. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 290. n. 9. *mant. inf.* I. p. 188. n. 10.

*Forst. nov. inf. sp.* 53. n. 53. *Dytiscus dermestoides*.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 85. n. 27. *Scarabæus* totus rufoniger, maculis nigrioribus.

*Habitat in Europa, vesperi sonorus, thorace interdum griseo.*

12. *H. supra cinereus*, sultus fuscus. *Fabr. mant. inf.* I. p. 189. n. 11.

*Habitat in Saxonia, statura & magnitudine minuti.*

13. *H. niger*, elytris piceis margine nigris & apice ochroleucis, pedibus pallideis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
5. p. 122. n. 6. t. 28. f. A. b.

*Habitat Berolini, lunam longus.*

14. *H. niger*, thoracisque margine elytrisque ferrugineis : his macula communi cordata nigra. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 122. n. 7. t. 28. f. A. a. b.

*Habitat Berolini, vix lineam longus, pedibus piceis.*

15. *H. rufus*, elytris lævissimis obscurioribus : margine exteriore albido anterieus bidentato. *Scop. ent. carn.*  
n. 298.

*Habitat in Carniola.*

16. *H. lividus*, abdomine nigro, elytris nitidis confertim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 69. n. 657.

*Habitat in Dania, an vere distinctus a lurido?*

17. *H. niger*, elytris lævissimis, antennis tarsisque fuscis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 69. n. 658.

*Habitat in Dania.*

18. *H. ater*, supra nitidus confertim punctatus. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 69. n. 659.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 184. n. 3. *Hydrophilus punctatus*.  
*Habitat in Europa.*



- niger. 19. *H. niger* nitidus, elytris punctis distantibus levissimis striatis, antennis plantisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 35. n. 769.*  
*Habitat in Europa, statura caraboidis, at quadruplo minor.*
- ater. 20. *H. ater* glaber, antennis tibiisque rufescentibus. *Lesk. p. 35. n. 774.*  
*Habitat in Europa.*

212. DYTISCUS. *Antennæ setaceæ.**Palpi sex filiformes.**Pedes posteriores villosi, nartorii, submutici.*

- latissimus. 6. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis: linea flavissima. *Fn. suec. 768.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 290. n. 1. mant. inf. 1. p. 189. n. 1.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 69. n. 663. Dytiscus amplissimus.*  
*Degeer inf. 4. p. 390. n. 1. Dytiscus nigro-fuscus.*  
*Frisch inf. 2. t. 7. f. 1. 2. Scarabæus aquaticus magnus niger, margine luteo.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 19.*  
*Schaeff. ic. t. 217. f. 1. 2.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 5. f. 1. 2. & t. 9. f. 3.*  
*Habitat in Europa boreali, in propriam speciem savientius mas glaber, femina sulcata.*
- costalis. 1. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine elytrorumque stria costali ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 291. n. 2. mant. inf. 1. p. 189. n. 2.*  
*Habitat in Surinamo. Femina obscurior.*
- marginalis. 7. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. *Fn. suec. 769. Scop. ent. carn. 294. Geoffr.*

*Hydrophili & Dytisci in aquis & humidis habitant, egregie natant, dorso impetu circumgyrando exsiliunt, in umbra quiescunt, noctu volitant, diutius in suis servati difficilius submergi possunt; maribus pedum anteriorum plantæ hexapharicæ, feminis elytra sæpius sulcata, priores dermestidi, posteriores carabici affines; ceterum sexus discerni, species determinari difficulter possunt: larvæ subaquaticæ voracissimi aquatiliæ crocodili, pisces ipsos occidunt innumeros, uti Baruthi 1762 teste Schrebero nevez Samml. 1763. 3. p. 680. de sensibilitate alias de latissimo compertum est.*

*ins. par.* 1. p. 186. n. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 291. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 189. n. 3.

*Degeer inf.* 4. p. 391. n. 2. t. 16. f. 2. *Dytiscus nigro-*  
*fuscus nitidus.*

*Mouss. inf.* 164. *Hydrocantharis.*

*Raj. inf.* p. 93. n. 1. *Hydrocantharis nostras.*

*Aldr. inf.* 707.

*List. mut. t.* 5. f. 2.

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 1. f. 9. 11.

*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 42.

*Schaeff. ic. t.* 8. f. 8.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 1. n. 1. t. 1. f. 1. & t. 6. f. 1.  
 2. & (larv. pupp.) t. 7. f. 4. 5. β) 1. t. 7. f. 1.

*Habitat in Europa.*

*semistriatus.* 8. *D. fuscus*, elytris fulcis dimidiatis decem villosis. *Fn.*  
*suec.* 772.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 187. n. 3. t. 3. f. 2.  
*Fn. suec.* 1. n. 568. *Dytiscus* supra fuscus, subtus ater.  
*Raj. inf.* p. 94. n. 2. *Hydrocantharis elytris striatis sive*  
*canaliculatis.*

*Frisch. inf.* 2. t. 7. f. 4.

*Bradl. nat. t.* 26. f. 2.

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 1. f. 10.

*Degeer inf.* 4 p. 391. n. 2. t. 16. f. 1.

*Schaeff. ic. t.* 8. f. 7.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 2. n. 2. t. 1. f. 2.

*Fn. suec.* 1. n. 567. *Dytiscus* elytris striis 20 dimidiatis.

*Habitat in Europa, ense recurvo, acuto, recondito instruc-*  
*tus, ova oblonga, magna, alba pariens, marginalis,*  
*ut videtur, femina.*

*punctulatus.* 2. *D. niger*, clypeo thoracis elytrorumque margine exte-  
 riori albis, elytris striis tribus punctatis. *Fabr. sp. inf.*  
 1. p. 292. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 189. n. 4.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 185. n. 1. *Dytiscus* margine co-  
 leoptrorum thoracisque flavo.

*Degeer inf.* 4. p. 396. n. 3. *Dytiscus laterali-marginatus.*

*Müll. zool. dan. prodr.* p. 70. n. 664. *Dytiscus virens.*

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 2.

*Frisch. inf.* 13. t. 1. f. 7.

*Schaeff. elem. t.* 7.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 31. n. 45. t. 6. f. 4. 5. t. 8. f.  
 4. & t. 9. f. 2.

β) *Bergstr. nomencl.* 1. t. 8. f. 6. 7.

*Habitat in Germaniæ rivulis silvaticis.*

*Femina elytrorum sulcis decem dimidiatis.*

- limbatus. 3. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 292. n. 5. mant. inf. 1. p. 189. n. 5.*  
*Habitat in Sina, & India, abdomine atro: punctis utriusque 3 ferrugineis.*
- ruficollis. 4. *D. niger*, fronte thoraceque fulvis, elytris striga basales margineque exteriori testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 189. n. 6.*  
*Habitat in Siam, sulcati magnitudine.*
- fstriatus. 9. *D. fuscus*, elytris transversim subtilissime striatis. *Fn. suec. 770.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 8. mant. inf. 1. p. 190. n. 9.*  
*Degeer inf. 4. p. 399. n. 5. t. 15. f. 16. Dytiscus transverse striatus.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscus. 10. *D. fuscus*, elytris transverse substriatis.  
*Habitat in Europa, an specie distinctus a striato?*
- Lanio. 5. *D. niger*, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 9. mant. inf. 1. p. 190. n. 10.*  
*Habitat in Madera.*
- cicurius. 24. *D. ater lævis*, ore verticis puncto thoracisque marginibus rufis, elytris flavo striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 190. n. 11.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine striati.*
- vittatus. 25. *D. ater lævis*, elytris vitta marginali flava: macula basalis atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 10. mant. inf. 1. p. 190. n. 12.*  
*Habitat in India.*
- cinereus. 11. *D. cinereus*, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Fn. suec. 771. Geoffr. inf. par. 1. p. 188. n. 4. Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 11. mant. inf. 1. p. 190. n. 13.*  
*Degeer inf. 4. p. 397. n. 14. Dytiscus fasciatus.*  
*List. mut. t. 5. f. 1.*  
*Petiv. gaz. t. 70. f. 3.*  
*Ad. Nidros. 425. t. 70. f. 3.*  
*Huffn. inf. 2. t. 12.*

*Roesf. inf.* 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 6.

*Schæff. ic.* *t.* 90. *f.* 7.

*Habitat in Europa, frequentissimus.*

*griseus*. 26. *D. cinereus*, elytris fascia dentata nigra. *Fabr. sp. inf.*  
1. *p.* 293. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 14.  
*Habitat in India, cinereo paulo major.*

*lividus*. 12. *D. pallens*, elytris griseis : puncto oblongo laterali  
impresso nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 13.  
*mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 15.  
*Habitat in Africa.*

*decempunctatus*. 27. *D. ater glaber*, elytris punctis albis quinque. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 16.  
*Habitat in nova Hollandia.*

*fulcatus*. 13. *D. elytris fulcis decem longitudinalibus villosis.* *Fn.*  
*succ.* 773. \* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 189. *n.* 5. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. *p.* 292. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 7.  
*Raj. inf.* *p.* 94. *n.* 3. & 10. *Hydrocantharis minor*,  
corpore rotundo plano.  
*Bradt. mut. t.* 26. *f.* 2. *A.*  
*Frisch inf.* 13. *p.* 13. *t.* 7.  
*Roesf. inf.* 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 7.  
*Schæff. ic.* *t.* 3. *f.* 3.  
*Bergstr. nomencl.* 1. *t.* 5. *f.* 3-5. & *t.* 7. *f.* 6. 7.  
*Habitat in Europa & America, maris elytris glabris.*

*fasciatus*. 28. *D. elytris flavis : fasciis duabus punctoque apicis*  
*nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 293. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.*  
190. *n.* 8.  
*Habitat in India.*

*erythrocephalus*. 14. *D. ovato-oblongus niger*, capite pedibusque rufis.  
*Fn. succ.* 774. \* *Degeer inf.* 4. *p.* 404. *n.* 12. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 31.  
*Habitat in Europa.*

*planus*. 29. *D. ovato-oblongus planus niger*, tibiis solis rufis. *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 32.  
*Habitat in Dania, statura erythrocephali.*

*varius*. 30. *D. thorace rufo*, elytris cinereo nigroque striatis. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 33.  
*Habitat in Patagonia.*

- notatus. 31. *D. fuscus*, thorace flavo: punctis quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 34. *Bergstr. nomencl.* 1. t. 5. f. 10.  
*Habitat in Germania, statura palustris, thorace interdum rufo, aut punctis fasciave abbreviata nigris vario.*
- depressus. 32. *D. thorace ferrugineo: punctis duobus baseos nigris, elytris fuscis ferrugineo maculatis. Fabr. mant. inf.* 1. p. 296. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 35.  
*Habitat in Suecia.*
- dorsalis. 33. *D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inaequali ferrugineis. Fabr. mant. inf.* 1. p. 192 n. 36.  
*Habitat Kilonii, sexpustulato affinis, at major.*
- sexpustulatus. 34. *D. ater*, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baseos majore. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 37.  
*Habitat in Suecia aquis stagnantibus.*
- maculatus. 15. *D. niger*, thorace nigro: fascia pallida elytris albo nigroque variis. *Fn. jucc.* 777.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 38. *Uadm. diff.* 43.  
*Habitat in Europa.*
- ferrugineus. 16. *D. ferrugineus totus.*  
*Habitat in Europa, cinctis magnitudine. Ascanius.*
- bipustulatus. 17. *D. ater laevis*, capite posterius punctis duobus rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 294. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 17.  
*Degeer inf.* 4. p. 401. n. 8? *Dytiscus ater.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 189. n. 6? *Dytiscus totus niger laevis.*  
*Schaeff. ic. t.* 8. f. 9.  
*Habitat in Europa boreali.*
- cinctus. 35. *D. capite thoraceque flavis, elytris nigris: margine omni albo. Fabr. sp. inf.* 1. p. 294. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 18.  
*Habitat in America.*
- bipunctatus. 36. *D. ater thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuscoque variis. Fabr. mant. inf.* 1. p. 190. n. 19.  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*

- fenestratus. 37. *D. subtus ferrugineus*, supra niger, elytris punctis duobus fenestris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 294. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 20.  
*Habitat* Hamburgi, *statura bipustulati*.
- Hübneri. 38. *D. lævis ater*, ore thoracisque margine ferrugineis, elytris linea marginali flava. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 190. n. 21.  
*Habitat in Germania*, *magnitudine & statura transversalis*.
- stagnalis. 39. *D. lævis niger*, thorace anterieus ferrugineo, elytris fuscis flavo linearis. *Fab. mant. inf.* 1. p. 191. n. 22.  
*Habitat in Germania*, *statura & magnitudine transversalis*.
- transversalis. 40. *D. ater*, thorace anterieus ferrugineo, elytrorum margine strigaeque baseos abbreviata flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 294. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 23.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 71. n. 668. *Dytiscus niger*, thorace utrinque fasciaque antica, elytris margine lineaque transversa baseos flava:  
*Pontopp. atl. Dan.* 1. t. 29.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 5. f. 6.  
*Habitat in Europa.*
- Hermani. 41. *D. gibbus*, capite thorace elytrorumque basi ferrugineis, elytris truncatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 24.  
*Fabr. syst. ent.* p. 232. n. 14. *Dytiscus gibbus*, elytris fascia undata baseos ferruginea.  
β) *Herbst. Besch. der berl. naturf.* Fr. 4. t. 7. f. 3. *Dytiscus tardus*.  
γ) *Schranck enum. inf. austr.* n. 379. *Dytiscus undulatus*.  
*Habitat in Afsatiæ aquis stagnantibus*.
- abbreviatus. 42. *D. niger* elytris striga abbreviata baseos punctisque duobus flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 191. n. 25.  
*Habitat Kilonii*, *statura transversalis*, *at duplo minor*.
- gibbus. 43. *D. gibbus ferrugineus*, elytris nigris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 26.  
*Habitat Kilonii*, *in aquis stagnantibus*.
- hæmorrhoidalis. 44. *D. niger*, thorace elytrorumque basi apiceque ferrugineis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 191. n. 27.  
*Habitat Kilonii*, *magnitudine uliginosæ*.



- ovatus*. 18. *D. ovatus fuscus*, capite thoraceque ferrugineis. *Fn. suec.* 2282. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 39.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 191. n. 10. *Dytiscus ovatus fuscus*, capite thoraceque rubicundis.  
*Degeer inf.* 4. p. 402. n. 9. t. 14. f. 17-19. *Dytiscus sphaericus*.  
*Habitat in Europæ aquis stagnantibus, consueto interdum duplo major, margine elytrorum albo-maculato.*
- picipes*. 45. *D. niger*, thorace anterieus ferrugineo: elytris flavo lineatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 40.  
*Habitat in Germania, parvus.*
- litturatus*. 46. *D. niger*, elytris basi litturaque apicis pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 41.  
*Habitat in Italia, parvus.*
- chrysomelinus*. 47. *D. supra cinereus subtus niger*. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 42.  
*Habitat in Germania, parvus.*
- signatus*. 48. *D. niger*, capite thoraceque rufis: signaturis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 43.  
*Habitat in Patagonia.*
- halensis*. 49. *D. ater*, thorace rufo: baseos medio nigro: puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 44.  
*Habitat in Germania, parvus, planus.*
- palustris*. 19. *D. niger lævissimus*, elytris lituris duabus lateralibus albidis. *Fn. suec.* 775.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 38.  
*Habitat in Europa, thorace ferrugineo.*
- uliginosus*. 20. *D. ater nitidus*, antennis, pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Fn. suec.* 776.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 28.  
*Habitat in Europa.*
- irroratus*. 50. *D. testaceus nigro irroratus*, capite pectoreque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 29.  
*Habitat in America.*
- bimaculatus*. 21. *D. testaceus*, elytris macula nigricante.  
*Habitat in Gallia, magnitudine seminis oryzae, elytris substriatis. Gouan,*

- granula- 22. *D. niger*, elytris lineis duabus flavescens, pedibus  
ris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 296. n. 33. mant. inf. 1. p. 193. n. 45.*  
*Scop. ent. carn. n. 297. Dytiscus minimus.*  
*Habitat in Europæ borealis aquis stagnantibus, pulicis magnitudine.*
- confluens. 51. *D. niger*, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis :  
lineis quatuor disci nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 193. n. 46.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- obliquus. 52. *D. ferrugineus*, elytris maculis quinque obliquis fuscis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 193. n. 47.*  
*Habitat Kilonii, statura granularis.*
- impressus. 53. *D. oblongus* flavescens, elytris cinereis : punctis im-  
pressis striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 193. n. 48.*  
*Schall. Abh. der hall. naturf. Fr. 1. p. 312. Dytiscus impresso-punctatus.*  
*Habitat in Europa.*
- lineatus. 54. *D. ferrugineus*, coleoptris fuscis : lineis flavescens.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 297. n. 34. mant. inf. 1. p. 193. n. 49.*  
*Bergstr. nomencl. 1. p. 32. n. 8. 9. t. 6. f. 8. 9.*  
*Habitat in Alsatia aquis stagnantibus.*
- inæqualis. 55. *D. ferrugineus*, elytris nigris : lateribus inæqualiter  
ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 297. n. 35. mant. inf. 1. p. 193. n. 50.*  
*Habitat in Sueciæ aquis stagnantibus.*
- minutus. 23. *D. elytris* fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo  
immaculato, corpore ovato. *Fn. suec. 778.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 297. n. 36. mant. inf. 1. p. 193. n. 51.*  
*Dytiscus flavescens, elytris fuscis, margine flavo maculato.*  
*Degeer inf. 4. p. 404. n. 18. t. 16. f. 9. Dytiscus ruficollis.*  
*Habitat in Europa.*
- crassicorn- 56. *D. fuscus*, capite thoraceque flavis, antennis medie-  
nis. incrassatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 193. n. 52.*  
*Müll. zool. dan. prodr. n. 779. Dytiscus crassicornis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 193. n. 15.*  
*Degeer inf. 4. p. 402. n. 10. Dytiscus clavicornis.*  
*Habitat in Europa magis boreali, parvus.*

- pictus, 57. *D. ferrugineus*, thorace ferrugineo, elytris pallidis,  
 futura maculaque laterali nigris. *Fabr. mant. inf.* 1.  
 p. 194. n. 53.  
*Habitat in Germania, minutus.*
- pusillus, 58. *D. ater*, thorace elytrisque margine albis. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 297. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 194. n. 54.  
*Habitat in Italia, vix pediculi magnitudine.*
- ovalis, 59. *D. elytris fuscis pallido lineatis*, thorace ferrugineo,  
 abdomine atro. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 19. n. 33.  
*Habitat Upsaliæ, magnitudine nitidulæ aquaticæ, ovato*  
*major.*
- intricatus, 60. *D. flavicans*, supra nigro-virens intricatus, elytris  
 excavato-striatis: margine apice thoraceque flavis.  
*Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 311.  
*Müll. Naturf.* 7. p. 99. *Dytiscus semifulcatus.*  
*Habitat Halæ Saxonum in stagnis, statura & magnitu-*  
*dine punctulati.*
- varicolor, 61. *D. fulvus*, elytris maculis oblongis nigris. *Schall.*  
*Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 313.  
*Habitat Halæ Saxonum in stagnis, ovatus, magnitudine*  
*chrysomelæ nemorum.*
- Schalleri, 62. *D. niger*, capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris  
 fuscis: margine extimo rufo. *Schall. Abh. der hall.*  
*Naturf. Ges.* 1. p. 313.  
*Habitat Halæ Saxonum.*
- laminatus, 63. *D. fulvus*, elytris striatis nigro punctatis, lamine  
 duabus ad basin abdominis. *Schall. Abh. der hall. Na-*  
*turf. Ges.* 1. p. 314.  
*Habitat, rarior, Halæ Saxonum, magnitudine chrysomelæ*  
*nemorum.*
- aciculatus, 64. *D. thoracis elytrorumque margine maculisque tribus*  
*abdominis flavis, elytris striis excavatis decussantibus*  
*abruptis, Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. p. 123.  
 n. 4.  
*Habitat in India, limbato affinis.*
- fusculus, 65. *D. ater*, elytris fuscis lævibus, pedibus obscure  
 testaceis. *Schranck inf. austr.* p. 203. n. 382.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 110.  
*Habitat in Austria superiore.*

- oculatus. 66. *D. capite cinereo : margine posteriori maculisque duabus trigonis frontis nigris, elytris piceis : margine omni flavo. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 125. n. 13. Habitat Berolini, in paludibus, 5 fere lineas longus.*
- ornatus. 67. *D. niger, subtus piceus, ore, maculis elytrorum, & duabus inter oculos rotundis, thorace & antennis ferrugineis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 125. n. 15. t. 28. f. B. Habitat Berolini, 4 lineas longus.*
- unilineatus. 68. *D. niger, elytrorum margine fisso lineaque dimidia flavescens. Schrank inf. austr. p. 204. n. 384. Habitat in Germania.*
- dispar. 69. *D. niger, laevis, ore flavo, elytris variegatis thoraceque piceis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 126. n. 18. Habitat Berolini, 1½–3 lineas longus.*
- sordidus. 70. *D. niger, antennis ferrugineis apice nigris, pedibus piceis, elytris atris. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 126. n. 19. Habitat Berolini, 2 lineas longus.*
- insularius. 71. *D. subtus spadiceus, capite thoraceque luteis, elytris nigris punctatis cancellatis : margine fulvo. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 127. n. 20. Habitat Pomerania, vix 2 lineas longus.*
- aquaticus. 72. *D. spadiceus, oculis, elytris thorace & ventre nigris, thoracis fascia media & margine spadiceis, elytrorum margine obsolete ferrugineo. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 127. n. 21. Habitat Berolini, ultra 2 lineas longus.*
- parvulus. 73. *D. subtus piceus, capite thoraceque fulvis, elytris nigris : margine striisque duabus dimidiatis flavis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 127. n. 22. Habitat Berolini, vix 1½ lineas longus.*
- piceolus. 74. *D. subtus niger, capite thoraceque spadiceis, elytris piceis : margine obsolete fulvo. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 127. n. 23. Habitat Berolini, 3½ lineas longus.*
- simplex. 75. *D. niger, capite, thoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque piceis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 127. n. 24. Habitat Berolini, statura & magnitudine undulati.*

- capricornis- 76. *D. lutescens*, ventre oculisque nigris, antennarum articulis mediis multo lationibus, elytris fuscis punctato-excavatis. *Fuefsli apud Herbst arch. inf. 5. p. 128. n. 25. t. 28. f. C. & b. c.*  
*Habitat Berolini, 2 lineas longus.*
- variolosus- 77. *D. flavescens*, subtus ex fusco luteus, oculis nigris, elytris ex viridi lutescentibus, variegatis. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 5. p. 128. n. 26.*  
*Habitat Berolini, statura & magnitudine capricornis.*
- orbicula- 78. *D. niger*, laevis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace elytrisque ex luteo fuscis pellucidis: maculis obsoletis nigris. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 5. p. 128. n. 27.*  
*Habitat Berolini, vix lineam longus.*
- pedicula- 79. *D. laevis*, subtus thorace elytrisque fuscis, capite nigro, pedibus piceis. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 5. p. 128. n. 28.*  
*Habitat Berolini,  $\frac{1}{2}$  lineam longus.*
- marginellus- 80. *D. niger*, thoracis margine flavo, elytris flavescentibus seriatim punctatis: maculis obsoletis nigricantibus. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 6. p. 129. n. 29.*  
*Habitat Berolini, 1-1 $\frac{1}{2}$  lineam longus.*
- femulinum- 81. *D. niger laevis*, elytris pellucidis spadiceis: apice rubro, pedibus ferrugineis. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 6. p. 129. n. 30.*  
*Habitat Berolini, vix ultra lineam longus.*
- oblongus- 82. *D. obsolete niger*, capite, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbst apud Fuefsli arch. inf. 6. p. 129. n. 31.*  
*Habitat Berolini, fusculo affinis, 2 lineas longus.*
- Zeylanicus- 83. *D. niger*, thorace elytrorumque margine flavo, sterno mutilo. *Gron. mus. 2. p. 164. n. 552.*  
*Habitat in Zeylon.*
- Gronovii- 84. *D. niger laevis*, antennis ferrugineis, capite posterioribus maculis binis rubris. *Gron. mus. 2. p. 164. n. 555.*  
*Habitat - - - an diversus a bipustulato?*
- Scopolii- 85. *D. niger*, thoracis margine lineaque media transversa rufis, elytris testaceis subpellucidis: posterius fascia abrupta punctisque plurimis atris. *Scop. ent. carn. n. 295.*  
*Habitat in Carniola.*



- glaber. 86. *D. fuscus*, elytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis.  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 55. n. 55.*  
*Habitat in Angliæ aquis stagnantibus, striato affinis.*
- nebulosus. 87. *D. lividus nigro-nebulosus*, antennis pedibusque ferrugineis ventre atro : margine ferrugineo. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 56. n. 56.*  
*Habitat in Angliæ aquis stagnantibus, magnitudine uliginosi.*
- exoletus. 88. *D. lividus*, antennis, capite, thorace, abdomine pedibusque pallidis. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 57. n. 57.*  
*Habitat in Angliæ aqua stagnante inter lemnium, cinicis fere magnitudine.*
- danicus. 89. *D. niger*, margine thoracis extimo elytrorumque flavo.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 669.*  
*Habitat in Dania.*
- Mülleri. 90. *D. elytris acuminatis glabris apice bipunctatis.* *Müll. Fn. Friedrichsd. p. 20. n. 194. zool. dan. prodr. p. 71. n. 670.*  
*Habitat in Dania.*
- lacustris. 91. *D. flavicans*, thoracis margine flavo, elytris sparsim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 671.*  
*Habitat in Dania.*
- piceus. 92. *D. niger*, corpore subtus & thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 673.*  
*Habitat in Dania.*
- foetidus. 93. *D. ferrugineus*, supra niger, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 674.*  
*Habitat in Dania.*
- Comma. 94. *D. flavicans*, supra nigro-æneus, elytrorum margine exteriore lineolaque lutescente. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 676.*  
*Habitat in Dania.*
- quadripunctatus. 95. *D. ferrugineus*, elytris nigris : fascia, macula punctifera quatuor albis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 677.*  
*Habitat in Dania.*
- biocellatus. 96. *D. rufus*, elytris æneis : maculis albis longitudinaliter dispositis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 72. n. 768.*  
*Habitat in Dania.*



- erythromelas. 97. *D. niger*, antennis tarsisque rufis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 72. n. 770.  
*Habitat in Dania.*
- fulvus. 98. *D. flavus*, thorace macula media, elytris nigro irroratis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 72. n. 771.  
*Habitat in Dania.*
- fulvipes. 99. *D. nigro-æneus nitidus*, antennis, pedibus, elytrorum apice punctisque duobus ferrugineis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 72. n. 772.  
*Habitat in Dania.*
- quadricolor. 100. *D. ovatus rufus*, thoracis medio nigro, elytris fuscis: margine inferiore punctoque baseos flavis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 780.  
*Habitat in Dania.*
- cimicoides. 101. *D. virens*, elytris virescentibus: margine inferiore maculisque albis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 781.  
*Habitat in Dania.*
- velox. 102. *D. ovatus rufus*, elytris striis octo fuscis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 783.  
*Habitat in Dania.*
- nanus. 103. *D. niger*, thorace anterieus flavo, elytris fulco abrupto, pedibus piceis. Müll. *zool. dan. prodr.* 73. n. 784.  
*Habitat in Dania.*
- rufifrons. 104. *D. niger*, thorace utrinque, elytris basi lateribusque flavis, capite pedibusque rufis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 785.  
*Habitat in Dania.*
- tricolor. 105. *D. rufus*, elytris luteis: disco macula communi nigra sinuata. Müll. *prodr. zool. dan.* p. 73. n. 786.  
*Habitat in Dania.*
- exilis. 106. *D. ovatus niger*, antennis basi pedibusque ferrugineis, elytris lævibus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 788.  
*Habitat in Dania.*
- quadripustulatus. 107. *D. niger*, elytris maculis quatuor flavis, pedibus rufis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 789.  
*Habitat in Dania.*

- flavicans. 108. *D. ater*, supra flavicans, thorace posterius, elytris striis maculisque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 74. n. 790.*  
*Habitat in Dania.*
- ævius. 109. *D. fulvus*, maculis sparatis nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 189. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- umbriatus. 110. *D. fuscus*, elytris antèrius & extèrius flavis. *Geoffr. inf. par. I. p. 190. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- rufipes. 111. *D. ovatus ater*, pedibus antennarumque basi ferrugineis, elytris punctatis subpubescentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 73. n. 782.*  
*Fn. suec. I. n. 568. 2. p. 216. n. 772. b.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 190. n. 9?*  
*Habitat in Europa.*
- gibbus. 112. *D. flavicans*, capite thoraceque virente, elytris obscure lævibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 72. n. 778.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 191. n. 11.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrimaculatus. 113. *D. niger*, thorace flavo, elytris lævibus: maculis limboque luteis. *Geoffr. inf. par. p. 192. n. 13.*  
*Habitat in Gallia.*
- unifstriatus. 114. *D. niger*, elytris maculis & limbo luteis: stria unica. *Geoffr. inf. par. I. p. 192. n. 14.*  
*Habitat in Gallia.*
- bilineatus. 115. *D. elytris fuscis*, corpore subtus fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra. *Degeer inf. 4. p. 400. n. 6.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- feminiger. 116. *D. corpore subtus toto nigro*, thorace elytrisque obscure fuscis: margine rufo. *Degeer inf. 4. p. 401. n. 7.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- nubilus. 117. *D. niger*, supra maculis striisque griseis, pedibus rufo-fulcis. *Degeer inf. 4. p. 403. n. 11.*  
*Habitat in Europa, minutus.*
- hyalinus. 118. *D. virescens*, elytris hyalinis: maculis lateralibus albidis. *Degeer inf. 4. p. 406. n. 14. t. 15. f. 21-23.*  
*Habitat in Europa, 2½ lineas longus, velocissime natans.*

- virescens. 119. *D. testaceus* supra virescens, thoracis elytrorumque marginibus externis flavis, his longitudinaliter striatis, pedibus posterioribus crassioribus. *Mus. Lesk. p. 35. n. 778.*  
*Habitat in Europa.*
- testaceus. 120. *D. testaceus*, thoracis margine anteriori & posteriori fuscis, medio, elytrorum linea suturali atomisque marginalibus lividis. *Mus. Lesk. p. 35. n. 783.*  
*Habitat in Europa.*
- niger. 121. *D. niger*, thoracis margine antico externis latiore, elytrorum marginibus lividis longitudinaliter ferrugineo punctatis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 784.*  
*Habitat in Europa.*
- carbonarius. 122. *D. oblongo-ovatus niger*, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 788.*  
*Habitat in Europa.*
- bilobus. 123. *D. oblongo-ovatus niger*, ore, verticis macula biloba, thorace, elytrorum linea suturali basi marginibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 789.*  
*Habitat in Europa, thoracis disco macula transversa nigra picto.*
- ferrugineus. 124. *D. ferrugineus*, capite thoracisque margine posteriori nigris, illo anterieus, maculis inter oculos duobus, thorace elytrorum linea suturali marginibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 790.*  
*Habitat in Europa.*
- flavus. 125. *D. flavus*, ore, punctis inter oculos duobus, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 791.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 126. *D. ferrugineus*, capite, thorace elytrisque testaceofuscis, maculis inter oculos duobus ferrugineis, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 792.*  
*Habitat in Europa.*
- denigratus. 127. *D. niger*, ore, punctis inter oculos duobus & abdomine luteis: segmentis utrinque macula nigra, elytris fuscis: atomis marginibusque externis lividis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 793.*  
*Habitat in Europa.*

- unipunctatus. 128. *D. ater*, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto testaceo. *Mus. Lesk. p. 36. n. 795.*  
*Habitat in Europa.*
- biguttatus. 129. *D. niger*, pedibus, abdominis apice, antennis, ore, punctis inter oculos duobus, thorace elytrisque testaceis, his fusco maculatis, thoracis medio guttis duabus nigris. *Mus. Lesk. p. 36. n. 796.*  
*Habitat in Europa.*
- ostiomaculatus. 130. *D. lividus*, thorace viridi-livido, elytris fusco-lividis: singulis maculis quatuor connatis striisque brevibus pone medium lividis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 802.*  
*Habitat in Europa.*
- lividus 131. *D. lividus*, capite angusto, thorace anterieus angustiore, elytris punctis fuscis in strias seriatas. *Mus. Lesk. p. 37. n. 805.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrilineatus. 132. *D. niger*, elytris profunde punctatis fuscescentibus: lineis quatuor marginibusque externis flavescens ramosis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 809.*  
*Habitat in Europa.*
- denticulatus. 133. *D. piceus*, ore antennisque ferrugineis, elytris glabris: baseos fascia bidentata, maculis tribus, & margine externo, thorace anterieus pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 810.*  
*Habitat in Europa.*

213. CARABUS. *Antennæ* filiformes.*Palpi* sex: articulo ultimo obtuso, truncato.*Thorax* obcordatus, apice truncatus, marginatus.*Elytra* marginata.\* *maiores.*

- maxillofus. 44. *C. apterus ater*, mandibulis exsertis longitudine capitis, thorace posterius producto bilobo. *Fabr. sp. inf. I. p. 298. n. 1. mant. inf. I p. 194. n. 1.*

- Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 69. Carabus apterus ater*  
 thorace postice producto bilobo unicolore.  
*Voet coleoptr. t. 39. f. 47. 48.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 47. f. 3.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, congenerum maximus.*
- thoracicus. 45. *C. apterus ater*, thorace posterius producto bilobo  
 lateribus elytrorumque marginibus albo-villosis. *Thunb.*  
*nov. inf. sp. 4. p. 69. f. 82. Fabr. mant. inf. 1. p.*  
*195. n. 2. Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 47. f. 3.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, maxilloso proxime affinis.*
- coriaceus. 1. *C. apterus ater opacus*, elytris connatis : punctis im-  
 tricatis subrugosis. *Scop. ent. carn. 265. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 298. n. 2. mant. inf. 1. p. 195. n. 3.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 141. n. 1. Buprestis ater, elytris*  
*rugosis.*  
*Sulz. hist. inf. 1. t. 6. f. 44.*  
*Poda inf. 45.*  
*Pontopp. atl. Dan. 1. t. 29.*  
*Degeer inf. 4. p. 9. n. 4.*  
*Schæff. ic. t. 36. f. 1.*  
*Voet coleoptr. t. 38. f. 43.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 13. f. 7.*  
*Habitat in Germaniæ silvis, inter maximos europæos.*
- variolosus. 46. *C. apterus ater*, elytris punctis variolosis impressis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 195. n. 4.*  
*Habitat in Transylvania, magnus.*
- granulatus. 2. *C. apterus nigricans*, elytris æneis striatis : interjectis  
 punctis elevatis longitudinalibus. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*301. n. 17. mant. inf. 1. p. 197. n. 25.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 668. n. 2. Fn. suec. 780. Carabus*  
*apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis.*  
*Fn. suec. 511. Carabus ater, &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 82. n. 2. Carabus subapterus, &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 143. n. 3. Buprestis niger, &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 2.*  
*Schæff. ic. t. 18. f. 6.*  
*Voet coleoptr. t. 37. f. 31.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 12. f. 4. 5.*  
 β) *Carabus niger*, elytris subvirescentibus convexe punctatis  
 striatisque. *Fn. suec. 512.*

- 7) *Carabus purpurascens-niger*, elytris convexe punctatis striatisque. *Fn. succ.* 513.

*Hufn. inf.* 2. t. 3.

*Habitat in Europæ arvis.*

- hortensis.* 3. *C. apterus niger*, elytris lævibus, punctis æneis excavatis triplici serie, margine cyaneo. *Fn. succ.* 783.  
*Stroem. act. Nidros.* 3. p. 401. t. 6. f. 7. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 16.  
*Degeer inf.* 4. p. 90. n. 5. t. 3. f. 1. *Carabus striatus.*  
*Raj. inf.* p. 96. n. 2. *List. mut.* t. 8. f. 4. *Cerambix purpurea punctata.*

*Schæff. ic.* t. 11. f. 3.

*Voet coleopt.* t. 37. f. 33.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 4. 5.

*Habitat in Europæ hortis & silvis, elytrorum punctis interdum concoloribus.*

- tadatus.* 47. *C. apterus niger*, elytris sublævibus fuscis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 196. n. 17.

*Habitat in America, boreali, statura & magnitudinæ hortensis.*

- arvensis.* 48. *C. apterus nigro-cupreus*, elytris striatis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 196. n. 18.

*Habitat in Germania, statura tadati, at paulo minor.*

- validus.* 49. *C. apterus niger*, elytris crenato-striatis punctisque aureis excavatis triplici serie. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 19.

*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.*

- retusus.* 50. *C. apterus*, elytris striatis virescentibus: punctis æneis excavatis triplici serie, basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 20.

*Habitat ad Patagoniæ littora.*

- Maderæ.* 51. *C. apterus ater*, elytris basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 21.

*Habitat in insula Madera.*

- convexus.* 52. *C. apterus convexus ater* lævis, thoracè posterius emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 22.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 29. f. 2.

*Habitat in Germaniæ silvis.*



- leucophthalmos. 4. *C. elytris lævibus : firiis obsoletis octo. Fn. succ. 784.  
Fabr. sp. inf. 1. p. 304. n. 29. mant. inf. 14. p. 198. n. 41.  
Carabus elatus ater, elytris striatis, thorace canaliculato.  
Degeer inf. 4. p. 96. n. 13. Carabus niger striatus.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 146. n. 7. Buprestis ater, elytris  
singulo striis 8 lævibus, pedibus nigris.  
List. scar. angl. p. 390. n. 23. Scarabæus ex toto niger.  
Schaeff. ic. t. 18. f. 2.  
Bergstr. nomencl. 1. p. 9. n. 13. t. 1. f. 13.*
- β) *Carabus niger. Scall. Abh. der hall. Naturf. Ges. t.  
p. 315.  
Habitat in Europæ quisquiliis frequens, magnitudine varius, thorace, quam in congeneribus, minore.*
- attelaboides. 53. *C. apterus ater, thorace angustiori, capite posteriori  
attenuato, elytris sulcatis truncatis. Fabr. sp. inf. 1.  
p. 305. n. 30. mant. inf. 1. p. 198. n. 42.  
Habitat in Coromandel, magnitudine leucophthalmi.*
- arilineatus. 54. *C. apterus ater, thorace posteriori angustato : marginibus  
albis, elytris albidis : sutura lineaque atris. Fabr. sp.  
inf. 1. p. 305. n. 31. mant. inf. 1. p. 198. n. 43. Thunb.  
nov. inf. sp. 4. p. 71. f. 85. Herbst apud Fuesli arch.  
inf. 8. t. 47. f. 6.  
Habitat in Coromandel, & ad Caput bonæ spei, prioribus minor.*
- cicindeloides. 289. *C. apterus ater, thorace posteriori angustato, elytris  
ovatis planis ferrugineis villosis : margine albo. Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. n. 3. 24.  
Habitat ad Caput bonæ spei, trilineato affinis, at paulo  
major, cicindelæ facie.*
- clathratus. 5. *C. apterus nigricans, elytris æneis porcatis interjectis  
punctis excavatis longitudinalibus. Fn. succ. 782.  
Fabr. sp. inf. 1. p. 302. n. 18. mant. inf. 1. p. 197. n. 197.  
n. 26. Carabus apterus nigricans, elytris æneis striatis  
interjectis punctis excavatis cupreis.  
Habitat in Europa.*
- porcatus. 55. *C. apterus ater, elytris striatis apice granulatis. Fabr.  
sp. inf. 1. p. 302. n. 19. mant. inf. 1. p. 197. n. 27.  
Habitat in nova Hollandia.*
- reflexus. 56. *C. apterus ater, thoracis margine rotundato reflexo  
elytris sulcatis : maculis duabus flavis. Fabr. sp. inf.  
1. p. 302. n. 20. mant. inf. 1. p. 179. n. 28.  
Habitat in Coromandel.*

- angulatus. 57. *C. apterus hirtus ater*, thorace canaliculato, coleoptris sulcatis : fasciis duabus flavis interruptis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 302. n. 21. mant. inf. 1. p. 197. n. 29.*  
*Habitat in Coromandel, reflexo affinis.*
- nitens. 6. *C. apterus*, elytris porcatis : striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Fn. succ. 185.\* It. oel. 96. Scop. ent. carn. 262.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 302. n. 22. mant. inf. 1. p. 197. n. 30.*  
*Carabus apterus*, elytris porcatis scabris viridibus : margine aureo.  
*Degeer inf. 4. p. 91. n. 6. Carabus aureus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 3.*  
*Schaeff. ic. t. 51. f. 1.*  
*Voet coleopt. t. 38. f. 41.*  
*Habitat in Europæ silvis.*
- auratus. 7. *C. apterus*, elytris porcatis : striis sulcisque lævibus inauratis. *Fn. succ. 780.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 301. n. 15. mant. inf. 1. p. 197. n. 23.*  
*Carabus apterus*, elytris auratis sulcatis, antennis pedibusque rufis.  
*Degeer inf. 4. p. 104. n. 1. t. 7. f. 20. Carabus fulcatus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 142. n. 2. t. 2. f. 5. Buprestis viridis, &c.*  
*Raj. inf. p. 96. n. 6. Cerambyx dorso in longas regulas diviso, omnium pulcherrimus.*  
*Schaeff. ic. t. 202. f. 4.*  
*Voet coleopt. 1. t. 36. f. 21.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 12. f. 3. 9.*  
*Habitat in Europæ locis suffocatis, silvis.*
- futuralis. 58. *C. apterus*, elytris striatis viridibus : sutura aurea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 301. n. 16. mant. inf. 1. p. 197. n. 24.*  
*Habitat in Tierra del fuego.*
- violaceus. 8. *C. alatus*, elytris læviusculis nigris : margine aureo, thorace subviolaceo. *Fn. succ. 787.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 299. n. 3. mant. inf. 1. p. 195. n. 5.*  
*Carabus alatus niger*, thorace elytrorumque marginibus violaceis.  
*Degeer inf. 4. p. 89. n. 3. Carabus apterus æneo-niger nitidus.*  
*Raj. inf. p. 96. n. 1. Scarabæus major e purpura nigricans.*  
*List. scar. angl. p. 389. n. 22. Scarabæus maximus e viola nigricans.*

- Frisch inf.* 13. t. 23. *Scarabæus terrestris nigricans*.  
*Schaeff. ic.* t. 3. f. 1. & t. 88. f. 1.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 16. n. 14. t. 2. f. 14. & t. 10. f. 6.  
*Habitat in Europæ silvis passim.*
- purpuraf- 59. *C. apterus ater*, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 195. n. 6.  
*Habitat in Germania, magnus, violaceo affinis.*
- cyaneus. 60. *C. apterus niger violaceo-nitens*, elytris punctis intricatis rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 299. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 7.  
*Fn. suec.* 780. *Carabus (intricatus) violaceo-niger*, elytris intricatis elevato-striatis punctatisque.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 144. n. 4. *Buprestis nigro-violaceus*; elytris dense striatis.  
*Pontopp. atl. Dan.* 1. t. 29.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 7.  
*Voet coleoptr.* t. 37. f. 30.  
*Habitat in Europa boreali, rarior.*
- hispanus. 61. *C. apterus niger*, thorace cyaneo, elytris rugosis aureis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 195. n. 8.  
*Habitat in Hispania, statura cyanei.*
- cephalo- 9. *C. apterus*, elytris atris lævibus, thorace exserto oblongo. *Fn. suec.* 788.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 304. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 198. n. 39. *Carabus apterus ater lævissimus*, thorace orbiculato convexo.  
*Frisch inf.* 13. p. 25. t. 22. *Scarabæus*.  
*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 4.  
*Schaeff. ic.* t. 17. f. 1.  
*Voet coleoptr.* t. 33. f. 2.  
*Habitat in Europa boreali.*
- lævigatus. 62. *C. alatus depressus ater*, thoracis angulis posterioribus rotundatis, thorace elytrisque lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 304. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 198. n. 40.  
*Habitat in Coromandel, majusculus, congeneribus magis planus.*

*Carabi larvæ saepe intra ligna putrida, muscas, terram, &c. degunt, imagines vero insectorum, imprimis larvarum sones sunt, cursu festinantes.*

- decem-  
guttatus. 10. *C. apterus ater*, thorace angustato, coleoptris novemfulcatis: punctis decem albis. *Mus. Lud. Ulr.* 96.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 299. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 9. *Forsk. Fn. arab.* p. 77. n. 4? *Carabus ferrator*.  
*Habitat in Africa, maximus.*
- sexgutta-  
tus. 63. *C. apterus* thorace posterius angulato, elytris lævibus atris: punctis duobus griseis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 10.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 4. p. 70. f. 84. *Carabus apterus ater*, thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoso-albis.  
*Habitat in Surate.*
- sexmacu-  
latus. 64. *C. apterus ater*, thorace posterius angustato: margine albo, elytris substriatis: maculis tribus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 196. n. 11.  
*Habitat in Barbaria, sexguttato fere duplo major.*
- quadrigut-  
tatus. 65. *C. apterus*, thorace posterius attenuato, elytris sulcatis: maculis duabus griseis remotis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 12.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- tabidus. 66. *C. apterus ater*, thorace posterius angustato, elytris rugoso-sulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 13.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- variega-  
tus 67. *C. apterus ater*, elytris planis lævibus: margine sinuato punctisque disci albis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 501. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 14.  
*Forsk. ic. anim. t.* 24. f. A. *Cicindela*.  
*Habitat in Oriente, mediæ magnitudinis.*
- gemma-  
tus. 68. *C. apterus niger*, elytris striatis: punctis æneis bilobis excavatis triplici serie. *Fab. sp. inf.* 1. p. 300. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 15.  
*Habitat Hamburgi, statura hortensis.*
- inquisitor. 11. *C. alatus*, elytris striatis viridi-æneis: punctis triplici ordine. *Fn. succ.* 789.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 303. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 31.  
*Roland. aet. Stockh.* 1750. p. 292. t. 7. f. 3. *Carabus alatus viridi-æneus*, concave punctatus striatusque, pedibus antennisque nigris,

*Degeer inf.* 4. p. 94. n. 9. *Carabus alatus*, elytris striatis margine æneis, &c.

*Geoffr. inf. par.* 1. 145. n. 6. *Buprestis elytris latis*, sin-  
gulo striis sedecim.

*Voet coleoptr.* t. 38. f. 39.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 12. f. 3.

*Habitat in Europæ locis suffocatis, elytris rarius totis nigris.*

scrutator. 69. *C. alatus*, elytris striatis viridibus: punctis triplici serie,  
thorace cyaneo: margine reflexo aurato. *Fabr. sp. inf.*

*I. p.* 303. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 32.

*Habitat in Virginia.*

reticulatus. 70. *C. alatus niger*, elytris reticulatis viridi-æneis, thorace  
cis margine virescente. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 197. n. 33.

*Habitat in Europa, statura & magnitudine inquisitoris.*

sycophanta. 12. *C. aureo-nitens*, thorace cæruleo, elytris aureo-viridi-  
bus striatis, thorace subatro. *Mus. Lud. Ulr.* 95. \* *Fn.*  
*suec.* 795. \*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 303. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 34.

*Carabus alatus violaceo-nitens*, elytris striatis aureis.

*Degeer inf.* 4. p. 105. n. 2. t. 17. f. 19.

*Podæ inf.* 46.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 144. n. 5.

*Reaum. inf.* 2. t. 37. f. 18.

*Rob. jun. t.* 20. f. 2.

*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 1.

*Schæff. elem. t.* 2. f. 1.

*icon. t.* 66. f. 6.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 12. f. 1. 2.

*Voet coleoptr.* t. 37. f. 32.

β) *Carabus punctato-fulcatus*. *Müll. zool dan. prodr.* p. 357.  
n. 12. t. 7. f. 14.

*Habitat in Europa, maximus europæorum.*

*Larva nigra, noctu larvas phalænarum devastat.*

indagator. 71. *C. apterus ater*, thoracis, margine rotundato, elytris  
lævissimis: punctis æneis triplici serie. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 197. n. 35.

*Habitat in Barbaria, sycophantæ propior quam hortensi.*

rostratus. 72. *C. apterus*, elytris lævibus nigris, thorace angustiore,  
capite angustissimo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 304. n. 26.  
*mant. inf.* 1. p. 198. n. 36.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 577. n. 20. *Fn. suec.* 123. *Tenebrio rostratus.*

*Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria elytris deflexis ad tenebriones accedens.*

- elevatus.* 73. *C. apterus*, thoracis margine rotundato deflexo, elytris violaceis, corpore atro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 198. n. 37.*

*Habitat in America meridionali, magnitudine & statura rostrati.*

- unicolor.* 74. *C. apterus*, thoracis margine rotundato reflexo, corpore atro, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 198. n. 38.*  
*Habitat in America meridionali, elevato proxime affinis.*

- imbriatus.* 75. *C. apterus ater*, thorace simplici: lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentosis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70. f. 83. Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 47. f. 1.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, lævis, magnitudine thoracici.*

- alacer.* 76. *C. apterus ater immaculatus*, thorace posterius rotundato fulcato. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, sinbiato proxime affinis.*

- spinosus.* 77. *C. apterus ater*, elytris octo-fulcatis punctato-rugosis, posterius spinosis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70. Voet coleopt. 1. t. 38. f. 44. 45.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, leucophthalmi magnitudine, glaber.*

- lunulatus.* 78. *C. apterus ater*, thorace lunato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72 f. 86.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glaber, magnitudine violacei, at latior & magis depressus.*

- difformis.* 79. *C. apterus ater*, thorace transverso posterius truncato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72.*  
*Habitat in interioribus regionibus pone Caput bonæ spei sitis, statura & magnitudine hortensis.*

- dorsalis.* 80. *C. ater*, antennis elytrisque rubris: margine nigro. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 73.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glaber, magnitudine fere leucophthalmi.*

- obtus.* 81. *C. thorace elytrisque fuscis, capite antennis pedibusque rubris.* *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 74.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine fere cephalotis, crepitanti similis.*



- adspersus. 82. *C. apterus*, supra viridi-æneus obscurus, subtus niger, elytris punctis excavatis, aureis quadruplici ordine sulcisque elevatis.  
*Degeer inf. 4. p. n. 1. t. 3. f. 12.* *Carabus æneo-punctatus.*  
*Voet coleoptr. 1. t. 37. f. 35.*  
*Habitat in Europæ silvis, sub cespite; elytris interdum nigris.*
- Herbstii. 83. *C. elytris transversim undulatis: punctorum aureorum ordine triplici.* *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 131. n. 15.*  
*Habitat in Germania, inquisitori simillimus, sed major, pollicem longus, nunc virescens, nunc niger.*
- pomcranus. 84. *C. cupreus* subtus niger, elytris decussatim striatis: punctorum elevatorum serie triplici. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 132. n. 16.*  
*Habitat in Pomerania, granulato affinis, 9 fere lineas longus.*
- cylindricus. 85. *C. ater cylindricus*, thorace angustato, medio sulcato, elytris novemsulcatis: margine exteriori punctato.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 132. n. 17. t. 29. f. 3.*  
*Habitat - - - ultra 9 lineas longus.*
- problematicus. 86. *C. apterus niger cæruleo-nitens*, elytris obsolete striatis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. p. 177. n. 67. t. 47. f. 5.*  
*Habitat in Austria, cyaneo intricatoque affinis, at brevior & latior.*
- nemoralis. 87. *C. niger*, elytris æneis: lineolis intricatis subrugosis punctisque excavatis triplici serie. *Müll. zool. dan. prodr. p. 75. n. 809. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 211.*  
*Habitat in Dania; an vere distincta species?*
- rubicundus. 88. *C. apterus*, subtus niger, thorace violaceo, elytris rubicundis: futura atque marginibus albis. *Lepech. it. 2. p. 195. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in Russiæ fissuris montium.*
- catenulatus. 89. *C. elytris porcatis: punctorum elevatorum triplici serie tribus stitiis elevatis scabriusculis decussata.* *Scop. ent. carn. n. 264.*  
*Habitat in Carniola & Helvetia.*
- atomarius. 228. *C. apterus ater glaber*, elytris sublævibus: punctis minutissimis sparsis confluentibus, marginibusque subviolaceis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 818.*  
*Habitat in Europa.*

*belliarius*. 229. *C. apterus ater*, elytris marginibus externis violaceo-  
æneis punctisque elevatis sparsis. *Mus. Lesk.* p. 37.  
n. 819.

*Habitat in Europa.*

*rugosus*. 230. *C. apterus ater*, elytris rugosis: rugis alternis confuse  
fractis. *Mus. Lesk.* p. 37. n. 820.

*Habitat in Europa.*

*ærugino-*  
*sus*. 231. *C. apterus ater*, elytris confertim striatis: punctorum  
impressorum viridum serie triplici. *Mus. Lesk.* p. 37.  
n. 823.

*cyprius*. 232. *C. apterus niger*, capite, thorace elytrisque cupreis:  
his rugis quatuor singulis triplici punctorum elevato-  
rum serie discretis. *Mus. Lesk.* p. 38. n. 824.

*Habitat in Europa.*

\* \* *minores.*

*ater*. 90. *C. niger*, antennis pedibusque rufescentibus, elytris  
lævibus. *Thunb. nov. inf. sp. 4.* p. 73.

*Habitat ad Caput bonæ spei sub lapidibus montium, mag-  
nitudine vulgaris, subius piceus, oblongus.*

*capensis*. 91. *C. ferrugineus*, thorace elytrorumque futura linea lon-  
gitudinali nigra. *Thunb. nov. inf. sp. 4.* p. 75. f. 83.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura marginati, sed paulo  
minor, glaber, abdomine nunc nigro, nunc ferrugineo.*

*fasciatus*. 92. *C. ferrugineus fascia elytrorum nigra.* *Thunb. nov. inf.  
sp. 4.* p. 75. f. 89.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, quadrimaculato affinis.*

*striatulus*. 93. *C. niger*, thoracis basi utrinque puncto impresso, elytris  
striatis medio glabris. *Fabr. sp. inf. 1.* p. 305. n. 32.  
*mant. inf. 1.* p. 199. n. 44.  
*Habitat ad Patagoniæ littora*

*caliginosus*. 94. *C. ater*, thorace quadrato lævi, antennis piceis. *Fabr.  
sp. inf. 1.* p. 305. n. 33. *mant. inf. 1.* p. 199. n. 45.  
*Habitat in America, capitis punctis duobus impressis.*

*arenarius*. 95. *C. pallidus*, elytris maculis duabus dorsalibus atris.  
*Fabr. sp. inf. 1.* p. 305. n. 34. *mant. inf. 1.* p. 199.  
n. 46.

*Habitat in Cambriæ arena mobili.*

- fabulosus. 96. *C. pallidus*, capite coleoptrorumque macula dorsali nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 47.*  
*Habitat in Saxonix Jabuletis, arenario affinis.*
- ruficornis. 97. *C. ater*, elytris fulcatis lævibus, antennis pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 305. n. 35. mant. inf. 1. p. 199. n. 48.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 146. n. 8. Buprestis niger, &c. List. scarab. angl. p. 390. n. 24. Scarabæus niger, pedibus corniculisque croceis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 843. Carabus cursor.*  
*Habitat in Europæ silvis, frequens.*
- bicolor. 98. *C. supra niger*, subtus ferrugineus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 36. mant. inf. 1. p. 199. n. 49.*  
*Habitat in America boreali.*
- flavicornis. 99. *C. niger*, thoracis margine antennis pedibusque flavescens. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 50.*  
*Habitat Halæ Saxonum, mediæ magnitudinis.*
- buprestoides. 13. *C. niger*, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piceis.  
*Habitat in Europa australi, mediæ magnitudinis.*
- fastigiatus. 14. ferrugineus, abdomine elytrisque fastigiatis nigris. *Mus. Lud. Ulr. 97.\**  
*Habitat ad Caput bonæ spei. Tulbagh.*
- lividus. 15. *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. Fn. succ. 791.\**  
*Habitat in Europa.*
- marginatus. 16. *C. niger*, elytris margine tibiisque testaceis. *Fn. succ. 804. Fabr. sp. inf. 1. p. 310. n. 61. mant. inf. 1. p. 202. n. 84.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 162. n. 41. Buprestis viridis, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis.*  
*Pontopp. atl. Dan. 1. t. 29.*  
*Habitat in Europa, aliquando viridis.*
- cinctus. 100. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi-æneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 310. n. 62. mant. inf. 1. p. 202. n. 85.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. t. 29. f. 7.*  
*Habitat in Coromandel, marginato major.*

- pallipes*. 101. *C. ater*, thoracis rotundati coleoptrorumque limbo & pedibus pallidis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 202. n. 86.*  
*Habitat in America, marginato minor.*
- umbatus*. 102. *C. supra ferrugineus*, thorace macula, elytris fasciis undatis viridi-æneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 310. n. 63.*  
*mant. inf. 1. p. 202. n. 87.*  
*Herbst Besch. der berl. naturf. Ges. 4. t. 7. f. 4.*  
*Habitat in Germania sub lapidibus.*
- fulgidulus*. 103. *C. niger* elytrorum margine æneo nitido. *Fabr. mant. inf. 1. p. 202. n. 88.*  
*Habitat in Camtschatka, statura & magnitudine cuprei.*
- complanatus*. 17. *C. pallidus*, elytris fasciis duabus undulatis nigricantibus.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 41. mant. inf. 1. p. 200. n. 57.* *Carabus* thorace orbiculato, rufus, elytris fasciis duabus nigris.  
*Habitat in insula S. Dominici.*
- micornis*. 104. *C. thorace rotundato*, elytris striatis punctisque impressis, antennis pilosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 307. n. 48.*  
*mant. inf. 1. p. 200. n. 65. Lesk. it. p. 18. t. A. f. 7.*  
*Habitat in Anglia, nunc niger, nunc æneus.*
- spinibarbis*. 105. *C. cyaneus*, thorace orbiculato, ore antennis tibiisque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 307. n. 47. mant. inf. 1. p. 200. n. 64.*  
*Habitat in Anglia.*
- sexpustulatus*. 106. *C. rufus*, elytris nigris: punctis sex rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 307. n. 46. mant. inf. 1. p. 200. n. 63.*  
*Habitat in America meridionali.*
- maculatus*. 107. *C. niger*, fascia communi flava interrupta, antennis pedibusque testaceis. *Mant. p. 532.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 307. n. 45. mant. inf. 1. p. 200. n. 62.* *Carabus niger*, capite elytrisque truncatis puncto baseos fasciaque media ferrugineis.  
*Sulz. hist. inf. 1. 7. f. 5.*  
*Voet. coleoptr. t. 34. f. 10. II.*  
*Habitat in India, thorace mox flavo, mox nigro, mox maculato.*
- crepitans*. 18. *C. thorace capite pedibusque ferrugineis*, elytris nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 307. n. 44. mant. inf. 1. p. 200. n. 61.*

*Degeer inf.* 4. p. 103. n. 22. t. 3. f. 18. Carabus alatus ferrugineus, &c.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 151. n. 19. Buprestis capite, thorace pedibusque rubris, &c.

*Rol. aët. Stockh.* 1750. p. 292. t. 7. f. 2. Cicindela capite, thorace pedibusque rubris, &c.

*Schaeff. ic.* t. 11. f. 13.

*Voet coleoptr.* 1. t. 36. f. 26.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 13. f. 9.

Habitat in Europæ nemoribus, persequentes carabos majores crepitu ventris pellens.

fumans. 108. C. ferrugineus, elytris nigro-cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 307. n. 43. mant. *inf.* 1. p. 200. n. 60.

Habitat in America, crepitanti affinis, at triplo major.

lateralis. 109. C. niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 200. n. 59.

Habitat Kilonii, statura & magnitudine americani.

americana- 19. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 306. n. 42. mant. *inf.* 1. p. 200. n. 58.

nus.

*Degeer inf.* 4. p. 107. n. 3. t. 17. f. 21.

Habitat in America, crepitanti similis, sed quadruplo major.

spinipes. 20. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, marginibus spinosis. *Fn. suec.* 793. *Scop. ent. carn.* 267.

Habitat in Europa, super tritici spicas frequens.

cyanocéphalus. 21. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. suec.* 794. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 310. n. 65. mant. *inf.* 1. p. 203. n. 90.

*Fn. suec.* 525. Carabus capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

*Degeer inf.* 4. p. 100. n. 17. t. 3. f. 17. Carabus alatus, capite elytrisque viridi-cæruleis, &c.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 149. n. 40. Buprestis capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

*Raj. inf.* p. 89. n. 1. Cantharis elytris & capite cæruleis, scopulis croceis.

*Schaeff. ic.* t. 10. f. 14.

Habitat in Europæ silvis.

ruficollis. 110. C. thorace obcordato ferrugineo, elytris truncatis strigatis viridibus, capite plano auro. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 203. n. 91.

Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.

- amethystinus. III. *C. cyaneus*, capite thoraceque æneis nitidis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 203. n. 92.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine cyanocephali.*
- flexuosus. III2. *C. niger*, elytris ferrugineis: macula media finuata punctoque apicis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 311. n. 66.*  
*mant. inf. 1. p. 203. n. 93.*  
*Habitat in India.*
- melanocephalus. 22. *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. Fn. suec. 795.\**  
*Fn. suec. 1. n. 526. Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 310. n. 64. mant. inf. 1. p. 202. n. 89.*  
*Carabus niger, thorace pedibusque ferrugineis.*  
*Voet coleoptr. 1. t. 35. f. 15.*
- β) *Fn. suec. 524. Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.*  
*Degeer inf. 4. p. 93. n. 8. Carabus apterus niger nitidus, &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 162. n. 42. Buprestis nigro, &c.*  
*Habitat in Europæ locis suffocatis.*
- vaporariorum. 23. *C. thorace fusco, pedibus antennis elytrisque anterioribus & apice ferrugineis. Fn. suec. 796.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 312. n. 76. mant. inf. 1. p. 205. n. 110.*  
*Fn. suec. 1. n. 529. Carabus ater, elytris antice griseis.*  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 78. n. 850. Carabus nigricans, antennis, thorace, pedibus elytrisque antice ferrugineis.*  
*Voet coleoptr. 1. t. 35. f. 18.*  
*Habitat in Europa, frequens, meridiano quadruplo major.*
- latus. 24. *C. niger*, elytris striatis crenatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec. 521.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 308. n. 54. mant. inf. 1. p. 201. n. 73.*  
*Degeer inf. 4. p. 101. n. 18. Carabus alatus niger nitidus, &c.*  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 7.*  
*Habitat in Europa frequens.*
- abdominalis. III3. *C. niger*, antennis, abdominis disco pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 201. n. 74.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine lati.*
- lineola. III4. *C. thorace subæquali ferrugineus, elytris lineola nigra.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 309. n. 55. mant. inf. 1. p. 201. n. 75.*  
*Habitat in America septentrionali.*



- ferrugi- 25. *C. ferrugineus*, thorace glaberrimo. *Fn. suec.* 798.  
neus, *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 56. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 76. *Carabus ferrugineus elytris striatis obscurioribus.*  
*Degeer inf.* 4. p. 101. n. 19. *Carabus alatus flavo-  
seus nitidus*, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 162. n. 43. *Buprestis ferruginea  
lividus*, &c.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 29. f. 6. c.  
*Habitat in Europæ arvis.*
- pallens. 115. *C. pallidus*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 57. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 77.  
*Habitat Dresdæ, an satis distinctus a ferrugineo?*
- dorsiger. 116. *C. ferrugineus abdomine coleoptrorumque lunula lat  
nigris.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 201. n. 78.  
*Habitat in Barbaria, statura pallentis.*
- germanus. 26. *C. cyaneus*, capite, pedibus elytrisque testaceis  
elytris apice violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 317. n. 71. *mant. inf.* 1. p. 204. n. 102.  
*Schæff. ic. t.* 31. f. 13.  
*Habitat in Germania, interdum niger.*
- vulgaris. 27. *C. nigro-æneus*, antennis pedibusque nigris. *Fn. suec.* 799. *Scop. ent. carn.* 268. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 308. n. 52. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 70.  
*Degeer inf.* 4. p. 97. n. 14. *Carabus alatus supra virid  
æneus nitidus*, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 158. *Buprestis fusco-æneus.*  
*Schæff. ic. t.* 18. f. 2.  
*Habitat in Europæ silvis frequens.*
- azureus. 117. *C. cyaneus*, antennis pedibusque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 508. n. 53. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 71.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 3.  
*Habitat in Lipsiæ collibus arenosis.*
- erythro- 118. *C. niger*, capite rufo, antennis pedibusque flavo-  
cephalus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 201. n. 72.  
*Habitat Kilonii, mediæ magnitudinis.*
- cærulef- 28. *C. nigro-cæruleus*, antennis basi rubris. *Fn. suec.* 800.  
cens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 308. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 200. n. 66. *Carabus nigro-cæruleus, elytris striatis.*  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 76. n. 817. *Carabus vires*  
*Schæff. ic. t.* 18. f. 3. 4.  
*Habitat in Europæ hortis, viis.*

- lepidus*. 119. *C. viridi-æneus*, thorace quadrato posterius utrinque biftriato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 200. n. 67. Lesk. it. 1. p. 17. n. 8. t. A. f. 6.*  
*Habitat in Lusatix arenosis, magnitudine & statura cærulescentis.*
- cupreus*. 29. *C. cupreus*, antennis basi rubris. *Fn. suec. 801. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 308. n. 50. mant. inf. 1. p. 201. n. 68. Degeer inf. 4. p. 97. n. 13. t. 3. f. 15. Carabus alatus supra viridi-æneus, &c. Geoffr. inf. par. 1. p. 161. n. 40. Buprestis totus viridi-cupreus, antennis nigris.*  
*Habitat in Europæ silvis.*
- Carnifex*. 120. *C. alatus viridi-æneus*, antennis pedibusque rufis, thorace angustato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 308. n. 51. mant. inf. 1. p. 201. n. 69.*  
*Habitat in Tierra del fuego.*
- piceus*. 30. *C. niger*, pedibus antennisque piceis. *Fn. suec. 802. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 37. mant. inf. 1. p. 199. n. 51. Carabus thorace obcordato, antennis tibialisque piceis, elytris striatis. Gron. zooph. 501. Carabus apterus niger. Schaeff. ic. t. 18. f. 9.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- holosericeus*. 121. *C. holosericeo-niger*, capite æneo nitido. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 52.*  
*Habitat Kilonii, statura picei.*
- femoralis*. 122. *C. capite thoraceque æneis, elytris striatis obscurioribus, femoribus rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 38. mant. inf. 1. p. 199. n. 53.*  
*Habitat in Sierra Leon, Africa.*
- madidus*. 123. *C. niger*, thorace posterius utrinque impresso, femoribus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 39. mant. inf. 1. p. 199. n. 54.*  
*Habitat in Anglia.*
- binotatus*. 124. *C. ater*, capite punctis duobus frontalibus rubris, antennis basi flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 55.*  
*Habitat Kilonii, statura & magnitudine ruficornis.*

- interrup- 125. *C. ater*, thorace posterius rotundato abdomineque  
tus. remotis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 306. n. 40. mant. *inf.* 1. p. 200. n. 56.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 29. f. 4. a.  
*Habitat in Oriente, an forte tenebrio?*
- velox. 31. *C. nigricans*, pedibus tibiisque pallidis. *Fn. succ.* 803.  
*It. gotl.* 207.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 72. mant. *inf.* 1. p. 204. n. 103.  
*Carabus nigricans*, antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis.  
*Habitat in Europæ arena volatili, agilissimus.*
- rufescens. 126. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, vertice anoque  
nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 73. mant. *inf.* 1. p. 204. n. 104.  
*Habitat in Anglia.*
- viridanus. 127. *C. viridi-æneus*, elytris ferrugineis: macula communi nigro-ænea. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 204. n. 105.  
*Habitat in Germaniæ quisquiliis, statura c. vaporariorum, thorace interdum nigro.*
- bipustula- 128. *C. thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis*  
tus. duabus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 74. mant. *inf.* 1. p. 204. n. 106.  
*Habitat in Anglia.*
- æquinoc- 129. *C. flavus*, thorace cordato, elytris fuscis: maculis  
rialis. duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 75. mant. *inf.* 1. p. 204. n. 107.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 29. f. 8. d.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus.*
- lunatus. 130. *C. niger*, capite thoraceque viridi-æneis, elytris  
flavis: maculis tribus nigris. *Fabr. syst. ent.* p. 247. n. 60. mant. *inf.* 1. p. 204. n. 108.  
*Habitat in - - -*
- prasinus. 131. *C. niger*, capite thoraceque viridi-æneis, elytris  
macula magna communi posteriore nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 204. n. 109.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 4. p. 74. f. 87. *Carabus thorace capiteque cyaneis, elytris rubris: postice macula communi fusca.*  
*Habitat Hafniæ & ad Caput bonæ spei, statura c. vaporariorum, at paulo major.*

- multipunctatus. 32. *C. subæneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis.  
*Fn. suec.* 805. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 58. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 79.  
*Habitat in Europæ sabulosis.*
- hafnienfis. 132. *C. niger*, elytris striatis : punctis dorsalibus plurimis impressis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 202. n. 80.  
*Habitat Hafniæ, mediæ magnitudinis.*
- æneus. 133. *C. ferrugineus*, thorace elytrisq; æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 59. *mant. inf.* 1. p. 202. n. 81.  
*Habitat in Liphæ hortis.*
- nigricornis. 134. *C. niger*, thorace cupreo, elytris striatis viridibus, pedibus piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 202. n. 82.  
*Habitat in Dania, statura sexpunctati, at paulo major.*
- bipunctatus. 33. *C. subæneus*, elytris punctis duobus impressis. *Fn. suec.* 806.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 313. n. 86. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 121.  
*Carabus æneus, antennis nigris, tibiis pallidis.*  
*Habitat in Europæ quisquiliis.*
- angustatus. 135. *C. thorace cylindrico cyaneo*, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 205. n. 122.  
*Habitat in Germania, parvus, an hujus generis?*
- quadripunctatus. 34. *C. capite ferrugineo*, thorace atro, elytris maculis duabus flavis. *Fn. suec.* 811. \*  
*Habitat in Europa.*
- sexpunctatus. 35. *C. subæneus*, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Fn. suec.* 807. \*  
*Fn. suec.* 1. n. 519. *Carabus nitens*, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 60. *mant. inf.* 1. p. 202. n. 83.  
*Carabus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.*  
*Degeer inf.* 4. p. 99. n. 16. *Carabus alatus*, capite thoraceque viridi-aureis, &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 149. n. 14. *Buprestis nitens*, capite thoraceque viridibus, &c.  
*Goed. inf.* 2. p. 126. t. 31.  
*Schæff. ic.* t. 66. f. 4.  
*Voet coleoptr.* 1. t. 33. f. 4.  
*Habitat in Europa & boreali America.*

- meridia- 36. *C. niger*, elytris anterieus pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 77. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 111.  
nus. *Habitat in Europa, parvus.*
- Comma. 136. *C. niger*, thorace fusco, elytris griseis: macula lineari nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 312. n. 78. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 112.  
*Habitat in America.*
- testaceus. 37. *C. pallide testaceus*, elytris glabris. *Fn. suec.* 812. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 313. n. 84. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 113.  
Carabus capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 153. n. 25. *Buprestis testaceus*, capite nigro.  
*Habitat in Europa.*
- abbrevia- 137. *C. thorace rotundato rufo*, elytris abbreviatis testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 313. n. 85. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 20.  
tus. *Habitat in Norwegiæ rupibus.*
- ustulatus. 38. *C. thorace nigro*, elytris obscuris pallido-bifasciatis. *Fn. suec.* 810. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 313. n. 81. *mant. inf.* 1. p. 205. n. 115.  
*Fn. suec.* 528. Carabus niger, coleoptris pone fascia ferruginea; lateribus macula ferruginea.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 151. n. 20.  
*Voet coleopt. r.* 1. t. 34. f. 7.  
*Habitat in Europæ quisquilis, maculis interdum magnis obsoletis rubro-pallidis variis.*
- kilonien- 138. *C. thorace rotundato nigro*, coleoptris pallidis: macula magna dorsali nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 205. n. 116.  
fis. *Habitat Kilonii, parvus.*
- Crux major. 39. *C. thorace capiteque nigro-rubescente*, coleoptris ferrugineis: cruce nigra. *Fn. suec.* 808.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 311. n. 67. *mant. inf.* 1. p. 203. n. 94.  
Carabus thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis rubris, cruce nigra.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 150. n. 18.  
*Schaeff. ic. t.* 1. f. 13.  
*Habitat in Europæ silvis.*
- vittatus. 139. *C. thorace marginato rufo*, elytris atris: vitta alba. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 311. n. 68. *mant. inf.* 1. p. 203. n. 95.  
*Habitat in America boreali,*

- turcicus. 140. C. thorace orbiculato rufo, elytris nigris: lunula bascos pallida. *Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 96.*  
*Habitat* --- *statura & magnitudine vittati.*
- hemorrhoidalis. 141. C. thorace suborbiculato, elytris nigris apice rufis.  
*Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 97.*  
*Habitat* Dresdæ, rufus.
- picipes. 142. C. ater nitidus, thorace rotundato, elytris fuscis, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 98.*  
*Habitat* in Suecia, parvus, oblongus, agilis.
- agilis. 143. C. rufus, thorace rotundato, elytris abdomineque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 204. n. 99.*  
*Habitat* Upsaliæ, *statura vittati.*
- Crux minor. 40. C. thorace luteo glabro, elytris posterius nigris: maculis duabus flavis. *Fn. succ. 809.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 311. n. 69. mant. inf. I. p. 204. n. 100.* Carabus thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, macula rufa.  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 18. f. 8. & t. 41. f. 13.*  
*Habitat* in Europa, præsertim Anglia.
- Andrææ. 144. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: fascia media nigra. *Fabr. mant. inf. I. p. 311. n. 70. mant. inf. I. p. 204. n. 101.*  
*Habitat* in Italia, *statura c. crucis minoris.*
- quadrimaculatus. 41. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtusissimis fuscis: maculis duabus albis. *Fn. succ. 813.\** *Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 79. mant. inf. I. p. 205. n. 113.*  
*Fn. succ. I. n. 532.* Carabus niger, thorace ferrugineo, elytrorum maculis 4 lividis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 152. n. 24.* Buprestis niger, thorace plano ferrugineo, &c.  
*Pontopp. atl. Dan. I. t. 29.*  
*Habitat* in Europæ quisquiliis.
- quadriguttatus. 145. C. thorace rotundato atro, elytris nigris: punctis quatuor albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 80. mant. inf. I. p. 205. n. 114.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. t. 29. f. 9. e.*  
*Habitat* in Anglia.



- atricapillus.** 42. *C. flavus*, capite nigro, elytris obtusissimis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 313. n. 82. mant. inf. 1. p. 205. n. 117.*  
*Carabus thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis,*  
*capite atro.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. t. 29. f. 10. f?*  
*Habitat in Europa boreali.*
- biguttatus.** 146. *C. capite rotundato æneo, elytris nigris: macula*  
*apicis pallida. Fabr. sp. inf. 1. p. 313. n. 83. mant. inf.*  
*1. p. 205. n. 118. Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 76.*  
*Habitat in Norwegia, sub arborum corticibus, in Suecia,*  
*& ad Caput bonæ spei, pediculo duplo major.*
- truncatellus.** 43. *C. niger*, supra æneus, elytris apice subtruncatis.  
*Fn. suec. 814.\**  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 206. n. 123. Carabus thorace*  
*rotundato, supra obscure æneus, subtus ater.*  
*Habitat in Europæ quisquiliis; parvus.*
- Thunbergii.** 147. *C. elytris testaceis; macula communi violacea, capite*  
*thoraceque nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 20. n. 34.*  
*Habitat Upsaliæ, cærulescentis magnitudine, c. vaporis*  
*rriorum affinis.*
- upsalicnsis.** 148. *C. elytris viridibus striatis, thorace plano æneo*  
*punctato. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 20. n. 35.*  
*Habitat Upsaliæ, vulgaris magnitudine, cupreo affinis, et*  
*thorace punctato distinctus.*
- sericeus.** 149. *C. ater*, capite thorace & elytris viridi-nitentibus, antennis  
*pedibusque rufis. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 58. n. 58.*  
*Habitat in America septentrionali, spinipede paulo major.*
- lineatus.** 150. *C. thorace ferrugineo, pedibus elytrisque griseis;*  
*futura linea communi alteraque media nigra, tarsis*  
*nigris. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 59. n. 59.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine crucis*  
*minoris.*
- marchicus.** 151. *C. subtus niger, capite thoraceque castis, palpis*  
*antennisque fuscis basi ferrugineis. Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf. 6. p. 137. n. 38.*  
*Habitat Berolini, germano affinis.*
- Schranckii.** 152. *C. viridi-æneus, abdomine nigro, pedibus antennis-*  
*que pallide rufis. Schranck inf. austr. p. 213. n. 401.*  
*Habitat in Germania, 5 lineas longus.*

- radicus.* 153. *C. niger*, antennis apice griseis, thorace linea impressa, elytris septemfulcatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 138. n. 40. t. 29. f. 11.*  
*Habitat in India, 9 lineas longus.*
- splendens.* 154. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi-æneis, pedibus pallidis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 138. n. 41.*  
*Habitat in India, cincto proxime affinis, an satis distinctus?*
- marginellus.* 155. *C. piceus*, pedibus spinulosis, antennis thoracisque margine flavescentibus, elytris octosfriatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 138. n. 42.*  
*Habitat in India, angustus, 7½ lineas longus.*
- Prischii.* 156. *C. niger*, thoracis sulco unico medio, elytrorum octo. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 138. n. 43.*  
*Habitat Berolini, 8-9 lineas longus, oculis albis.*
- varius.* 157. *C. supra nigro-æneus* subtus niger, corpore ovato brevi, thorace convexo, elytris lævibus, antennis brevibus. *Degeer inf. 4. p. n. 15.*  
*Habitat in Europa, 3. circiter lineas longus.*
- Herbstii.* 158. *C. niger*, antennis thoracisque glaberrimi margine anteriori ferrugineis, pedibus piceis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 138. n. 45.*  
*Habitat Berolini.*
- Mülleri.* 159. *C. æneo-niger*, elytris punctato-striatis: punctis tribus impressis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 139. n. 46.*  
*Müll. 1001. dan. prodr. n. 842. Carabus sexpunctatus.*  
*Habitat in Europa, 3 lineas longus.*
- obscurus.* 160. *C. niger*, subtus badius, elytris fuscis: striis 8 punctatis, antennis pedibusque luteis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 139. n. 47. t. 29. f. 12. g.*  
*Müll. 1001. dan. prodr. n. 819.*  
*Habitat in Europa.*
- Pelidnus.* 161. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris ferdide luteis octosfriatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 139. n. 48.*  
*Habitat Berolini.*
- hungaricus.* 162. *C. ex fusco rufus*, elytris striatis; thorace rotundato. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 108. n. 103. Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 139. n. 49.*  
*Habitat in Hungaria & Germania, vir ultra 2 lineas longus.*

- aterri- 163. *C. totus ater nitidus, thorace rotundato, elytris ob-*  
mus. *solete striatis: punctis quatuor ad futuram excavatis.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 140. n. 50. t. 29.*  
*f. 13.*  
*Habitat Berolini, statura multipunctati, at major, ses-*  
*lineas longus.*
- terricola. 164. *C. niger, subtus fuscus, elytris cæruleis: striis nove-*  
*punctatis; extima crenata.* *Herbst apud Fuesli arch.*  
*inf. 6. p. 140. n. 51. t. 29. f. 14.*  
*Habitat Berolini, 7-8 lineas longus.*
- platys. 165. *C. totus niger, thorace submarginato, elytris glabris*  
*obsolete striatis.* *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p.*  
*140. n. 52.*  
*Habitat Berolini, lato proxime affinis, at latior.*
- Æthiops. 166. *C. totus niger nitidus.* *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*6. p. 141. n. 53.*  
*Habitat Berolini, vulgari affinis, an propria species?*  
*5-6 lineas longus.*
- Virgo. 167. *C. niger, antennis pedibusque fuscis, thorace pos-*  
*terius sinuato, elytris obsolete striatis.* *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 6. p. 141. n. 54.*  
*Habitat Berolini, vulgari similis, 3 lineas longus.*
- glaber. 168. *C. niger nitidus, elytris fuscis striatis, ore palpis*  
*pedibusque piceis.* *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6.*  
*p. 141. n. 55.*  
*Habitat Berolini, vulgari affinis, sed angustior.*
- globosus. 169. *C. niger, thorace hemisphærico, elytris punctato-*  
*striatis, ore palpisque ferrugineis, antennis basi fulvis*  
*submoniliformibus.* *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p.*  
*142. n. 58. t. 29. f. 17. k.*  
*Habitat Berolini, vix sesquilineam longus, an hujus generis?*
- chalcos. 170. *C. æneus subtus niger, antennis basi ferrugineis;*  
*thorace punctato, elytris punctato-striatis.* *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf. 6. p. 142. n. 59.*  
*Habitat Berolini, 2½ lineas longus.*
- micros. 171. *C. badius, elytris punctato-striatis, oculis nigris.* *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf. 6. p. 142. n. 60.*  
*Habitat Berolini, 2 lineas longus.*

- lampros. 172. *C. nitens* glaberrimus æneo-niger, subtus niger, elytris punctato-striatis, antennis griseis, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 61.*  
*Habitat Berolini, ad ripas humidas, chalcæ affinis, at minor, 1½ lineas longus.*
- Pyropus. 173. *C. ater* nitens, thoracis margine elevato, antennis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 62.*  
*Habitat Berolini, statura lati, 4 lineas longus.*
- mixtus. 174. *C. luteus*, capite nigro, elytris posterius nigro irroratis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 63.*  
*Habitat Berolini, 2 lineas longus.*
- Geerii. 175. *C. supra* niger, subtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque fulvis. *Degeer inf. 4. p. 102. n. 20.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 840? Carabus bimaculatus.*  
*Habitat in Europa.*
- didymus. 176. *C. ex* nigro cæruleus, elytris flavis: macula didyma fusca. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 849.*  
*Habitat in Dania.*
- minimus. 177. *C. thorace* subnigro, elytris striatis pedibus antennisque fuscis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 212. zool. dan. prodr. p. 77. n. 833.*  
*Habitat in Dania, herbariis quoque infestus, vix pediculi magnitudine.*
- flavus. 178. *C. flavus*, elytris striatis, capite, thorace maculaque apicis elytrorum viridi. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 846.*  
*Habitat in Dania.*
- fenestratus. 179. *C. niger*, elytris fuscis: maculis obliquis flavis fenestratiss. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 812.*  
*Habitat in Dania.*
- inflexus. 180. *C. niger*, tibiis tarsisque piceis, elytris punctorum impressorum serie flexuosa. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 814.*  
*Habitat in Dania.*
- fulvipes. 181. *C. niger*, elytris æneis, pedibus antennisque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 816.*  
*Habitat in Dania.*

- nigri- 182. *C. ater*, elytris, antennis, palpis pedibusque piceis.  
cans. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 76. n. 819.  
*Habitat in Dania.*
- celer. 183. *C. piceus*, capite, thorace elytrisque striatis nigris. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 76. n. 823. *act. nidros.* 4. p. 32.  
*Habitat in Scandinavia.*
- cæruleus. 184. *C. niger*, elytris cyaneis, antennis, palpis pedibusque  
fulvis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 827.  
*Habitat in Dania.*
- similis. 185. *C. niger*, thorace posterius utrinque excavato, elytror-  
um striis sub-unctatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77.  
n. 828.  
*Habitat in Dania.*
- æstivus. 186. *C. flavus*, capite ferrugineo, thorace elytrisque nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 832.  
*Habitat in Dania.*
- flexilis. 187. *C. flavicans*, capite nigro, elytris lividis. Müll. *zool.*  
*dan. prodr.* p. 78. n. 837. *act. nidros.* 4. p. 30.  
*Habitat in Scandinavia.*
- lævis. 188. *C. æneus*, capite thoraceque viridi, elytris cupreis,  
pedibus piceis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 841.  
*Habitat in Dania.*
- vernalis. 189. *C. niger*, antennis, palpis pedibusque flavis, elytris  
striato-punctatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 847.
- pullus. 190. *C. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. Müll. *zool.*  
*dan. prodr.* p. 78. n. 848.  
*Habitat in Dania.*
- ater. 191. *C. ater*, elytris striatis, unguibus subferrugineis. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 78. n. 851.  
*Habitat in Dania.*
- discolor. 192. *C. ater*, subtus rufus, elytris mollibus. Müll. *zool. dan.*  
*prodr.* p. 79. n. 857. *act. nidros.* 4. p. 31.  
*Habitat in Europa boreali.*
- aureichal- 193. *C. flavescens* supra æneus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 79.  
ceus. n. 859.  
*Habitat in Dania.*

- fulvicornis. 194. *C. niger* glaber, elytris striatis, antennis, palpis pedibusque fulvis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 826.  
Geoffr. *ins. par.* 1. p. 147. n. 9. *Buprestis niger*.  
Degeer *ins.* 4. p. 95. n. 10. *Carabus niger ruficornis*.  
*Habitat in Europa.*
- leprofus. 195. *C. cæruleus*, antennis, basi pedibusque ferrugineis, elytris fuscis: maculis binis albis.  
Pontopp. *Naturg. Dinnem.* p. 211. t. 16. *Carabus quadriguttatus*.  
*Habitat in Dania.*
- Inderiensis. 196. *C. obscure viridis*, subtus ater, pedibus testaceis, elytris striatis: margine laterali ex griseo lutescente. Pall.  
*it.* 1. app. n. 39.  
*Habitat circa lacum Sibiriae Inderiensis, paulo major.*
- pictus. 197. *C. depressus testaceus*, elytris striatis pedibusque griseis. *Pallus it.* 1. app. n. 40.  
*Habitat in Sibiriae campis aridissimis sub cadaveribus torrefactis.*
- elegans. 198. *C. thorace lineari elytra æquante*, pedibus rufis. *Scop. ent. carn.* n. 269.  
*Habitat in Carniola.*
- metallicus. 199. *C. supra æneus nitens*, thorace lateribus connivente, antennis basi fulvis. *Scop. ent. carn.* n. 270.  
*Habitat in Carniola.*
- cordatus. 200. *C. thorace inverse cordato.* *Scop. ent. carn.* n. 271.  
*Habitat in Carniola & Helvetia.*
- juncus. 201. *C. corpore sublineari, thorace pone angustiori.* *Scop. ent. carn.* n. 272.  
*Habitat in Carniola & Helvetia.*
- Scopoli. 202. *C. æneo-viridis*, elytris testaceis: margine toto fasciaque fuscis. *Scop. ent. carn.* n. 275.  
*Habitat in Carniola.*
- salicinus. 203. *C. niger punctatus*, elytris fuscis striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn.* n. 276.  
*Habitat in Carniolæ salice cuprea.*
- arenosus. 204. *C. æneo-fuscus*, thorace subrotundo pone dentato pedibus rufis. *Scop. ent. carn.* n. 277.  
*Habitat in Carniolæ & Helvetiæ arena.*



- lucidus. 205. *C. niger nitens*, elytris pedibusque testaceis. *Scop. ant. hist. nat. 5. p. 108. n. 104.*  
*Habitat in Hungaria, parvus.*
- octostriatus. 206. *C. viridis punctatus*, elytris octostriatis, pedibus pallidis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 147. n. 11. Buprestis, &c.*  
*Habitat in Gallia.*
- nitidus. 207. *C. viridi-nitens*, elytris octostriatis: punctis tribus impressis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 148. n. 12.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridis. 208. *C. viridis*, elytris octostriatis, anterius & margine fulvis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 148. n. 13.*  
*Habitat in Gallia.*
- ærugineus. 209. *C. nitens*, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo: punctis duodecim. *Geoffr. inf. par. 1. p. 149. n. 15.*  
*Habitat in Gallia.*
- nobilis. 210. *C. niger*, thorace atro, elytris rubris: cruce nigra.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 150. n. 17.*  
*Habitat in Gallia.*
- strigosus. 211. *C. niger*, thorace ferrugineo, elytris striatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 152. n. 22.*  
*Habitat in Gallia, an vere diversus a quadrimaculato?*
- nigricollis. 212. *C. totus niger*, elytris striatis: maculis quatuor lividis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 152. n. 23.*  
*Habitat in Gallia, an varietas quadriguttati?*
- octomaculatus. 213. *C. niger*, elytris striatis: maculis octo lividis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 153. n. 24.*  
*Habitat in Gallia.*
- minutus. 214. *C. totus niger lævis.* *Geoffr. inf. par. 1. p. 153. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- variegatus. 215. *C. cupreo viridique variegatus*: punctis quatuor impressis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 157. n. 32.*  
*Habitat in Gallia.*
- renebrioides. 216. *C. ater*, thorace lato, elytrorum striis punctatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 159. n. 34.*  
*Habitat in Gallia.*

- laticollis. 217. *C. totus viridis, thorace lato. Geoffr. inf. par. 1. p. 159. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- lugubris. 218. *C. ater opacus, palpis antennisque fulvis, tibiis tarsisque ferrugineis. Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 820.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 160. n. 37. Buprestis lugubris.*  
*Habitat in Europa.*
- pubescens. 219. *C. niger tomentosus, elytris striatis, antennis palpis pedibusque fulvis. Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 725.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 160. n. 38. Buprestis nigro-sericeus.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscipes. 220. *C. ater lævis, pedibus antennarumque basi ferrugineis. Geoffr. inf. par. 1. p. 161. n. 39.*  
*Habitat in Gallia.*
- fuscus. 221. *C. fuscus, elytris striatis, corpore subtus rufescente; pedibus antennisque ferrugineis. Degeer inf. 4. p. 96. n. II.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 830. Carabus fulvus.*  
*Schaeff. ic. t. 18. f. 7.*  
*Habitat in Europa, mediæ magnitudinis.*
- versicolor. 222. *C. æneus, corpore ovato brevi supra nigro-æneo, subrus nigro, thorace convexo, elytris lævibus, antennæ basi rufis. Degeer inf. 4. p. 98. n. 15.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 824. Carabus varius.*  
*Habitat in Europa, parvus.*
- substriatus. 223. *C. niger nitidus, elytris substriatis: punctis quatuor impressis. Degeer. inf. 4. p. 102. n. 21.*  
*Habitat in Europa, inter minimos hujus generis.*
- penylvanicus. 224. *C. rufo-fuscus, capite obscuro, elytris striatis, corpore subtus, antennæ pedibusque testaceis. Degeer. inf. 4. p. 108. n. 4. t. 17. f. 22.*  
*Habitat in Pennsylvania, 7 lineas longus.*
- hulensis. 225. *C. niger, elytris striatis versus thoracem ferrugineis, antennæ pedibusque testaceis. Schall. Abh. der hall. naturf. Ges. 1. p. 317.*  
*Habitat rarior Halæ Saxonum, in locis humidis sub lapidibus, ruficornis magnitudine, sed magis oblongus.*

- Schalleri. 226. *C. ater* lævis, elytris striis subtilissimis punctatis. Schall.  
*Abh. der hall. naturf. Ges. I. p. 318.*  
*Habitat Halæ Saxonum, in viis inter agros, cuprei statura & magnitudine.*
- tristis. 227. *C. niger*, elytris striatis thoraceque scabris opacis.  
*Schall. Abh. der hall. naturf. Ges. I. p. 318.*  
*Habitat rarior Halæ Saxonum, in viis campestribus, cuprei statura & magnitudine.*
- quinque-lineatus. 233. *C. ater*, thorace lateribus rotundato posteriorius truncato:  
 linea dorsali & utrinque lineola baseos duplici impressa,  
 elytris rugosis, rugarum quinque interiorum apice cum  
 sexta confluyente. *Mus. Lesk. p. 38. n. 836.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 234. *C. nigro-ferrugineus*, capite, antennarum basi thoraceque nigris, antennis cinereis glabris, elytris depressis striatis apice truncatis thoracisque marginibus externis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 837.*  
*Habitat in Europa.*
- confluens. 235. *C. ater*, thorace lateribus rotundato, elytris striatis: rugis prima & octava, secunda & septima apice unis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 843.*  
*Habitat in Europa.*
- holofericeus. 236. *C. ater*, capite thoraceque nigris, elytris fuscis holofericeis striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 844.*  
*Habitat in Europa.*
- trichrous. 237. *C. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, elytris levissime striatis, capite thoraceque æneis: hujus linea dorsali & posterior utrinque lineolis duabus impressis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 845.*  
 β) *Carabus* antennis basi rubris. *Mus. Lesk. p. 39. n. 861.*  
 γ) *Carabus ater*. *Mus. Lesk. p. 40. n. 880.*  
 δ) *Carabus niger*. *Mus. Lesk. p. 40. n. 888.*  
*Habitat in Europa.*
- pullus. 238. *C. nigro-ferrugineus*, elytris striatis, antennis rufis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 846.*  
*Habitat in Europa.*

# INSECTA COLEOPTERA. Carabus.

1989

- quadra-  
tus. 239. *C. thorace subquadrato : linea dorsali & posterius  
utrinque lineola impressa, elytris striatis. Mus. Lesk.  
p. 39. n. 848. & 860.  
Habitat in Europa.*
- plicatus. 240. *C. ater, thorace suborbiculato posterius utrinque plicato,  
elytris rugosis. Mus. Lesk. p. 39. n. 849.  
Habitat in Europa.*
- plicatus. 241. *C. piceus, elytris atris striatis, thoracis linea dorsali &  
posterius utrinque lineolis duabus impressis : interna  
altiore. Mus. Lesk. p. 39. n. 850.  
Habitat in Europa.*
- emargi-  
natus. 242. *C. ater, thorace subquadrato, posterius truncato, elytris  
striatis apice emarginatis. Mus. Lesk. p. 39. n. 851.  
Habitat in Europa.*
- chaly-  
beus. 243. *C. niger, capite thoraceque æneis, elytris æneo-nigris  
striatis : marginibus externis virescentibus. Mus. Lesk.  
p. 39. n. 852.  
Habitat in Europa.*
- erythro-  
ceras. 244. *C. niger, thorace subquadrato ad latera rotundato,  
elytris striatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. Mus.  
Lesk. p. 39. n. 853.  
Habitat in Europa.*
- concolor. 245. *C. niger, thorace subquadrato, elytris atris levissime  
striatis. Mus. Lesk. p. 39. n. 854.  
β) Carabus niger, elytris levissime striatis. Mus. Lesk. p. 39.  
n. 866.  
Habitat in Europa.*
- erythro-  
pus. 246. *C. niger, thorace posterius quadrato, elytris striatis, an-  
tennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 39. n. 859.  
β) Carabus elytris punctato-striatis. Mus. Lesk. p. 40. n. 875.  
Habitat in Europa.*
- crenatus. 247. *C. niger, elytris striatis punctato-crenatis. Mus. Lesk.  
p. 39. n. 862.  
Habitat in Europa.*
- distinc-  
tus. 248. *C. supra niger, subtus ferrugineus, thorace posterius  
truncato Mus. Lesk. p. 39. n. 865.  
Habitat in Europa.*

rubricor- 249. *C. niger*, antennis rubris, thorace posterius truncato:  
 nis. linea dorsali impressa. *Mus. Lesk. p. 29. n. 868.*  
*Habitat in Europa.*

punctu- 250. *C. niger*, elytris punctulorum minimorum ordine no-  
 latus. tatis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 869.*

β) *Carabus elytrorum punctis sex impressis. Mus. Lesk. p. 40. n. 881.*

*Habitat in Europa.*

bispino- 251. *C. niger*, thorace posterius truncato, tibiis anticis crassis  
 fus, bispinosis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 870.*

*Habitat in Europa.*

erythro- 252. *C. niger*, antennis tibiisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 871.*

β) *Carabus thorace posterius truncato, elytris striatis. Mus. Lesk. p. 40. n. 873.*

*Habitat in Europa.*

glaber. 253. *C. niger* glaber, thorace posterius truncato utrinque  
 impresso, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 872.*

*Habitat in Europa.*

viridans. 254. *C. nigro-virescens*, antennis pedibusque rufis, elytris  
 striatis: rugis planis levissime punctatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 874.*

*Habitat in Europa.*

multico- 255. *C. niger*, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-  
 lor. cærulescentibus lutescente-villosis, ore, antennarum basi  
 pedibusque rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 876.*

*Habitat in Europa.*

obsfca- 256. *C. fuscus*, thorace posterius truncato, elytris striatis,  
 tus. antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 877.*

*Habitat in Europa.*

mœstus. 257. *C. niger*, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 879.*

*Habitat in Europa.*

discolor. 258. *C. niger*, thorace posterius truncato: linea dorsali punctis  
 utrinque impressis, elytris striatis margine viref-  
 centibus, antennis ferrugineis basi rufis. *Mus. Lesk. p. 40 n. 882. 883.*

*Habitat in Europa.*

- excisus. 259. *C. ferrugineus* glaber, thorace anterieus truncato, posterius exciso, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 884.*  
*Habitat in Europa.*
- limbatus. 260. *C. niger*, thorace marginato posterius plicato, elytris striatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 885.*  
*Habitat in Europa.*
- truncatulus. 261. *C. niger*, thorace posterius truncato, elytris striatis, pedibus fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 886.*  
*Habitat in Europa.*
- chlorome-las. 262. *C. niger*, supra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 887.*  
*Habitat in Europa.*
- sinuatus. 263. *C. niger*, elytris striatis apice sinuatis, antennis basi rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 889.*  
*Habitat in Europa.*
- pallidicornis. 264. *C. niger*, elytris striatis, thorace posterius truncato: marginibus externis, antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 892.*  
*Habitat in Europa.*
- aurichalcus. 265. *C. nigro-æneus*, antennis pedibusque rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 894.*  
*Habitat in Europa.*
- rotundatus. 266. *C. niger*, supra æneus, thorace rotundato, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 897.*  
*Habitat in Europa.*
- lituratus. 267. *C. piceus*, capite, pedibus striatisque elytris testaceis: macula ad apicem communi magna thoraceque violaceis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 899.*  
*Habitat in Europa.*
- truncatus. 268. *C. ater* thorace posterius truncato, elytris striatis tibiarum basi plantisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 901.*  
 β) *Carabus piceus*, tibiis totis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 903.*  
 γ) *Mus. Lesk. p. 41. n. 910.*  
*Habitat in Europa, antennis rufis, femoribus fuscis.*



- ferruginosus. 269. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, elytris striatis, antennis pedibusque lividis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 904.*  
 $\beta$ ) *Carabus capite nigro. Mus. Lesk. p. 41. n. 918.*  
*Habitat in Europa.*
- denigratus. 270. *C. niger*, thorace rotundato, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus compressis supra nigris. *Mus. Lesk. p. 41. n. 905.*  
*Habitat in Europa.*
- cylindricus. 271. *C. testaceus cylindricus*, capite nigro, thorace orbiculato rufo. *Mus. Lesk. p. 41. n. 909.*  
*Habitat in Europa.*
- geniculatus. 272. *C. niger*, thorace suborbiculato, elytris pedibusque testaceis: geniculis fuscis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 911.*  
*Habitat in Europa.*
- quadriguttatus. 273. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris fusco-cæruleis: guttis quatuor pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 916.*  
*Habitat in Europa.*
- sempunctatus. 274. *C. nigro-æneus*, thorace rotundato, elytris striatis: punctis ad futuram impressis æneis trium parium. *Mus. Lesk. p. 41. n. 917.*  
*Habitat in Europa.*
- porphyropus. 275. *C. piceus*, thorace truncato, elytris striatis, antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 920.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscicornis. 276. *C. niger* supra æneus, thorace rotundato punctatis, elytris crenato-striatis, antennis fuscis, pedibus rufis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 921.*  
*Habitat in Europa.*
- atratus. 277. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris pallidis nigro-variis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 924.*  
*Habitat in Europa.*
- trispinosus. 278. *C. niger*, capite thoraceque orbiculato æneis, elytris ferrugineo-æneis striato-punctatis, pedibus rufis: femoribus crassius, tibiis trispinosis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 925.*  
*Habitat in Europa.*

mœstus. 279. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, elytris striatis, capite fusco, antennis pedibusque testaceis. *Mus. Lesk.* p. 42. n. 926.  
*Habitat in Europa.*

lepidus. 280. *C. supra æneo-viridis*, subtus cærulescens, thorace subquadrato pollice striis quatuor impressis, tibiis anticis apice dilatatis. *Lesk. it. p. 17. t. A. f. 6.*  
*Habitat in Lusatiæ monte Keulenberg, 6 lineas longus, vulgari affinis.*

214. **TENEBRIO.** *Antennæ moniliformes: articulo ultimo subrotundo.*  
*Thorax plano-convexus, marginatus. Caput exsertum.*  
*Elytra rigidiuscula.*

\* *palpis sex filiformibus: tibiis anterioribus fossoriis, palmato-dentatis. Scaritæ Fabricii & Pallatii.*

complanatus. 13. *T. ater*, thorace subquadrato, elytris lævissimis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 206. n. 1.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*

marginatus. 14. *T. ater*, thorace subquadrato, elytris fulcatis: margine cyaneo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 206. n. 2.*  
*Habitat in Cayenna, an varietas depressi?*

giganteus. 15. *T. ater*, mandibulis fulcatis, elytris lævibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 314. n. 1. mant. inf. 1. p. 206. n. 3.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 47. f. 4.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, subterraneo proxime affinis, at triplo major.*

subterraneus. 16. *T. ater*, capite antèrius fulcato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 314. n. 2. mant. inf. 1. p. 206. n. 4.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 133. n. 18. t. 29. f. 4. a. Carabus interruptus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 4.*  
*Voet coleopt. t. 33. f. 2.*

cyaneus. 17. *T. cyaneus glaberrimus*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 314. n. 3. mant. inf. 1. p. 206. n. 5.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

- Fossor. 7. *T. piceus*. *Fn. suec.* 817. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 6.  
*Degeer inf.* 4. p. 350. n. 1. t. 30. f. 1. 2. *Attelabus* Fossor.  
*Habitat in Europæ collibus arenosis, quos perforat.*
- Cursor. 8. *T. fuscus*, thorace oblongo : angulis quinque denticulatis.  
*Fn. suec.* 818.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 7.  
*Scarites testaceus*, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis.  
*Müll. zool. dun. prodr.* p. 74. n. 798. *Tenebrio fuscus*  
*Habitat in Europæ collibus arenosis, pediculi longitudine.*
- arabs. 10. *T. niger*, thorace ferrato, antennis pedibusque testaceis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 8.  
*Habitat in Oriente.*
- minutus. 12. *T. niger*, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 315. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 207. n. 9.  
*Scarites piceus*, antennis clavatis.  
*Habitat Sueciæ, duplo major in Saxoniz sabulis : an hujus generis ?*
- collaris. 19. *T. niger*, elytris punctato-striatis & capite fuscis, antennis pedibusque piceis : anterioribus spinosis. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 141. n. 56. t. 29. f. 15.  
*Habitat Berolini, 3 fere lineas longus.*
- luccephalus. 20. *T. totus fuscus punctatus*, oculis nigris. *Herbst apud*  
*Fuesli arch. inf.* 6. p. 141. n. 57. t. 29. f. 16. i.  
*Habitat in India, 3 lineas longus.*  
*\* \* palpi inæqualibus filiformibus, Scaurus Fabricii.*
- atratus. 21. *T. totus ater glaber.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 320. n. 1. *mant.*  
*inf.* 1. p. 270. n. 1.  
*Habitat in Ægypto, elytris connatis, pedibus anterioribus bidentatis.*  
*\*\*\* palpi quatuor, anterioribus subclavatis, posterioribus filiformibus, Tenebriones Fabricii, Mylandes Pallatii.*
- laminatus. 22. *T. niger*, thorace subquadrato lævi, elytris sulcatis, tibiis anterioribus incurvis apice lamina ferruginea acutis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 211. n. 1.  
*Habitat in India, maximus sui generis.*

Gigas.

1. *T. ater*, elytris striatis, thorace laevi. *Amœn. ac.* 6. p. 396. n. 26.

*Pall. ic. inf. Ruff. I. p. 37. t. C. f. I. Mylaris gigantea.*  
*Habitat Surinami, lucani cervi magnitudine antennis subclavatis.*

punctatus.

23. *T. niger*, thorace quadrato: marginibus subdenticulatis, elytris striato-punctatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 211. n. 2.*  
*Habitat in India, magnus, palpis securiformibus.*

ferratus.

24. *T. ater* glaber, elytris striatis, tibiis posterioribus ferratis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 322. n. I. mant. inf. I. p. 211. n. 3.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*

Molitor.

2. *T. totus niger*, femoribus anterioribus crassioribus. *Fn. succ.* 875. *Scop. ent. carn.* 259.  
*Fn. succ.* 547. *Mordella* antennarum articulis lentiformibus: ultimo globofo.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 322. n. 2. mant. inf. I. p. 211. n. 4.*  
*Tenebrio oblongus piceus, elytris striatis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 349. n. 6. Tenebrio atra oblonga, &c.*  
*Degeer inf. 5. p. 34. n. 3. t. 2. f. 4. Tenebrio elatus nigro-fuscus, &c.*  
*Raj. inf. 4. (larva) Vermis farinarius.*  
*Frisch inf. 3. p. I. t. I.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 52.*  
*Schæff. ic. t. 66. f. I.*  
*Habitat in farina pistorum, molendinis, pane sicco, saccharato.*  
*Larva pallida, glabra, segmentis 13, mollis, lusciniis gratissimus cibus.*

luridus.

26. *T. niger*, pedibus fuscis. *Fabr. mant. I. p. 211. n. 5.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 9. Helops luridus.*  
*Habitat in Brasilia.*

chalybeus.

3. *T. violaceus*, pedibus antennisque piceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 323. n. 4. mant. inf. I. p. 211. n. 7.*  
*Degeer inf. 5. p. 53. n. 4. t. 13. f. 11. Tenebrio æneus.*  
*Habitat in Guinea.*

mauritanicus.

4. *T. niger*, subtus piceus, thoracis marginibus anterieus posteriusque dente angulatis.  
*Habitat Algeriæ, chalybeo similis; at quintuplo minor, pedibus antennisque piceis. Brander.*

- variega- 27. *T. oblongus*, fusco cinereoque varius. *Fabr. sp. inf.* 1.  
tus. p. 323. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 8.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, fuscus, pilis griseis varius.*
- abbrevia- 28. *T. ovatus ater*, elytris striatis, capite tuberculato. *Fabr.*  
tus. *sp. inf.* 1. p. 323. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 9.  
*Habitat in India.*
- capensis. 30. *T. ovatus niger*, elytris striatis, tibiis anterioribus den-  
tato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 323. n. 7. *mant. inf.*  
1. p. 212. n. 10.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, an forsan primæ tribus?*
- cornutus. 31. *T. thoracis bicornis* marginibus crenatis angulisque  
prominulis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 8. *mant. inf.* 1.  
p. 212. n. 11.  
*Habitat Smirnæ.*
- sanguini- 32. *T. ater*, antennis pedibusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.*  
pes. 1. p. 323. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 12.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- buprestoi- 33. *T. ater*, thorace ovali marginato, elytris connatis  
des. lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 323. n. 10. *mant. inf.* 1.  
p. 212. n. 13.  
*Pell. it.* 2. p. 719. n. 44.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, caraboidi proxime affinis,*  
*at major.*
- dermestoi- 34. *T. ater*, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr.*  
des. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 14.  
*Habitat Halæ Saxonum, buprestoidi affinis.*
- culinaris. 5. *T. ferrugineus*, elytris striatis, clypeo emarginato. *Fn.*  
*succ.* 816. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 212. n. 15.  
*Fn. succ.* 546. *Mordella ferrugineo-rufa*, thorace antice  
depresso.  
*Schæff. ic. t.* 66. f. 2.  
*Habitat in Hispaniæ arena mobili, in Sueciæ quisquiliis,*  
*& frumentorum accervis.*
- barbarus. 6. *T. ater glaberrimus*, thorace orbiculato, capitis clypeo  
anteriorius margine elevato.

---

*Tenebriones & Pimeliæ in locis suffocatis, umbrosis, quisquiliis potissimum  
in terra ipsa, larvæ ibidem, in ligno, farina, aliisque cibariis degant.*

*Habitat in Mauritania, nitidus, carabi mediocris magnitudine; elytris connatis.* Brander.

erraticus. 9. *T. niger*, antennis thorace suborbiculato elytrisque ferrugineis, his apice fuscis. *Fn. suec.* 819.\*  
*Habitat in Europæ.*

pallens. 10. *T. pallide testaceus*, thorace transverso. *Fn. suec.* 820.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 16.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parvus.*

ferrugineus. 35. *T. ferrugineus*, elytris striatis testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 17.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, pallente minor & magis depressus.*

villosus. 36. *T. fuscus cinereo-villosus*, elytris lævibus ferrugineis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 212. n. 18.  
*Habitat in Europæ quæsiuiliis, parvus.*

caraboides. 25. *T. niger*, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 19.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 677. n. 25. *Fn. suec.* 825. *Tenebrio apterus*, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.  
*Fn. suec.* 595. *Tenebrio ater*, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.  
*Degeer inf.* 4. p. 97. n. 7. t. 3. f. 13. *Carabus coadunatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 64. n. 3. *Platycerus fuscus*, elytris striatis.  
*Habitat in Europæ quæsiuiliis.*

brunni-pes. 37. *T. ater glaber nitidus*, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 212. n. 20.  
*Habitat Dicsdæ, parvus.*

lævigatus. 29. *T. oblongus ater*, elytris læviusculis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 323. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 6.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 678. n. 29. *Tenebrio apterus niger* lævis, elytris lævibus, thorace lunato subtus cæruleus.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, molitore paulo minor.*

gibbosus. 38. *T. subovatus totus æneus*, elytris gibboso-convexis: striis tenuissimis crenulatis. *Pall. ic. in j. Russ.* 1. p. 38. t. C. f. 2.  
*Habitat in Brasilia, pimeliæ mortifagæ magnitudine.*



- spinima-* 39. *T. thorace marginato lævi, elytris lævissimis posterius*  
*nus. obtusis, tibiis primoribus spina robustissima arcuata pro-*  
*ductis. Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 55. t. C. f. 23.*  
*Habitat in Russia australi, circa Borysthenem, pimeliæ*  
*mortisagæ magnitudine, sed crassior & magis convexus,*  
*aterrimus, nitidus, glaberrimus, durus.*
- uncinus.* 40. *T. apterus niger, thorace marginato subæquali, elytris*  
*striato-punctatis angulatisque, femoribus anterioribus cla-*  
*vatis maximis biuncinatis. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 60. n. 60.*  
*Habitat in Hispania, pimeliæ mortisagæ magnitudine,*  
*sed gracilior, elytris brevioribus.*
- piceus.* 41. *T. depressus niger, subtus piceus, elytris striatis. Schaller*  
*Abh. der hall. naturf. Ges. 1. p. 319.*  
*Habitat Halæ Saxonum sub corticibus & in ligno saligno*  
*putrescente; an a mauritanico vere diversus?*
- cylindri-* 42. *T. aterrimus, thorace punctis elevatis, antennis fuscis,*  
*cus. tarsis subtus flavo-pilosis. Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*6. p. 144. n. 3.*  
*Habitat Berolini, molitori proxime affinis.*
- montanus.* 43. *T. totus ater, elytris opacis. Scop. ann. hist. nat. 5.*  
*p. 108. n. 102.*  
*Habitat in Hungariæ inferioris montanis.*
- tristis.* 44. *T. niger subopacus, punctis excavatis variolosus. Scop.*  
*ent. carn. n. 256.*  
*Habitat in Carniola.*
- pomonæ.* 45. *T. supra piceus, infra niger, elytris striis elevatis quinis.*  
*Scop. ent. carn. n. 257.*  
*Habitat in Carniolæ arboribus pomiferis, larvis binis ter-*  
*nise reticulo laxo testis in folio convoluto latentibus.*
- capræ.* 46. *T. niger, thorace punctis impressis elytrisque testaceis.*  
*Scop. ent. carn. n. 258.*  
*Habitat in Carniolæ & Helvetiæ salice caprea.*
- flavus.* 47. *T. flavus, oculis nigris. Scop. ent. carn. n. 260.*  
*Habitat in Carniolæ umbelliferis.*
- æstivus.* 48. *T. niger, palpis pedibusque flavis. Müll. zool. dan.*  
*prodr. p. 74. n. 795.*  
*Habitat in Dania,*

- striatus. 49. *T. niger*, abdomine subtus dense striato. *Müll. 7001.*  
*dan. prodr. p. 74. n. 796.*  
*Habitat in Dania.*
- festinans. 50. *T. totus niger glaber*, thorace ferrugineo.  
*Habitat - - - cicindela affinis, pediculi magnitu-*  
*dine, femoribus clavatis.*
- globosus. 51. *T. ater*, thorace globoso : lineis duabus scabris ele-  
vatis. *Lepech. it. 2. p. 209. t. II. f. 34.*  
*Habitat in Sibiria.*
- incurvatus. 52. *T. totus piceus*, elytris striatis medio transversaliter  
impressis. *Lepech. it. 2. p. 210. t. II. f. 25.*  
*Habitat in Sibiria.*
- ovatus. 53. *T. ovatus nigro-fuscus*, elytris striis octo laevibus.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 348. n. 4.*  
*Habitat in Gallia.*
- rotunda-  
tus. 54. *T. niger totus laevis*, coleoptris pone rotundatis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 351. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- subvillo-  
sus. 55. *T. totus ferrugineus subvillosus.* *Geoffr. inf. par. I. p.*  
*351. n. 9.*  
*Habitat in Gallia. \*)*
- glaber. 56. *T. totus ferrugineus laevis.* *Geoffr. inf. par. I. p. 351.*  
*n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- lignarius. 57. *T. thorace cavitatibus duabus*, elytris violaceis vel  
rufis, antennis pedibusque ferrugineis. *Degeer inf.*  
*5. p. 38. n. 4. t. 2. f. 15-18.*  
*Habitat in Europa, larva sub cortice pinuum in terra*  
*jacentium, quarum librum corroduunt; imago 5 lineas*  
*longa; mas minor.*
- lardarius. 58. *T. oblongus flavo-fulvus*, oculis nigris, elytris striis  
punctatis. *Degeer inf. 5. p. 45. n. 7. t. 2. f. 25. 26.*  
*Habitat in Belgis, larva in vesica suilla; imago pulicis*  
*magnitudine.*

\*) Species 43-55 enumeratae utrum ad tenebriones, an ad pimelias referenda;  
autoptis definiendum relinquo.

1000 INSECTA COLEOPTERA. *Pimelia. Blaps.*

- curvipes. 59. *T. ovatus piceus*, elytris punctato-striatis, femoribus arcuatis: posterioribus subtus ciliatis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 937.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 60. *T. ovatus*, elytris striatis, supra niger, subtus antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 938.*  
*Habitat in Europa.*
- ater. 61. *T. ater*, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 939.*  
*Habitat in Europa.*
- lunatus. 62. *T. niger depressus*, thorace lunato, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. 941.*  
*Habitat in Europa.*
- hispidus. 63. *T. niger hispidus*, elytris striatis: basi macula utrinque rufa; antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 942.*  
*Habitat in Europa.*
- glaber. 64. *T. ferrugineus*, capite thoraceque glabris elytrisque atris: his striatis, ore ferrugineo, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 943.*  
*Habitat in Europa.*

PIMELIA. *Antennæ filiformes.*

*Palpi quatuor.*

*Thorax plano-convexus, marginatus.*

*Caput exsertum.*

*Elytra rigidiuscula. Alæ ( plurimis ) nullæ.*

\* *antennis apice moniliformibus.*

† *palpis clavatis*, *Blaps Fabricii.*

Gages.

1. *P. nigra*, thorace rotundato, elytris mucronatis levissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 321. n. 1. mant. inf. 1. p. 210. n. 1.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 14. Tenebrio Gages.*

*Sulz. hist. inf. p. 64. t. 7. f. 9.*

*Habitat in Europa magis australi, simillima mortisegetæ at duplo major.*

fulcata.

2. *P. coleoptris mucronatis fulcatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 321. n. 2. mant. inf. 1. p. 210. n. 2.*

*Forsk. Fn. arab. p. 79. n. 10.* *Tenebrio* (polychrestus) apterus, elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.  
*Habitat in Ægypti hortis frequens.*  
*Commendantur contra aurium dolores scorpionumque morsum, & coctæ a feminis turcis saginandi causa comeduntur.*

*mortifaga. 3. P. atra*, coleoptris mucronatis lævibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 321. n. 3. mant. inf. I. p. 210. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 15.* *Tenebrio* (mortifagus) apterus, thorace æquali, coleoptris lævibus mucronatis.  
*Fn. suec. 594. 822.\* Scop. ent. carn. 252.* *Tenebrio ater* coleoptris acuminatis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 346.* *Tenebrio atra aptera*, &c.  
*Degeer inf. 5. p. 31. n. 1.* *Tenebrio acuminatus.*  
*Mouff. inf. 139.* *Blatta foetida.*  
*Raj. inf. p. 90. n. 12.*  
*List. scar. angl. p. 388. n. 21.*  
*Jonst. inf. t. 16.*  
*Aldr. inf. 499.*  
*Petiv. gazoph. t. 24. f. 7.*  
*Frisch. inf. 13. t. 25.*  
*Schæff. elem. t. 24. f. 1.*  
*icon. t. 6. f. 13. & t. 37. f. 6.*  
*Habitat in Europæ umbrosis suffocatis.*

*excavata. 4. P. thorace* posterius angulato, elytris excavato-punctatis acutiusculis. *Fabr. sp. inf. I. p. 322. n. 4. mant. inf. I. p. 210. n. 4.*  
*Petiv. gazoph. t. 92. f. 14.*  
*Ad. angl. 271. 861. 13.*  
*Habitat in Coromandel.*

*striata. 5. P. ater*, thorace posterius angulato, elytris obtusis striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 322. n. 5. mant. inf. I. p. 210. n. 5.*  
*Habitat in Coromandel, statura excavatæ.*

*crenata. 6. P. griseo-fuscus*, thorace posterius angulato, elytris crenato-striatis obtusis. *Fabr. sp. inf. I. p. 322. n. 6. mant. inf. I. p. 210. n. 6.*  
*Habitat in Coromandel, statura striatæ, at duplo minor.*

*speciosa. 7. P. subovata ænea* alata, elytris politissimis striatis cupreo viridique lineatis.  
*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 39. t. C. f. 3.* *Mylaris speciosa.*  
*Habitat in Brasilia, attelabi ceramboidis magnitudine.*  
 N n n n n 4

chryso- 8. *P. ovata* scaberrima, thorace longitudinaliter rugoso, ely-  
 meloides. trorum porcis tribus verrucosis. *Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 52.*  
*Habitat in Mauritania, glandis magnitudine, an forsan*  
*ad alteram tribum ableganda.*

costata. 9. *P. subglobosa* glabriuscula opaca, elytris singulis costis  
 tribus crenulatis: extrema carinata.  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 52. t. C. f. 18. Tenebrio costatus.*  
*Habitat, rarior, in torridis deserti caspici inter fluvios*  
*Volgam & Ural intermedii; an forte insequentis tribus?*

torulosa. 10. *P. ovato-subglobosa*, elytris tuberculatis undique con-  
 vexis enerviis.  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 51. n. 17. t. C. f. 17. Tenebrio*  
*torulosus.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine variabilis.*

agricola. 11. *P. rufescens*, thorace capiteque nigris. *Scop. ann. hist.*  
*nat. 5. p. 108. n. 101.*  
*Habitat in agro Laibacenfi, tenebrionis molitoris magnitudine.*

fabulosa. 12. *P. atra*, coleoptris rugosis pone acuminatis. *Geoff. inf.*  
*par. 1. p. 347. n. 2. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Gallia & Helvetia.*

octostria- 13. *P. nigra*, elytrorum striis octo punctatis per paria disposi-  
 tus. tis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 348. n. 3.*  
*Habitat in Gallia. \*)*

† † palpis filiformibus.

striata. 14. *P. atra* glabra, elytris striis quatuor sanguineis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 316. n. 1. mant. inf. 1. p. 207. n. 1.*  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 45. t. C. f. 11. a. b.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mortifaga major, nitida.*

unicolor. 15. *P. glabra* nigra, elytris immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 316. n. 2. mant. inf. 1. p. 207. n. 2.*  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 46. t. C. f. 12. Tenebrio gibbus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 9. Tenebrio gigas.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, striata æq̃nis, at paulo minor.*

\*) Species 11-13 an hujus generis ordinisve sint, haud certo constat.

- gibba*. 16. *P. atra*, thorace globofo, elytris linea abbreviata elevata carinatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 207. n. 3.  
*Habitat in India.*
- hispida*. 17. *P. atra*, corpore muricato hispido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 316. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 207. n. 4.  
*Forsk. Fn. arab.* p. 79. n. 8. *Tenebrio hispidus.*  
*Pall. ic. inf. Russ.* 1. p. 42. t. 6. f. 1. *Tenebrio setosus.*  
*Habitat rarior in Africa, mortisagæ magnitudine, sed brevior & crassior.*
- longipes*. 18. *P. atra*, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 316. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 208. n. 5.  
*Habitat in Ægypto.*
- cephalotes*. 19. *P. thoracis* margine anteriori & posteriori ciliato, elytris scaberrimis: nervis quatuor lateralibus carinatis subferratis.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 676. n. 16? *Tenebrio (grossus) apterus niger glaber, coleoptris nervosis: nervis lateralibus scabris, thorace emarginato.*  
*Pall. ic. inf. Russ.* 1. p. 49. t. C. f. 15. *Tenebrio cephalotes.*  
*Habitat in desertis aridissimis salis australibus Uralensibus, muricata brevior, & ut plurimum minor.*
- muricata*. 20. *P. nigra*, coleoptris obtusis: striis muricatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 316. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 208. n. 6.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 676. n. 12. *Mus. Lud. Ulr.* 100.\* *Pall. ic. inf. Russ.* 1. p. 48. t. C. f. 14. *Tenebrio muricatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 352? *Tenebrio atra aptera rotundata, elytris sulcis tribus elevatis.*  
*Pet. gaz.* 11. t. 92. f. 14.  
*Habitat in Europa australi, Ægypto, in deserto arenoso Naryn, inter fluvios Volga & Ural, nemoruni posteriorum attritu ad elytra stridens, mortisagæ major.*
- tuberculata*. 21. *P. nigra*, thorace scabro, elytris tuberculato-muricatis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 208. n. 7.  
*Habitat in Europa magis australi, statura muricatæ, at duplo minor.*
- bipunctata*. 22. *P. atra*, thorace globofo: punctis duobus impressis, elytris rugosis: striis elevatis tribus lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 316. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 208. n. 8.  
*Habitat in Italia, statura muricatæ.*



- scabra*. 23. *P. atra*, elytris scabris lineisque elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 7. *mant. inf.* I. p. 208. n. 9.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in Barbariæ ruderatis.*
- angulata*. 24. *P. elytris spinosis: linea laterali elevata ferrata.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 8. *mant. inf.* I. p. 208. n. 10.  
*Forsk. Fn. arab. p. 80. n. 13. Tenebrio spinosus.*  
*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 55. t. H. f. C. 22. Tenebrio asper-*  
*rimus.*  
*Habitat Alexandriæ in Ægypto.*
- echinata*. 25. *P. thoracis lateribus spinosis, elytris lineis elevatis tribus echinatis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 9. *mant. inf.* I. p. 208. n. 11.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura angulatæ.*
- dentipes*. 26. *P. thorace scabro, elytris pilosis muricatis, femoribus anterioribus unispinosis.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 208. n. 12.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura echinatæ, et paulo minor.*
- dentata*. 27. *P. nigra, thorace glabro, elytris fuscis: lineis elevatis tribus ferratis.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 208. n. 13.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, pedibus inermibus elongatis.*
- porcata*. 28. *P. thorace lævi nitido, elytris lineis elevatis tribus: interjectis punctis elevatis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 10. *mant. inf.* I. p. 209. n. 14.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, echinata minor.*
- maculata*. 29. *P. thorace nigro, elytris cinereis fusco, maculatis: lineis tribus elevatis; secunda subundata.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 11. *mant. inf.* I. p. 209. n. 15.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- ferrata*. 30. *P. thorace varioloso, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elongatis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 317. n. 12. *mant. inf.* I. p. 209. n. 16.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parva, atra.*
- minuta*. 31. *P. thorace lævi obscuro, elytris cinereis hispidis: lineis tribus elevatis lævibus.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 318. n. 13. *mant. inf.* I. p. 209. n. 17.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, pedibus cinereis.*

rugosa.

32. *P. thorace scabro, elytris rugosis antèrius angustioribus. Fabr. sp. inf. I. p. 318. n. 14. mant. inf. I. p. 209. n. 18.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 678. c. 27? Tenebrio apterus niger, elytris rugosis, abdomine pedibusque cæruleis, thorace lunato.*

*Habitat in Ægypto.*

gibbosa.

33. *P. nigra lævis, thorace orbiculato convexo antèrius truncato.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 18. Fn. suec. 824.\* Tenebrio gibbus.*

*Habitat in Europa & Africa.*

linearis.

34. *P. nigra lævis, pedibus ferrugineis, antennis brevissimis.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 23. Tenebrio linearis.*

*Habitat in Suecia, magnitudine culicis; an hæc & gibbosa huic generi tribuenda describenda, judicent autoptæ.*

pubescens.

35. *P. ovata lanuginosa opaca, elytris singulis costis quatuor denticulatis.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 53. t. C. f. 19. Tenebrio pubescens.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 22. Tenebrio (angulatus) apterus, thorace teretiusculo, elytris striis quatuor elevatis: tertia crenata.*

*Voet coleoptr. I. t. 39. f. 52.*

*Habitat in Ægypto & torridis deserti caspici inter fluvios Volgam & Ural intermedii, rarior, supra aterrimus, costato magis oblongus.*

spinosa.

36. *P. thorace marginato antèrius & postèrius spinoso, elytris striis elevatis lævibus. Fabr. sp. inf. I. p. 318. n. 15. mant. inf. I. p. 209. n. 19.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 24. Mus. Lud. Ulr. 101.\* Tenebrio spinosus.*

*Habitat in Europa australi, Oriente.*

acuminata.

37. *P. thorace marginato: marginibus antèrius & postèrius spinosis, elytris lævibus carinatis. Fabr. mant. inf. I. p. 209. n. 20.*

*Habitat in Europa magis australi, spinosæ proxime affinis tota atra.*

reflexa.

38. *P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata lævi. Fabr. sp. inf. I. p. 318. n. 16. mant. inf. I. p. 209. n. 21.*

*Forsk. Fn. arab. p. 79. n. 9. Tenebrio vulgaris.*  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 41. t. C. f. 6. Tenebrio ptery-*  
*godes.*

*Habitat in Oriente, frequens in Ægypto, aurita affinis*  
*at minor.*

*aurita.* 39. *P. thorace marginato antèrius dilatato, elytris utrinque*  
*bicarinatis lævissimis muticis.*

*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 40. t. C. f. 5. a. b. Tenebrio auritus*

*Habitat ad lacum Sibiriae Inderiensem, tota atra, mori-*  
*suga major & magis oblonga.*

*fasciata.* 40. *P. atra, thorace suborbiculato, elytris fasciis duabus*  
*abbreviatis flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 318. n. 18. mant.*  
*inf. 1. p. 209. n. 22.*

*Habitat in India.*

*collaris.* 41. *P. nigra, elytris lævibus uniangulatis, thorace angul-*  
*tiore, capite depressiusculo carinato. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 319. n. 19. mant. inf. 1. p. 209. n. 23.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 21. Tenebrio (collaris) ap-*  
*terus niger, elytris læviusculis uniangulatis, thorace*  
*angustiore, capite depressiusculo carinato.*

*Habitat in Europa australi, e geniculis oleum flavescens*  
*exsudans.*

*carinata.* 42. *P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis*  
*bus lævibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 319. n. 20. mant. inf.*  
*1. p. 209. n. 24.*

*Forsk. Fn. arab. p. 878. n. 6. Tenebrio ægyptiacus.*  
*Habitat in Gallia, Calabria, Ægypto.*

*lineata.* 43. *P. thorace rotundato scabro, elytris striis tribus punc-*  
*tato-scabris postèrius lineolis albis. Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*319. n. 22. mant. inf. 1. p. 209. n. 26.*

*Habitat in Sibiria, parva.*

*ciliata.* 44. *P. nigra depressa, thorace elytrisq. reflexo-marginatis*  
*ciliatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 319. n. 23. mant. inf. 1.*  
*p. 209. n. 25.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

*glabra.* 45. *P. atra, thorace rotundato, elytris glaberrimis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 319. n. 23. mant. inf. 1. p. 209. n. 27.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 73. n. 7. Tenebrio lævis.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 30? Tenebrio (latipes) apterus*  
*niger lævis, elytris lævibus thorace sublunato, subtrus atq.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 44. t. C. f. 10?* *Tenthredo hypolithus.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 351. n. 8?* *Tenebrio nigra tota lævis, coleoptris pone rotundatis.*

*Voet coleoptr. I. t. 32. f. 5.*

*Habitat in Africa, Calabria, & frequens in arenosis aridis sub saxis latens ad Volgam.*

angustata. 46. *P. glabra, thorace posterius angustato, elytris acuminatis. Fabr. sp. inf. I. p. 320. n. 24. mant. inf. I. p. 209. n. 28.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 44. t. C. f. 9.* *Tenebrio longicornis?*

*Habitat in deserto australi circa Volgam, sub lapidibus & in stercore vaccino sicco vere frequens, & in Ægypto, carabi mediocris magnitudine.*

orbiculata. 47. *P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. Fabr. sp. inf. I. p. 320. n. 25. mant. inf. I. p. 209. n. 29.*  
*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 43. t. C. f. 8.* *Tenebrio Nomas.*  
*Barrel. ic. plant. t. 945.*

*Habitat in Oriente, in universo deserto tatarico, & campis aridis Sibiriae australis tota æstate frequens, durissima.*

didyma. 48. *P. thorace late marginato, posterius bicorni, elytris angularis supra biconvexis.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 42.* *Tenebrio didymus.*

*Habitat in Mauritania, mortisagæ fere magnitudine, tota atra, glabra.*

caspica. 49. *P. ex ovato depressiuscula, thorace antèrius postèriusque excavato, elytris utrinque carinatis: fasciis scaberrimis lævigatisque alternis.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 47. t. C. f. 13.* *Tenebrio caspicus.*

*Habitat in ripis elatioribus maris caspii, præsertim orientem versus sitis, mortisaga duplo crassior.*

subglobosa. 50. *P. subglobosa, elytris toruloso-lævigatis: nervis subquaternis; extimis carinatis crenulatis.*

*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 50. t. C. f. 16. a. b.* *Tenebrio subglobosus.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 28.* *Tenebrio (variabilis) apterus niger lævis, elytris elevato-punctatis angularisque.*

*Habitat in Gallia australi, circa Volgam, & in limosis torridis deserti tatarici magis australis, lente incedens, interdum fere immota, gordiis frequenter infestata, varicata brevior, & magis globosa; an vere distincta a rugosa?*

- filphoides. 51. *P. thoracis lateribus posterius acuminatis, antennis excisis, elytris striis tribus elevatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 26. Tenebrio filphoides.*  
*Syst. nat. X. p. 360. n. 9. Silpha maura.*  
*Habitat in Mauritania.*
- tibialis. 52. *P. nigra lævis; tibiis anterioribus compressis unidentatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 31. Tenebrio tibialis.*  
*Habitat in Africa, Hispania, vix chrysomela major tota opaca. Brander.*
- femoralis. 53. *P. nigra lævis, femoribus crassiusculis, subtus canaliculatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 679. n. 32. Tenebrio femoralis.*  
*Habitat in Germania, chrysomela minor.*
- striatula. 54. *P. nigra, coleoptris ovato-oblongis striatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 679. n. 33. Tenebrio striatulus.*  
*Habitat in Hispania.*
- laticollis. 55. *P. ovalis depressa aterrima lævissima, thorace marginato latissimo anterieus excavato, posterius truncato, elytris substriatis.*  
*Pall. ic. inf. Russ. I. p. 56. t. H. f. C. 21. Tenebrio laticollis.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine glabra, sed multo magis depressa. \*)*
- vittata. 55. *P. gibba atra, elytris connatis glabris: sutura & uniusque striis tribus coccineis, pedibus inermibus nigris.*  
*Mus. Lesk. p. 42. n. 932.*  
*Habitat extra Europam.*
- \*\* *antennis totis filiformibus.*  
† *palpis quatuor filiformibus, Sepidia Fabricii*
- tricuspidata. 56. *P. thorace tricuspidato, corpore griseo. Fabr. sp. inf. 1. p. 315. n. 1. mant. inf. 1. p. 207. n. 1.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 80. n. 12? Tenebrio alexandrinus.*  
*Habitat in Ægypto.*
- cristata. 57. *P. thorace tricuspidato cristato, corpore variegato. Fabr. sp. inf. 1. p. 315. n. 2. mant. inf. 1. p. 207. n. 2.*  
*Pall. ic. inf. Russ. I. t. C. f. 26.*  
*Habitat in Ægypto.*

\*) De his posterioribus speciebus, potissimum 52-55, incertum, cui tribus accensenda.

reticulata. 58. *P. thoracis* lateribus angulatis, elytris reticulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 315. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 207. n. 3.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine tricuspidatæ.*

corrugata. 59. *P. atra*, thorace lævi nitido, elytris rugosis: linea elevata unica. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 315. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 207. n. 4.

*Habitat ad Caput bonæ spei, reticulatæ proxime affinis.*

vittata. 60. *P. thorace* subangulato elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 315. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 207. n. 5.

*Habitat ad Caput bonæ spei, reticulata duplo minor.*

†† *palpis anterioribus securiformibus, posterioribus clavatis, Helopes Fabricii.*

cærulea. 61. *P. cærulescens*, thorace suborbiculato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 213. n. 1. *Mus. Lud. Ulr.* 98.\*

*Syst. nat.* XII. 2. p. 677. n. 19. *Tenebrio apterus cærulescens*, thorace suborbiculato, coleoptris obtusis.

*List. angl. app.* 4. f. 14.

*Pet. gaz. t.* 22. f. 6.

*Habitat in Europa magis australi.*

lanipes. 62. *P. aurea*, elytris striatis acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 213. n. 2.

*Mant.* 1. p. 533. *Tenebrio alatus æneus*, elytris subbiduo-mucronatis, plantis subtus hirsutis.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 349. n. 5. *Tenebrio nigro-cuprea*, &c.

*Scop. ent. carn.* 255. *Tenebrio æneus.*

*Habitat in Germaniæ quisquiliis.*

arginosa. 63. *P. viridi-ænea*, antennis, elytris pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 213. n. 3.

*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine lanipedis.*

ferrata. 64. *P. nigra*, digitis ferrugineis, palpis porrectis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 213. n. 4.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 675. n. 11? *Tenebrio (depressus) alatus niger*, elytris cærulescentibus, antennis tibialibus, que sanguineis, thorace depresso.



*Schall. Abh. der hall. Ges. naturf. Fr. I. p. 324. Tenebrio rufibarbis.*

*Sulz. act. Dresd. I. Serratula.*

*Habitat in Anglia & Germania.*

barbata. 65. *P. nigra*, palpis porrectis pedibusque flavescentibus.  
*Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 5.*

*Habitat Halæ Saxonum, statura serratæ, at duplo minor.*

canaliculata. 66. *P. niger*, thorace canaliculato utrinque impresso, elytris striatis, palpis porrectis. *Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 6.*  
*Schall. Abh. der hall. Ges. naturf. Fr. I. p. 326. Tenebrio dubius.*

*Habitat Halæ Saxonum, statura serratæ, alata.*

lævis. 67. *P. nigra* thorace canaliculato, posterius attenuato, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 7.*

*Habitat Halæ Saxonum, statura canaliculatæ.*

equestris. 68. *P. atra*, elytris fascia abbreviata aurea. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 4. mant. inf. I. p. 214. n. 8.*

*Habitat in Brasilia.*

maura. 69. *P. atra*, thorace utrinque rotundato lævi, elytris excavato-punctatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 5. mant. inf. I. p. 214. n. 9.*

*Habitat in India, magna.*

noxio. 70. *P. atra*, thorace quadrato lævi, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 6. mant. inf. I. p. 214. n. 10.*

*Habitat in America boreali.*

nigrita. 71. *P. atra*, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-fulcatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 7. mant. inf. I. p. 214. n. 11.*

*Fabr. syst. ent. p. 256. n. 4. Tenebrio atratus.*

*Habitat in America meridionali.*

rufipes. 72. *P. nigra*, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 8. mant. inf. I. p. 214. n. 12.*

*Habitat in nova Hollandia.*

granulata. 73. *P. depressa*, elytris granulato-subspinosis. *Fabr. mant. inf. I. p. 214. n. 13.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, tribulibus minor & latior.*

- longipes. 74. *P. nigra*, elytris striatis, pedibus elongatis: pedibus secundis parvis barbatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 14.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, tibiis raro omnibus lævibus.*
- atra. 75. *P. atra*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 15.  
*Degeer inf.* 5. n. 4. *Pyrochroa* (nigra) nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuscis.  
*Habitat Lipsiæ.*
- anglica. 76. *P. nigra*, thorace antè rotundato, elytris punctato-striatis, antennis apice rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 214. n. 16.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 318. n. 17. *Pimelia* Morio.  
*Habitat rarior in Anglia.*
- indica. 77. *P. atra*, elytris fulcato-punctatis, femoribus anterioribus acute dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 17.  
*Habitat in Coromandel, statura atræ, sed paulo minor.*
- quisquilia. 78. *P. nigra*, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 18.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 676. n. 13. *Fn. suec.* 821. \* *Tenebrio niger*, ore pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Europæ quisquiliis, subius tota ferruginea.*
- ruficollis. 79. *P. ferruginea*, elytris striatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 214. n. 19.  
*Habitat Halæ Saxonum, statura quisquiliæ.*
- lævis. 80. *P. corpore atro lævi.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 20.  
*Habitat in Europæ quisquiliis.*
- cyanea. 81. *P. cærulea*, thorace punctato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 214. n. 21.  
*Habitat Hafniæ, tota cærulea immaculata.*
- violacea. 82. *P. cylindracea* splendidissima cæruleo violaceoque varians, abdomine posterius rubro, elytris punctato-striatis.  
*Pall. ic. inf. russ.* 1. p. 40. t. C. f. 4. *Mylaris violacea.*  
*Habitat in Brasilia, tenebrione molitore longior & gracilior. \*)*

\*) de hac et duabus sequentibus dubium adhuc, an ad hanc tribum spectent.

2012 INSECTA COLEOPTERA. Manticora. Erodus.

leucogra- 83. *P. ovata*, thorace scaberrimo difformi, elytris carinatis  
pha. scabris: fasciis longitudinalibus albatis lævibus.  
*Pall. it. 2. app. p. 719. n. 43. Tenebrio leucogrammus.*  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 54. t. C. f. 20. Tenebrio leucographus.*  
*Habitat frequens ad fluvium Irin, rarior ad fluvios Ural,*  
*Volga, Selenga Russiæ orientalis.*

buparia. 84. *P. alata atra glabra*, thorace lunato, maxillis validis  
dentatis longitudine capitis.  
*Forster nov. inf. sp. 1. p. 61. n. 6. Tenebrio buparius.*  
*Habitat in Hispania ad fretum Gaditanum, magnitudinis*  
*& statura lucani interrupti, habitu tenebrionis fossoris.*

MANTICORA. *Antennæ filiformes: articulis*  
*cylindricis.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Thorax antèrius rotundatus,*  
*postèrius apice emarginatus.*

*Caput porrectum. Mandi-*  
*bula exserta, porrecta.*

*Elytra connata. Alæ nullæ.*

maxillofa. 1. *M. Fabr. sp. inf. 1. p. 320. n. 1. mant. inf. 1. p. 210. n. 1.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 25. t. 1. f. 38. Cicindela (gi-*  
*gantea) nigra, elytris costâ longitudinali serrata acuta,*  
*thorace bilobo.*

*Degeer inf. 7. p. 623. n. 10. t. 46. f. 14. Carabus (tuber-*  
*culatus) apterus niger, elytris scabris: tuberculis con-*  
*cis hirsutis, tibiis obscure ferrugineis.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, vulgaris carabi majoris*  
*magnitudine, celerrime currens & mordens.*

ERODIUS. *Antennæ moniliformes.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cornea, bifida, truncata.*

*Labium corneum, emarginatum.*

testudina- 1. *Er. gibbus ater, elytris connatis scabris: lateribus pulverulen-*  
rius, *to-albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 326. n. 1. mant. inf. 1. p. 215. n. 1.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus, subtus planus.*

- gibbus.* 2. *Er.* gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 326. n. 2. *mant. inf.* I. p. 215. n. 2. *Foršk. Fn. arab.* p. 80. n. 11? *Tenebrio* (cothurnatus) apterus niger, thorace lævi utrinque antice unidentato, elytris tuberculatis, striis duabus elatis. *Habitat in Africæ arena mobili, in Ægypto frequens.*
- planus.* 3. *Er.* ater, elytris linea elevata unica. *Fabr. sp. inf.* I. p. 327. n. 3. *mant. inf.* I. p. 215. n. 3. *Habitat in Ægypto.*
- minutus.* 4. *Er.* ater, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 327. n. 4. *mant. inf.* I. p. 215. n. 4. *Habitat in Oriente.*

# LYTTA. *Antennæ filiformes.*

*Palpi* quatuor inæquales: posteriores clavati.

*Thorax* subrotundus: *Caput* inflexum, gibbum.

*Elytra* mollia, flexilia.

- vesicatoria.* I. L. viridis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 328. n. 1. *mant. inf.* I. p. 215. n. 1.
- Syst. nat.* XII. 2. p. 679. n. 3. *Fn. suec.* 827. *Scop. ent. can.* 185. *Melœ* (vesicatorius) alatus viridissimus nitens, antennis nigris.
- It. scan.* 186. *Cantharis officinarum.*
- Geoffr. inf. par.* I. p. 341. n. 1. t. 6. f. 5. *Cantharis viridi-aurata*, antennis nigris.
- Degeer inf.* 4. p. 12. n. 2. t. 1. f. 9. *Cantharis vesicatoria.*
- Raj. inf.* I. 341. *Cantharis vulgaris officinarum.*
- Mouff. inf.* 144.
- Jonst. inf.* p. 76. t. 7.
- Aldrov. inf.* 276.
- Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 55.
- Schæf. elem.* t. 33.
- icon. t. 47. f. 1.

*Habitat in Ligustro, Fraxino, Sambuco, Syringa, Persiæ populo tremula, Tatarici lonicera tatalica, Calabria quoque asperula, officinalis pro vesicatoriis.*

- nitidula. 2. *L. viridi-ænea*, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 328.  
*n. 2. mant. inf.* 1. p. 215. *n. 2.*  
*Habitat in Anglia.*
- collaris. 3. *L. atra*, vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris  
 cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 215. *n. 3.*  
*Habitat in Russia meridionali, magna; mas duplo minor.*
- lyriaca. 4. *L. viridi-cærulea*, thorace ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
 329. *n. 3. mant. inf.* 1. p. 216. *n. 4.*  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 680. *n. 4. Mus. Lud. Utr.* 102.  
*Gron. zooph.* 620. *Meloë alatus viridi-cæruleus*,  
 thorace luteo.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 30. f. 1.  
*Habitat in Sibiria, India, Oriente, & frequens in aus-*  
*trali Europa.*
- festiva. 5. *L. viridi-ænea nitida*, elytris testaceis maculis viridi-  
 æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. *n. 4. mant. inf.* 1. p.  
 216. *n. 5.*  
*Pall. it.* 2. app. p. 721. *n. 54. Meloë festiva.*  
*Habitat in Sibiria.*
- marginata. 6. *L. atra*, elytrorum marginibus cinerascens. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 329. *n. 5. mant. inf.* 1. p. 216. *n. 6.*  
*Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 62. *n. 62. Meloë (cinereus)*  
*alatus cinereus, antennis elytrisque atris margine*  
*cinereis.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- atrata. 7. *L. corpore atro immaculato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 321.  
*n. 7. mant. inf.* 1. p. 216. *n. 8.*  
*Habitat in Barbaria.*
- erythroce- 8. *L. atra*, capite testaceo, thorace elytrisque cinereo li-  
 phala. neatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. *n. 8. mant. inf.* 1. p.  
 216. *n. 9.*  
*Pall. it.* 1. app. *n. 46.*  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 103. *n. 81.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. t. 30. f. 2.  
*Habitat in Europa australi, & Russia, atrata affinis.*
- vittata. 9. *L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis.* *Fabr. sp. inf.*  
 1. p. 329. *n. 6. mant. inf.* 1. p. 216. *n. 7.*  
*Habitat in America.*

- dubia. 10. *L. atra* capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 10.  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 12.* Meloë algericus.  
*Habitat in Sibiria, erythrocephalæ proxime affinis.*
- afra. 11. *L. nigra*, thorace rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 11.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 680, n. 10.* Meloë alatus niger, thorace rufo.  
*Habitat in Africa, atratæ affinis.*
- indica. 12. *L. nigra*, thorace convexo, elytris lævissimis fuscescenti-luteis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 145. n. 4. t. 30. f. 3.  
*Habitat in America, vesicatoriæ affinis.*
- rusicollis. 13. *L. cærulea*, thorace orbiculato rubro, elytris punctatis pubescentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 179. n. 6. t. 48. f. 4.  
*Habitat in India, syriacæ affinis, sed multo latior.*
- quadrin- 14. *L. nigra* glabra, pectore pubescente, elytris ex griseo  
 culata. luteis: maculis duabus subquadratis nigris. *Pall. it. 2. app. n. 48.*  
*Habitat in Sibiria, statura et magnitudine fenestratæ, et instar ejus oleum suaveolens ex pedibus exsudans.*
- fenestrata. 15. *L. glabra* pallide testacea, thorace depresso, elytris griseis apice nigris: maculis duabus quadratis hyalinis. *Pall. it. 2. app. n. 47.*  
*Habitat ad Volgam inter flores, statura vesicatoriæ, mediæ magnitudinis.*
- clematidis. 16. *L. ex chalybeo atra* nitida, elytris dilute testaceis immaculatis. *Pall. it. 2. app. n. 51.*  
*Habitat in regionibus a fluvio Irtis versus orientem sitis in clematide, vesicatoriæ affinis.*
- uralensis. 17. *L. nigra* opaca glaberrima. *Pall. it. 2. app. n. 56.*  
*Habitat ad montes Uraleses, muscæ domesticæ magnitudinis, proscarabæo affinis, elytris tamen longioribus, et capite latiore.*
- sibirica. 18. *L. atra* opaca glaberrima, elytris margine albis, capite rubro, oculis, ore antennisque nigris. *Pall. it. 2. app. n. 50.*  
*Habitat gregaria in Sibiria lotis et astragalis; maris antennarum articulis mediis compressis et dente munitis.*



- lutea. 19. *L. atra* lanuginosa, elytris ventricosis subcompressis luteis punctis sex nigris. *Pall. it. app. n. 54.*  
*Habitat ad fluvium Irtis, major ad fluvium Ural, syriacæ fere magnitudine.*
- ocellata. 20. *L. nigra* lanuginosa, pedibus testaceis, capite thorace elytrisque flavescentibus, elytris ocellis sex medio nigris. *Pall. it. app. n. 53.*  
*Habitat prope mare caspium, statura meloës trifasciata, & duplo major, instar luteæ oleum ex pedibus exsudans.*
- pectinata. 21. *L. antennis* pectinatis, corpore atro, fronte rubra. *Leptchin it. 2. p. 200. t. 11. f. 26.*  
*Habitat in Sibiria.*
- cinnabarina. 22. *L. nigra*, thorace supra, elytris et capite utrinque rubris. *Scop. ent. carn. n. 186.*  
*Habitat in Carniola.*
- rufa. 26. *L. nigra*, capite rufo. *Scop. ann. hist. nat. p. 103. n. 82.*  
*Habitat in Carniolæ calidioris collibus.*
- subvillosa. 27. *L. flavescens* subvillosa, elytris attenuatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 343. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*
- bicolor. 28. *L. testacea*, elytris apice nigris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 344. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- formicaria. 29. *L. fusca*, elytris antè thoraceque elongato rubris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 344. n. 8.*  
*Habitat in Gallia. \*)*
- pensylvanica. 30. *L. tota* nigra opaca. *Degeer inf. 5. p. 16. n. 1. t. 13. f. 1.*  
*Habitat in Pennsylvania, 4½ lineas longa.*
- pubescens. 31. *L. nigra*, capite thoraceque pubescentibus, elytris flavis macula postè utrinque ferruginea. *Mus. Lesk. p. 43. n. 949.*  
*Habitat -- --*
- ferruginea. 32. *L. ferruginea*, capite thoraceque rufis, elytris fuscis basi testaceis. *Mus. Lesk. p. 43. n. 949. b.*  
*Habitat in Europa.*

\*) Species 17, 19-29 utrum huic generi adscribendæ, an sequenti, dubium.

215. MELOE. *Antennæ moniliformes.*  
*Thorax subrotundus.*  
*Elytra mollia, flexilia.*  
*Caput inflexum, gibbum.*

\* *alis nullis, elytris abbreviatis.*

Proscarabæus. 1. *M. corpore violaceo. Fn. suec. 826. Scop. ent. carn. 184.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 327. n. 1. mant. inf. 1. p. 215. n. 1.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 377. n. 1. Meloë.*

*Degeer inf. 5. p. 31. t. 1. f. 1. Cantharis proscarabæus.*

*Lister scarab. angl. p. 392. n. 27. Scarabæus mollis, e nigra viola nitens.*

*Mouff. inf. 162. f. med. Proscarabæus.*

*Jonst. inf. p. 74. t. 1. Proscarabæi femina.*

*Clut. hemereb. p. 81. n. 73. Vermis maiialis.*

*Goed. inf. 2. t. 42.*

*Frisch inf. 6. t. 6. f. 5.*

*Hufn. inf. 2. t. 9.*

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 10. & 54.*

*Schaeff. elem. t. 82.*

*icon. t. 3. f. 5.*

*Bergstr. nomencl. 1. p. 17. n. 15. t. 2. f. 15.*

*Habitat, vere potissimum in Europæ campis apricis arenosis, ranunculos, veratrum e. c. comedens, ova suaveolentia pariens, tacta oleum limpidissimum flavicans e geniculis præsertim pedum exsudans valde diureticum, cum melle vel oleo mixta in rabie canina commendata.*

maiialis. 2. *M. segmentis dorsalibus abdominis rubris. Fabr. sp. inf.*

*1. p. 327. n. 2. mant. inf. 1. p. 215. n. 2.*

*Frisch inf. 6. t. 6. f. 4. Proscarabæus alter.*

*Pontopp. atl. dan. 1. t. 29.*

*Schaeff. ic. t. 3. f. 6.*

*Habitat in Europa australi, proscarabæo valde affinis.*

marginata. 3. *M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 328. n. 3. mant. inf. 1. p. 215. n. 3.*

*Schranck Beytr. 7. Naturg. p. 71. n. 19. Meloë (hungarus) apterus ater lævis, thoracis basi elytrorumque margine interiori ferrugineis.*

*Habitat in Italia & Hungaria, proscarabæo duplo minor.*

\* \* *alata*, *elytris alas regentibus*.  
 † *maxilla bifida*, *Mylabrides Fabricii*.

- fasciata. 4. *M. nigra*, *elytris fascia media flava*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 1.  
*Habitat in India*.
- cichorei. 5. *M. nigra*, *elytris flavis : fasciis tribus nigris*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 2.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 680. n. 5. *Mus. Lud. Ulr.* 103.  
*Meloë alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis*.  
*Degeer inf.* 5. p. 17. n. 2. t. 13. f. 2. *Cantharis cichorei*.  
*Hasselq. it.* p. 410. n. 101. *Chrysomela cichorei*.  
*Imper. hist. nat.* 78. *Cantharis fasciata*.  
*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 11.  
*Habitat in totius Orientis, etiam Sibiriae & Calabriae cichoreis, proscarabæi magnitudine, in Sina officinalis, antennis interdum apice flavis*.
- decem- 6. *M. atra*, *elytris testaceis : punctis quinque nigris*. *Fabr. punctatus. sp. inf.* 1. p. 331. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 5.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 680. n. 6. *Meloë (quadripunctata) alatus niger, elytris flavis : maculis quinque nigris, antennis clavatis*.  
*Habitat in Italia, m. cichorei similis, at triplo minor, antennarum articulo ultimo clavato*.
- capensis. 7. *M. nigra*, *elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis flavis*. *Mus. Lud. Ulr.* 104.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 4.  
*Degeer inf.* 7. t. 48. f. 14.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, m. cichorei duplo minor*.
- chryso- 8. *M. viridi-cærulescens, subtus nigro-violacea*. *Amæn. meloides. ac.* 6. p. 396. n. 25.  
*Habitat Surinami, an hujus generis?*
- quadri- 9. *M. atra*, *elytris testaceis : punctis duobus nigris*. *Fabr. punctata. mant. inf.* 1. p. 217. n. 6.  
*Habitat in Russia, decempunctatæ affinis*.
- primacu- 10. *M. nigra, coleoptris flavis : fascia punctoque communi lata, fuscis*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 331. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 217. n. 7.  
*Habitat in Oriente*.

- algirica. 11. *M. nigra*, elytris testaceis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 3.  
*Fabr. syst. ent. app.* 828. *Mylabris immaculata*.  
*Degeer inf.* 7. n. 53. t. 40. f. 17. *Cantharis fulva*.  
*Habitat in India*.
- testacea. 14. *M. testacea*, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 331. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 217. n. 8.  
*Habitat in Sibiria, congeneribus paulo minor*.
- americana-  
na. 15. *M. nigra*, thorace semicirculari, elytris fasciis tribus flavis: prima arcuata, reliquis confluentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 145. n. 2. t. 30. f. 5. a.  
*Habitat in America, antennarum apice clavato, ochraceo*.
- indica. 16. *M. nigra*, elytris flavescentibus posterius fulvis: puncto, baseos litura triloba, fascia media dentata apicisque margine semilunari nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 147. n. 5. t. 30. f. 6.  
*Habitat in India, congeneribus latior*.
- elongata. 17. *M. nigra nitida*, elytris flavis, cæruleo-variis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 147. n. 6. t. 30. f. 7. b.  
*Habitat - - - satis angusta*.
- undulata. 18. *M. nigra*, elytrorum vittis duabus angustis undulatis dentatis spadiceo-marginatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 179. n. 8. t. 48. f. 3.  
*Habitat in India*.
- aurea. 19. *M. viridi-aurea*, elytris fulvis. *Degeer inf.* 7. n. 54. t. 48. f. 18.  
*Habitat - - - 4 lineas longa; an vere distincta species?*
- arcuata. 20. *M. nigra hirsuta*, elytris anterieus macula arcuata fasciisque binis undatis flavis.  
*Pall. ic. inf. Russ.* 2. t. E. f. 3. b? *Meloë phalerata*.  
*Degeer inf.* 7. n. 52. t. 48. f. 15. *Cantharis undato-bifasciata*.  
*Habitat - - - tres lineas longa, antennis nigris apice clavatis*.
- bifasciata. 21. *M. nigra hirsuta*, elytris anterieus macula rotunda, & ad angulum anteriorem altera fasciisque binis transversis flavis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 179. n. 7. t. 48. f. 2.  
*Degeer inf.* 7. n. 50. t. 48. f. 13. *Cantharis bifasciata*.  
 β) *Pall. ic. inf. Russ.* 2. t. E. f. 3. a. *Meloë plagiata*.

*Habitat in India, magna, antennis flavis, elytrorum basipicea, a 9½ lineis ad 3 lineas ultra pollicem longa; is β) ad elytrorum angulum anteriorem macula nulla.*

trifasciata. 22. *M. ex virescente chalybea sericea cana, elytris griseo pallidis: fascia communi alteraque ex virescente atrata. Pall. it. 2. app. n. 52.*

*Habitat in vicinia maris caspii, magnitudine meloës Schaefferi, statura n. cichorei, antennis apice clavatis.*

atrata. 23. *M. aterrima nitens, elytris fascia flava versus apicem undulata. Pall. it. 2. app. n. 55.*

*Habitat in confiniis maris caspii, frequens in gypsophilis & veronicis florentibus, antennis apice clavatis, oleum ex pedibus exsudans.*

necydalea. 24. *M. nigra, elytris ruberrimis, abdomine paulisper brevioribus, apice distantibus. Pall. it. 2. app. n. 49.*

*Habitat in Russici imperii provinciis orientalibus, oleum pariter suaveolens exsudans.*

chloroptera. 25. *M. nigra subvillosa, elytris flavis. Geoffr. inf. par. 1. p. 344. n. 6.*

*Habitat in Gallia, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*

pensylvanica. 26. *M. nigra opaca tota.*

*Degeer inf. 5. p. 16. n. 1. t. 13. f. 1. Cantharis pensylvanica.*

*Habitat in Pennsylvania. \*)*

Marci. 13. *M. nigra, pedibus ferrugineis, palpis clavatis crispis. Habitat Calmariae Suecorum, an hujus generis?*

melanura. 30. *M. elytris flavis: maculis quatuor apiceque nigris, antennis clavatis. Petagn. inf. Calabr. p. 127. n. 136. f. 13.*

*Habitat Brancalemi in Calabria, in frumenti spicis, n. cichorei simillima, sed major.*

ochroptera. 31. *M. nigra, elytris croceis basi nigris: utrinque gutta crocea ante & pone medium, fascia interrupta apiceque nigris. Mus. Lesc. p. 43. n. 952.*

*Habitat extra Europam.*

\*) Huic tribui referendæ videntur species ab Ill. Pallas descriptæ, & in ic. inf. Russ. delineatæ, luxata T. B. f. 5. a. b. variabilis t. E. f. 7. & 14. b. & solonica t. E. f. 12. de specibus 13. 22-26 magis dubium.

bicolor. 32. *M. nigra*, elytris flavis : basi utrinque punctulo, in medio fascia ad margines externos latiore apiceque nigris. *Mus. Lesk. p. 43. n. 953.*  
*Habitat extra Europam.*

† † *maxilla integra*, Cerocomata Fabricii.

Schaefferi. 12. *M. viridis*, antennis pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 331. n. 1. mant. inf. 1. p. 217. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 358. n. 1. Cerocomia.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 681. n. 12. Meloë alatus viridis,*  
*pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis*  
*brevibus irregularibus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 13.*  
*Schaeff. el. t. 37.*  
*ic. t. 53. f. 8. 9.*  
*Habitat in Europa magis australi & Sibiria, statura*  
*vesicatoriæ, sed dimidio minor.*

VahlII. 27. *M. viridis*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 217. n. 2.*  
*Habitat in Barbariæ umbellatis, statura & magnitudine*  
*m. Schaefferi.*

Schreberi. 28. *M. viridis*, antennis pedibus abdominisque segmentis tribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 331. n. 2. mant. inf. 1. p. 217. n. 3.*  
*Habitat in Europa magis australi, m. Schaefferi nimis*  
*affinis, at duplo major, antennis flavis.*

Gouani. 29. *M. atra*, elytris apice fasciaque sanguineis. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1068. n. 11.*  
*Habitat in Gallia, pediculi magnitudine ; an hujus ordinis ?*



216. MORDELLA. *Antennæ moniliformes, aur*  
*pectinataæ.*

*Palpi quatuor, anteriores cla-*  
*vati, posteriores filiformes.*

*Caput deflexum sub collo, in*  
*territa.*

*Elytra deorsum curva apicem*  
*versus.*

*Ante femora lamina lata ad*  
*basin abdominis.*

\* *antennis pectinatis.*

ferrugi- 7. *M. rufa, pectore ano pedibusque nigris. Fabr. sp. inf.*  
nea. *I. p. 332. n. 1. mant. inf. I. p. 217. n. 1.*  
*Habitat in India.*

nasuta. 8. *M. corpore atro immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 3*  
*p. 66. f. 77. Fabr. mant. inf. I. p. 217. n. 2.*  
*Habitat in Japonia, glabra, aculeata quadruplo major.*

pectinata. 9. *M. rufa, elytris nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 332. n. 3*  
*mant. inf. I. p. 217. n. 3.*  
*Habitat in America.*

paradoxa. 1. *M. thoracis lateribus elytrisque testaceis. Fn. suec. 831*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 332. n. 2. mant. inf. I. p. 218. n. 4.*  
*Habitat rarius in Europæ plantis umbellatis.*

flabellata. 10. *M. testacea, ore pectore abdominisque dorso atris. Fabr.*  
*sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. I. p. 218. n. 5.*  
*Habitat in Italia, ferrugineæ affinis, at duplo fere minor.*

punctata. 11. *M. thorace testaceo nigro punctato, elytris nigris:*  
*marginibus testaceo. Fabr. mant. inf. I. p. 218. n. 6.*  
*Habitat in Cayenna, statura pectinataæ, atra, capite testaceo.*

\*\* *antennis moniliformibus.*

fexmacu- 12. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: macula ni-*  
lata. *gra. Fabr. sp. inf. I. p. 332. n. 4. mant. inf. I. p. 213. n. 7.*  
*Habitat in America.*

- bimacu-  
lata. 13. *M. ferruginea*, pectore atro, elytris testaceis : macula  
nigra. *Fabr. mant. inf. 1. p. 218. n. 8.*  
*Habitat in Hungaria, magna.*
- dimidiata. 14. *M. atra*, elytris basi flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 5.*  
*mant. inf. 1. p. 218. n. 9.*  
*Habitat - - - statura sexmaculatae, abdomine obtuso*  
*fere truncato.*
- limbata. 15. *M. ferruginea*, vertice thoracis disco elytrisque atris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 6. mant. inf. 1. p. 218. n. 10.*  
*Habitat - - - statura sexmaculatae, antennis ferratis,*  
*pedibus nigris.*
- aculeata. 2. *M. atra*, ano spina terminato. *Fn. suec. 832. Scop. ent.*  
*carn. 192.*  
*Fn. suec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo ter-*  
*minata.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 7. mant. inf. 1. p. 218. n. 11.*  
*Mordella ano aculeato, corpore atro immaculato.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 353. n. 1. Mordella atra caudata*  
*unicolor.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 46.*  
*Schaeff. elem. t. 84.*  
*ic. t. 127. f. 7.*
- \*) *Lepech. it. 2. t. 10. f. 15.*  
*Habitat frequens in Europæ borealis floribus semiflosculo-*  
*sis, umbellatis, in Calabriae thapsia.*
- fasciata. 16. *M. nigra*, ano aculeato, elytris fasciis duabus cinereis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 8. mant. inf. 1. p. 218. n. 12.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 354. n. 2. Mordella atra caudata,*  
*fasciis villosa-aureis.*  
*Habitat in Germaniæ & Europæ magis australis floribus,*  
*an varietas aculeatae?*
- scopunc-  
tata. 17. *M. ano aculeato*, elytris nigris : punctis quatuor flavis ;  
primo lunato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 9. mant. inf. 1.*  
*p. 218. n. 13.*  
*Habitat in America septentrionali & Bavaria.*
- testacea. 18. *M. atra*, elytris testaceis : marginibus nigris. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 218. n. 14.*  
*Habitat in Africae daeco, statura & magnitudine aculeatae,*  
*ano aculeato.*

abdomi- 19. *M. nigra*, thorace abdomineque fulvis, ano aculeato.  
nalis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 10. mant. inf. 1. p. 219.*  
*n. 15.*

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 15. Mordella bicolor.*

*Habitat in Germania.*

humeralis. 3. *M. atra*, ore lateribus thoracis pedibusque flavis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 333. n. 11. mant. inf. 1. p. 219. n. 16.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 682. n. 3? Fn. suec. 833.\* Mordella*  
*atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavesc-*  
*centibus.*

*Habitat in Europæ floribus.*

frontalis. 4. *M. atra*, fronte pedibusque flavescens. *Fn. suec.*  
*834.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 12. mant. inf. 1. p.*  
*219. n. 17.*

*Habitat in Europæ borealis floribus.*

thoracica. 5. *M. atra*, capite thoraceque flavis. *Fn. suec. 835.\* Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 333. n. 13. mant. inf. 1. p. 219. n. 18.*  
*Habitat in Europæ floribus.*

flava. 6. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris. *Fn. suec. 836.\* Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 334. n. 14. mant. inf. 1. p. 219. n. 19.*  
*Habitat frequens in Europæ floribus umbellatis.*

tricuspi- 20. *M. flava*, lamina abdominali cyanea, elytrorum punctis  
data. tribus nigris thorace posterius tricuspidato. *Lepech. in*  
*1. t. 19. f. 8.*

*Habitat in deserto Uralensi.*

murina. 21. *M. pubescens undulata*, cinerea thoracis maculis tribus  
nigris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 148. n. 3.*  
*Habitat Berolini, statura & magnitudine fasciatæ.*

sempunct- 22. *M. atra nitida*, elytrorum punctis tribus albis. *Herbst*  
tata. *apud Fuesli arch. inf. 6. p. 148. n. 4.*  
*Habitat in Marchia, murina fere major.*

oxyacan- 23. *M. testacea*, capite nigro, thorace fusco. *Forst. nov.*  
thæ. *inf. sp. 1. p. 63. n. 63.*  
*Habitat in Angliæ floribus cratægi oxyacanthæ, acu-*  
*leatæ fere magnitudine.*

melano- 24. *M. nigra*, elytris, thorace capite pedibusque testaceis.  
pus. *Forst. sp. inf. nov. 1. p. 64. n. 64.*  
*Habitat cum m. oxyacanthæ, magnitudine pediculi*  
*majoris.*

bicolor. 25. *M. atra*, elytris testaceis apice nigris fasciaque nigra  
in medio. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 65. n. 65.*

*Habitat in Anglia, frequens in floribus cratægi, rumicis, umbellatarum, pediculi magnitudine.*

- perlata. 26. *M. nigra nitida subpilosa, thoracis margine posteriore, elytrorumque maculis quatuor perlatis. Sulz. hist. inf. p. 67. t. 7. f. 14.*  
*Habitat in Rhætia.*

- ruspes. 27. *M. fusca, pedibus ferrugineis. Geoffr. inf. par. 1. p. 355. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*

\*\*\* *antennis clavatis.*

- clavicornis. 28. *M. tota picea. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 66. n. 66.*  
*Habitat in Anglia, cursitans in rhei rhabarbari floribus, thoracica magnitudine, vel paulo major; utrum hujus, an perinde ac 1. 7-11. proprii generis?*

217. STAPHYLINUS. *Antennæ moniliformes.*  
*Palpi quatuor.*  
*Elytra dimidiata. Alæ tectæ.*  
*Cauda simplex, exferens duas vesiculas oblongas.*

\* *palpis omnibus filiformibus.*

- aureus. 27. *St. capite thorace elytrisque villoso-aureis, abdomine nigro: fasciis cinereis. Fabr. mant. inf. 1. p. 219. n. 1.*  
*Habitat in Siam, hirti magnitudine.*

- hirtus. 1. *St. hirsutus niger, thorace abdomineque posterius nigris. Fn. suec. 839. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 334. n. 1. mant. inf. 1. p. 219. n. 2.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 363. n. 7. Staphylinus niger villosus, &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 20. n. 5. Staphylinus bombylius. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 16.*  
*Schæff. monogr. 1754. t. 2. f. 12. ic. t. 36. f. 6.*  
*Habitat in Europæ arenosis.*

- marinus.** 2. *St. pubescens cinereus nigro-nebulosus.* *Fn. suec.* 840.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 334. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 219. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 362. n. 1. *Staphylinus villosus*  
*fulco cinereoque viridi tessellatus.*  
*Degeer inf.* 4. p. 12. n. 1. t. 1. f. 1. *Staphylinus villosus*  
*Schaeff. ic. t.* 4. f. 11.  
*Stroem. ad. Nidr.* 6.  
*Habitat in cadaveribus, fimo, elytris subtus cæruleis.*  
*Larva hexapus, nuda, pallida, capite segmentisque tribus*  
*anterioribus fuscis; cauda setis duabus articularis fuscis*  
*tusque tuberculo pediformi cylindrico tubuloso.*
- olens.** 28. *St. niger opacus immaculatus, capite thorace latiore*  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 219. n. 4.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1090. *Fn. Fridrichs.*  
*p. 23. n. 28.* *Staphylinus totus niger, capite thoraceque*  
*scabriusculo.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 6. p. 149. n. 4. *Staphylinus*  
*unicolor.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 360. n. 1. t. 7. f. 1. *Staphylinus*  
*ater extremo antennarum articulo lunulato.*  
*Raj. inf.* p. 109. n. 1. *Staphylinus major totus niger.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus.*
- maxillo-** 3. *St. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine*  
**fus.** *capitis.* *Fn. suec.* 841. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 334. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 220. n. 5.  
*Degeer inf.* 4. p. 18. n. 4. t. 1. f. 7. 8. *Staphylinus*  
*balteatus.*  
*List. log.* 391. *Scarabæus majusculus niger, forcipibus infestis.*  
*Mouff. inf.* 197.  
*Gron. zooph.* 630.  
*Jonst. inf. t.* 17. f. 1-3.  
*Bocc. mus.* 2. t. 31. f. A. A.  
*Habitat in Europæ silvis, viditans rapina.*
- oculatus.** 29. *St. ater nitidus, capite utrinque macula fulva.* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 335. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 220. n. 6.  
*Habitat in novis Hollandia & Seelandia.*

*Staphylini voracissimi, rapina insectorum victitant, mordaces, humentibus ut plurimum delectantur, vesiculas caudales periculo imminente exserunt; larvæ subterraneæ: Spec. 7-9. 21. 30. 96-100. thorace scutiformi, domine utrinque pilis hispido apice setoso gaudent.*

- dilatatus. 30. St. thorace marginato, atro nitidulo, elytris fuscis, antennis serratis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 220. n. 7.*  
*Habitat Halæ Saxonum, erythroptero major.*
- bicolor. 96. St. ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 997.*  
 β) Staphylinus ater, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 999.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscus. 97. St. fuscus, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1000.*  
*Habitat in Europa.*
- clavatus. 98. St. ater glaber, elytris testaceis: marginibus externis fuscis, antennis clavatis, pedibus fusco-testaceis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 1001.*  
*Habitat in Europä.*
- flavus. 99. St. niger, thorace marginibus externis late, anteriore posteriorique summo elytrisque flavis: vitta media margineque externo fuscis, antennis pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1004.*  
*Habitat in Europa.*
- melanophthalmus. 100. St. thorace capiteque rufis, oculis, nucha abdomineque nigris, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1005.*  
*Habitat in Europa.*
- erythrop- 4. St. ater, elytris, antennarum basi pedibusque rufis. *Fnæ-  
 terus. suec. 842.\* Scop. ent. carn. 306. Stroem. act. nidr. 3:  
 p. 404. t. 6. f. 8. Fabr. sp. inf. 1. p. 335. n. 5. mant.  
 inf. 1. p. 220. n. 8.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 364. n. 9. Staphylinus ater non  
 nitens.*  
*Frisch inf. 5. p. 49. t. 25. Scarabæus rapax, elytris  
 brevibus.*  
*Degeer inf. 4. p. 21. n. 6.*  
*Schaeff. elem. t. 117.*  
*icon. t. 2. f. 2.*
- β) Staphylinus ater, capitis verticè, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuscis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 968?*  
*Habitat sæpius in Europæ simo.*
- erythrocephalus. 31. St. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 335. n. 6. mant. inf. 1. p. 220. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*



- pilosus.** 32. *St. pilosus niger*, abdomine fusco, elytris scabris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 220. n. 10.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, brevis, crassus.*
- politus.** 5. *St. niger*, thorace elytrisque nitidis. *Fn. succ. 843.\**  
*Scop. ent. carn. 304. Fabr. sp. inf. 1. p. 335. n. 7.*  
*mant. inf. 1. p. 220. n. 11.*  
*Fn. succ. 605. Staphylinus niger*, thorace æneo nitido,  
 elytris atro-cæruleis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 361. n. 3. Staphylinus ater, &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 22. n. 7. Staphylinus niger nitidus, &c.*  
*Schæff. ic. t. 89. f. 12.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus, recens odorem ambrosiacum spargens.*
- brunnipes.** 33. *St. niger*, pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 336. n. 8. mant. inf. 1. p. 220. n. 12.*  
*Habitat in Anglia, statura & magnitudine politi.*
- nitidus.** 34. *St. ater nitidus*, elytris testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 220. n. 13.*  
*Habitat Kilonii, statura & magnitudine politi, an ejus varietas?*
- fulgidus.** 35. *St. ater nitidus*, elytris plantisque testaceis, capite punctulato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 220. n. 14.*  
*Habitat Kilonii, statura politi, at tenuior.*
- marginatus.** 36. *St. ater*, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 336. n. 9. mant. inf. 1. p. 221. n. 15. Ald. Nidros. 4. p. 332. n. 33.*
- obtus.** 9. *St. testaceus*, elytris antè anoque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 336. n. 11. mant. inf. 1. p. 221. n. 17.*  
*Habitat in Germania, Anglia, pediculi magnitudine, pectore inter femora posteriora fusco.*
- lignorum.** 10. *St. fuscus*, elytris, sutura, abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. succ. 848.\**  
*Habitat in Europa.*
- silphoides.** 11. *St. niger*, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis; margine maculaque longitudinali nigris.  
*Habitat in Europa, obtuso similis.*
- subterraneus.** 12. *St. niger*, elytris antè extrorsum flavis, pedibus nigris. *Fn. succ. 849.\**  
*Habitat in Europa.*

- flavescens. 13. St. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. suec.* 850.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 16.  
*Habitat in Europa boreali.*
- biguttatus. 15. St. niger, elytris puncto fulvo. *Fn. suec.* 851.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 20.  
Staphylinus niger, elytris puncto albido, oculis prominulis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 371. n. 24?  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1123?  
*Habitat ad littora maris baltici.*
- cicindeloides. 37. St. niger rugosus, antennis pedibusque testaceis: geniculis nigris. *Schaller Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. p. 324.  
*Habitat Halæ Saxonum, statura & magnitudine biguttati.*
- bipustulatus. 16. St. niger, elytris puncto ferrugineo. *Fn. suec.* 847.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 18.  
*Habitat in Europa boreali, antennis extrorsum crassioribus.*
- analis. 38. St. ater nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 221. n. 19.  
*Habitat Kilonii, bipustulato major.*
- clavicornis. 39. St. niger immaculatus, thorace rotundato lævi, antennis extrorsum crassioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 25.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 371. n. 25?  
β) *Scop. ent. carn.* n. 303. Staphylinus clavicornis.  
*Habitat Kilonii, β) pedibus rufis sub Carniolæ pyri cortice.*
- Cantharellus. 17. St. niger, elytris glaucis apice flavicantibus.  
*Habitat in Suecia ad Hammarby, cantharidi biguttatæ simillimus.*
- littoreus. 18. St. niger, elytris anterius griseis, pedibus rufis. *Fn. suec.* 852.\* *It. gott.* 173.  
*Habitat in littoribus.*
- sanguineus. 19. St. niger, elytris sanguineis. *Fn. suec.* 853.\*  
*Habitat in Europa.*
- caraboides. 20. St. flavus immaculatus. *Fn. suec.* 854.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 337. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 222. n. 33.  
*Fn. suec.* 613. Staphylinus totus testaceus.  
*Degeer inf.* 4. p. 25. n. 12. Staphylinus fulvus.  
*Habitat in Europa boreali.*

- chryso- 21. St. niger, thorace elytris pedibusque testaceis. *Fn. suec.*  
 melinus. 855.\* *Fabr. sp. inf. 1. p. 685. n. 21. mant. inf. 1. p.*  
*221. n. 28.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 368. n. 18.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- fuscipes. 22. St. niger, elytris pedibusque testaceis. *Fn. suec. 857.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 336. n. 15. mant. inf. 1. p. 221. n. 22.*  
*Habitat in Europæ stercore.*
- hypno- 40. St. ater lævis, thoracis lateribus, elytris pedibusque  
 rum. testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 336. n. 16. mant. inf. 1.*  
*p. 221. n. 23.*  
*Habitat in Angliæ hypnis.*
- nitidulus. 41. St. ater, thoracis marginibus flavescentibus, elytris  
 ferrugineis : margine nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 337. n.*  
*17. mant. inf. 1. p. 221. n. 24.*  
*Habitat in Anglia.*
- atricapit- 42. St. thorace rufo, elytris fuscis : puncto bascos margine-  
 lus. que posteriore albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 337. n. 19.*  
*mant. inf. 1. p. 221. n. 25.*  
*Habitat in Anglia.*
- marginel- 43. St. ater, elytrorum margine laterali & posteriore fer-  
 lus. rugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 337. n. 20. mant. inf. 1.*  
*p. 221. n. 26.*  
*Habitat in Angliæ stercore, mediæ magnitudinis.*
- canalicu- 44. St. flavus, capite abdominisque cingulo atris, thorace  
 latus. canaliculato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 221. n. 29.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- tricolor. 45. St. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque  
 testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 221. n. 30.*  
*Habitat in Daniæ boletis, parvus.*
- rufipes. 24. St. ater glaber, pedibus rufis. *Fn. suec. 858.\* Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 337. n. 22. mant. inf. 1. p. 222. n. 31.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 367. n. 19. Staphylinus niger, &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 24. n. 11. t. 1. f. 14. Staphylinus*  
*ovatus glaber, &c.*  
*Habitat in Europa, interdum testaceus, aut niger, pedibus*  
*testaceis.*

- melano- 46. *St. ferrugineus*, capite atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 222.*  
cephalus. n. 32.  
*Habitat in Suecia, minutus.*
- rugosus. 47. *St. niger*, thorace elytrisque rugosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 338.*  
n. 24. *mant. inf. I. p. 222. n. 34.*  
*Habitat in Anglia.*
- piceus. 25. *St. niger*, elytris piceis, thorace depresso: lineis elevatis  
tribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 338. n. 25. mant. inf. I. p.*  
*222. n. 35.*  
*Habitat in Europa boreali, pediculi magnitudine, sed ma-*  
*gis oblongus.*
- boleti. 26. *St. fuscus*, elytris pallidioribus, antennis pedibusque li-  
vidis. *Fa. succ. 859.\**  
*Habitat gregarius in boletis abietinis, quorum fistulas tan-*  
*quam apes suas fistulas intrat, pulice dimidio minor.*
- obscurus. 48. *St. niger* opacus obsolete punctatus, antennis basi fuscis,  
versus apicem incrassatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*6. p. 149. n. 8.*  
*Habitat Berolini, magnitudine politi, statura murini.*
- tricornis. 49. *St. niger*, fronte bicuspidata, thorace posterius cornuto,  
elytris rubris: margine superiori et interiori nigricante.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 149. n. 9. t. 30. f. 8. c.*  
*Habitat rarior Berolini, polito tertia parte minor.*
- blattinus. 50. *St. ater*, thorace lato, elytris pedibusque testaceis nitidis.  
*Schranck inf. austr. p. 236. n. 447.*  
*Habitat in Austria in terra, habitu blattæ lucifugæ.*
- minor. 51. *St. niger* glaber, elytris pallide, antennis basi fuscis, pe-  
dibus luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 97. n. 1096.*  
*Habitat in Europa boreali, ultra 3 lineas longus.*
- faxatilis. 52. *St. ater* nitidus subpubescens, elytris pedibus abdominis-  
que apice testaceis. *Schranck inf. austr. p. 234. n. 442.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 365. n. 13.*  
*Habitat in Germania & Gallia, in terra sub lapidibus, mi-*  
*nore minor.*
- similis. 53. *St. niger*, pedibus luteis: femorum apice nigro. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf. 6. p. 151. n. 15.*  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine biguttæ si.*

- Domicella. 54. *St. niger*, thorace elytris pedibusque badiis. *Schrank inf. austr. p. 235. n. 444.*  
*Habitat in Austria superiori, 2 lineas longus.*
- glaberri-mus. 55. *St. niger nitidus*, antennis apicem versus incrassatis: articulo primo longissimo. *Herbst apud Tuesli arch. inf. 6. p. 151. n. 17.*  
*Habitat Berolini, 4 circiter lineas longus.*
- buphtalmos. 56. *St. niger immaculatus*, oculis magnis exsertis. *Schrank Beyr. zur Naturg. p. 72. §. 21. inf. austr. p. 235. n. 445.*  
*Habitat in Austria ad hortorum muros.*
- ophthalmicus. 57. *St. atro-cæruleus punctatus*, oculis macula pallida lunulata suffusus. *Scop. ent. carn. n. 300.*  
*Habitat in Carniola.*
- fulvipes. 58. *St. atro-cæruleus*, palpis pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n. 301.*  
*Habitat in Carniola.*
- brassica. 59. *St. ferrugineus*, capite et corpore nigris, elytris punctatis, antennis extorsum crassioribus villosis. *Scop. ent. carn. n. 309.*  
*Habitat in Carniolæ brassica.*
- arnica. 60. *St. niger*, thorace antennisque ferrugineis, pedibus testaceis. *Scop. ent. carn. n. 310.*  
*Habitat in Carniolæ arnica.*
- hellebori. 61. *St. niger*, elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n. 311.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 366. n. 14?*  
*Habitat in Carniolæ helleboro, & Gallia.*
- fossor. 62. *St. fusco-rufus*, elytris apice pedibusque rufis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 109. n. 105.*  
*Habitat in fungis metallorum Schemnizensium.*
- fodinarum. 63. *St. cærulescens villosus*, tarsis rufis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 109. n. 106.*  
*Habitat ad ligna cuniculorum Schemnizensium, statura fossoris.*
- niger. 64. *St. totus niger*, capite thoraceque nitido non punctato. *Müll. prodr. zool. dan. p. 98. n. 1109. Fn. Fridrichsd. p. 23. n. 227.*  
*Habitat in Dania.*

- cursor. 65. *St. niger*, thorace depresso: litura duplici, elytris pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1095.  
*Habitat in Dania.*
- agarici. 66. *St. luteus*, capite nigro, abdomine rufo. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1097.  
*Habitat in Daniæ agaricis.*
- latus. 67. *St. niger*, elytrorum summo margine posteriori pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1011.  
*Habitat in Dania.*
- pene-trans. 68. *St. niger*, antennis, elytris pedibusque castaneis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1102.  
*Habitat in Dania.*
- vernalis. 69. *St. fulvus*, elytris anterieus, abdomineque posterius nigris, medio rufo. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 98. n. 1103.  
*Habitat in Dania, facie chrysomelini, vere potissimum conspicuus.*
- marginalis. 70. *St. niger*, thoracis marginibus, elytris, pedibus abdominisque apice flavis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 98. n. 1107.  
*Habitat in Dania.*
- fuscicornis. 71. *St. niger*, capite thoraceque nitidis, elytris margine inferiore antennisque lividis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 98. n. 1112.  
*Habitat in Dania.*
- floreus. 72. *St. niger*, thorace convexo punctulato, elytris pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1117.  
*Habitat in Daniæ floribus.*
- fracticornis. 73. *St. linearis niger*, pedibus antennisque fuscis: infirmo articulo atro. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1118.  
*Habitat in Dania.*
- formicarius. 74. *St. linearis niger*, infimo antennarum articulo atro. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1119.  
*Habitat in Dania, aliquando rufus, capite & abdomine, aut etiam thorace, aut infimus elytris nigris.*
- punctatus. 75. *St. atropæuruleus*, femoribus testaceis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1121. *Ad. Nidros.* 4. p. 36.  
*Habitat in Dania.*



- striatus. 76. St. ater, thorace punctato striatoque. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1122. *ad. Nidrosf.* 4. p. 35.  
*Habitat in Dania.*
- spinipes. 77. St. niger, pedibus testaceis, tibiis spinosis. *Pontopp. Naturg. Dannem.* p. 211. u. 9. t. 16.  
*Habitat in Dania.*
- tataricus. 78. St. totus ater nitidas, thorace cylindrico-capite angustiore, elytris subtilissime punctatis. *Pall. it.* 2. app. n. 74.  
*Habitat id lacum Tatariae falsum Inderissem, maximus, gracilis, longus, glaberrimus.*
- pubescens. 79. St. villosus nigro-fuscus, nigro viridi griseoque maculatus, subtus argenteus, abdominis apice subrotundato. *Degeer inf.* 4. p. 17. n. 2.  
*Habitat in Europa in terra & fimo, 6½ lineas longus.*
- chalcophthalmus. 80. St. obscure fuscus, capite thoraceque æneis nitidis, tibiis fasciisque rufis-fuscis. *Degeer inf.* 4. p. 22. n. 8.  
*Habitat in Europa, polito paulo minor.*
- æneus. 81. St. glaber æneo-viridis nitidus, abdomine pedibusque nigris. *Degeer inf.* 4. p. 23. n. 9.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 367. n. 17.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 98. n. 1110.  
*Habitat in Europa, 4 lineas longus.*
- glaber. 82. St. niger nitens, elytris lævibus pedibusque testaceis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 364. n. 10.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 98. n. 1106.  
*Habitat in Europa.*
- glaucus. 83. St. atro-cærulescens, extremis antennarum articulis lunulato. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 361. n. 2.  
*Habitat in Gallia.*
- macropthalmus. 84. St. ater, elytris thorace duplo longioribus. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 362. n. 4.  
*Habitat in Gallia.*
- ochrocephalus. 85. St. pubescens, capite flavo, thorace elytrisque fusco nigroque nebulosis: punctis impressis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 363. n. 8.  
*Habitat in Gallia.*

- punctatus. 86. *St. niger nitens*, elytris punctatis pedibusque testaceis. *Geoffr. inf. par. I. p. 365. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- curtus. 87. *St. niger nitens*, thorace plano marginato, elytris punctatis pedibusque fuscis. *Geoffr. inf. par. I. p. 365. n. 12.*  
*Habitat in Gallia.*
- fulcatus. 88. *St. niger*, thorace marginato fulcato, pedibus rufis. *Geoffr. inf. par. I. p. 730. n. 45.*  
*Habitat in Gallia.*
- limbatus. 89. *St. niger*, elytris fuscis: margine flavo. *Geoffr. inf. par. I. p. 368. n. 19.*  
*Habitat in Gallia, flavescente multo major.*
- maculatus. 90. *St. niger*, thorace utrinque elytrisque macula flava. *Geoffr. inf. par. I. p. 369. n. 20.*  
*Habitat in Gallia.*
- rubricollis. 91. *S. atro-cærulescens*: thorace rubro. *Geoffr. inf. par. I. p. 370. n. 23.*  
*Habitat in Gallia.*
- cylindricus. 101. *St. cylindricus* totus ater glaber. *Mus. Lesk. p. 44. n. 967.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 102. *St. ater*, capite thoraceque glabris, elytris fusco-ferrugineis, antennarum basi et articulis quinque ultimis planisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 970.*  
*Habitat in Europa.*
- pictus. 103. *St. ater*, capite thoraceque piceis glabris. *Mus. Lesk. p. 44. n. 972.*  
*Habitat in Europa.*
- glabra. 104. *St. ater* glaber. *Mus. Lesk. p. 44. n. 973.*  
*Habitat in Europa.*
- erythropus. 105. *St. ater*, antennis, pedibus elytrisque rufis: his basi nigris. *Mus. Lesk. p. 44. n. 974.*  
*Habitat in Europa.*
- cruentatus. 106. *St. ater*, elytris singulis disco gutta sanguinea. *Mus. Lesk. p. 44. n. 975.*  
*Habitat in Europa.*

- lugubris. 107. St. niger, antennis, elytris pedibusque fuscis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 976.*  
 β) St. ater, elytris, antennis pedibusque fusco-testaceis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 982.*  
*Habitat in Europa.*
- biclava- 108. St. ater glaber, elytris pedibusque fusco-testaceis, antennis biclavatis: basi longa clavata atra. *Musf. Lesk. p. 44. n. 978.*  
*Habitat in Europa.*
- rufescens. 109. St. capite thoraceque atris punctatis, abdomine nigro, elytris, antennis pedibusque fusco-rufescentibus. *Musf. Lesk. p. 44. n. 979.*  
*Habitat in Europa.*
- cephalo- 110. St. ater, capite magno, elytris fuscis, antennis ferrugineis, pedibus testaceis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 980.*  
*Habitat in Europa.*
- brevipes. 111. St. ater, elytris pedibusque testaceis, tibiis brevibus. *Musf. Lesk. p. 44. n. 981.*  
*Habitat in Europa.*
- marginel- 112. St. niger, thoracis abdominisque marginibus, antennarum basi, elytris pedibusque testaceis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 982.*  
*Habitat in Europa.*
- hæmor- 113. St. ater, thorace utrinque impresso, elytris, pedibus, ore rhoidalis. anoque testaceis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 983.*  
*Habitat in Europa.*
- crassipes 114. St. ater, thorace longo subquadrato glabro, elytris, fuscis, antennis pedibusque rufescentibus, femoribus anticis crassis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 986.*  
*Habitat in Europa.*
- flavicornis. 115. St. ater, punctis elevatis minimis undique obfusus, antennis flavis apice fuscis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 990.*  
*Habitat in Europa.*
- lituratus. 116. St. ater, elytris testaceis, basi macula communi et in medio ad marginem externum utrinque macula fusca, antennis pedibusque testaceis. *Musf. Lesk. p. 44. n. 991.*  
*Habitat in Europa.*

INSECTA COLEOPTERA. Staphylinus. Oxyporus. 2037

- alatus. 117. St. fuscus, elytris longis, pedibus rufo-fuscescentibus.  
*Mus. Lesk. p. 44. n. 992.*  
*Habitat in Europa.*

*\*\* palpis posterioribus securiformibus, Oxypori Fabricii.*

- rufus. 6. St. rufus, capite elytrorum abdominisque posterioribus, femoribus basi nigris. *Fn. suec. 844. Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 1. mant. inf. 1. p. 222. n. 1. Scop. ent. carn. 307. Geoffr. inf. par. 1. p. 370. n. 22. Staphylinus flavus. Gadd sat. 80. Staphylinus pallide rufus elytris carulefcentibus, capite & apice abdominis nigris. Degeer inf. 4. p. 24. n. 10. t. 1. f. 11. 12. Schaeff. ic. t. 35. f. 3. Habitat in Europæ boletis.*

- annulatus. 7. St. rufus, capite abdominis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. suec. 845. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 2. mant. inf. 1. p. 222. n. 2. Oxyporus flavus, elytris nigris basi apiceque pallidis. Habitat in Europæ boletis.*

- parvus. 92. St. flavus, elytris basi anoque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 222. n. 3. Habitat Kilonii, antennis flavis apice fuscescentibus.*

- thoracicus. 93. St. nigricans, thorace rufo, elytris fuscis basi albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 3. mant. inf. 1. p. 222. n. 4. Habitat Kilonii in boletis.*

- pygmaeus. 94. St. nigricans, thorace elytrisque pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 339. n. 4. mant. inf. 1. p. 222. n. 5. Habitat Kilonii in boletis.*

- flavipes. 22. St. niger, elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec. 856. \* Fabr. sp. inf. 1. p. 339. n. 5. mant. inf. 1. p. 222. n. 6. Oxyporus niger, elytris tibiisque fuscis. Habitat in Europæ boletis.*

- abdominalis. 95. St. rufus, abdomine atro nitido. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 222. n. 7. Habitat in Norwegia, reliquis hujus tribus minor.*

\*\*\* *palpis anterioribus clavatis* : *Pæderi* Fabricii

riparius. 9. *St. rufus*, elytris cæruleis, capite abdominisque apice  
nigris. *Fn. suec.* 846.\* *It. gotl.* 173. *Degeer inf.* 4. p.  
28. n. 14. t. 1. f. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 339. n. 1. mant.  
*inf.* 1. p. 223. n. 1.

*Scop. ent. carn.* 308. *Staphylinus gregarius*.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 369. n. 21.

*Schaeff. ic. t.* 71. f. 3.

*Habitat ad Europæ ripas frequens.*

ruficollis. 96. *St. niger*, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 339. n. 2. mant. *inf.* 1. p. 223. n. 2.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 48. f. 5. a. b.

*Habitat in Germania sub lapidibus.*

elongatus. 14. *St. niger*, elytris posterius, pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 339. n. 3. mant. *inf.* 1. p. 223. n. 3.

*3. Pæderus niger*, elytris postice pedibusque fulvis.

*Habitat in Europa boreali.*

## 218. FORFICULA. *Antennæ* fetacæ.

*Palpi* inæquales, filiformes.

*Elytra* dimidiata. *Alæ* rectæ.

*Cauda* forcipata.

auricularia. 1. *F.* elytris apice albis, antennis 14-articulatis. *Fn. suec.*  
860. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 375. n. 1. *Scop. ent. carn.*

312. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 340. n. 1. mant. *inf.* 1. p. 224. n. 1.

*Degeer inf.* 3. p. 545. n. 1. t. 25. f. 16. *Forficula major*.

*Mouff. inf.* 171. f. *inf.* *Forficula auricularia vulgaris*.

*Petiv. gaz. t.* 74. f. 5. *Forficula vulgaris*.

*List. scar. angl. p.* 391. mut. t. 31. f. A. *Scarabæus*  
subrufus, cauda furcata.

*Frisch inf.* 8. p. 31. t. 15. f. 1. 2. *Vermis auricularius*.

*Fonst. inf. t.* 16. f. 2.

*Merian. inf. t.* 30.

*Sulz. inf. t.* 7. f. 50.

*hist. inf. t.* 7. f. 17.

*Schaeff. elem. t. 63.*

*icon. t. 144. f. 3. 4.*

*Habitat in Europæ fructibus frequens, aures dormientium interdum intrans, spiritu frumenti pellenda.*

*bidentata.* 3. *F. pallida* supra nigro variegata, ano bidentato: forcipe porrecta unidentata. *Fabr. mant. inf. I. p. 224. n. 2.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 49. f. 1.* Forficula bilineata.

*Habitat in Europa magis australi, maxima.*

*bipunctata.* 4. *F. nigra*, capite posterius pedibusque rufis, elytris macula alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 340. n. 2. mant. inf. I. p. 224. n. 3.*

*Habitat in Italia, antennis 11-articulatis.*

*albipes.* 5. *F. atra*, thorace posterius, elytris basi alis pedibusque albis. *Fabr. mant. inf. I. p. 224. n. 4.*

*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis, mediæ magnitudinis.*

*minor.* 2. *F. elytris testaceis immaculatis, antennis 10-articulatis.*  
*Fn. suec. 861.\* Geoffr. inf. par. I. p. 376. n. 2. Fabr. sp. inf. I. p. 340. n. 3. mant. inf. I. p. 224. n. 5.*  
*Fn. suec. 600.* Forficula alis elytro concoloribus.  
*Degeer inf. 3. p. 553. n. 2. t. 25. f. 26. 27.*  
*Schaeff. ic. t. 41. f. 12. 13.*

*Habitat rarius in Europa, antennarum apice albido.*

*flexuosa.* 6. *F. forcipe flexuosa*, elytris punctis duobus flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 341. n. 4. mant. inf. I. p. 224. n. 6.*  
*Habitat in Cayenna.*

*dentata.* 7. *F. fusca*, antennis 10-articulatis, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe basi dentata. *Fabr. sp. inf. I. p. 341. n. 5. mant. inf. I. p. 224. n. 7.*  
*Habitat in Madera.*

*parallela.* 8. *F. nigra*, thoracis marginibus elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Fabr. sp. inf. I. p. 341. n. 6. mant. inf. I. p. 224. n. 8.*  
*Habitat in Madera.*



- Morio. 9. *F. atra*, antennis fascia alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 341.*  
7. *mant. inf. I. p. 224. n. 9.*  
*Habitat in Tahiti.*
- pallipes. 10. *F. forcipe* elongata unidentata nigra, pedibus albis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 341. n. 8. mant. inf. I. p. 224. n. 10.*  
*Habitat in insulis Promontorii viridis.*
- livida. 11. *F. livida* minima, forcipe ad lentem dentata.  
*Lesk. p. 46. n. 3.*
-

## II. HEMIPTERA.

Os rostrumque inflexum versus pectus.

Alæ hemelytratae : superioribus semicoriaceis  
(per futuram rectam minime conniventibus) sed margine interiore impositis.

119. BLATTA. Caput inflexum.

Antennæ setaceæ.

Palpi inæquales, filiformes.

Elytra alæque planæ, subcoriaceæ.

Thorax planiusculus, orbiculatus, marginatus.

Pedes cursorii.

Cornicula duo supra caudam  
(plurimis).

gigantea. 1. Bl. livida, thoracis clypeo macula quadrata fusca. *Mus. Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. t. 16. f. 3.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 341. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 1.  
*Seb. mus.* 3. t. 77. f. 1. 2. & 4. t. 85. f. 17. 18.  
*Drury inf.* 2. t. 36. f. 2.  
*Habitat in Asia & America, diametro ovi gallinacei.*

madera. 11. Bl. fusca, thorace elytrisque lividis fusco variegatis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 341. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 2.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 49. f. 3.  
*Habitat in insula Madera, statura giganteæ, at paulo minor.*

ægyptiaca. 2. Bl. atra, thoracis margine anteriori albo. *Mus. Lud. Ulr.* 107.\* *Gron. zooph.* 637. t. 15. f. 2.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 3.  
*Drury inf.* 2. t. 36. f. 3.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 49. f. 4.  
*Habitat in Ægypto, Oriente.*

occidentalis. 12. Bl. thorace atro : margine omni pallido punctisque duobus baseos fulvis, elytris olivaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 225. n. 4.  
*Habitat in America, ægyptiaca minor.*

- Surinamen-3. Bl. livida, thoracis margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 5.  
*Sulz. inf.* 1. t. 8. f. 1.  
*Degeer inf.* 3. t. 44. f. 8.  
*Habitat in Surinamo.*
- americana. 4. Bl. ferruginea, thoracis clypeo posterius exalbido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 6.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 381. n. 2. Blatta fusco-flavescens.  
*Degeer inf.* 3. t. 44. f. 1. 2. 3. Blatta ferruginea.  
*Raj. inf.* 623. Blatta molendinaria ab insula Jamaica alata major.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 49. f. 5.  
*Merian. surin.* 1. t. 1.
- β) Blatta alata. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 49. f. 6.  
*Habitat in America, cum saccharo in Europam delata.*
- australa-13. Bl. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris lineola alba. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 7.  
*Capta frequens in navi ex Oceano australi reduce.*
- erythrocephala. 14. Bl. atra, capite pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 8.  
*Habitat - - - magna.*
- capensis. 15. Bl. fusca, capite pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf.* sp. 4. p. 77. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 225. n. 9.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine americanæ; glabra.*
- indica. 16. Bl. grisea, thorace atro: margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 343. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 10.  
*Habitat in India.*
- nivea. 5. Bl. alba, antennis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 343. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 226. n. 11.  
*Degeer inf.* 3. t. 44. f. 10.  
*Drury inf.* 2. t. 36. f. 1.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 49. f. 8.  
*Habitat in America meridionali, magnitudine tabani.*
- irrorata. 17. Bl. pallida, thorace elytrisque fusco irroratis, alis disco nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 343. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 226. n. 12.  
*Thunb.*

*Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 76?* Blatta pallida thorace elytrisque fusco irroratis, alis basi nigris.

*Habitat ad Caput bonæ spei & in nova Hollandia, giganteæ fere magnitudine.*

*viridis.* 18. Bl. viridis, antennis thoracisque linea laterali flavis; alis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 11. mant. inf. 1. p. 226. n. 13.*

*Habitat in America.*

*brasiliensis.* 19. Bl. pallida, abdomine atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 12. mant. inf. 1. p. 226. n. 14.*

*Degeer inf. 3. p. 538. n. 3. t. 44. f. 5.* Blatta abdomen nigrum.

*Habitat in Brasilia.*

*Petiveriana.* 20. Bl. nigra, elytris maculis quatuor flavescentibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 13. mant. inf. 1. p. 226. n. 15.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 578. n. 28.* Cassida petiveriana.

*Pallas spic. zool. 9. p. 9. t. 1. f. 5.* Blatta heteroclita.

*Petiv. gaz. t. 71. f. 1.* Cimici affinis niger.

*Seb. mus. 4. t. 95. f. 21.*

*Schröet Abh. 1. t. 1. f. 7. 8.*

*Sulz. hist. inf. t. 11. f. A. B.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 49. f. 7.*

*Habitat in India, statura cassidæ.*

*orientalis.* 7. Bl. ferrugineo-fusca immaculata, elytris abbreviatis: sulco oblongo impresso. *Fn. suec. 862.\* Scop. ent. carn. 313. Gron. zooph. 635. 636. Geoffr. inf. par. 1. p. 380. t. 7. f. 5. Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 14. mant. inf. 1. p. 226. n. 16. Kalm. it. 2. p. 406.*

*Degeer inf. 3. p. 530. n. 1. t. 25. f. 1. 2.* Blatta culinaris.

*Frisch inf. 5. t. 3.* Blatta lucifuga f. molendinaria.

*Mouff. inf. 138. f. 2. 3.* Blatta molendinaria.

*Raj. inf. 68. n. 1.* Blatta prima f. mollis Mouffeti.

*Column. ephr. 1. p. 40. t. 36.* Scarabæus alter testudinatus minor atque alatus.

*Jonst. inf. t. 13. f. A. Grylli.*

*Sulz. inf. t. 7. f. 47.*

*hist. inf. t. 8. f. 2.*

*Schaeff. ic. t. 155. f. 6. 7.*

*Sonner. it. t. 12.*

*Habitat in America, hospitatur in Oriente & Europa, a 200 inde annis in Bohemia, a 1739 in Belgio, & antea*

*in Finlandia, & Russia, frequens in farina, pane, aliis cibariis, calceis, &c. quæ consumit, lucifuga, velocissime currens, a tenthredine magna cærulea infestatur. Femina aptera larvæ similis parit ovum magnitudine dimidia abdominis subcylindricum; carina crenulata.*

cinæta. 21. Bl. flavescens, thoracis elytrorumque marginibus albis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 226. n. 17.*  
*Habitat in America, statura & magnitudine orientalis, corpore fusco, elytris nunc brevior, nunc longior, pedibus albidis.*

picta. 22. Bl. atra, elytris vitta sanguinea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 226. n. 18.*  
*Habitat in Brasilia.*

variegata. 23. Bl. thorace flavescente, elytris testaceis apice nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 344. n. 15. mant. inf. 1. p. 226. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

lapponica. 8. Bl. flavescens elytris nigro maculatis. *Fn. suec. 863.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 344. n. 16. mant. inf. 1. p. 226. n. 20. Geoffr. inf. par. 1. p. 381. n. 3. Blatta flavescens, &c. Degeer inf. 3. p. 533. n. 2. t. 25. f. 8. 9. Blatta nigro-fusca. Sulz. hist. inf. t. 8. f. 3. Schaeff. clem. t. 26. f. 2. icon. t. 88. f. 2. 3.*  
*Habitat in Europa, cibaria consumens, in australioris tamen humidis silvis minus noxia, thorace interdum toto, frequentius margine tantum flavescente.*

germanica. 9. Bl. livida, corpore flavescente, thorace lineis duabus parallelis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 344. n. 17. mant. inf. 1. p. 226. n. 21.*  
*Pontopp. atl. dan. 1. t. 29. Blatta transfuga.*  
*Habitat in Europa, Brasilia, insulis oceani australis, magnitudine lapponica.*

ruficollis. 24. Bl. thorace ferrugineo, corpore pallido testaceo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 226. n. 22.*  
*Habitat in India, statura & magnitudine germanica.*

---

*Blattæ lucifugæ cum larvis suis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celerius cursu se subtrahentes; fumo lithantræis occid. cum gryllis. Scopoli. An a Seba delineatæ fusca mus. 4. t. 85. f. 13. 14. & cinereo-fusca f. 15. 16, propria species!*

- maculata. 25. Bl. thorace nigro : margine albido , elytris pallidis : macula magna apicis nigra. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 226. n. 23.*  
*Schreber Naturf. 15. p. 89. t. 3. f. 17. 18.*  
*Habitat in Germaniæ pinetis & ericetis.*
- marginata. 26. Bl. nigra, thorace rufo albo marginato , elytris nigris : limbo albo. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 502. mant. inf. 1. p. 226. n. 24.*  
*Schreber Naturf. 15. p. 88. t. 3. f. 16.*  
*Habitat in Italia , maculata paulo minor.*
- oblongata. 10. Bl. oblonga livida , thorace punctis duobus lunulaque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 18. mant. inf. 1. p. 226. n. 25.*  
*Degeer inf. 3. p. 541. n. 9. t. 44. f. 11. Blatta oblonga.*  
*Habitat in Surinamo , forma cantharidis.*
- nitidula. 27. Bl. thorace ferrugineo , elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 19. mant. inf. 1. p. 226. n. 26.*  
*Habitat in Surinamo , minuta , nitida.*
- fusca. 28. Bl. fusca immaculata capite , antennis , pedibus , thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. 77.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei , magnitudine americanæ , glabra.*
- deusta. 29. Bl. fusca immaculata , capitis hemelytrorumque basibus rufis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 77.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei , germanica paulo major.*
- chlorotica. 30. Bl. polita ex griseo lutea , elytris subpellucidis virenti-venosis : margine crassiore opaco prasino ; margine extimo basique lutescentibus. *Pallas spic. zool. 9. p. 11. t. 1. f. 6.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei , magnitudine & statura scree orientalis.*
- latissima. 31. Bl. fusca punctata , thoracis margine anoque flavis , abdomine subtus nigro , tibiis spinulosis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. p. 184. n. 1. t. 49. f. 2.*  
*Habitat in Surinamo.*
- aterrima. 32. Bl. nigra immaculata , tarsis albis , geniculis fuscis , tibiis spinosis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. p. 185. n. 8. t. 49. f. 9.*  
*Habitat in India.*



- perspicil- 33. Bl. flavescens, thorace medio fulvo : margine hyalino.  
laris. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. p. 186. n. 12. t. 49. f. 11.*  
*Habitat in Marchia, an varietas lapponicæ, cui perquam*  
*affinis?*
- asiatica. 34. Bl. grisea oblonga, elytris alisque abdomine longiori-  
bus apice angustatis. *Pallas it. 3. p. 263.*  
*Habitat in Asia australi, cum mercibus Sinarum in Sibi-*  
*riam delata, germanica major.*
- Schaefferi. 35. Bl. nigricans, thorace elytrorumque margine flavescen-  
te, pedibus luteis : femoribus nigris.  
*Schaeff. ic. t. 158. f. 2.*
- sylvestris. 36. Bl. subtus nigra, antennis nigris, thoracis margine  
elytrisque testaceis. *Scop. ent. carn. p. 104. n. 314.*  
*Podæ mus. græc. p. 50.*  
*Habitat in Carniola.*
- peninsula- 37. Bl. fusca, thoracis clypeo albido : medio nigro fusco,  
nica. elytris flavo-fuscis antè albida. *Degeer inf. 3. p.*  
*537. n. 2. t. 44. f. 4.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longa.*
- livida. 38. Bl. fusca, corpore subtus pedibusque fulvo-griseis,  
alis longitudine abdominis. *Degeer inf. 3. p. 538. n. 4.*  
*t. 44. f. 6.*  
*Habitat in Surinamo, 8½ lineas longa.*
- rufa. 39. Bl. oblonga rufa, pedibus testaceis, alis abdomine  
longioribus. *Degeer inf. 3. p. 539. n. 5. t. 44. f. 7.*  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longa.*
- grisea. 40. Bl. oblonga cinereo-grisea : punctis aliquot fuscis mi-  
nutissimis. *Degeer inf. 3. p. 540. n. 7. t. 44. f. 9.*  
*Habitat in Surinamo, 10½ lineas longa.*
- minutissi- 41. Bl. ovata nigro-fusca, antennis brevioribus, thoracis  
ma. lateribus alisque hyalinis. *Degeer inf. 3. p. 542. n. 10.*  
*t. 44. f. 13. 14.*  
*Habitat in Surinamo, cimicis lectularii magnitudine.*
- aptera. 42. Bl. aptera fusca punctata, abdominis segmentis mar-  
gine posteriori tibiisque lividis, alis ferrugineis, tibiis  
spinosis. *Mus. Lesk. p. 46. n. 5.*  
*Habitat extra Europam.*

punctula- 43. Bl. fusca, thorace punctis elevatis impressisque variegato,  
ta. alis albis. *Mus. Lesk. p. 46. n. 7.*

*Habitat extra Europam, statura & facie orientalis, an  
varietas?*

ocellata. 44. Bl. brunnea, fronte thoracisque disco macula rubra:  
posteriori ocellis duobus fuscis varia, abdominis seg-  
mentis margine anteriore supra infraque rubris. *Mus.*  
*Lesk. p. 46. n. 8.*

*Habitat extra Europam.*

**PNEUMORA.** *Corpus ovatum, inflatum, hyalinum.*

*Caput inflexum, maxillosum.*

*Thorax convexus, subtus carinatus.*

*Elytra deflexa, membranacea.*

*Pedes cursorii.*

immacu- 1. Pn. elytris immaculatis. *Thunb. a7. Stockh. 1775. 3. p.*  
lata. *255. t. 7. f. 1.*

*Fa'r. sp. inf. 1. p. 363. n. 10. mant. inf. 1. p. 286. n. 12.*

*Gryllus (papillofus) viridis, albo maculatus scutello cari-  
nato utrinque dentato, abdomine vesiculoso variegato.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, in stoebe cernua, a Septembri  
ad Novembrem frequens; viridis, elytris aliquando  
minutissime nigro punctatis, rarius flavescens aut ru-  
bescens, gryllo domestico duplo major.*

maculata. 2. Pn. elytris viridibus: maculis quadratis albis. *Thunb. a7.*  
*Stockh. 1775. 3. p. 256. t. 7. f. 2.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 693. n. 4. Mus. Lud. Ulr. 120.\* Fabr.*

*sp. inf. 1. p. 363. n. 11. mant. inf. 1. p. 236. n. 13.*

*Gryllus (variolosus) viridis calloso-punctatus, abdomine  
vesiculoso albo variegato.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, in stoebe annua, Novembri  
& Decembri conspicua, immaculatæ magnitudine,  
tota viridis, albo maculata.*

sexguttata. 3. Pn. elytris viridibus: maculis tribus argenteis. *Thunb.*  
*a7. Stockh. 1775. 3. p. 257. n. 3. t. 7. f. 3.*

*Pneumoræ, quasi totæ membrana cava constant, pedes dentatos ad corpus  
fricando, crepusculo & nocte sonum edunt, lucem emicantem petunt.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 363. n. 9. mant. inf. 1. p. 236. n. 11.*  
*Gryllus (inanis) viridis, elytris maculis duabus albis*  
*abdomine vesiculoso : utrinque maculis tribus albis.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, Decembri conspicua,*  
*maculata quadruplo major, viridis.*

220. MANTIS. Caput nutans, maxillosum, palpis  
 filiformibus instructum.

*Antennæ setaceæ.*

*Alæ 4 membranaceæ, convolutæ :*  
*inferiores plicatæ.*

*Pedes anteriores compressi, subtus*  
*ferrato-denticulati, armati un-*  
*gue solitario & digito setaceo,*  
*lateralis, articulado.*

*posteriores 4 læves, gressorii.*

*Thorax linearis, elongatus, angus-*  
*tatus.*

filiformis. 15. *M. corpore filiformi aptero. Fabr. mant. inf. 1. p. 227.*  
*n. 1. Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. p. 187. n. 5.*  
*t. 51. f. 2. 3?*

*Scop. delic. insubr. 1. p. 60. t. 24. f. A. 1-3. Plocaria*  
*domestica?*

*Habitat in America, India, Italia, fusca, pedibus*  
*corpore longioribus, antennis nigris.*

Gigas. 1. *M. thorace teretiusculo scabro, elytris brevissimis, pedibus*  
*spinosis. Mus. Lud. Utr. 109.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 345.*  
*n. 1. mant. inf. 1. p. 227. n. 2.*

*Marcgr. bras. 251. Arumatia.*

*Roes. inf. 2. gryll. t. 19. f. 9. 10.*

*Bradl. natur. 1. 27. f. 6.*

*Petiv. gaz. t. 60. f. 2.*

*Seb. mus. 4. t. 77. f. 1. 2.*

*Habitat in Asia, alis maximis.*

cylindrica. 54. *M. thorace cylindrico, pedibus anterioribus thoraci*  
*anteriorius annexis, elytris griseis basi subtusque rufis,*  
*alis fuscis albo guttatis. Mus. Lesk. p. 46. n. 12.*

*Habitat extra Europam, alarum guttis vagis, fenestratis, spina prostrata utrinque ad basin elytrorum abdomen respiciente.*

phthifica. 2. M. thorace teretiusculo muricato, elytris brevissimis, pedibus inermibus. *Mus. Lud. Ulr.* 110\*  
*Habitat in America australi et India.*

siccifolia. 3. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. *Mus. Lud. Ulr.* 111.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 16.  
*Roes. inf.* 2. gryll. t. 17. f. 4. 5.  
*Edw. glean.* t. 258.  
*Merian. surin.* t. 66.  
*Seligm. av.* 7. t. 48.  
*Habitat in America australi & India.*

gongylo- 4. M. thorace subciliato, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobofo. *Mus. Lud. Ulr.* 112.\* *Gron. zooph.* 639.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 346. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 227. n. 10.  
*Amn. acad.* 1. p. 504. *Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.*  
*Aldr. inf.* t. 13. f. 21. Mantis.  
*Marcgr. bras.* 246. Gaayra.  
*Ad. angl.* 301. t. 20. f. 3.  
*Seb. mus.* 4. t. 68. f. 9-12.  
*Roes. inf.* 2. gryll. t. 7.  
*Sulz. hist. inf.* t. 8. f. 56.  
*Aubent. misc.* t. 65. f. 2.  
*Drury inf.* 1. t. 56. f. 2.  
*Habitat in Africa & Asia, capitis vertice subulata bifido, antennis rarius pectinatis.*  
*Larvæ pedes lobis membranaceis alati.*

paupera- 16. M. thorace lineari spinuloso, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 346. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 227. n. 11.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 3. p. 61. Mantis thorace apice dilatato spinuloso, femoribus lobo simplici terminatis.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 51. f. 1.  
*Habitat in India, gongyloda minor & angustior.*

mendica. 17. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis; margine albo punctato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 12.  
*Habitat Alexandria.*

religiosa. 5. *M. thorace lævi subcarinato elytrisque viridibus immacu-*  
*latis. Scop. ent. carn. 315.*

*Roes. inf. 2. gryll. t. 1. 2.*

*Seb. mus. 4. t. 67. f. 7. 8.*

*Sulz. hist. inf. t. 8. f. 4.*

*Schaeff. elem. t. 81.*

*Seligm. av. t. 4.*

*Habitat in Sibiria, Austria, Africa, tota viridis, an mera*  
*varietas oratoriae?*

oratoria. 6. *M. thorace lævi, elytris viridibus, alis macula nigra ante-*  
*rius rufescentibus. Mus. Lud. Ulr. 115.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 348. n. 19. mant. inf. 1. p. 228. n. 21.*

*Mantis thorace lævi, elytris viridibus immaculatis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 399. n. 1. t. 8. f. 4. Mantis.*

*Mouff. inf. 118. f. 3.*

*Aldr. inf. 4. t. 3. f. 10.*

*Seb. mus. 4. t. 67. f. 9. 10.*

*Roes. inf. 2. gryll. t. 1. 2.*

*Degeer inf. 3. t. 37. f. 2.*

*Habitat in Oriente & australi Europa Francofurtum ad Mœ-*  
*num usque.*

irrorata. 7. *M. thorace lævi subcarinato, elytris viridibus: punctis fer-*  
*rugineis vagis. Amæn. acad. 6. p. 397. n. 29. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 348. n. 18. mant. inf. 1. p. 228. n. 20.*

*Habitat in America meridionali, precariae similis.*

precaria. 8. *M. thorace subciliato, elytris virescentibus: ocello ferru-*  
*gineo. Mus. Lud. Ulr. 114.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 349.*  
*n. 20. mant. inf. 1. p. 228. n. 22.*

*Merian. surin. t. 66.*

*Seb. mus. 4. t. 67. f. 3-6.*

*Degeer inf. 3. p. 406. n. 3. t. 36. f. 4.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 50. f. 1.*

*Habitat in America & Africa, elytrorum ocello anterieus di-*  
*midato albo, aut toto interdum albo.*

sancta. 18. *M. viridi-flavescens, thorace ferrulato, elytris viridibus*  
*immaculatis, alis subhyalinis. Fabr. mant. inf. 1. p.*  
*228. n. 23.*

*Habitat in Gallia magis australi, statura oratoriae, at tri-*  
*plo minor.*

- monacha*. 19. *M. testacea*, thorace lævi, elytris alisque viridi-hyalinis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 228. n. 24.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura precariæ, at duplo minor.*
- obscura*. 20. *M. obscure grisea*, thorace ferrulato, elytris maculæ baseos, alis apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 21.*  
*mant. inf. 1. p. 228. n. 25.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura precariæ, at minor.*
- hyalina*. 21. *M. thorace ciliato*, elytris hyalinis : margine viridi, fronte bidentata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 22. mant. inf. 1. p. 229. n. 26.*  
*Degeer inf. 3. p. 410. n. 4. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in America.*
- fenestrata*. 22. *M. thorace lævi*, alis hyalinis, elytrorum margine exteriori fusco. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 23. mant. inf. 1. p. 229. n. 27.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura hyalinæ.*
- bidens*. 23. *M. thorace scabro*, elytris viridibus : fasciis nigris, alis fuscis, disco atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 24. mant. inf. 1. p. 229. n. 28.*  
*Habitat in America.*
- ministra-*  
*lis*. 24. *M. thorace scabro crenato longitudine capitis antè ferrugineo*, elytris viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 25. mant. inf. 1. p. 229. n. 29.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- urbana*. 25. *M. thorace integro*, elytris viridibus : puncto fasciæque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 26. mant. inf. 1. p. 229. n. 30.*  
*Habitat in America australi & India.*
- rufica*. 26. *M. thorace lævi fusco*, elytris ala brevioribus fusco-hyalinis, antennis pilosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 27. mant. inf. 1. p. 229. n. 31.*  
*Habitat ad Patagoniæ littora, pagana magnitudine.*

---

*An forsitan hujus generis insectum a Queronio fuco adhærens in mari mediterraneo repertum in ad. parif. extr. 9. p. 329. sub nomine puce de mer arpentense descriptum & delineatum? repugnat habitatio in mari.*



- nasuta. 27. M. thorace spinoso ciliatoque, fronte porrecta <sup>spinosa</sup>  
 emarginata. *Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 32.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*
- lobata. 28. M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, <sup>oculis</sup>  
 conico-acuminatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 28. mant.*  
*inf. 1. p. 229. n. 33.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 62. f. 73. Mantis virescens,*  
 capitis cornu oculisque conico-acuminatis.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, parva.*
- pulchra. 29. M. viridis, thorace integro, alis fusco-hyalinis <sup>basibus</sup>  
 ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 34.*  
*Habitat Tranquebariæ, parva.*
- fausta. 30. M. linearis cinereo-fusca immaculata. *Thunb. nov. inf.*  
*sp. 3. p. 63. Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 35.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, numen tutelare Hottentottorum.*
- perspicua. 31. M. obscura, elytris alisque hyalinis, alis macula <sup>margi-</sup>  
 nali apiceque fuscis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 230. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, statura minutæ, at paulo major.*
- pagana. 32. M. alis reticulatis albis: macula laterali ferruginea, <sup>mac-</sup>  
 nibus chelatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 29. mant. inf.*  
*1. p. 230. n. 37.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 14. t. 1. f. 8. Mantis Perla.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 916. n. 2. Raphidia (mantispa)*  
 pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis <sup>thorac-</sup>  
 brevioribus.  
*Scop. ent. carn. 712.*  
*Poda inf. 101. t. 1. f. 15.*  
*Habitat in Calabria, Gallia, & Germania.*
- minuta. 33. M. thorace cylindrico flavescente, elytris hyalinis: <sup>costis</sup>  
 virecente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 30. mant. inf.*  
*1. p. 230. n. 38.*  
*Habitat in America meridionali, & circa Aurelianum.*
- pusilla. 34. M. thorace cylindrico flavescente, elytris alisque <sup>hyali-</sup>  
 nis immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 351. n. 31. mant.*  
*inf. 1. p. 230. n. 39.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 15. t. 1. f. 9. Mantis pusilla.*  
*Habitat in Africa, raphidia ophiopsi major.*

- Carolina. 9. *M. thorace subciliato carinato, elytris albidis fusco-nebulosis. Amœn. acad. 6. p. 396. n. 28.\**  
*Habitat in Carolina, precariæ similis, elytris alisque abdomine brevioribus.*
- pectini-  
cornis. 10. *M. thorace lævi, elytris viridibus, alis oblique striatis, vertice subulato, antennis pectinatis. Amœn. acad. 6. p. 396. n. 27.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 15. mant. inf. 1. p. 228. n. 17.*  
*Drury inf. 1. t. 50. f. 1.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 50. f. 2.*  
*Habitat in India, australi America, Jamaica.*
- oculata. 35. *M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato-spinosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 348. n. 16. mant. inf. 1. p. 228. n. 18.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis, capite pallido, thorace testaceo, elytris alisque albo-hyalinis, pedibus obscuris.*
- supersti-  
tiosa. 36. *M. thorace filiformi triangulo antè ferrulato, elytris virescentibus, alarum costa transverse striata. Fabr. sp. inf. 1. p. 348. n. 17. mant. inf. 1. p. 228. n. 19.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magna.*
- bicornis. 11. *M. thorace lævi, capite bipartito subulato. Mus. Lud. Ulr. 116.\**  
*Habitat in America australi & India, pedibus inermibus.*
- tricolor. 12. *M. thorace lateribus expanso-lobato, capite cornuto, pedibus anterioribus latissimis. Mus. Lud. Ulr. 117.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 12. mant. inf. 1. p. 228. n. 14.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 51. f. 4.*  
*Habitat in India, oculis in cornicula auriformia acutè desinentibus.*
- cancellata. 37. *M. thorace utrinque dilatato membranaceo plano. Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 13. mant. inf. 1. p. 228. n. 15.*  
*Habitat in America australi & India.*
- grammaria. 13. *M. thorace utrinque membranaceo dilatato obcordato. Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 11. mant. inf. 1. p. 228. n. 13.*  
*Roes. inf. 2. gryll. t. 3.*  
*Merian. furin. t. 27.*  
*Seb. mus. 4. t. 69. f. 7. 8.*  
*Habitat in America australi & India.*

- necyda- 14. *M. thorace scabro, elytris ovatis angulatis brevissimis*  
 loides. oblongis. *Antæn. acad. 6. p. 397. n. 3. Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 345. n. 2. mant. inf. 1. p. 227. n. 3.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 19.*  
*Degeer inf. 3. t. 36. f. 2.*  
*Habitat in Asia; mas angustior, femina crassior, thorace levius.*
- atrophica. 38. *M. thorace quadrispinoso, elytris brevissimis basi aristatis*  
 mucronatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 3. mant. inf. 1.*  
*p. 227. n. 4.*  
*Pall. spicil. zool. 9. t. 1. f. 7.*  
*Habitat in insula Java, capite inermi.*
- spinosa. 39. *M. capite thoraceque spinosis, elytris brevissimis acutis*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 4. mant. inf. 1. p. 227. n. 5.*  
*Habitat in India.*
- bispinosa. 40. *M. thorace teretiusculo anterieus bispinoso, elytris brevissimis*  
 v. *marginis flavo. Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 5.*  
*mant. inf. 1. p. 227. n. 6.*  
*Habitat in America.*
- jamaicensis. 41. *M. linearis viridis, elytris brevissimis: margine exteriori*  
 flavo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 6. mant. inf. 1. p. 227. n. 7.*  
*Drury inf. 2. t. 49. f. 1.*  
*Habitat in Jamaica.*
- lateralis. 42. *M. linearis nigra, elytris brevissimis gibbis: lateribus*  
 vis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 7. mant. inf. 1. p. 227. n. 8.*  
*Habitat in Brasilia.*
- linearis. 43. *M. linearis fusca, elytris brevissimis basi subspinosis.* *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 227. n. 9.*  
*Habitat in India, antennis filiformibus.*
- labiata. 44. *M. linearis virescens inermis, capitis lateribus viridibus*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 61.*  
*Habitat in India.*

*An huc omnes species a Seba in thesauri vol. IV. delineatae? tridens t. 68. f. 7. 8.*  
*clavata (on varietas gongylodis?) t. 68. f. 11. 12. parvula t. 68. f. 13. 14.*  
*tricornis t. 69. f. 1. 2. cubitata t. 69. f. 3. 4. ollosetosa t. 69. f. 5. 6. 7.*  
*ginea t. 70. f. 7. 8. rubro-maculata t. 70. f. 9. 10. plumbea t. 70. f. 11. 12.*  
*nigro-venulata t. 73. f. 6. paradoxa t. 73. f. 9. 10. nigro-punctata t. 73. f. 11.*  
*3. 4. bifubulata t. 75. f. 11. falcatoria t. 76. f. 1-4. dentata t. 76. f. 5. 6.*  
*pater nosler t. 76. f. 7-12. spuria t. 76. f. 13. 14. tessulata t. 78. f. 1. 2.*  
*foliata t. 80. f. 13. 14. Species hujus generis insecta alia venantur; larva*  
*puppaque hexapode agili; illa penitus aptera.*

- maculata. 45. *M. cinerea*, thorace alato spinuloso, pedibus intus nigro maculatis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 61.*  
*Habitat in Japonia, bipollicaris.*
- capensis. 46. *M. cinerea*, thorace inermi, capite conico integro. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 62.* Mantis nasuta.  
*Habitat ad Caput bonæ spei & in India, sesquipollicaris.*
- parva. 47. *M. livida lævis*, elytris alisque hyalinis; abdominis segmentis nigro marginatis.  
*Drury inf. 2. p. 75. t. 39. f. 5.*  
*Habitat in America, fere sesquipollicaris.*
- cingulata. 48. *M. thorace subfusco*, elytris viridibus atro reticulatis: maculis quatuor nigricantibus, alis nigricantibus nigro lineatis: margine ex fusco flavescente.  
*Drury inf. 2. p. 89. t. 49. f. 2.*  
*Habitat in Jamaica, abdomine nigro-cingulato, apice bispinoso.*
- gigantea. 49. *M. fuscescens*, collo, thorace femoribusque ferratis.  
*Drury inf. 2. p. 89. t. 50.*  
*Habitat in Italia superiori, 8 fere pollices longa.*
- angusta. 50. *M. virescens*, cauda bifurca, antennis longitudine corporis filiformibus. *Drury inf. 1. p. 130. t. 50. f. 3.*  
*Habitat in insula Antigua.*
- sibirica. 51. *M. corpore flavo fuscoque vario*, alis hyalinis: nervulis rufescentibus. *Lepech. it. 1. p. 271. t. 17. f. 8.*  
*Habitat in Sibiria heliantho & umbellatis; an pusillæ varietas?*
- brachyptera. 52. *M. cinerea*, thorace dentato, alis abdomine dimidio brevioribus. *Pall. it. 2. app. n. 81.*  
*Habitat in desertis aridissimis, etiam salis, ad Irin sitis, rarior in Uralentibus, oratoria major.*
- pennicor-  
nis. 53. *M. verticis spina conica*, antennis pennatis linearibus, femoribus posterioribus lobo terminatis. *Pall. it. 2. app. n. 81.*  
*Habitat rarior in desertis, mari caspio finitimis, australibus, forma & colore gongylodis.*

2056 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Acrida*.) *Truxalis*.

221. GRYLLUS. *Caput inflexum, maxillosum, pal-*  
*pis filiformibus instructum.*  
*Antennæ setaceæ vel filiformes.*  
*Alæ quatuor, deflexæ, convolutæ*  
*inferiores plicatæ.*  
*Pedes posteriores saltatorii. U-*  
*gues ubique bini.*

\* *antennis ensiformibus, capite conico thorace longiori,*  
*Acridæ sive Truxalides Fabricii.*

*nasutus.* 1. Gr. corpore viridi. *Mus. Lud. Ulr.* 118. \* *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 352. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 1.  
*Mouff. inf.* 119. *Mantis africana,*  
*Roef. inf.* 2. *gryll.* t. 4.  
*Sulz. inf.* t. 8. f. 57.  
*hist. inf.* t. 8. f. 5.  
*Drury inf.* 2. t. 40. f. 1.  
*Seb. mus.* 4. t. 96. f. 41.

*turritus.* β) *Gryllus capite conico, antennis ensiformibus, alis hy-*  
*linis. Syst. nat.* X. p. 427.  
*Seb. mus.* 4. t. 80. f. 1. 2.  
t. 96. f. 46.  
*Habitat in omni Africa, in Sicilia, Calabria, ad mar-*  
*Caspium, ore ad basin, antennis ad apicem capitis*  
*positis, thorace non longioribus.*

*conicus.* 62. Gr. corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi  
linea punctorum alborum. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 352. n. 2.  
*mant.* 1. p. 231. n. 2.  
*Habitat in nova Hollandia, nasuto nimis affinis.*

*vittatus.* 63. Gr. testaceus, capite prominulo thorace femoribusque  
vitta laterali argentea. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 231. n. 3.  
*Habitat in Sina, nasuti magnitudine.*

*brevicornis.* 2. Gr. viridis, capite prominulo, antennis compressis lon-  
gitudine thoracis. *Aman. acad.* 6. p. 398. n. 37. \* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 352. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 4.  
*Degeer inf.* 3. p. 499. n. 16. t. 41. f. 7. *Acridium ensicorne*  
*Habitat in America meridionali,*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Acrida*.) *Truxalis*. 2057

*Giganteus*. 64. Gr. viridis, vittis duabus rubescentibus, antennis ferrugineis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 191. n. 1. t. 52. f. 6.  
*Habitat in America, nasuto major.*

*Ungaricus*. 65. Gr. obscure viridis, pedibus spadiceis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 192. n. 2. t. 52. f. 7.  
*Habitat in Ungaria.*

*Corycephalus*. 66. Gr. capitis apice spatulato, elytris abdomine longioribus: striga longitudinali fusca, alis flavescentibus margine hyalinis. *Pall. it.* 1. app. n. 54.  
*Habitat in desertis Russiæ australibus, inter glycyrrhizam vagans, Augusto vulgaris, nasuto perquam similis.*

*Foliaceus*. 67. Gr. alis flavescentibus, antennis foliaceis.  
*Seb. mus.* 4. t. 74. f. 9. 10.  
*Habitat in Asia.*

\*\* *Thorace carinato, antennis filiformibus longiore, palpis æqualibus: Bullæ s. Acridia Fabricii.*

*Unicolor*. 3. Gr. unicolor, thorace brevissimo, antennis scutello brevioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 119.\*  
*Habitat in America australi & India flavus aut ruber, varioloso similis, sed thorace non cristato, an hujus tribus?*

68. Gr. thoracis scutello plano acuminato abdominis longitudine. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 230. n. 1.  
*Habitat in Sierra Leon, niger, bipunctati magnitudine.*

*Cinimatus*. 6. Gr. thorace cymbiformi lævi, vertice depresso. *Mus. Lud. Ulr.* 122.\*  
*Habitat in America australi & India; an hujus tribus?*

*Bipunctatus*. 7. Gr. fuscescens, thoracis scutello longitudine abdominis. *Fn. suec.* 864.\* *Scop. ent. carn.* 316. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 351. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 230. n. 2.

*An species a Seba musci vol. IV. delineatæ, tapetum persicum t. 74. f. 1. viridè maculatus t. 74. f. 3. pallidissime virens t. 74. f. 4. griseo-rubicundus t. 74. f. 5. nigro-fuscus t. 74. f. 6. nigricans t. 79. f. 5. 6. albo maculatus t. 80. f. 2. 4. coffeus t. 83. f. 6. testaceus t. 83. f. 7. obscure flavus t. 83. f. 8. rufescens t. 83. f. 10. cinereus t. 83. f. 11. nigro maculatus t. 84. f. 7. purpureascens t. 84. f. 8. nigro striatus t. 84. f. 9. varicolor t. 84. f. 10. ad hanc tribum referendæ?*



2058 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (Bulla.) *Acridium*.

*Fn. suec.* 1. n. 623. Gryllus elytris nullis, thorace elytron longitudinale extenso: macula utrinque nigra rhombea.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 394. n. 5. *Acridium* elytris nullis, thorace producto, abdomine æquali.

*Degeer inf.* 1. p. 483. n. 11. t. 23. f. 15. *Acridium* scutellatum.

*Raj. inf.* 60. Locusta minor fuscescens, cucullo longo rhomboideo.

*Sulz. hist. inf.* t. 8. f. 6.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 52. f. 1.

**striatus.** β) Gryllus linea albida a fronte per medium scutellum percurrente. *Lepech. it.* 2. p. 211. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Europæ collibus arenosis apricis.*

**subulatus.** 8. Gr. thoracis scutello abdomine longiore. *Fn. suec.* 865.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 351. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 230. n. 3.

*Degeer inf.* 3. p. 484. n. 12. t. 23. f. 17.

*Fn. suec.* 624. Gryllus elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 395. n. 6. *Acridium* elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

*Sulz. hist. inf.* t. 8. f. 7.

*Schaeff. ic.* t. 154. f. 9. 10. t. 161. f. 2. 3.

*Habitat in Europa ad fossas & aquas stagnantes, bipunctatus valde affinis, nunc griseus, nunc fuscus.*

**opacus.** 69. Gr. spadiceus aut niger, thorace carinato ad latera sinuato abdominis longitudine. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 190. n. 3. t. 52. f. 2.

*Habitat Berolini in fossis sabulosis, statura bipunctati, at minor.*

**bifasciatus.** 70. Gr. fuscus albo maculatus: fasciis duabus lateralibus ochroleucis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 190. n. 4. t. 52. f. 3.

*Habitat Berolini in arenosis, statura & magnitudine opaci.*

**bimaculatus.** 71. Gr. thorace fusco: utrinque lunula ochroleuca. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 190. n. 5. t. 52. f. 4.

*Habitat Berolini, statura & magnitudine subulati.*

**granulatus.** 72. Gr. ex griseo viridi nigricanteque varius punctis elevatis asper ad latera complanatus, thorace subovali gibbo.

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 198. n. 6. t. 52. f. 5.

leucostictos. 219. Gr. fuscus, thoracis scutellique dorso elevato pallido, scutello utrinque basi macula alba. *Mus. Lesk. p. 46. n. 16. b.*

*Habitat in Europa.*

griseus. 220. Gr. griseus scutello basi & pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Mus. Lesk. p. 47. n. 16. c.*

*Habitat in Europa.*

bi-notatus. 231. Gr. griseus, scutella versus apicem laminæ alarum macula utrinque ferruginea. *Mus. Lesk. p. 47. n. 16. d.*

*Habitat in Europa.*

\*\*\* *antennis setaceis, palpis inæqualibus, thorace rotundato, cauda bifida: Acheta.*

Gryllotalpa. 10. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tomentosis. *Mus. Lud. Ulr. 123. \*Fn. suec. 866. Scop. ent. carn. 317. Geoffr. inf. par. 1. p. 387. n. 1. Fabr. sp. inf. 1. p. 353. n. 1. mant. inf. 1. p. 231. n. 1. Degeer inf. 3. p. 517. n. 2. Gryllus supra fuscus, subtus ferrugineo-flavus, &c.*

*Raj. inf. 64. Jonst. inf. t. 12. f. ult. Gryllotalpa.*

*Mouff. inf. 104.*

*Aldr. inf. 571.*

*Welfsch hecast. 1. p. 39.*

*Goed. inf. 1. t. 76.*

*Barthol. ad. Hafn. 4. p. 5. f. 1. 6.*

*Blanck. herb. t. 81. f. 10.*

*Imperat. nat. 921. f. 2.*

*Frisch. inf. 11. t. 5.*

*Seb. mus. 4. t. 89. f. 3. 4.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 14. 15.*

*Catesb. Carol. 1. t. 8.*

*Sulz. inf. t. 9. f. 59.*

*Schuef. ic. i. 37. f. 1.*

*Habitat in Europæ, borealis Americæ & Asiæ, insus Javæ (minor tamen) cutis, hortorum pestis, finio equino allicienda, porcino pellenda.*

monstrifus. 73. Gr. elytris alisque caudato-convolutis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 353. n. 2. mant. inf. 1. p. 231. n. 2.*

*Drury inf. 2. t. 43. f. 1.*

*Habitat in India.*

2060 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Achetæ*.)

minutus. 11. Gr. flavescens, alis caudatis, tibiis posterioribus trispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 355. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 232. n. 14.

*Degeer inf.* 3. p. 524. n. 8. t. 43. f. 8. *Gryllus testaceus*.

*Habitat in America meridionali, semipollicaris, saturatus domesticus, subtus fuscus.*

domesticus. 12. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus corpore glauco. *Fn. suec.* 868. *Scop. ent. carn.* 318. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 353. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 3.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 389. n. 2. *Gryllus pedibus anticis simplicibus.*

*Degeer inf.* 3. p. 509. n. 1. t. 24. f. 1. 2. *Gryllus griseofuscus pallidus, &c.*

*Raj. inf.* 63. *Mouff. inf.* 135. *Gryllus domesticus.*

*Jonst. inf.* t. 12.

*Hufn. inf.* 11. f. 4.

*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 24.

*Roef. inf.* 2. *gryll.* t. 12.

*Hospitatur hodie in Europæ muris domesticis, in Guinea sextuplo major, tota nocte, præsertim pluvia ingruente stridens, caloris fornacum amans, sanie & liquore cuminum vescens, blattis, ut fertur, non cohabitans, pilulis ex arsenico & dauci recente radice farinæ trita immistis, aut nymphææ radicibus lacti incoctis, ut perhibent, necandus, a campestri, si inquilinum se reddiderit, pellendus.*

affimilis. 74. Gr. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stylis duobus apice fissis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 344. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 4.

*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*

reticulatus. 75. Gr. niger, elytris rufo reticulatis, antennis albo annulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 5.

*Habitat ad Caput bonæ spei, antennis corpore duplo longioribus.*

*Grylli, si primum tribum exceperis, quæ aliis insectis vicitant, plantis vescuntur, achetæ potissimum radicibus, tettigoniæ & locustæ foliis; larva & puppa emittunt hexapus, æquilis, imagini simillima, illa aptera; sub terra sæpe habitans, hæc non raro cum imagine vorans; paucis speciebus elytra aut alæ nullæ. & cum interdum modo feminis; in paucis ocellus elytrorum vitreus stridoris argumentum; japonicæ oryxam infestant.*

- brasiliensis. 76. Gr. fuscus, alis caudatis elytris longioribus, dorso pallidior, cauda adscendente longitudine corporis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 6.  
*Habitat in Brasilia.*
- orientalis. 77. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 7.  
*mant. inf.* 1. p. 232. n. 7.  
*Habitat Tranquebariæ.*
- capensis. 78. Gr. niger, alis caudatis elytris longioribus, elytris fuscis basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 8, *mant. inf.* 1. p. 232. n. 8.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- Morio. 79. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis apice nigris, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 232. n. 9.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura & magnitudine campestris.*
- campestris. 13. Gr. alis elytro brevioribus, corpore nigro: stylo lineari. *Mus. Lud. Ulr.* 124. *Scop. ent. carn.* 319. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 355. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 232. n. 10.  
*Raj. inf.* 63. *Gryllus campestris* Mouffeti.  
*Frisch inf.* 1. t. 1.  
*Sch. mus.* 4. t. 65. f. 23. & t. 96. f. 24.  
*Schaeff. elem.* t. 66.  
*icon.* t. 157. f. 2-4.  
*Habitat in Europa magis australi, a primo Maii die æquinoctium usque stridens.*
- umbraculatus. 14. Gr. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo. *Habitat in Mauritania, facie campestris, at capite magis ferrugineo, & membrana obovata ante caput deflexa distinctus.*
- convolutus. 15. Gr. corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis. *Anæn. acad.* 6. p. 399. n. 38.\*  
*Habitat in Surinamo.*
- hospes. 80. Gr. alis caudatis elytro longioribus albis: costa fusca, elytris nigris albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 355. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 232. n. 11.  
*Habitat in America.*

Crucis. 81. Gr. fuscus, alis caudatis elytro longioribus, elytrorum margine flavo nigro-punctato. *Fabr. mant. inf. 1. f. 232. n. 12.*

*Habitat in insula S. Crucis, statura campestris.*

Allioni. 82. Gr. capite thoracæque flavescentibus, elytris aqueis longitudine alæ. *Fabr. sp. inf. 1. p. 355. n. 12. mant. inf. 1. p. 232. n. 13.*

*Habitat in Italia, parvus.*

gryllodes. 83. Gr. griseus, thorace depresso, abdomine fuscescente elytris paulo brevioribus, alis elytris longioribus reticulatis griseo-hyalinis. *Pall. spic. zool. 9. p. 16. t. 1. f. 10.*

*Habitat in Jamaica, habitu ferme domestici, sed gracilior et longior; an huc spectat?*

binotatus. 84. Gr. niger, elytrorum basi maculis binis flavis, antennarum corpore brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 338. n. 4. t. 43. f. 4. Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 53. f. 1. Acheta binotatus.*

*Habitat in Europa.*

pellucens. 85. Gr. albidus, thorace trapeziformi. *Scop. ent. carn. 3. 4. delic. infubr. 1. p. 65. t. 24. f. E.*

*Habitat in Carniolæ & Italiæ vineis & hortis semipollicaris, æstate tota fere nocte stridens, habitu domestici, at duplo major, capite lucido, thoracis maculis tribus fuscis, elytris flavescentibus distinctus.*

Gigas. 86. Gr. badius.

*Sulz. hist. inf. p. 83. t. 8. f. 8.*

*Habitat in America, domestico dimidio major.*

teffellatus. 87. Gr. ex fusco testaceus, alis albo nigroque tessellatis. *Drury inf. 2. p. 80. t. 42. f. 3.*

*Habitat in insula S. Johannæ.*

membranaceus. 88. Gr. pallide testaceus, thorace collari flavescente, alis ochraceis caudatis. *Druri inf. 2. p. 81. t. 43. f. 2.*

*Habitat - - -*

desertus. 89. Gr. alis caudatis elytro longioribus, corpore nigro. *Pall. it. 1. app. n. 53.*

*Habitat terrestris in desertis austrâibus Uralensibus, domestico affinis.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Acheta*.) 2063

furina-  
mensis.

90. Gr. griseo-fuscus, thorace plano, elytris macula oblonga nigra, pedibus posterioribus corpore duplo longioribus. *Degeer inf. 3. p. 519. n. 1. t. 43. f. 1.*

*Habitat in Surinamo.*

muticus.

91. Gr. capite elytrisq. badiis, pedibus testaceis, cauda feminae mutica. *Degeer inf. 3. p. 520. n. 2. t. 43. f. 2.*

*Habitat in Surinamo.*

ater.

92. Gr. ex nigro fuscus, cauda feminae mutica. *Degeer inf. 3. p. 520. n. 3. t. 43. f. 3.*

*Habitat in Surinamo.*

fasciatus.

93. Gr. fuscus, thorace elytrisq. lineis longitudinalibus fulvis. *Degeer inf. 3. p. 522. n. 5. t. 43. f. 5.*

*Habitat in Pensylvania.*

niveus.

94. Gr. albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, antennis femoribusq. posterioribus longissimis. *Degeer inf. 3. p. 522. n. 6. t. 43. f. 6.*

*Habitat in Pensylvania.*

punctula-  
tus.

95. Gr. ex griseo fuscus, elytris hyalinis: puncto fusco, alis carneis antennisq. longissimis, thorace elongato. *Degeer inf. 3. p. 523. n. 7. t. 43. f. 7.*

*Habitat in Pensylvania.*

\*\*\* antennis setaceis, palpis inæqualibus, cauda femi-  
nis ensifera, Tettigonia, Fabricio Locustæ.

citrifo-  
lius.

16. Gr. thorace tetragono angulis scabro. *Mus. Lud. Ulr. 125. Gron. zooph. 657.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 356. n. 1. mant. inf. 1. p. 232. n. 1.*

*Locusta thorace tetragono, angulis crenatis.*

*Degeer inf. 3. p. 437. n. 7. t. 37. f. 3. Locusta viridis.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 16. f. 1.*

*Habitat in America australi & India.*

laurifo-  
lius.

17. Gr. thorace subtetragono laevi trilobo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 126.\**

*Fabr. sp. inf. 4. p. 356. n. 2. mant. inf. 1. p. 232. n. 2.*

*Degeer inf. 3. p. 445. n. 6. t. 38. f. 2. Locusta oblongifolia.*

*Sloan. jam. 2. p. 101. t. 236. f. 1. Locusta maxima vi-  
ridis, alis latissimis.*

*Marcgr. bras. 246. Tucurubi.*

*Habitat in America, nova Hollandia.*



- 2064 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*.
- myrtifo- 18. Gr. thorace subtetragono lævi, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 356. n. 3. mant. inf. 1. p. 232. n. 3.*  
 lius. *Locusta* thorace subtetragono lævi, alis deflexis elytris longioribus, ense brevissimo recurvo.  
*Degeer inf. 3. p. 447. n. 8. t. 38. f. 4. Locusta viridis.*  
 pedibus testaceis, thorace tetragono plano, clypeo ovatis ala acuminata brevioribus.  
*Drury inf. 2. t. 41. f. 2.*  
*Habitat in America meridionali, laurifolio quadruplo minor.*
- camillifo- 96. Gr. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis  
 lius. ala longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 356. n. 4. mant. inf. 1. p. 232. n. 4.*  
*Degeer inf. 3. p. 438. n. 2. t. 37. f. 5. Locusta ficeifolia.*  
*Habitat in America.*
- thymifo- 97. Gr. thorace tetragono lævi, elytris sublinearibus fusco punctatis, alis brevioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 5. mant. inf. 1. p. 233. n. 5.*  
 lius. *Habitat in nova Hollandia, nunc viridis, nunc ferrugineus.*
- gramini- 98. Gr. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis alae brevioribus, capite acuminato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 6. mant. inf. 1. p. 233. n. 6.*  
 folius. *Habitat ad Caput bonæ spei.*
- specularis- 99. Gr. thorace deflexo, elytris concavis viridibus: basi ocello dorsali vitreo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 7. mant. inf. 1. p. 233. n. 7.*  
*Habitat in America.*
- australis. 100. Gr. virescens, thorace rotundato, elytris alis æqualibus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 233. n. 8.*  
*Habitat in insula Amsterdam, spinipedi affinis, at major.*
- spinipes. 101. Gr. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis alae brevioribus, pedibus anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 8. mant. inf. 1. p. 233. n. 9.*  
*Habitat in Brasilia.*
- maxillo- 102. Gr. viridis, antennis maxillisque flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 9. mant. inf. 1. p. 233. n. 10.*  
 lius. *Habitat in insulis Americæ oppositis.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) Locusta. 2065

- conocephalus. 19. Gr. thorace rotundato lævi, elytris oblongis ala brevioribus, tibiis muticis, capite conico obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 18.  
*Habitat in Africa, viridis, magnitudine domestici.* Brün-  
niche.
- elongatus. 20. Gr. thorace subquadrato lævi, elytris alisque griseis corpore longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 127.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 357. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 233. n. 11.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 18. f. 7.  
*Habitat in India.*
- femoratus. 103. Gr. thorace scabra griseo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus, femoribus subtus membranaceis dentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 233. n. 12.  
*Habitat Tranquebariæ, statura & magnitudine elongati.*
- lamellatus. 21. Gr. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora posteriora. *Mus. Lud. Ulr.* 128.\*  
*Habitat in America australi & India, magnus.*
- ocellatus. 22. Gr. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Mus. Lud. Ulr.* 129.\* *Gron. zooph.* 649.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 357. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 233. n. 14.  
*Seb. mus.* 4. t. 73. f. 7. 8.  
*Habitat in America australi & India.*
- lanceolatus. 104. Gr. thorace rotundato lævi, elytris oblongis alæ æqualibus, fronte porrecta lanceolata subtus unidentata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 357. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 233. n. 15.  
*Habitat in Sierra Leon Africa.*
- pallens. 105. Gr. albidus, thorace lævi, alis lanceolatis elytris longioribus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 234. n. 16.  
*Habitat in Cayenna, parvus, tener.*
- acuminatus. 23. Gr. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus longitudine corporis. *Mus. Lud. Ulr.* 130.\* *Gron. zooph.* 650.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 17.  
*Degeer inf.* 3. p. 443. n. 4. t. 37. f. 8. *Locusta acuminata.*  
*Sloan. jam.* 2. p. 202. t. 236. f. 3.  
*Sulz. hist. inf.* t. 9. f. 1.  
*Habitat in America meridionali.*
- triops. 24. Gr. thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 131.\*

2066 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 19. *Locusta* vertice acuminato subtus puncto ocellari nigro, elytris alæ æqualibus.

*Habitat in America australi & India, abdomine brevi, ense non superante.*

rugosus. 25. Gr. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato, femoribus posterioribus subtus repandis. *Musf. Lud. Ulr.* 132.\*

*Habitat in America australi & India, crista compressa crenata versus apicem thoracis.*

coronatus. 26. Gr. thorace spinis erectis coronato, elytris variolos-concavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 20.

*Degeer inf.* 3. p. 448. n. 9. t. 38. f. 5. *Locusta* coronata.

*Habitat in America australi & India, antennis corpore triplo longioribus, ense lanceolato longo.*

aquilinus. 27. Gr. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis quindecim. *Musf. Lud. Ulr.* 133.\*

*Habitat in America australi & India, magnus, elytris lanceolatis, tibiis quadrisariam spinosis.*

melanop- 28. Gr. thorace rotundato lævi, elytris abdomine dimidio  
terus. brevioribus, alis nigris. *Musf. Lud. Ulr.* 134.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 21.

*Habitat in America australi & India, elytris ovatis.*

fastigia- 29. Gr. thorace rotundato lævi, elytris ovatis, alis trun-  
tus. catis, spinis tibiarum filiformibus. *Musf. Lud. Ulr.* 135.\*

*Habitat in America australi & India.*

coriaceus. 30. Gr. thorace rotundato lævi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *Musf. Lud. Ulr.* 136.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 358. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 22.

*Habitat in America australi & India, magnus, colore flavo corii, femoribus teretibus.*

albifrons. 106. Gr. thorace posterius rotundato lævi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido, ense apice ferrato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 359. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 23.

*Habitat in insula Madera.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. ( *Tettigonia* . ) *Locusta* . 2067

falx.

107. Gr. fuscus , thorace lævi posterius rotundato , capite pallido , ense falcato atro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 359. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 24.

*Habitat in Madera.*

griseus.

108. Gr. fuscus , thorace posterius carinato rotundato , ense falcato atro basi utrinque pallido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 359. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 25.

*Habitat in Italia , antennis flavescentibus longitudine corporis , pedibus virentibus , elytris fusco cinereoque variis.*

viridissimus.

31. Gr. thorace rotundato , alis viridibus immaculatis , antennis longissimis. *Fn. suec.* 869.\* *Scop. ent. carn.* 320. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 359. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 26. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 397. n. 2. t. 8. f. 3. *Locusta cauda ensifera recta.*

*Degeer inf.* 3. p. 428. *Locusta viridis cantatrix.*

*List. goed.* 301. t. 121. *Agrigoneus.*

*Goed. inf.* 2. p. 165. t. 40.

*Zinann. obs.* t. 7. f. 7.

*Robert. ic.* t. 27.

*Frisch inf.* 12. t. 2. f. 1. 2.

*Roef. inf.* 2. gryll. t. 10. 11.

*Schaeff. elem.* t. 79.

*icon.* t. 139. f. 3. 5.

*Habitat in Europæ arboribus , graminosis , agris hordeaceis , sub canicula noctu stridulus , totus viridis.*

cinerarius.

32. Gr. antennis longissimis , elytris deflexis verticalibus. *Am æn. acad.* 6. p. 397. n. 31.\*

*Habitat in Brasilia.*

verrucivorus.

34. Gr. thorace subquadrato lævi , alis viridibus fusco maculatis , antennis setaceis longitudine corporis. *Fn. suec.* 870.\* *Scop. ent. carn.* 321.

*It. wgoth.* 253. *Gryllus cauda ensifera recta , corpore subviridi.*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 359. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 234 n. 27.

*Locusta alis viridibus fusco maculatis , antennis longitudine corporis.*

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 398. n. 1. *Locusta cauda ensifera curva.*

*Degeer inf.* 3. p. 430. n. 2. t. 21. f. 1. 2. *Locusta verrucivora.*

*Raj. inf.* 61. *Locusta viridis major.*

*Frisch inf.* 12. t. 2. f. 1. 2. *Locusta major viridis.*

*Mouff. inf.* 117. f. 5.

2068 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*.

*Rob. ic. t. 27.*

*Jonst. inf. t. 11. f. 1-3.*

*Merian. inf. t. 176.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 8.*

*Sulz. inf. t. 9. f. 61.*

*Schaeff. ic. t. 62. f. 5.*

*Habitat in Europa, e murino suscescens, a rusticis Suecis manuum verrucis admotus, quas præmordet, & liquorem in vulnus emovendo, ut contabescat, efficit.*

varius. 109. *Gr. thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 25. mant. inf. 1. p. 234. n. 28.*

*Degeer inf. 3. p. 433. n. 3. Locusta thalassina.*

*Goed. inf. 2. p. 142. t. 40.*

*Frisch inf. 12. t. 2. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 8. f. 9.*

*Habitat in Lipsiæ hortis, viridissimo affinis, et quadruplo minor.*

brachypterus. 110. *Gr. griseo-fuscus, elytris alisque corpore dimidio brevioribus. Fn. suec. 868. Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 26. mant. inf. 1. p. 234. n. 29.*

*Degeer inf. 3. p. 434. n. 4. t. 22. f. 2. 3. Locusta brachyptera.*

*Habitat in Europæ borealis graminosis, ense elongato recurvo.*

Papus. 34. *Gr. apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. Amœn. acad. 1. p. 322. Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 27. mant. inf. 1. p. 234. n. 30.*

*Degeer inf. 3. p. 433. n. 13. t. 39. f. 5. Locusta Papa spinosa.*

*Pet. gazoph. t. 13. f. 7. Locusta talpa capensis pedibus longis. Kundm. promptuar. 118. n. A. 184.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Æthiopia, scutello magno rotundato spinis ciliato, femoribus posterioribus subtus quadridentatis.*

spinulosus. 59. *Gr. thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero. Fabr. sp. inf. 1. p. 361. n. 28. mant. inf. 1. p. 234. n. 31. Edw. glean. 2. p. 161. t. 285. f. 3-5.*

*Habitat in America australi & India, ense recurvo, abdomine nigro; maculis testaceis.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*. 2069

- Onos. 111. Gr. thorace lævi nigro : lateribus griseis, corpore aptero. *Pall. spic. zool.* 9. p. 18. t. 2. f. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 361. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 234. n. 32.  
*Peiv. gazoph.* t. 39. f. 9? *Locusta echinata impennis* e. Chusan.  
*Habitat in Sibiria, ense longitudine abdominis.*
- ephippi- 112. Gr. thorace posterius elevato, elytris brevissimis forni-  
ger. catis. *Fiubig Schr. der naturf. berl. Ges.* 5. t. 3. f. 6-8.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 235. n. 33.  
*Habitat in Europæ magis australis pratis, magnus.*
- dubius. 113. Gr. thorace lævi posterius rotundato, elytris brevif-  
simis apice capiteque albidis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 235.  
n. 34.  
*Habitat in Italia, statura ephippigeri.*
- Laxman- 114. Gr. thorace posterius marginato dentato, ense recurvo  
ni. apice deflexo, femina aptera. *Pall. it.* 1. app. n. 52.  
*spic. zool.* 9. p. 20. t. 2. f. 2. 3. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
361. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 35.  
*Habitat in Sibiria.*
- glaber. 115. Gr. fuscus, thorace subdepresso lævissimo. elytris  
medio viridibus fusco maculatis. *Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf.* 8. p. 193. n. 6.  
*Schæff. ic.* t. 62. f. 1. 2.  
*Habitat in Germania verrucivoro affinis.*
- indicus. 116. Gr. viridis, fronte obtuse conica, thorace anterieus &  
posterius elevato, medio excavato, abdomine alisque  
fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 193. n. 7.  
t. 53. f. 2.  
*Habitat in India, ephippigero affinis.*
- leucostic- 117. Gr. fusco-testaceus, elytris margine maculisque flavis,  
tos. femoribus in junctura puncto albissimo notatis.  
*Fuesli inf.* 2. gryll. p. 128. t. 20. f. 8-10.  
*Habitat in Germania, femina virefcens.*
- palpatus. 118. Gr. apterus fusco-testaceus, palpis anterioribus pe-  
dibusque posterioribus longissimis.  
*Sulz. hist. inf.* p. 83. t. 9. f. 2.  
*Habitat in Sicilia.*
- cantans. 119. Gr. thorace rotundato maculato, elytris rotundatis:  
macula baseos rotunda hyalina antennis longissimis.  
*Fuesli inf. helv.* p. 23. n. 439. f. 5. a. 5. b.



2070 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. ( *Tettigonia*. ) *Locusta*.

Müll. 200l. dan. prodr. p. 101. n. 1144? *Locusta viridis*.  
*Habitat in Europa, viridissimo affinis, at paulo minor, elytris brevioribus.*

falcatus. 120. Gr. elytris viridibus ala brevioribus, antennis longissimis ense inflexo ferrugineo quadruplici. *Scop. ent. carn. p. 108. o. 322.*

*Fuesli inf. helv. p. 23. n. 440.*

*Lepcchin it. 1. p. 79. d.*

*Poda mus. græc. p. 52.*

*Schaeff. ic. t. 138. f. 1-3.*

*Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria.*

Pedo. 121. Gr. gracilis mollis, pedibus posterioribus longioribus gracillimis. *Pall. it. 1. app. n. 51.*

*Habitat in Sibiria.*

flavescens. 122. Gr. flavescens, elytris rubescentibus atro reticulatis, ense ex flavo atro.

*Schaeff. ic. t. 91. f. 6.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori, oculis carnalis, ense adscendente.*

bipustulatus. 123. Gr. fuscus, ense thoracisque punctis binis atris, elytris subflavescentibus atro tessulatis ala brevioribus.

*Schaeff. ic. t. 138. f. 4. 5.*

*Habitat in Germania.*

marginatus. 124. Gr. viridis variegatus, thoracis margine flavo.

*Schaeff. ic. t. 236. f. 1-4.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori.*

rubicundus. 125. Gr. capite femoribusque rubicundis atro squamatis.

*Schaeff. ic. t. 242. f. 5. 6.*

β ) *Schaeff. ic. t. 249. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori.*

rufipes. 126. Gr. viridis, ense femorumque nodulis fuscis, pedibus rubris.

*Schaeff. ic. t. 255. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania.*

luteus. 127. Gr. luteus, alis intime viridescentibus, ense aterrimo.

*Schaeff. ic. t. 258. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*. 2071

cinereus. 128. Gr. griseus, capite thoraceque fasciis duabus nigris, femina aptera.

*Degeer inf. 3. p. 436. n. 5. Locusta griseo-aptera.*

*Habitat in Suecia, brachyptero major, antennis longissimis.*

cornutus. 129. Gr. viridis, thorace rotundato, capitis vertice cornuto rugoso, femoribus spinosissimis, antennis testaceis elytro brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 441. n. 3. t. 37. f. 7.*

*Habitat in Surinamo, 3 lineas ultra 2 pollices longus.*

tubercu- 130. Gr. thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, ely-  
latus. tris elongatis angustis, antennis testaceis longitudine ely-  
trorum. *Degeer inf. 3. p. 444. n. 5. t. 38. f. 1.*

*Habitat in Surinamo, viridis, acuminato minor.*

curvicau- 131. Gr. totus viridis, thorace tetragono plano, elytris elon-  
dus. gatis ala brevioribus, pedibus posterioribus longissimis.  
*Degeer inf. 3. p. 446. n. 7. t. 38. f. 3.*

*Habitat in Pennsylvaniae pratis, laurifolio paulo minor.*

vulturi- 132. Gr. thorace angulato laevi, femoribus anterioribus mu-  
nus. ticis, fronte macula abdomineque subtus fascia nigris,  
antennis corpore triplo longioribus. *Degeer inf. 3. p. 451. n. 11. t. 39. f. 2.*

*Habitat in Surinamo, vix 2 pollices longus.*

falcona- 133. Gr. thorace rotundato, femoribus teretibus longis: in-  
rius. termediis muticis, elytris lanceolatis, antennis longissi-  
mis. *Degeer inf. 3. p. 452. n. 12. t. 39. f. 4.*

*Habitat in Surinamo, ultra 2 pollices longus.*

capitatus. 134. Gr. capite magno, thorace plano laevi: fasciis binis lon-  
gitudinalibus nigris, elytris longitudine abdominis. *De-  
geer inf. 3. p. 455. n. 14. t. 40. f. 1.*

*Habitat - - - sesquipollicaris.*

spini- 135. Gr. thorace planiusculo laevi, vertice spinoso, fronte-  
frons. nigra, corpore rufo fusco, elytris viridi, purpureis palli-  
dis. *Degeer inf. 3. p. 456. n. 15. t. 40. f. 2.*

*Habitat in Surinamo, pollicem longus.*

agilis. 136. Gr. griseo-viridis, abdomine fusco, thorace planiusculo,  
pedibus posterioribus antennisque longissimis, alis elytro  
longioribus. *Degeer inf. 3. p. 457. n. 16. t. 40. f. 3.*

*Habitat in Pennsylvania, vix pollicem longus.*

fasciatus. 137. Gr. viridis, abdomine fasciis sulphureis fuscisque, thorace planiusculo, alis elytro longioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. p. 458. n. 17. t. 40. f. 4.  
*Habitat in Pennsylvania, 9 modo lineas longus.\*)*

teres. 138. Gr. ex flavo lividus, oculis maximis, alis elytro longioribus, pedibus anterioribus spinosis. *Degeer inf.* 3. p. 458. n. 18. t. 40. f. 5.  
*Habitat in Surinamo, 7 modo lineas longus.*

muticus. 222. Gr. thorace oblongo quadrato marginato, femoribus tibiisque bifariam spinosis, ense lævi adscendente longitudine fere abdominis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 22.  
*Habitat extra Europam.*

macrop- 223. Gr. thorace rotundato, alis albidis fusco lineatis elytra pal-  
 terus. lide immaculata superantibus, abdomine filis quatuor terminato, femoribus posterioribus subtus tibiisque quatuor anterioribus bifariam spinosis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 13. C.  
*Habitat extra Europam.*

nigroma- 224. Gr. thorace rotundato lævi, capite elytrisque pallidis,  
 culatus. antennis longissimis, alis cæruleo-virescentibus: macularum nigrarum undulatarum ordinibus septem transversis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 24.  
*Habitat extra Europam, pedibus pallidis, tibiis anterioribus longis spinis armatis.*

testaceus. 225. Gr. testaceus, abdomine elytris longiore subtus & thoracis margine externo flavo, ense adscendente quadrivalvi. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 28.  
*Habitat in Europa.*

fulvicor- 226. Gr. fusco cinereoque varius, antennis flavescens longi-  
 nis. tudine corporis, thorace plano posterius subcarinato, elytris fusco-griseis: punctorum pallidorum ordine obsoleto, ense adscendente. *Mus. Lesk.* p. 48. n. 33.  
*Habitat in Europa.*

---

\*) An propria species huc referenda a Seba *mus.* vol. 4. delineata? flavus t. 77. f. 11. 12. tessellatus t. 71. f. 7. 8. nigro notatus t. 72. f. 1. 2. chloropterus t. 75. f. 5. 6. duplicatus t. 75. f. 7-10. subulatus t. 78. f. 6. bifurcatus t. 79. f. 13-16. alba punctatus t. 80. f. 7. 8. capite & cauda subulatis t. 83. f. 9. ensiferi consueti t. 96. f. 39. 40.

longicor- 227. Gr. thorace rotundato supra testaceo, capite viridi :  
nis. fronte acuminata testacea antennis longissimis, elytris  
testaceis abdomine dimidio brevioribus, ense adscen-  
dente testaceo basi viridi. *Mus. Lesk. p. 48. n. 34.*  
*Habitat in Europa.*

\*\*\*\*\* *antennis filiformibus, palpis simplicibus,*  
*cauda simplici, Locustæ, Grylli Fabricii.*

reticula- 4. Gr. thorace cymbiformi posterius producto acuto, elytris  
tus. reticulatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 362. n. 7. mant. inf. 1.*  
*p. 236. n. 7.*

*Habitat in Bengala, magnitudine fere ferrati.*

ferripes. 139. Gr. thorace cymbiformi posterius producto, elytris  
fuscis, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 236. n. 8.*

*Habitat in America australi & India, magnitudine fere*  
*ferrati.*

ferratus. 5. Gr. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acu-  
minato, abdomine cæruleo. *Mus. Lud. Utr. 121.\**  
*Gron. zooph. 142.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 363. n. 8. mant. inf. 1. p. 236. n. 9.*  
Gryllus thorace cymbiformi carinato ferrato pollice pro-  
ducto acuto.

*Degeer inf. 3. p. 493. n. 10. t. 41. f. 6. Acrydium ferratum.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 16. f. 2.*

*Sulz. inf. t. 8. f. 58.*

*Habitat ad Caput bonæ spei.*

turcicus. 140. Gr. cinereus, thorace cymbiformi, elytris basi fascia-  
que fuscis, alis basi atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 236. n. 10.*  
*Habitat in India, parvus.*

lunus. 9. Gr. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris ni-  
gris : fasciis albis. *Amœn. acad. 6. p. 397. n. 30.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 362. n. 6. mant. inf. 1. p. 236. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali, alis nigris immaculatis.*

elephas. 33. Gr. thorace carinato integro, corpore aptero. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 361. n. 1. mant. inf. 1. p. 235. n. 1.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in Africa, reliquis hujus tribus major & ponderosior,*  
*viridis femoribus muticis, rudimentis alarum duarum.*

2074 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (Locusta.)

- fuccine- 36 Gr. thoracis carina margineque posteriori elytrorum-  
rus. quemargine dorsali flavis, gula cornuta. *Amœn. acad.*  
6. p. 398. n. 36. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 2. *mant.*  
*inf.* 1. p. 235. n. 2.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 54. f. 2.  
*Habitat in America australi, & duplo major in India,*  
*antennis flavis, tibiæ posteriorum spinis luteis apice*  
*atris.*
- cristatus. 37. Gr. thorace cristato, carina quadrifida, aliis apice fusci-  
*Mus. Lud. Utr.* 137.\* *Amœn. acad.* 1. p. 21. t. 17. f.  
4. *Gron. zooph.* 658. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 235. n. 3.  
*Hasselq. it.* 413. *Gryllus arabicus.*  
*Olear. mus.* t. 17. f. 5. *Gryllus ex Ægypto.*  
*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 1.  
*Seb. mus.* 4. t. 72. f. 11. 12.  
*Roes. inf.* 2. *gryll.* t. 5.  
*Edw. glean.* t. 312.  
*Habitat frequens in Arabia, Ægypto, Arabicus esculentus.*
- Dux. 141. Gr. thorace carinato scabro, elytris viridibus, alis rubi-  
fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 4. *mant.*  
*inf.* 1. p. 235. n. 4.  
*Drury inf.* 1. t. 44.  
*Habitat in America meridionali, magnus, virescens, co-*  
*pitate flavescente, antennis nigris.*
- ægyptia- 142. Gr. thorace cristato; carina trifida, alis fascia nigra-  
cus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 5.  
*Habitat in Ægypto.*
- mobillo- 38. Gr. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis at-  
rus. bo punctatis, alis rufis. *Mus. Lud. Utr.* 141.\* *Gron.*  
*zooph.* p. 279. n. 662. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 364. n. 13.  
*mant. inf.* 1. p. 236. n. 15.  
*Seb. mus.* 4. t. 79. f. 7. 8.  
*Roes. inf.* 2. *gryll.* t. 18. f. 6.  
*Seligm. av.* 1. t. 43.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. t. 54. f. 1.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- puncta- 143. Gr. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, 2<sup>da</sup>  
tus. atris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 364. n. 14. *mant. inf.* 1. p.  
236. n. 16, *Sali*

*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 3.*

*Drury inf. 2. t. 41. f. 4.*

*Habitat in India.*

- Equamofus.* 144. Gr. viridis, thorace subarticulato: articulis utrinque subtricuspidibus; alis rubris nigro punctatis. *Mant. p. 533.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 364. n. 15. mant. inf. 1. p. 236. n. 17.*  
 Gryllus thorace subtriarticulato, articulis utrinque spinosis, alis rubris nigro punctatis.  
*Drury inf. 1. t. 49. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*
- miliaris.* 39. Gr. thorace subquadrato dentato verrucoso, elytris punctis callosis albis. *Mus. Lud. Ulr. 142.\**  
*Degeer inf. 3. p. 486. n. 1. t. 40. f. 6. Acridium verrucosum.*  
*Habitat in America meridionali, morbilloso affinis.*
- hæmatus.* 40. Gr. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femoribus piloso-ciliatis. *Mus. Lud. Ulr. 143.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 16. mant. inf. 1. p. 237. n. 18.*  
*Degeer inf. 3. p. 490. n. 6. t. 40. f. 10. Acridium rubripes.*  
*Habitat in America australi & India, elytris cinereis, alis nigro venosis.*
- flavicornis.* 145. Gr. viridis, thorace subcarinato, elytris immaculatis, alis basi rufis; tibiis posterioribus sanguineis flavo ferratis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 232. n. 19.*  
*Habitat in Sina, magnus.*
- pictus.* 146. Gr. elytris viridibus albo punctatis apice rufescentibus; corpore cæruleo flavoque variegato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 17. mant. inf. 1. p. 237. n. 20.*  
*Habitat in Cayenna.*
- migratorius.* 41. Gr. thorace subcarinato: segmento unico capite obtuso, maxillis atris. *Mus. Lud. Ulr. 140.\* Fn. suec. 871. Scop. ent. carn. 323.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 19. mant. inf. 1. p. 237. n. 22.*  
 Gryllus thorace subcarinato, segmento unico, mandibulis cæruleis.  
*Frisch inf. 9. t. 1. f. 8. Gryllus migratorius.*  
*Degeer inf. 3. p. 466. n. 1. t. 23. f. 1. Acridium migratorium.*  
*Seb. mus. 4. t. 65. f. 21.*  
*Roesel inf. 2. gryll. t. 24.*  
*Edw. glean. t. 208.*  
*Seligm. av. 6. t. 103.*



*Habitat in Tataria, variis annis numerosissimis gregibus in Europam migrans, & omnia vegetabilia exedens, ab Ægyptiis vivus prunis injectus, rejectis alis pedibusque esitatur.*

tataricus. 42. Gr. thorace subcarinato : segmentis tribus, capite rotundato : maxillis concoloribus. *Mus. Lud. Ulr. 139.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 18. mant. inf. 1. p. 237. n. 21.*  
 Gryllus thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandibulis concoloribus.

*Roef. inf. gryll. t. 18. f. 8.*

*Drury inf. 1. t. 49. f. 2.*

*Habitat in Africa, elytris præsertim cinerascens fuscis maculatis, migratorio affinis.*

ruficornis. 147. Gr. thoracis dorso nigro : carina flava, antennis tibiisque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 237. n. 23.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, statura migratorii, paulo minor.*

Lineola. 148. Gr. thorace subcarinato fusco : linea dorsali rufa, femoribus posterioribus intus sanguineis, tibiis cæruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 20. mant. inf. 1. p. 237. n. 24.*  
*Habitat in Italia, magnitudine migratorii.*

variegatus. 43. Gr. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis cæruleis. *Mus. Lud. Ulr. 144. Fabr. sp. inf. 1. p. 366. n. 21. mant. inf. 1. p. 237. n. 25.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 8. t. 53. f. 3.*  
*Habitat in America, fronte rubra atro maculata, antennis nigris rubro annulatis.*

vocans. 149. Gr. thorace carinato, elytris pallidis : maculis ocellaribus fuscis, alis basi ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 366. n. 22. mant. inf. 1. p. 237. n. 26.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

luridus. 150. Gr. niger, thorace subcarinato, pectoris macula abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta. *Fabr. sp. inf. 1. p. 366. n. 23. mant. inf. 1. p. 237. n. 23.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnitudine striduli.*

fuscus. 151. Gr. thorace carinato, elytris antè nigris fascia alba, posterius griseis nigro variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 366. n. 24. mant. inf. 1. p. 237. n. 28.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (Locusta.) 2077

- scaber. 152. Gr. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus posterioribus supra infraque carinatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 366. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 30.  
*Habitat in Jutlandiæ arenosis.*
- cisti. 153. Gr. thorace scabro: crista bifida, alis rubris: fascia nigra: femoribus posterioribus canaliculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 237. n. 29.  
*Habitat in cisto halimifolio, stridulo paulo major.*
- cæruleo-  
cens. 44. Gr. thorace subcarinato, alis virescenti-cæruleis: fascia nigra. *Mus. Lud. Ulr.* 145. \* *Scop. ent. carn.* 325. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 43. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 392. n. 2. *Acrydium elytris nebulosis, alis cæruleis extremo nigro.*  
*Degeer inf.* 3. p. 473. n. 3. *Acrydium cæruleipenne.*  
*Raj. inf.* 60.  
*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 3.  
*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 19.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 4.  
*Sulz. inf.* t. 9. f. 60.  
*Schaeff. ic.* t. 27. f. 6. 7.  
*Habitat in Sibiria & Europa magis australi.*
- fulvina-  
mus. 45. Gr. thorace lineis quatuor flavis, alis cæruleis, elytris viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 146. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 367. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 34.  
*Habitat in America meridionali, femorum basi sanguinea.*
- italicus. 46. Gr. fuscus, thorace carinato, alis rubris, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 147. \* *Scop. ent. carn.* 327. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 367. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 35.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 6.  
*Schaeff. ic.* t. 27. f. 8. 9.  
*Habitat in Europa magis australi.*
- thalassius. 154. Gr. thorace lævi viridi, alis hyalinis latere tentiori viridibus, apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 367. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 37.  
*Habitat in Italia, capite thoraceque viridi, ore oculisque fuscis, ribiis sanguineis.*
- germanicus. 155. Gr. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus posterioribus nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 367. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 36.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 7.  
*Habitat in Germaniæ agris.*

virginia- 156. Gr. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris  
nus. basi virescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 32. *mant.*  
*inf.* 1. p. 238. n. 38.  
*Habitat in America boreali.*

stridulus. 47. Gr. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris. *Fn.*  
*suec.* 872.\* *Scop. ent. carn.* 326. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
366. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 31.  
*It. ocl.* 158. *Gryllus* elytris nebulosis, alis rubris extimo  
nigris.

*Uddm. diff.* 50.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 393. n. 4. *Acrydium* elytris nebu-  
losis, alis rubris externe nigris.

*Degeer inf.* 3. p. 472. n. 2. *Acrydium* rubripenne.

*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 2.

*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 20.

*Roef. inf.* 2. *gryll.* t. 21. f. 1.

*Schaeff. elem.* t. 15.

*icon.* t. 27. f. 10. 11.

*Habitat in Europæ siccis arenosis, tota die in seram noc-*  
*tem stridens, niger, aut nigro flavoque varius.*

ferrugi- 157. Gr. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis,  
neus. alis ferrugineis, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
367. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 33.  
*Habitat in Africa æquinoctiali.*

morio. 158. Gr. obscurus, thorace subcarinato, alis atris imma-  
culatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 238. n. 32.  
*Habitat in Africa, stridulo affinis, at paulo minor.*

cærulans. 48. Gr. thorace læviusculo, elytris pallidis nigro macula-  
tis, alis latere tenuiore cærulescentibus. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 368. n. 33. *mant. inf.* p. 238. n. 39.  
*Habitat in Europæ magis australis campestribus.*

carolinus. 49. Gr. thorace subcarinato, alis nigris: margine poste-  
riore flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 34. *mant. inf.*  
1. p. 238. n. 40.

*Catesb. carol.* 2. p. 89. t. 89. *Locustella* carolina, elytris  
fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis.

*Degeer inf.* 3. p. 491. n. 7. t. 41. f. 2. 3. *Acrydium*  
carolinum.

*Habitat in America boreali, elytris obscuris fusco punctatis.*

- obscurus. 50. Gr. thorace subcarinato, alis disco rubro fascia nigra, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 230. n. 41. *Degeer inf.* 3. p. 492. n. 8. t. 41. f. 4. *Acrydium obscurum*.  
*Seb. mus.* 4. t. 80. f. 15. 16.  
*Drury inf.* 2. t. 41. f. 1.  
*Habitat in Africa, femoribus interne basi atris.*
- sibiricus. 51. Gr. thorace subcarinato, antennis clavatis, tibiis anterioribus ovato-clavatis crassiss. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 42.  
*Pall. it.* 1. app. n. 48. *spicil. zool.* 9. p. 29. t. 1. f. 11. *Gryllus clavimanus*.  
*Laxmann nov. omn. Petrop.* 14. t. 25. f. 8.  
*Habitat in Sibiria, femina tibiis simplicibus.*
- cinerascens. 159. Gr. thorace carinato, elytris margine tenuiore viridibus, alis basi flavescentibus apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 44.  
*Habitat in Italia, flavo affinis, at duplo major.*
- sulphureus. 160. Gr. obscurus thorace carinato, alis flavissimis apice nigricantibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 45.  
*Habitat in America boreali, parvus.*
- flavus. 52. Gr. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 367. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 46.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 702. n. 52. *Gryllus* thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis.  
*Scop. delic. insubr.* 1. p. 63. t. 24. f. C. *Gryllus* alis semiluteis: fascia fusca, corpore subtus fusco-ferrugineo.  
*Degeer inf.* 3. p. 493. n. 9. t. 41. f. 5? *Acrydium nigro fasciatum*.  
*Petiv. gazoph.* 6. t. 3. f. 6. *Locusta capensis*, alis inferioribus luteis.  
*Habitat in Europa magis australi, & Africa, tibiis posterioribus sanguineis, elytris fuscis: maculis obsoletis albis.*
- insubricus. 161. Gr. elytris testaceis, alis basi rubris: fascia fusca. *Scop. delic. insubr.* 1. p. 64. t. 24. f. D.  
*Habitat in Insubria, italico minor.*

2080 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Locusta*.)

- nitidulus. 162. Gr. vididis, capite lucido luteo. *Scop. delic. insubr.*  
*1. p. 62. t. 24. f. B.*  
*Habitat circa Mediolanum, biprlicaris, ad tettegonias*  
*remittendus.*
- cyanipes. 163. Gr. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posterioribus  
 flavis apice cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 370. n.*  
*41. mant. inf. 1. p. 239. n. 47.*  
*Degeer inf. 3. p. 489. n. 4. t. 40. f. 3. Acrydium*  
*flavo fasciatum.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*
- ruficus. 164. Gr. griseus, elytris basi fuscis flavo maculatis apice  
 cinereo fuscoque variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 370. n.*  
*42. mant. inf. 1. p. 239. n. 48.*  
*Habitat in Insulis Americæ meridionali oppositis.*
- lateralis. 165. Gr. thorace fusco: margine punctoque utrinque tibiis-  
 que flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 370. n. 43. mant.*  
*inf. 1. p. 239. n. 49.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*
- velox. 166. Gr. fuscus, thoracis plani margine pedibusque viref-  
 centibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 239. n. 50.*  
*Habitat in Sina, parvus.*
- apricarius. 53. Gr. thorace cruciato, antennis longitudine corporis.  
*Fn. suec. 873.\* It. oel. 157.*  
*Habitat in Europæ campis siccissimis.*
- viridulus. 54. Gr. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum  
 margine albido. *Fn. suec. 874.\* Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*370. n. 44. mant. inf. 1. p. 239. n. 51.*  
*It. wgoth. 276. Gryllus capite, thorace elytrisque su-*  
*perne viridibus.*  
*Degeer inf. 3. p. 480. n. 7. Acrydium albo marginatum.*  
*Frisch inf. 9. t. 1. f. 7.*  
*Schæff. ic. t. 141. f. 2. 3.*  
*Habitat frequens in Europæ arvis sterilioribus.*
- biguttulus. 55. Gr. thorace cruciato, elytris nebulosis: puncto  
 oblongo albo versus apices. *Fn. suec. 875. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 370. n. 45. mant. inf. 1. p. 231. n. 51.*  
*Degeer inf. 3. p. 479. n. 6. Acrydium biguttulum.*  
*Schæff. icon. t. 190. f. 1. 2.*  
*Habitat in Europæ magis borealis arvis sterilioribus,*  
*frequens.*



- rufus. 56. Gr. Thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis acutis. *Fn. suec.* 876. \* *Scop. ent. carn.* 329.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 55.  
 Gryllus fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis.  
*Schaeff. ic. t.* 136. f. 4. 5.  
*Habitat in Europæ arvis sterilioribus frequens.*
- captivus. 167. Gr. fuscus, thorace cruciato, femoribus tibiisque posterioribus fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 47.  
*mant. inf.* 1. p. 231. n. 54.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- danicus. 57. Gr. thorace subcarinato femoribusque virescentibus, tibiis posterioribus sanguineis.  
*Habitat in Dania, verrucivori magnitudine.* Brünniche.
- grossus. 58. Gr. femoribus sanguineis, elytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fn. suec.* 877. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 46. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 53.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 393. t. 8. f. 2. Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.  
*Degeer inf.* 3. p. 477. n. 5. t. 22. f. 4. Acrydium rubripes.  
*Hollar. inf. t.* 10. f. 5. 6.  
*Frisch inf.* 9. p. 5. t. 4.  
*Habitat in Europæ arvis arenosis frequens.*
- pedestris. 60. Gr. corpore incarnato-aptero. *Fn. suec.* 878. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 56.  
*Degeer inf.* 3. p. 474. n. 4. t. 239. f. 8. 9. Acrydium apterum.  
*Habitat in Europa, & ad Sibiria montem Tscheremschan.*
- perspicillatus. 61. Gr. alarum rudimentis oculo atro, oculis aureis. *Amæn. acad.* 6. p. 398. n. 34. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 50.  
*mant. inf.* 1. p. 239. n. 57.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 357. n. 11? *mant. inf.* 1. p. 233. n. 13?  
 Locusta (specularis) thorace rotundato, elytris griseis basi oculo dorsali vitreo, antennis longissimis.  
*Habitat in America australi & India.*
- annulatus. 168. Gr. thorace planiusculo, fronte gibbosa, alis cæruleiscenti-nigris intus cæruleis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.* 8. p. 195. n. 5. t. 53. f. 4.  
*Habitat in America, punctis elevatis scaber, ex rubescente griseus, abdominis annulis aliquot virescentibus, antennis flavicantibus nigro annulatis.*



- triangu- 169. Gr. spadiceus, scutello abdominisque segmento primo  
laris. a macula triangulari, elytris margine flavis, alis fla-  
vescentibus.  
*Roefel inf. 2. gryll. p. 138. §. 2. t. 22. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- versicolor. 170. Gr. viridi rubro flavoque varius, capite cum anten-  
nis elytrorumque margine viridi, thorace elytrisque  
fuscis.  
*Sulz. hist. inf. p. 84. t. 9. f. 4.*  
*Habitat in Insubria.*
- Centurio. 171. Gr. fuscus atro maculatus, alis ruberrimis: basi  
margine strisque tenerrimis undulatis atris.  
*Drury inf. 2. p. 78. t. 41. f. 3.*
- cæruleus. 172. Gr. viridis, alis cæruleis apice cinereis, femoribus  
viridi-flavis, tibiis nigerrimis.  
*Drury inf. 2. p. 79. t. 42. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*
- Miles. 173. Gr. viridis, frontis fasciis thoracisque punctis binis  
flavis, elytris spadiceis, alis alternatim rufescentibus  
& atris.  
*Drury inf. 2. p. 80. t. 42. f. 2.*  
*Habitat in America.*
- ignavus. 174. Gr. thorace subcucullato: lineis tribus elevatis;  
lateralibus lunulatis.  
*Roef. inf. 2. gryll. p. 128. §. 5. t. 20. f. 6. 7.*  
*Scop. ent. carn. p. 110. n. 328.*  
*Habitat in Germania.*
- subcari- 175. Gr. thorace subcarinato viridescente, alis basi luteis:  
natus. apicis macula nigricante. *Lepech. it. 1. p. 256. c. t.*  
*47. f. 4.*  
*Habitat in Sibiriae desertis Uralensibus.*

---

An huc referendi, tanquam propriæ species, a reliquis distinctæ, *Gryllus femoratus*  
*Lepech. it. 1. t. 19. f. 1. 2. t. 20. f. 5. pluresque a Seba Mus. vol. 4.*  
*delineati, cyaneus t. 65. f. 18. singularis t. 65. f. 22. fuscus t. 67. f. 11.*  
*purpurascens t. 70. f. 3. 4. albo marginatus t. 70. f. 5. 6. pallide flavus t.*  
*71. f. 1. 2. tæniolatus t. 71. f. 3. 4. luteo-fuscus t. 71. f. 5. 6. hyalinus t. 71.*  
*f. 11. 12. cinereus t. 72. f. 7. 8. cinereo-fuscus t. 72. f. 9. 10. capito.*  
*t. 75. f. 1. 2. fusco maculatus t. 79. f. 1. 2. viridi-purpurascens t. 79. f.*  
*9. 10. olivaceus t. 79. f. 11. 22. Locustella t. 80. f. 5. 6. cinnabarinus t.*  
*80. f. 9. 10. capeensis t. 80. f. 11. 12. exiguus t. 87. f. 19. alique anonymi t.*  
*69. f. 9-12. t. 96. f. 34-38. depicti, minutus & virens Hermannii!*

- fuscus*. 176. Gr. fuscus , elytris fasciis duabus albis. *Lepechin it.* 1. p. 314.  
*Habitat in desertis Uralensibus.*
- Lepechini*. 177. Gr. thoracis scutello abdominis longitudine: linea albidâ a fronte per medium scutellum decurrente. *Lepechin it.* 2. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Sibiria.*
- fuliginosus*. 178. Gr. thoracis dorso triangulo, elytris ex griseo fufcescentibus, alis fuliginosis. *Pallas it.* 2. app. n. 77.  
*Habitat in Sibiriae campestribus; italici magnitudine.*
- muricatus*. 179. Gr. thorace pentagono, alis flavescentibus: arcu fusco, femoribus posterioribus exterius muricatis. *Pallas it.* 1. app. n. 47.  
*Habitat in desertis Uralensibus, obscuro major, colore varians.*
- miniatus*. 180. Gr. thorace subcarinato, alis miniatis: apicis arcu nigro. *Pallas it.* 1. app. n. 49.  
*Habitat in desertis australibus ad fluvium Ural, cœrulescentis forma et magnitudine.*
- variabilis*. 181. Gr. thorace subcarinato, alis nigro reticulatis: area ad marginem crassiorē atra apice fusco-hyalino. *Pallas it.* 1. app. n. 52.  
*Habitat in campis per fluvium Samara irrigatis, magnitudine facieque striduli, alis nunc hyalinis, nunc albican- tibus, nunc pallidis, nunc cœrulescentibus.*
- fulvus*. 182. Gr. thorace subcarinato, alis fascia nigra lata, basi roseis, apice hyalinis. *Pallas it.* 2. app. n. 78.  
*Habitat in desertis salis aridissimis ad fluvios Ural & Irtsch sitis, facie fere cœrulescentis.*
- tibialis*. 183. Gr. elytris nebulosis, alis cœrulescentibus fusco reticulatis, tibiis albidis longius spinosis. *Pallas it.* 2. app. n. 78. b.  
*Habitat in regionibus australibus Uralensibus, facie & magnitudine salini.*
- barabensis*. 184. Gr. elytris pallidis punctis fuscis irroratis, alis hyalino- flavescentibus: margine et apice venis punctisque fuscis. *Pallas it.* 2. app. n. 79. 3. p. 433.  
*Habitat in pinetis arenosis deserti Barabensis, magnitudinis tibialis, chenopodii amans.*

- numidi- 185. Gr. thorace carinato, aliis minimis squameis. *Poires*  
cus. *Journ. de physiq.* 1787. *Apr.* p. 242. t. 1. f. 1.
- cruenta- β) Gr. maculis sanguineis coopertus. *Poires Journ. de phys.*  
tus. 1787. *Apr.* p. 244.  
*Habitat in Numidia, voracissimus, glaberrimus, totus vi-*  
*ridis, elephante minor, sed longior, ova glutine coacta*  
*in arena sepeliens.*
- cinereus. 186. Gr. fusco punctatus, thorace subcarinato, alis albis.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 100. n. 1138.  
*Habitat in Dania.*
- flaves- 187. Gr. flavescens, elytris fuscescentibus obsolete macu-  
cens. latis, alis flavo nigroque reticulatis.  
*Schaeff. ic. t. 228. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- rhomboi- 188. Gr. elytris cinereis apice albidis: maculis atris rhom-  
deus. boideis.  
*Schaeff. ic. t. 228. f. 6. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- angula- 189. Gr. flavescens, abdomine fusco: annulorum segmentis  
tus. obtuse angulatis.  
*Schaeff. ic. t. 232. f. 2. 3.*  
*Habitat in Germania.*
- rubicun- 190. Gr. capite, thorace elytrorumque margine anteriore vi-  
dus. ridi, elytris lunula media albida, alis cinereis, abdomine  
posterius pedibusque rubicundis.  
*Schaeff. ic. t. 241. f. 5. 6.*  
*Habitat in Germania.*
- pullus. 191. Gr. atro-fuscus, thorace quadrato: margine flavescente.  
*Schaeff. ic. t. 232. f. 6. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- lineatus. 192. Gr. viridescens, thoracis linea longitudinali elytrorum-  
que supra aurantiis.  
*Schaeff. ic. t. 243. f. 3. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- sphæri- 193. Gr. viridescens, elytrorum basi maculis binis albis sphæ-  
cus. ricis.  
*Schaeff. icon. t. 247. f. 3. 4.*  
*Habitat in Germania.*

- rubicollis. 194. Gr. flavidus, thorace rubro: margine flavo.  
*Schaeff. ic. t. 247. f. 3. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- rosaceus. 195. Gr. varius, thorace viridi: margine rosaceo.  
*Schaeff. ic. t. 252. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- similis. 196. Gr. thorace subcarinato, alis atris: disco & margine  
 rubris.  
*Schaeff. ic. t. 253. f. 1. 2.*  
 β) Gryllus alis apice maculatis.  
*Schaeff. ic. t. 253. f. 5. 6.*  
*Habitat in Germania, stridulo affinis, an varietas.*
- purpu- 197. Gr. alis elytrisque pallidis maculatis, thorace abdo-  
 reus. minisque annulis tribus anterioribus purpureis.  
*Schaeff. ic. t. 263. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- flavens. 198. Gr. flavescens, thorace lineis duabus longitudinali-  
 bus obscurioribus.  
*Schaeff. ic. t. 264. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania.*
- viridis. 199. Gr. viridis, hinc inde flavescens.  
*Schaeff. icon. t. 265. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania; an propria species?*
- sexmacu- 200. Gr. subfuscus, alis flavescensibus maculis sex fuscis  
 latus. longitudinaliter positis.  
*Schaeff. ic. t. 265. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania, parvus.*
- maculo- 201. Gr. elytris maculosis, alis rosaceis apice cinerascensibus.  
 fus. *Schaeff. icon. t. 267. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- polyctic- 202. Gr. fuscescens hinc inde pallide punctatus, alis rufes-  
 tos. centibus: apice anis nigricantibus.  
*Schaeff. icon. t. 267. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania.*
- limbatus. 203. Gr. viridis, elytris apice & margine exteriori rufis.  
*Degeer inf. 3. p. 481. n. 8. Acrydium rufo marginatum.*  
*Habitat in Europæ pratis, 9 lineas longus.*

pratenfis. 204. Gr. viridis, elytris apice nigris, antennis corporis dimidio longitudine.

*Degeer inf. 3. p. 481. n. 9. Acrydium nigro terminatum.*  
*Habitat in Europæ pratis, limbo minor.*

albipes. 205. Gr. thorace cristato: segmento quadruplici, elytris obfcurè virentibus, alis violaceis, femoribus posterioribus albo maculatis. *Degeer inf. 3. p. 487. n. 2. t. 40. f. 7.*  
*Habitat in Surinamo, 2½ pollices longus.*

roseus. 206. Gr. viridis, antennis flavis, alis dimidiato tibiisque posterioribus roseis. *Degeer inf. 3. p. 488. n. 3. t. 41. f. 1.*  
*Habitat in Sina, 2½ pollices longus.*

sanguinolentus. 207. Gr. capite flavo rubro nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus, tibiis rubro maculatis. *Degeer inf. 3. p. 489. n. 5. t. 40. f. 9.*  
*Habitat - - - sesquipollicaris.*

denticulatus. 208. Gr. viridis, thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, fasciis binis longitudinalibus griseis. *Degeer inf. 3. p. 495. n. 11. t. 42. f. 2. Acrydium serrato-fasciatum.*  
*Habitat in Surinamo, gracilis, 2 pollices longus.*

dentatus. 209. Gr. fuscus nebulosus, thorace cymbiformi rugoso: carina lævi, femoribus posterioribus denticulatis, capite ovato. *Degeer inf. 3. p. 496. n. 12. t. 42. f. 3.*  
*Habitat in India, 2½ pollices longus.*

chlorophterus. 210. Gr. fuscus, alis viridibus, thorace rotundato lævi, femoribus posterioribus linea flava. *Degeer inf. 3. p. 497. n. 13. t. 42. f. 4. Acrydium flavo lineatum.*  
*Habitat in Surinamo, 15 lineas longus.*

erythropus. 211. G. griseo-fuscus, femoribus posterioribus subtus rubris, intus flavescens nigris maculatis, tibiis posterioribus rubris. *Degeer inf. 3. p. 498. n. 14. t. 42. f. 5. Acrydium Fennicæ mur rubrum.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*

chrysolas. 212. Gr. viridis, thorace carinato, elytris fuscis: margine inferiore viridi, alis nigris basi luteis. *Degeer inf. 3. p. 498. n. 15. t. 42. f. 6. Acrydium viridifasciatum.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*

- varius. 213. Gr. viridi-obscurus, alis cæruleis, corpore fasciis maculisque flavis, femoribus basi sanguineis.  
*Degeer inf.* 3. p. 500. n. 17. t. 42. f. 8. *Acrydium variegatum*.  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longus.*
- longipennis. 214. Gr. viridi-flavus, elytris abdomine duplo longioribus capite thoraceque fasciis binis nigris. *Degeer inf.* 3. p. 501. n. 18. t. 42. f. 9.  
*Habitat in Surinamo, 11 lineas longus.*
- acutus. 215. Gr. thorace nigro: macula flavo-viridi, elytris fuscis: macula viridi, femoribus posterioribus fasciis tribus nigris.  
*Degeer inf.* 3. p. 54. n. 19. t. 42. f. 10. *Acrydium acuminatum*.  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longus.*
- chalcops. 216. Gr. griseo-fuscus, thorace fasciis binis nigris, elytris unica grisea, femoribus posterioribus intus tibiisque sanguineis.  
*Degeer inf.* 3. p. 501. n. 20. t. 42. f. 11. *Gryllus æneopunctatus*.  
*Habitat in Surinamo, 10 lineas longus.*
- rusticus. 217. Gr. griseo-fuscus, elytris lineis punctatis nigris.  
*Degeer inf.* 3. p. 503. n. 21. t. 42. f. 12.  
*Habitat in Surinamo, 10 lineas longus.*
- hamatus. 218. Gr. thoracis scutello abdomine longiore antè harnato, antennis longitudine abdominis, alis nigris, elytris nullis. *Degeer inf.* 3. p. 503. n. 22. t. 42. f. 13.  
*Habitat in Surinamo.*
- rugosus. 228. Gr. apterus, viridis cinereo varius, capite vesiculoso: fronte rugis duabus dentatis & utrinque ruga minore denticulata, verrice impresso: margine elevato dentato, thorace morbilloso spinoso: crista elevata compressa rugoso-dentata. *Mus. Lesc.* p. 48. n. 39.  
*Habitat extra Europam, interdum cinereus fusco varius, abdominis segmentis singulis utrinque macula fusca notatis, utrinque dentibus 2, & præterea crista dentata armatis, femoribus tibiisque posterioribus supra infraque dentatis.*
- lanaris. 229. Gr. thorace carinato, alis basi rufis: lunula media margine anteriori maculisque tribus versis apicem ad-



marginem posteriorem fuscis, tibiis posterioribus albis  
 nigro-spinosis, griseo-villosis. *Mus. Lesk. p. 48. n. 49.*  
*Habitat* - - -

flavipes. 230. Gr. thorace supra elytrisque brunneis: margine anteriore viridi-flavis, femoribus posterioribus subtus saepe guineis tibiisque flavis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*

griseus. 231. Gr. thorace cruciato supra fusco, elytris griseo-fusco nebulosis, pedibus quatuor anterioribus griseo-fusco maculatis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 51.*  
*Habitat in Europa.*

cruciger. 232. Gr. thorace cruciato viridi: cruce alba elytris dorso viridibus margine inflexo fuscis apice albis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 52.*  
*Habitat in Europa.*

nubilus. 233. Gr. thorace carinato viridi: utrinque linea fracta alba, elytris fusco nebulosis supra viridibus. *Mus. Lesk. p. 49. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*

virens. 234. Gr. viridis, thorace cruciato, antennis corpore longioribus. *Mus. Lesk. p. 49. n. 56.*  
*Habitat in Europa.*

venosus. 235. Gr. thorace cruciato rufo, elytris hyalinis rufo venosis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 58.*

β) Gr. elytrorum maculis sex fuscis seriatis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 59.*  
*Habitat in Europa.*

bicolor. 236. Gr. griseus apterus, femoribus posterioribus subtus rufis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 60. b.*  
*Habitat in Europa,*

distinctus. 237. Gr. apterus viridis, femina dorso, mare femoribus posterioribus viridescente. *Mus. Lesk. p. 49. n. 61. c.*  
*Habitat in Europa.*

222. **FULGORA.** *Caput fronte producta, inani.*  
*Antennæ breves infra oculos :*  
*articulis duobus ; exteriore*  
*globoso majore.*  
*Rostrum inflexum, elongatum :*  
*vagina quinquearticulata.*  
*Pedes gressorii.*

- Laternaria.* 1. F. fronte rostrata recta, alis lividis: posterioribus ocellatis.  
*Mus. Lud. Ulr. 152.\* Gron. zooph. 668. Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 313. n. 1. mant. inf. 2. p. 260. n. 1.*  
*Grew. mus. 158. t. 13. Cucujus peruvianus.*  
*Merian. surin. t. 49. Laternaria.*  
*Reaumur inf. 5. t. 20. f. 6. 7.*  
*Roesel inf. 2. gryll. t. 28. 29.*  
*Seb. mus. 4. t. 77. f. 3. 4.*  
*Degeer inf. 3. p. 195. n. 1.*  
*Stoll. cicad. t. 1. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali, prominente fronte noctu*  
*lucem vividissimam spargens.*
- Ferrata.* 10. F. fronte rostrata adscendente quadrifariam ferrata. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 313. n. 2. mant. inf. 2. p. 260. n. 2.*  
*Sch. mus. 4. t. 77. f. 5. 6.*  
*Lindenb. Naturf. 13. p. 19. t. 3. f. 1. 2.*  
*Habitat in Surinamo.*
- Diadema.* 2. F. fronte rostrata muricata: apice trifido, alis nigris rubro  
 maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 3. mant. inf. 2.*  
*p. 260. n. 3.*  
*Drury inf. 3. t. 50. f. 4. Fulgora armata.*  
*Seb. mus. 4. t. 77. f. 7. 8.*  
*Lindenb. Naturf. 13. p. 20. t. 3. f. 3.*  
*Stoll. cicad. 1. t. 5. f. 22.*  
*Habitat in India, candelaria major.*
- Candelaria.* 3. F. fronte rostrata adscendente, elytris viridibus luteo  
 maculatis, alis flavis apice nigris. *Mus. Lud. Ulr. 153.\**  
*Aff. Stockh. 1746. p. 63. t. 1. f. 5. 6. Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 313. n. 4. mant. inf. 2. p. 260. n. 4.*  
*Degeer inf. 3. p. 197. n. 2.*

*Roef. inf. 2. gryll. p. 189. t. 30.*

*Edw. av. t. 120.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 62.*

*Habitat in Sina.*

phospho- 4. *F. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo*  
rea. *glauc. Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 5. mant. inf. 2. p.*  
*313. n. 5.*  
*Degeer inf. 3. p. 201. n. 4. t. 32. f. 6. Cicada filirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*

noctivida. 5. *F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore viridi,*  
*alis hyalinis. Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 6. mant. inf.*  
*2. p. 313. n. 6.*  
*Degeer inf. 3. p. 202. n. 5. t. 32. f. 4. Cicada conirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*

lucerna- 6. *F. fronte rostrata prominente, corpore supra viridescente,*  
ria. *subtus flavo. Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 7. mant. inf. 2.*  
*p. 313. n. 7.*  
*Degeer inf. 3. p. 202. n. 6. t. 32. f. 6. Cicada brevirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*

flammea. 7. *F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. Aman. ac.*  
*6. p. 399. n. 39. Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 8. mant.*  
*inf. 2. p. 260. n. 8.*  
*Stoll. cicad. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in America meridionali.*

tenebrosa. 11. *F. fronte rostrata recta truncata, elytris griseis scabris.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 9. mant. inf. 2. p. 260. n. 9.*  
*Degeer inf. 3. p. 200. n. 3. t. 32. f. 1. Cicada laternaria*  
*fulca.*  
*Habitat in Guinea.*

obscurata. 12. *F. fronte rostrata recta truncata, elytris cinereis nigro*  
*maculatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 10. mant. inf. 2.*  
*p. 260. n. 10.*  
*Stoll. cicad. 1. t. 6. f. 28.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

adscendens. 13. *F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris fer-*  
*rugineo-fuscis albo punctatis. Fabr. mant. inf. 2. p.*  
*260. n. 11.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*

- fasciata. 14. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo-fuscis: fasciis duabus punctoque posteriore viridibus. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 12.*  
*Habitat in Cayenna, adscendentis statura, an varietas?*
- truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 11. mant. inf. 2. p. 261. n. 13.*  
*Amæn. acad. 6. p. 399. n. 40. Cicada viridi-albicans, alis deflexis compressis postice truncatis.*  
*Habitat in India.*
- plana. 15. F. flavesceus, fronte porrecta plana, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 14.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- pallipes. 16. F. fronte porrecta plana, elytris viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, statura planæ.*
- hyalina. 17. F. fronte conica inæquali, elytris hyalinis: striga atra. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 12. mant. inf. 2. p. 261. n. 16.*  
*Habitat in Bengala, obscurata major.*
- festiva. 18. F. fronte conica, elytris fuscis: margine exteriori virecente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 13. mant. inf. 2. p. 261. n. 17.*  
*Habitat in Coromandel.*
- fenestrata. 19. F. fronte conica bifurcata, elytris hyalinis: macula marginali fusca. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 14. mant. inf. 2. p. 261. n. 18.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, europæa minor.*
- europæa. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 15. mant. inf. 2. p. 261. n. 19.*  
*Sulz. hist. inf. 1. 9. f. 5.*  
*Schulz. Naturf. 9. 1. 2.*  
*Stoll cicad. 1. t. 11. f. 51.*  
*Habitat in Europa australi, cicadæ spumantis magnitudine.*
- minuta. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescentibus: linea dorsali, elytris albidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 262. n. 20.*  
*Habitat Halæ Saxonum, parva cicadæ statura.*

2092 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. *Membracis*. ( *Foliacea*.)

Folium. 21. F. flavo-viridis, fronte rostrata brevi recta, alis amplissimis verticalibus compressis. *Degeer inf.* 3. p. 204. n. 7.  
*Habitat in America.*

223. CICADA. Rostrum inflexum.

*Antennæ setaceæ.*

*Alæ quatuor membranaceæ  
deflexæ.*

*Pedes (plerisque) saltatorii.*

\* *antennis subulatis fronti insertis, Membracides Fabricii.*

† *thorace compresso-membranaceo, corpore majore, Foliaceæ.*

inflata. 52. C. thoracis folio inflato testaceo reticulato. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 1.

*Habitat in Cayenna, magnitudine & statura foliatæ.*

rhombea. 1. C. folio thoracis rhombeo posteriori latiore. *Backer Aâ. angl.* 1765. p. 55. t. 6. *Fabr. Sp. inf.* 2. p. 316. n. 1.  
*mant. inf.* 2. p. 262. n. 2.

*Habitat in America.*

foliata. 2. C. thorace rotundato atro: arcibus albis. *Gron. zooph.* 677.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 316. n. 3.

*Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 5. *Membracis (lunata) thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.*  
*Degeer inf.* 3. p. 205. n. 8. t. 32. f. 9. 10. *Cicada foliata fasciata.*

*Merian. surin. t. 5. f. ult.*

*Habitat in America meridionali.*

laveola. 53. C. thorace rotundato flavo: fascia maculaque atris.  
*Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 4. *Membracis foliacea.*

*Stoll cicad. t. 1. f. 2.*

*Habitat in America meridionali, statura foliatæ, at paulo major.*

---

*Cicadæ succis plantarum vivunt; larva aptera, puppa solis alarum rudimentis instructa, ceterum utraque hexapus, currens imagine simillima, cercopidum æquilima; imago gryllorum instar stidula; manniatarum, veterum Testigometrarum per annum fodiunt, & sub terra latent, declarata mascula lamellis duabus abdominis subtrus obtinentibus senex in arboribus strident murtasque in venerem squinas proferant,*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. *Membracis*. (*Foliacea*.) 2093

- fasciata. 54. C. thorace rotundato atro : fasciis duabus ; anteriore fulva , posteriore alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 262. n. 6.*  
*Habitat in Cayenna , statura foliatæ.*
- bracteata. 55. C. thorace viridi immaculato. *Fabr. mant. inf. 2. p. 263. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna , parva.*
- tronditia. 3. C. thoracis dorso repando sinuato : apice porrecto obtusissimo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 316. n. 2. mant. inf. 2. p. 262. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 705. n. 3. Gronov. zooph. 676.\* Cicada foliacea , dorso repando , rostro obtusissimo.*  
*Degeer inf. 3. p. 208. n. 11. t. 32. f. 15. 16. Cicada foliata sinuata.*  
*Stoll cicad. 1. t. 6. f. 3. A. B. C.*  
*Habitat in Surinamo.*
- inquamigera. 4. C. antcrius posteriusque rostrata acuta.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 316. n. 4. mant. inf. 2. p. 263. n. 8. Membracis thorace foliaceo antice polliceque acuto griseo.*  
*Degeer inf. 3. p. 209. n. 12. t. 32. f. 17. 18. Cicada hastata.*  
*Habitat in America meridionali.*
- genistæ. 56. C. thorace fusco posterius producto , abdomine dimidio breviorc. *Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 17. mant. inf. 2. p. 265. n. 27.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 424. n. 19. Cicada thorace inermi pone producto.*  
*Habitat in Angliæ genistæ tinctoria.*
- inermis. 57. C. thorace virescente posterius subulato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 16. mant. inf. 2. p. 265. n. 26.*  
*Habitat in Americæ plantis.*
- mutica. 58. C. thorace ferrugineo posterius producto carinato longitudine abdomini. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 15. mant. inf. 2. p. 265. n. 25.*  
*Habitat in America boreali.*
- convoluta. 59. C. thorace lævi virescente : margine flavo posterius producto abdomine longiore. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 14. mant. inf. 2. p. 265. n. 24.*  
*Habitat in Brasilia , mediæ magnitudinis , flavo capite , thorace flavescente , apice atro.*



2094 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. *Membracis*. (*Cruciata*.)

arcuata. 60. *C. nigro-fusca*, thorace compresso verticali: arcu flavescente. *Degeer inf.* 3. p. 206. n. 9. t. 32. f. 10.  
*Habitat in Surinamo.*

fusca. 61. *C. tota fusca*, thorace compresso verticali. *Degeer inf.* 3. p. 208. n. 10. t. 32. f. 14.  
*Habitat in Surinamo.*

gibbosa. 62. *C. nigra*, thorace carinato gibbo, antèrius obtuso, posterius acuto, elytris flavo-lividis, pedibus fulvis.  
*Degeer inf.* 3. p. 311. n. 13. t. 32. f. 20. 21.  
*Forst. nov. inf. spec.* 1. p. 67. n. 67. *Cicada carinata*.  
*Habitat in America.*

binotata. 63. *C. thorace subinermi posterius producto*, abdomine breviorè testaceo, elytris macula basèos nigra. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 318. n. 12. *mant. inf.* 2. p. 265. n. 22.  
*Habitat in nova Hollandia.*

† † thorace utrinque cornuto : *Cruciatae*.

Crux. 5. *C. thorace cruciformi corpus totum tegente*. *Mus. Lud. Ulr.* 154.\*  
*Habitat in America australi & India.*

hastata. 64. *C. thoracis cornu supra caput porrecto compresso carinato*, corpore griseo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 263. n. 9.  
*Habitat in America meridionali, parva.*

lanceolata. 65. *C. thoracis cornu supra caput porrecto incurvo*, corpore auro: maculis duabus dorsalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 263. n. 10.  
*Habitat in Cayenna, parva.*

spinosa. 66. *C. thorace tricorni posterius producto longitudine alarum*.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 316. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 263. n. 11.  
*Sulz. hist. inf.* t. 9. f. 6.  
*Habitat in America australi & India.*

acuminata. 67. *C. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compresso*.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 317. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 263. n. 12.  
*Habitat in Pennsylvania.*

cornuta. 68. *C. thorace bicorni nigro posterius subulato longitudine abdominis*, alis fuscis. *Fn. succ.* 879.\* *Scop. ent. carn.* 435.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 317. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 264. n. 19.

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. *Membracis*. (*Cruciata*.) 2095

*Geoffr. inf. par. 2. p. 423. n. 18.* Cicada thorace acute bicorni, pone producto.

*Schreb. inf. 7. f. 3. 4.* Cicada cornuta.

*Degeer inf. 3. p. 181. n. 3. t. 11. f. 22.* Cicada fusca.

*Petiv. gazoph. t. 47. f. 2. 3.* Ranatra cornuta.

*Sulz. inf. t. 10. f. 63.*

*Schaeff. ic. t. 96. f. 2.*

*Habitat in carduis, falicibus.*

Taurus. 68. C. thorace bicorni fusco posterius producto filiformi longitudine abdominis: cornubus arcuatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 10. mant. inf. 2. p. 264. n. 20.*  
*Habitat in Coromandel.*

Vitulus. 69. C. thorace bicorni viridi posterius subulato longitudine abdominis, alis albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 11. mant. inf. 2. p. 265. n. 21.*  
*Habitat in America.*

Bonasia. 70. C. thorace bicorni posterius producto: margine albo, alis puncto baseos albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 13. mant. inf. 2. p. 265. n. 23.*  
*Habitat in America.*

aurita. 7. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 7. mant. inf. 2. p. 263. n. 13.*

*Geoffr. inf. par. 2. p. 422. n. 17.* Cicada thorace obtuse bicorni.

*Schreb. inf. 8. f. 1. 2.* Cicada cristata, thorace bicorni, corniculis subrotundis.

*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 7.*

*Schaeff. icon. t. 96. f. 3.*

*Habitat in quercu, corylo, tabani magnitudine, tota cinerea.*

finensis. 71. C. thorace bicorni posterius producto abdomine longiori atro: margine flavescente. *Fabr. mant. inf. 2. p. 263. n. 14.*

*Stoll cicad. 1. t. 11. f. 53. B.*

*Habitat in Sina, magna.*

horrida. 72. C. thorace bicorni posterius producto biclavato apice trispinoso. *Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*

trifida. 73. *C. pilosa*, thorace quadricorni posterius producto trifido : laciniis subulatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 16.*  
*Habitat in Cayenna, magnitudine c. tauri.*

clavata. 74. *C. thorace quadricorni posterius producto trifido : laciniis lateralibus ante apicem clavatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 17.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*

brasiliensis. 75. *C. thorace bicorni albo punctato posterius producto abdomine longiori. Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 8.*  
*mant. inf. 2. p. 264. n. 18.*  
*Habitat in Brasilia.*

\* \* non saltantes, *Mannifera*, *Tettigonia* Fabricii.

ciliaris. 8. *C. alis posterioribus ferrugineo-fuscis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis segmentis ciliatis. Mus. Lud. Ulr. 155.\**  
*Rumpf amb. 3. p. 210. t. 135? Folium ambulans. †*  
*Habitat in America australi & India.*

fornicata. 11. *C. thorace virescente, abdomine fornicato. Mus. Lud. Ulr. 156.\**  
*Habitat in America australi & India.*

tridula. 12. *C. elytris margine dilatato : punctis septem albis, Mus. Lud. Ulr. 157.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 9. mant. inf. 2. p. 266. n. 13.*  
*Cicada villosa, elytris griseis, alis flavis : omnibus margine hyalino.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 2. Cicada catenata.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*

cingulata. 76. *C. thorace maculato, elytris hyalinis : costa maculaque fuscis, abdomine atro : fasciis flavis. Fabr. sp. inf. 2. p. 310. n. 10. mant. inf. 2. p. 266. n. 14.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

villosa. 77. *C. thorace fusco viridique variegato, pectore albo villoso. Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 11. mant. inf. 2. p. 267. n. 15.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, minor, fronte viridi, utrinque atro striata.*

conventata. 78. *C. thorace variegato, elytris hyalinis : costa flavescente, abdomine atro : fasciis sanguineis. Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 12. mant. inf. 2. p. 267. n. 16.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Mannifera*.) *Tettigonia*. 2097

- conspur- 79. *C. atra*, elytris basi flavo maculatis, ano flavo. *Fabr.*  
cata. *sp. inf.* 2. p. 320. n. 13. *mant. inf.* 2. p. 267. n. 17.  
*Habitat in India.*
- capensis. 13. *C. alis inferioribus limbo posteriore fuscescente palmato-*  
*picto. Mus. Lud. Ulr.* 158.  
*Petiv. gaz.* 7. t. 4. f. 1. *Cicada capensis variegata*, margi-  
nibus transparentibus.  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- hæmato- 14. *C. nigra immaculata*, abdominis incisuris sanguineis.  
des. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 320. n. 14. *mant. inf.* 2. p. 267. n.  
18. *Scop. ent. carn.* 347.  
*Petiv. gazoph.* t. 15. f. 7.  
*Gron. zooph.* 675.  
*Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 452.  
*Stoll cicad.* t. 2. f. 11.  
*Habitat in Europa magis australi, mediæ magnitudinis,*  
*gibbosa.*
- plebeia. 15. *C. scutelli apice bidentato*, elytris anastomosibus quatuor  
lineisque tex ferrugineis. *Scop. entom. carn.* 345.  
*Mouff. inf.* 127.  
*Aldrov. inf.* 307.  
*Matthiol. Diosc.* 264.  
*Habitat in Italia, Africa, maxima.*  
*Et cantu querulæ rumpent arbusa cicadæ. Virgil.*
- œni. 16. *C. elytris intra marginem tenuiorem punctis sex concate-*  
natis anastomosibusque interioribus fuscis. *Scop ent.*  
*carn.* 346. \*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 320. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 267. n. 19.  
*Cicada nigra flavo maculata*, alis albis basi flavis: macu-  
lis duabus nigris.  
*Reaum. inf.* 5. t. 5. f. 16-19.  
*Seb. mus.* 4. t. 85. f. 4. 5.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 25.  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 65.  
*Schaeff. icon.* t. 4. f. 14.  
*Habitat in Europa australi; larva eduli.*  
*Sole sub ardenti resonant arbusa cicadis. Virgil.*
- repanda. 17. *C. elytris linea flexuosa*, alis margine hyalino. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 159. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 321. n. 16. *mant.*  
*inf.* 2. p. 267. n. 20.

2098 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Mannifera*.) *Tettigonia*.

*Degeer inf. 3. p. 219. n. 15. t. 33. f. 1. Cicada nigra.*  
*Habitat in India.*

reticulata. 18. *C. grisea*, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 17. mant. inf. 2. p. 267. n. 21.*  
*Degeer inf. 3. p. 227. n. 24. t. 23. f. 15. 16. Cicada*  
*fulco-testacea.*  
*Habitat in America meridionali.*

atrata. 80. *C. atra* alis basi nigris: venis testaceis. *Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 321. n. 18. mant. inf. 2. p. 267. n. 22.*  
*Habitat in Sina.*

sanguinea. 81. *C. nigra*, ore, thoracis maculis duabus abdomineque  
 sanguineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 19. mant. inf.*  
*2. p. 267. n. 24.*  
*Degeer inf. 3. p. 221. n. 18. t. 33. f. 17. Cicada sanguinea.*  
*Habitat in Sina.*

testacea. 82. *C. nigra*, abdomine sanguineo, elytris alisque testaceis:  
 venis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 267. n. 23.*  
*Stoll cicad. 1. t. 8. f. 41. C.*  
*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis.*

splendi- 83. *C. elytris fusco-aureis*, tibiis anterioribus incrassato-den-  
 dula. tatis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 20. mant. inf.*  
*2. p. 267. n. 25.*  
*Habitat in Sina.*

muta. 84. *C. elytris hyalinis*: costa sanguinea, abdomine linea  
 dorsali sanguinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 21.*  
*mant. inf. 2. p. 267. n. 26.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

grossa. 85. *C. thorace viridi nigro sublineato*, alis albis posterioribus  
 macula baseos flava. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 1.*  
*mant. inf. 2. p. 265. n. 1.*  
*Habitat in Brasilia.*

javana. 86. *C. capite thoraceque nigris rufo maculatis*, elytris nigris:  
 fascia abbreviata alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 265. n. 2.*  
*Stoll cicad. 1. t. 4. f. 17.*  
*Habitat in Java, magna.*

grisea. 87. *C. grisea*, elytris aqueis: margine posteriori nigro punc-  
 rato, costa anterieus alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 2.*  
*mant. inf. 2. p. 265. n. 3.*  
*Habitat in insulis Americæ oppositis.*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Mannifera*.) *Tettigonia*. 2099

limbata. 88. *C. thoracis* margine dilatato acuto, alis atris : margine albo.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 3. mant. inf. 2. p. 265. n. 4.*  
*Stoll cicad. 1. t. 12. f. 57.*  
*Habitat in America.*

dilatata. 89. *C. atra*, thoracis margine dilatato, alis albidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 4. mant. inf. 2. p. 266. n. 5.*  
*Habitat in Jamaica.*

bispinosa. 90. *C. fusca*, thorace utrinque unispinosa, elytris obscuris striga maculari nigra. *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 6.*  
*Habitat in Sumatra, magna.*

vaginata. 91. *C. testacea*, elytris albidis : costa nigra. *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 7.*  
*Habitat in Sumatra, magna.*

Tibicen. 19. *C. elytris anastomosibus ferrugineis*, scutelli apice emarginato. *Mus. Lud. Ulr. 160.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 5. mant. inf. 2. p. 266. n. 8.*  
*Tettigonia scutello emarginato, alarum costa virescente.*  
*Degeer inf. 3. p. 212. n. 14. t. 22. f. 23. Cicada Lyricea.*  
*Brown jam. 436. t. 43. f. 15. Panorpa.*  
*Marcgr. brasil. 256. Guercua Eremenbi.*  
*Merian. inf. surin. t. 49. Tibicen.*  
*Seb. mus. 4. t. 85. f. 9. 10.*  
*Habitat in America, thorace nunc nigro, nunc nigro brunneoque vario.*

septemdecim. 20. *C. nigro-virescens*, elytris margine flavescente, capite utrinque octostriato.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 6. mant. inf. 2. p. 266. n. 9.*  
*Tettigonia nigra, elytris albis, costa flava.*  
*Kalm ad. Stockh. 1756. p. 101. Cicada maxilla utraque lineis octo transversis concavis, alarum margine inferiore lutescente.*  
*Collins. ad. angl. 1765. p. 65. t. 8.*  
*Habitat in America.*

catena. 92. *C. thorace variegato*, elytris hyalinis antè nervis punctatis, postè strigibus duobus undatis fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 7. mant. inf. 2. p. 266. n. 10.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*



- 2100 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Mannifera*.) *Tettigonia*
- pustulata. 93. *C. atra*, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 11.*  
*Habitat in America meridionali, magna.*
- maculata. 94. *C. atra*, thorace elytris alisque flavo maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 8. mant. inf. 2. p. 266. n. 12.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in Syria.*
- violacea. 21. *C. violacea*, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Utr. 162.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 22. mant. inf. 2. p. 267. n. 27.*  
*Fuessli inf. helv. p. 24. n. 455.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- querula. 95. *C. capite thoraceque griseis: characteribus maculisque nigris. Pallas it. 2. app. n. 83.*  
*Habitat in australibus circa fluvium Ural, hæmatodi affinis.*
- prafina. 96. *C. dilute viridis, thoracis maculis fuscis inauratis. Pallas it. 2. app. n. 84.*  
*Habitat in desertis magis australibus circa fluvios Ural & Irty, Junio frequens, querula minor.*
- marginella. 97. *C. pallida*, thoracem inter & alas nigra: macula alba acuminata, thorace marginato. *Scop. entom. carn. p. 116. n. 342.*  
*Habitat in Carniolæ salicetis.*
- graminis. 98. *C. elytris albidis: lineis tribus ocellisque duodecim. Scop. ent. carn. p. 116. n. 343.*  
*Habitat in Carniolæ gramine.*
- notata. 99. *C. pallide flavicans, elytris albidis nigro punctatis. Scop. ent. carn. p. 117. n. 344.*  
*Habitat in Carniolæ plantis variis.*
- montana. 100. *C. abdominis segmentis margine rubellis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 109. n. 108.*  
*Habitat in Carniolæ montanis circa Idriam, c. orni duplo minor.*
- Schaefferi. 101. *C. ex fusco lutea, elytris alisque flavo fenestratis. Schaeff. icon. 2. t. 121. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*

\*\*\* *antennis filiformibus, sub oculis insertis.*

† *rostri vagina porrecta, obtusa, superne canaliculata.*  
Cercopides Fabricii.

atra. 102. C. elytris fusco-griseis: macula marginali fulva cinereaque.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 1. mant. inf. 2. p. 273. n. 1.*  
Cercopis grossa.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, in hac tribu magna.*

atra. 103. C. atra, elytris utrinque vitta marginali sanguinea. *Fabr.*  
*mant. inf. 2. p. 273. n. 2.*  
*Habitat in America meridionali, magna.*

maculosa. 104. C. thorace atro: fascia fulva, elytris fulvis: maculis apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 2. mant. inf. 2. p. 273. n. 3.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, statura afræ.*

quadrisfasciata. 10. C. flava: fasciis quatuor fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 6. mant. inf. 2. p. 274. n. 9.*  
*Degeer inf. 3. p. 225. n. 21. t. 33. f. 11. Cicada flava, fasciis quatuor transversis nigris.*  
*Habitat in America meridionali.*

fasciata. 11. C. flavescens elytris fuscis: fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 13. mant. inf. 2. p. 275. n. 20.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 706. n. 11. Fn. suec. 898.\* Fn. suec. 1. n. 633. Cicada fusca, fasciis alarum binis albis.*  
*Degeer inf. 3. p. 186. n. 6. t. 11. f. 25. Cicada trifasciata.*  
*Habitat in Europæ borealis plantis.*

sanguinolenta. 22. C. atra, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 3. mant. inf. 2. p. 274. n. 4. Scop. ent. carn. 330.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 418. t. 8. f. 5. Cicada nigra, elytris maculis sex rubris.*  
*Goeze Naturf. 6. t. 2.*

chach. *Fuessli inf. Helv. p. 24. n. 456.*  
*Habitat in Europæ salicibus et gramine.*  
105. C. nigra, elytris fuscis: fascia interrupta sanguinea.  
*Fabr. mant. inf. 2. p. 274. n. 5.*  
*Habitat in America septentrionali, statura sanguinolentæ.*

An huic etiam inferendæ tanquam propriæ species cicadæ a Seba musæi vol. 4. delinæ, fusca t. 85. f. 1. 2. albo guttata t. 85. f. 3. 4. scutata t. 85. f. 7. 8. & fusco maculata t. 85. f. 11. 12 ?

coleoptra- 23. *C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griseis fusco*  
 ta. *irroratis. Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 9. mant. inf. 2. p.*

274. n. 14.

*Habitat in Germaniæ plantis, mediæ magnitudinis, capite*  
*thoraceque flavescens, abdomine fusco.*

rustica. 106. *C. grisea immaculata, alis albis. Fabr. sp. inf. 2. p. 330.*  
*n. 10. mant. inf. 2. p. 275. n. 15.*

*Habitat in Europæ plantis.*

gibba. 107. *C. nigra, elytris albo maculatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 334.*  
*n. 11. mant. inf. 2. p. 275. n. 16.*

*Habitat in Daniæ nemoribus.*

biguttata. 108. *C. nigra flavo maculata, elytris fuscis: puncto margi-*  
*nali albo. Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 22. mant. inf. 2.*  
*p. 275. n. 17.*

*Habitat in Germania, statura leucophthalmæ.*

kilonien- 109. *C. flavescens, elytris obscuris: fascia maculisque duabus*  
 fis. *oppositis albidis. Fabr. mant. inf. 2. p. 275. n. 18.*

*Habitat Kilonii, statura & magnitudine biguttatæ.*

unifascia- 110. *C. cinerea, elytris fascia obliqua fusca. Fabr. sp. inf. 2.*  
 ta. *p. 330. n. 12. mant. inf. 2. p. 275. n. 19.*

*Habitat in agro Pedemontano, gibba major.*

spumaria. 24. *C. fusca, elytris maculis binis albis lateralibus: fascia*  
*duplici interrupta albida. Fn. suec. 881. \* Scop. ent. carn.*  
*331. Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 7. mant. inf. 2. p. 274.*  
*n. 10. Fuesli inf. helv. n. 450.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 415. n. 2. Cicada fascia duplici*  
*albida interrupta transversa.*

*Degeer inf. 3. p. 163. n. 1. t. 11. f. 1-21. Cicada spumaria*  
*graminis.*

*Degeer act. Stockh. 1741. p. 221. t. 7.*

*Reaumur act. paris. 1705. p. 162.*

*Raj. inf. 67.*

*Swammerd. quart. p. 83.*

*bibl. 1. p. 215.*

*Merian. inf. 77. t. 51.*

*Petiv. gazoph. t. 61. f. 9.*

*Blanck. inf. 97. t. 11. f. N. O. P.*

*Frisch inf. 8. p. 26. t. 12.*

*Roef. inf. 2. gryll p. 139. t. 23.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 64.*

*Schaeff. elem. t. 42.*

*Habitat in Europæ plantis variis, frequens in rosis, graminibus, salice viminali, more plurimum hujus & sequentis tribus ramis insidendo ano evacuans numerosas vesiculas, quasi spumam, intra quam latitat.*

aurea. III. *C. cinereo-aurea nitida immaculata. Fabr. mant. inf. 2. p. 274. n. 11.*

*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*

hafniensis. III2. *C. nigra, capite, thorace elytrorumque margine albis. Fabr. mant. inf. 2. p. 274. n. 12.*

*Habitat Hafniæ, statura spumariæ.*

albifrons. 27. *C. nigra, fronte alba. Fn. suec. 884.\**

*Habitat in Europa, an hujus tribus?*

striata. 30. *C. elytris albedo nigroque ad angulum acutum futuræ dorsalis striatis. Fn. suec. 887.\**

*Raj. inf. 68. n. 1.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 424. n. 20.*

*Habitat in Europa, an ex hac tribu?*

lineata. 31. *C. flavescens, coleoptris striis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 8. mant. inf. 2. p. 274. n. 13.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 709. n. 31? Fn. suec. 888? Cicada exalbida; linea utrinque longitudinali nigra.*

*Habitat in Europa, mediæ magnitudinis.*

populi. 32. *C. subtus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. Fn. suec. 890.\**

*Fabr. sp. inf. 2. p. 331. n. 14. mant. inf. 2. p. 275. n. 21.*

*Cercopis nebulosa, vertice punctis duobus, abdomineque basi atris.*

*Habitat in Europæ borealis plantis.*

rubra. 45. *C. alis deflexis fuscis: fasciis duabus flavis.*

*Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 4. mant. inf. 2. p. 274. n. 6. Cercopis (cruentata) rufa, elytris nigris: fasciis duabus flavis.*

*Degeer inf. 3. p. 224. n. 20. t. 33. f. 8.*

*Stoll cicad. t. 2. f. 10. C.*

*Habitat in America meridionali, alis inferioribus hyalinis immaculatis.*

Carnifex. 113. *C. sanguinea*, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 5. mant. inf. 2. p. 274. n. 7.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

varia. 114. *C. capite thoraceque virescentibus*, elytris fuscis : maculis duabus baseos strigaeque posteriore flavis. *Fabr. mant. 2. p. 274. n. 8.*  
*Habitat in Cayenna, atra, abdomine rufo.*

lineolata. 208. *C. elytris griseis fusco lineolatis : discilitura transversa*.  
*Mus. Lesk. p. 117. n. 46.*  
*Habitat in Europa.*

guttata. 209. *C. fusca*, elytris maculis lacteis. *Mus. Lesk. p. 117. n. 47.*  
*Habitat in Europa.*

unicolor. 210. *C. pallida immaculata.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 48.*  
*Habitat in Europa.*

bicolor. 211. *C. grisea*, thorace supra sanguineo. *Mus. Lesk. p. 117. n. 49.*  
*Habitat in Europa.*

punctulata. 212. *C. fusca*, thorace anterieus punctis impressis, elytrismaculis duabus albis lateralibus. *Mus. Lesk. p. 117. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*

leucoptera. 213. *C. elytris albis : striis fuscis interruptis.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 51.*  
*Habitat in Europa.*

venosa. 214. *C. alis hyalinis albo venosis : posterius fasciis duabus fuscis irregularibus.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 52.*  
*Habitat in Europa.*

nebulosa. 215. *C. alis albis luteo-nebulosis.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*

†† *rostri vagina brevissima, membranacea, cylindrica obtusa*, Cicadae Fabricii.  
 † *salinatoria*, Ranatrae.

perspicillata. 115. *C. atra*, alis macula ocellari albo-hyalina, abdomine apice flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 1. mant. inf. 2. p. 268. n. 1.*  
*Stoll cicad. 1. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in India, in hac tribu magna.*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Ranatra*.) 2103

- elongata*. 116. *C. thorace rubro flavo lineato, elytris longissimis nigro punctatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 324. n. 16. mant. inf. 2. p. 270. n. 22.*  
*Habitat in nova Hollandia, parva, gibba.*
- cayen-  
nensis*. 117. *C. capite thoraceque fusco-aureis nigro variis, elytris hyalinis apice obscurioribus: macula aurea. Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 20.*  
*Habitat in Cayenna, fusca, femoribus posterioribus flavis, statura ferrugineæ.*
- aurulenta*. 118. *C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice cinereis. Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 19.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine obtusæ.*
- obtusæ*. 119. *C. nigra, elytris apice cinereo-hyalinis. Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 18.*  
*Habitat in Cayenna, statura ferrugineæ.*
- ferrugi-  
nea*. 120. *C. capite, thorace scutelloque nigro punctatis, elytris rufis, alis atris. Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 17.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*
- nervosa*. 25. *C. fusca, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis. Fn. succ. 882.\* Scop. ent. carn. 341. Fuesli inf. Helv. p. 24. n. 459.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 35. mant. inf. 2. p. 272. n. 48.*  
*Cicada alis fuscis, nervis albo nigroque punctatis.*  
*Degeer inf. 3. p. 182. n. 4. t. 12. I. 2. Cicada nervoso-punctata.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 415. n. 1.*  
*Habitat in Europæ plantis.*
- variegata*. 121. *C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus costalibus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 36. mant. inf. 2. p. 272. n. 49.*  
*Habitat in Germania.*
- lycea*. 122. *C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente. Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 37. mant. inf. 2. p. 272. n. 37. n. 50.*  
*Habitat in India.*
- calgida*. 123. *C. flava, elytris fusco-auratis. Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 38. mant. inf. 2. p. 272. n. 51.*  
*Habitat in Angliæ plantis.*



2106 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Ranatra*.)

- punctata. 124. *C. elytris flavescens fusco punctatis*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 327. n. 39. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 52.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 417. n. 4. *Cicada fusco-pallida*, &c.  
*Habitat in Europæ nemoribus.*
- leucophthalma. 26. *C. nigra, oculis albis*. *Fn. suec.* 883\*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 21. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 28.  
*Habitat in Europæ borealis plantis.*
- leucocephala. 28. *C. nigra, capite albo*. *Fn. suec.* 885.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 23. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 29.  
*Geoff. inf. par.* 1. p. 421. n. 13.  
 β) *Schaeff. ic. t.* 237. f. 6.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- lateralis. 29. *C. nigra, elytris latere albis*. *Fn. suec.* 886.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 324. n. 18. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 24. *Fuesli inf. helv.* p. 24. n. 460.  
*Raj. inf.* 68. 2. *Locusta pulex fusca*, utrinque in lateribus alarum arcu albicante.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 416. n. 3.  
*Habitat in Europæ pratis.*
- bimaculata. 125. *C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsibus margineque exteriori flavescens*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 19. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 25.  
*Habitat in Brasilia.*
- fenestrata. 126. *C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 20. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 26.  
*Habitat in insula Tahiti oceani australis.*
- flavipes. 127. *C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro striatis*. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 270. n. 27.  
*Habitat in insula Rotterdam oceani australis, fenestrata proxime affinis.*
- flavicollis. 33. *C. fusca, capite thoraceque flavis*. *Fn. suec.* 891.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 25. *mant. inf.* 2. p. 271. n. 33.  
*Cicada nigra, capitis margine posteriori thoraceque flavis*  
*Habitat in Europæ graminibus.*
- flava. 34. *C. flava unicolor*. *Gron. zooph.* 681.  
*Habitat in Europa.*

- interrupta. 35. *C. elytris flavis* : linea nigra duplici interrupta longitudinali. *Fn. suec.* 889. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 24. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 30.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 419. n. 9.  
*Petiv. gazoph.* t. 61. f. 10.  
*Degeer inf.* 3. p. 186. n. 7. t. 12. f. 6.  
*Fuefsli inf. helv.* p. 24. n. 462.  
*Habitat frequens in Europæ plantis.*
- Hybneri. 128. *C. pallida*, capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 270. n. 31.  
*Habitat Halæ Saxonum, statura interruptæ.*
- abbreviata. 129. *C. flavescens*, elytris cinereis : vitta abbreviata atra. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 271. n. 23.  
*Habitat Hafniæ, statura interruptæ.*
- vittata. 36. *C. flava* : vitta ferruginea longitudinali duplici repandodentata. *Fn. suec.* 889. \* *Fuefsli inf. helv.* p. 24. n. 463.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 324. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 23.  
*Habitat in Europæ hortis.*
- Lanio. 36. *C. viridis*, capite thoraceque carneis. *Fuefsli inf. helv.* p. 24. n. 464. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 27. *mant. inf.* 2. p. 271. n. 38.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- ochromelas. 130. *C. nigra*, capite fasciis duabus flavis, elytris albo striatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 271. n. 39.  
*Habitat in Kilonii plantis, statura viridis.*
- ignita. 131. *C. virescenti-nitidula*, capite scutello abdomineque fulvis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 272. n. 40.  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- turca. 132. *C. atra*, abdomine flavo, alis apice fuscis : lunula hyalina. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 28. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 41.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- maura. 133. *C. nigra*, pectore abdomineque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 29. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 42.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nebulosa. 134. *C. nigra*, elytris hyalinis basi fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 30. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 43.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

2108 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Ranatra*.)

- hyalina. 135. *C. fusca*, elytris fascia abbreviata margineque posteriori hyalinis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 326. n. 31. mant inf. 2. p. 272. n. 44.*  
*Fabr. syst. entom. p. 688. n. 1. Cercopis fenestrata.*  
*Habitat in India.*
- pellucida. 136. *C. grisea*, elytris fascia media hyalina. *Fabr. sp. inf. 2. p. 326. n. 32. mant. inf. 2. p. 272. n. 45.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- cynosba- 137. *C. fusca*, alis albo-hyalinis : margine fusco punctato-  
 tos. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 33. mant. inf. 2. p. 272. n. 46.*  
*Habitat in Daniæ rosis.*
- ferratulæ. 138. *C. flava*, elytris albis : puncto fasciisque duabus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 34. mant. inf. 2. p. 272. n. 47.*  
*Habitat in Angliæ carduis.*
- aptera. 38. *C. aptera atra*, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis. *Fn. suec. 894. \**  
*Habitat in Sudermania ad Akeroum, pulicis magnitudine.*
- tricolor. 139. *C. elytris lacteis : punctis nigris, capite thoraceque virentibus. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 21. n. 36.*  
*Habitat Upsaliæ frequens & Lutatiis, pediculo vix duplo major.*
- reticulata. 140. *C. elytris hyalinis fusco reticulatis, capite thoraceque albis nigro maculatis. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 21. n. 37.*  
*Habitat Upsaliæ, interrupta paulo major.*
- variabilis. 141. *C. elytris fusco-flavescentibus : margine maculis duabus pallidis, capite thoraceque flavescentibus. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 22. n. 38.*  
*Habitat frequens Upsaliæ, interrupta vix major, elytris nunc flavescentibus, nunc fusco flavoque variis, nunc fuscis.*
- cincta. 142. *C. elytris fuscis : margine maculis duabus albis, capite thoraceque fuscis. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 23. n. 39.*  
*Habitat Upsaliæ, magnitudine nervosæ, variabilis sextuplo major.*
- exclamati- 143. *C. elytris nigris : linea punctoque albis, capite thoraceque nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 24. n. 40.*  
 tionis. *Habitat Upsaliæ, bifasciatæ magnitudine, supra nigra, subtus flavescentis.*

- guttata. 144. *C. fusco varia*, capite thorace elytrisque ferrugineis: punctatis flavis albisque, tergo coccineo. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 68. n. 68.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine spumariae, an ejusdem tribus?*
- crenata. 145. *C. capite thorace alisque subfuscis, abdomine nigro; elytris ruberrimis apice flavis.*  
*Drury inf. 2. p. 73. t. 38. f. 5. 6. Cicada sanguinea.*  
*Habitat in Jamaica.*
- salicina. 146. *C. grisea, pedibus rufo-testaceis.*  
*Degeer inf. 3. p. 180. n. 2. Cicada spumaria salicis.*  
*Habitat in salice, an ad cercopides releganda?*
- muscae- 147. *C. fronte quadrata, thorace brevissimo, scutello albido: fornix. punctis duobus impressis, alis fuscescentibus: basi fascia- que abrupta albis. Schranck inf. austr. p. 253. n. 482.*  
*Habitat in Austria superiori, infra 3 lineas longa.*
- bicincta. 148. *C. pallide fusca, capite thoraceque fascia albida. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 75. §. 26. inf. austr. p. 254. n. 483.*  
*Habitat in Austria superiori, infra 3 lineas longa.*
- decima- 149. *C. pallida, elytris numero 14 nigro notatis. Schranck quarta. Beytr. zur Naturg. p. 76. §. 28. inf. austr. p. 254. n. 485.*  
*Habitat in Austria, infra 3 lineas longa.*
- quadrima- 150. *C. ferruginea, elytris ad marginem exteriorē maculis culata. duabus albis. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 77. §. 30. inf. austr. p. 254. n. 486.*  
*Habitat Sienae austriae, 2½ lineas longa.*
- Schran- 151. *C. fusca subtus flava, alis hyalinis: apice nervis nigris ekil. fenestratis. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 74. §. 24. inf. austr. p. 255. n. 487.*  
*Habitat in Austria, 2½ lineas longa.*
- austriaca. 152. *C. nigra, pedibus pallidis, oculorum basi alba, alis hya- linis: fasciis subtribus nigris. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 73. §. 23. inf. austr. p. 255. n. 488.*  
*Habitat in Austria, 2½ lineas longa.*
- haemor- 153. *C. nigra, thorace maculis duabus sanguineis: Schranck rhousa. inf. austr. p. 256. n. 490.*  
*Habitat in Austriae arbutis, vix ultra 2 lineas longae.*

2110 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Ranatra*.)

- trilineata. 154. *C. ferruginea*, lineis tribus longitudinalibus nigris.  
*Schranck Beytr. zur Naturg. p. 75. §. 27. inf. austr. p. 258. n. 496.*  
*Habitat in Austria superiore.*
- erythrophthalma. 155. *C. flavescens*, oculis rubris, tibiis anterioribus nigro marginatis, alis hyalinis: lineolis obscuriusculis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 77. §. 31. inf. austr. p. 258. n. 498.*  
*Habitat in Austria.*
- melanostricta. 156. *C. sulphurea*, capite punctis duobus, elytris maculis aliquot nigris: apice fusco. *Schranck inf. austr. p. 259. n. 499.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 426.*  
*Habitat in Austria superiore & Gallia, sesquilineam longa.*
- arunci. 157. *C. tota ferruginea*, oculis fuscis. *Scop. ent. carn. p. 113. n. 332.*  
*Habitat in Spiræa Arunco.*
- marginalis. 158. *C. fusca*, elytris margine externo pedibusque flavescen-  
 bus, corpore luteo. *Scop. ent. carn. p. 113. n. 333.*  
*Habitat in Carniola.*
- bicordata. 159. *C. elytris nigris*: latere utroque & linea media, pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p. 114. n. 334.*  
*Habitat in Carniolæ corylo, frontis macula media nigra, cujus apici utrique insidet macula obcordata nigra.*
- œnotherea. 160. *C. flavescens*, oculis nigris, elytris rivulis fuscis. *Scop. ent. carn. p. 114. n. 336.*  
*Habitat in Carniolæ œnothera bienni, spumans, spumaria major, an ex cercopidum tribu?*
- carniolica. 161. *C. nigricans*, elytris margine omni lineolisque tribus longitudinalibus luteis. *Scop. ent. carn. p. 114. n. 337.*  
*Habitat in Carniolæ fruticibus.*
- pallida. 207. *C. pallida*, thorace punctis sex impressis. *Geoffr. inf. par. I. p. 419. n. 8.*  
*Habitat in Gallia & Calabria.*
- biguttata. 216. *C. nigra* thorace utrinque gutta sanguinea. *Mus. Lesk. p. 116. n. 20.*  
*Habitat in Europa.*



- rivulosa. 217. *C. testacea*, elytris ferrugineo variis : rivulis transversis albis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 25.*  
*Habitat in Europa.*
- strigosa. 218. *C. scutello thoraceque transversim strigoso rufescentibus*, elytris fusco, rufo cinereoque variis, ano setoso, pedibus posterioribus longis : tibiis spinis ciliatis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 26.*  
*Habitat in Europa.*
- casta. 219. *C. fusco-pallida immaculata.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 28.*  
*Habitat in Europa.*
- quadris-  
triata. 220. *C. elytris nervosis elevato-punctatis rugosis tiliarumque apice griseis*, thorace depresso : striis quatuor longitudinalibus, pedibus anterioribus latis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 37.*  
*Habitat in Europa.*
- lutea. 221. *C. lutea*, elytris ad scutelli margines albis *Mus. Lesk. p. 116. n. 29.*  
*Habitat in Europa.*
- bipuncta-  
ta. 222. *C. flava*, fronte punctis duobus fuscis, elytris albis. luteo venosis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 30.*  
*Habitat in Europa.*
- flavifrons. 223. *C. lutea fronte flava : punctis duobus minimis nigris.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 31.*  
*Habitat in Europa.*
- reticulata. 224. *C. flava*, elytris albis luteo venosis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 32. 35.*  
*Habitat in Europa.*
- lineolata. 225. *C. fusca*, elytris albidis fusco venosis : lineolis interruptis albis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 33.*  
*Habitat in Europa.*
- virescens. 226. *C. ex flavo virescens.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 34.*  
*Habitat in Europa.*
- lugubris. 227. *C. elytris albis : margine interno posteriorique nigro, dorso interrupto.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 36.*  
*Habitat in Europa.*
- hyalina. 228. *C. elytris hyalinis albo venosis.* *Mus. Lesk. p. 118. n. 37.*  
*Habitat in Europa.*



2112 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa*.)

- lactea. 229. *C. pallida*, alis lacteis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 38.*  
*Habitat in Europa.*
- denigrata. 230. *C. flava*, alis albis, abdomine supra nigro. *Mus. Lesk. p. 118. n. 39.*  
*Habitat in Europa.*
- maculosa. 231. *C. fusca*, elytris albidis fusco maculatis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 40.*  
*Habitat in Europa.*
- pallens. 232. *C. aptera pallida.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 42.*  
*Habitat in Europa.*
- †† *alis deflexis, latera obvolventibus*, *Deflexæ*,
- ocellata. 162. *C. elytris compressis adscendentibus viridibus : punctis ocellaribus ferrugineis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 2. mant. inf. 2. p. 268. n. 2.*  
*Degeer inf. 3. t. 33. f. 2.*  
*Habitat Tranquebariæ.*
- æquinotialis. 163. *C. elytris deflexis viridibus : margine rubro : interiori basi nigro punctato.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 3. mant. inf. 2. p. 268. n. 3.*  
*Habitat in Africa æquinotiali, magna.*
- marginata. 39. *C. flava*, elytris deflexis nigris : linea laterali alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 4. mant. inf. 2. p. 268. n. 4.*  
*Habitat in America, lateralis magnitudine, alis pallidis.*
- phalænoidea. 40. *C. exalbida*, alis patulis, elytris anterius nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 5. mant. inf. 2. p. 268. n. 5.*  
*Degeer inf. 3. p. 222. n. 19. t. 33. f. 6. Cicada flava, alis amplissimis deflexis albidis nigro punctatis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 10.*  
*Stoll cicad. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in America meridionali, hemerobio perlæ similis.*
- bipunctata. 41. *C. exalbida*, elytris deflexis griseis, thoracis margine anteriori punctis duobus impressis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 6. mant. inf. 2. p. 268. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali, cornutiæ magnitudine.*
- retusa. 164. *C. exalbida immaculata*, capite antè retuso. *Fabr. mant. inf. 2. p. 268. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine marginatæ.*

# INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa*.)

- grisea. 165. *C. grisea*, elytris deflexis, capite apice puncto nig.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 7. mant. inf. 2. p. 268. n. 8.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis.*
- tripuncta-166. *C. elytris deflexis viridibus* : punctis tribus albidis. *Fabr.*  
*ta. sp. inf. 2. p. 323. n. 8. mant. inf. 2. p. 268. n. 9.*  
*Habitat in America meridionali, viridis, virida major.*
- vivida. 167. *C. viridis*, elytris deflexis, alis albis, fronte conica.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 9. mant. inf. 2. p. 268. n. 10.*  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis, in*  
*nova quoque Hollandia.*
- minuta. 168. *C. elytris deflexis viridibus* : dorso scabro, capitis mar-  
 gine posteriori thoraceque linea dorsali sanguinea. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 323. n. 10. mant. inf. 2. p. 268. n. 11.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- lanata. 42. *C. alis nigris* : punctis cæruleis, fronte lateribusque ru-  
 bris, ano lanato. *Mus. Lud. Utr. 163. \* Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 324. n. 12. mant. inf. 2. p. 268. n. 13.*  
*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 11.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 11.*  
*Stoll cicad. 1. t. 10. f. D. 49.*  
*Habitat in America australi & India, nigricans, oculis*  
*spinosis.*
- tomentosa. 169. *C. elytris deflexis viridibus fulvo subfasciatis*, alis  
 albis : fasciis duabus atris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 324. n.*  
*13. mant. inf. 2. p. 269. n. 14.*  
*Habitat in India.*
- barbata. 170. *C. fusca*, abdomine virescente, ano lanato niveo. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 324. n. 14. mant. inf. 2. p. 269. n. 15.*  
*Habitat in India.*
- atrata. 171. *C. atra*, thorace maculis quatuor griseis, abdominis  
 margine flavo : punctis niveis. *Fabr. mant. inf. 2. p.*  
*269. n. 16.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine lanata, an-*  
*tennis testaceis, genubus flavis.*
- villosa. 172. *C. viridis*, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 324. n. 15. mant. inf. 2. p. 270. n. 21.*  
*Habitat in America meridionali.*

2114 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa*.)

- leporina. 43. *C. alis exalbidis : anterieus anastomosibus pallidis supra lineolam nigricantem, ano lanato. Fn. succ. 895.\**  
*Habitat in Europa.*
- cunicularia. 44. *C. alis hyalinis : striga, fascia punctisque fuscis, ano lanato. Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 11. mant. inf. 2. p. 268. n. 12.*  
*Habitat in India, fronte ovata ferruginea.*
- viridis. 46. *C. elytris viridibus, capite flavo : punctis nigris. Fn. succ. 896. Geoffr. inf. par. 1. p. 417. n. 5. Fuesli inf. helv. p. 24. n. 465. Fabr. sp. inf. 2. p. 326. n. 26. mant. inf. 2. p. 271. n. 34.*  
*Raj. inf. p. 68. n. 3. Locusta pulex paulo minor.*  
*Petiv. gaz. 73. t. 76. f. 6. Ranatra viridescens.*  
*Habitat in Europa, elytris rarius cærulescentibus.*
- læta. 173. *C. supra nigra nitida : punctis cærulescentibus. Fabr. mant. 2. p. 271. n. 34.*  
*Habitat in Cayenna, viridi minor, subtus flavescens, ano coccineo.*
- quadriguttata. 174. *C. elytris rufescentibus : maculis duabus viridibus apice hyalinis. Fabr. mant. inf. 2. p. 271. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis, subtus flavescens.*
- marginella. 175. *C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. Fabr. mant. inf. 2. p. 271. n. 37.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- compressa. 47. *C. flava compressa. Fn. succ. 897.\**  
*Habitat in Europa.*
- aurata. 48. *C. flava, elytris fulvo pictis : maculis quatuor nigris posteriusque auratis. Fn. succ. 899.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 41. mant. inf. 2. p. 273. n. 55. Fuesli inf. helv. p. 24. n. 466.*  
*Habitat in Europæ magis borealis plantis.*
- ulmi. 49. *C. alis viridi luteis : apicibus nigricantibus inauratis. Fn. succ. 900.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 42. mant. inf. 2. p. 273. n. 56. Geoffr. inf. par. 1. p. 427. n. 27. Degger inf. 3. p. 189. n. 8. Cicada muscifformis ulmi.*  
*Habitat in Europæ ulmis.*
- nitidula. 176. *C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 273. n. 57.*  
*Habitat Halæ Saxonum, parva, flava.*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa.*) 2115

cuspidata. 177. *C. grisea*, capite depresso plano apice fusco. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 328. n. 43. *mant. inf.* 2. p. 273. n. 58.  
*Habitat in Angliæ plantis.*

quercus. 178. *C. flavescens*, elytris sanguineo apice fusco maculatis.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 328. n. 44. *mant. inf.* 2. p. 273. n. 59.  
*Habitat in quercu.*

rosæ. 50. *C. flava*, alis albis apice fusco striatis. *Fn. suec.* 902.\*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 428. n. 28. *Fabr sp. inf.* 2. p. 327. n. 40. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 53.  
*Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 467.  
*Degeer inf.* 3. p. 103. n. 9. Cicada musciformis rosæ.  
*Reaum. inf.* 5. t. 20. f. 10-14.  
*Frisch inf.* 11. p. 13. t. 20.  
*Habitat in rosæ foliis.*

fuscata. 179. *C. grisea*, elytris punctis apiceque fuscis, alis albis apice fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 272. n. 54.  
*Habitat in Europa, statura & magnitudine c. rosæ.*

coryli. 51. *C. alis fuscis convolutis*: fascia albida pone maculam cordatam cæruleascentem. *Fn. suec.* 901.\*  
*Habita in corylo.*

coccinea. 180. *C. flava*, capite thorace scutello tergo elytrisque coccineis, elytris lincis duabus longitudine alibus obliquis viridentibus. *Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 69. n. 69.  
*Habitat in America septentrionali, compressæ circiter magnitudine.*

americana. 181. *C. elytris maculatis, ano lanato.*  
*Habitat in America, an vere distincta a 42, 169-172 species?*

albida. 182. *C. albida*, elytris nigro punctatis.  
*Habitat in America; an distincta a 42, 169-172 species?*

globulifera. 183. *C. atra*, capite conico in spinam longissimam desinente: pedunculis quatuor globuliferis. *Pall. miscell. zool.* p. 187. *spicil. zool.* IX. p. 22. t. 1. f. 12. D.E.F.  
*Habitat - - - pediculo duplo vel triplo major.*

erythrop-tera. 184. *C. fusca*, capite flavicante, elytris rubris: strigis quatuor nigris. *Lepechin it.* 2. p. 209. t. 11. f. 24.  
*Habitat in Sibiria.*

2116 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa.*)

- nitens. 185. *C. griseo-viridis*, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anterioribus tridentatis. *Degeer inf. 3. p. 220. n. 17. t. 33. f. 4.*  
*Habitat in Surinamo, 11 lineas longa.*
- collaris. 186. *C. flavo-fulva*, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. *Degeer inf. 3. p. 226. n. 22. t. 33. f. 12.*  
*Habitat in Surinamo, nuſcæ minoris magnitudine.*
- melanop-187. *C. fusca*: utrinque linea laterali flava, alis nigris.  
 tera. *Degeer inf. 3. p. 226. n. 23. t. 23. f. 14.*  
*Habitat in Surinamo, ſtatura & magnitudine collaris.*
- gibberula. 188. *C. fusco-viridis* reticulata, alarum baſi dilatata.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 418. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- ſexpunc-189. *C. flaveſcens*, thorace punctis ſex impreſſis. *Geoffr.*  
 tata. *inf. par. 1. p. 429. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- crocata. 190. *C. nigra*, thorace elytrisſque fascia crocea. *Geoffr. inf.*  
*par. 3. p. 422. n. 16.*  
*Habitat in Gallia.*
- caſtaneæ. 191. *C. tota nigra.* *Geoffr. inf. par. 3. p. 422. n. 15.*  
*Habitat in Gallia caſtanea.*
- triſtriata. 192. *C. fusca*, elytris albidis: faſciis tribus tranſverſis  
 fufcis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 425. n. 21.*  
*Habitat in Gallia.*
- biſtriata. 193. *C. flava*, elytrorum faſciis duabus tranſverſis  
*Geoffr. inf. par. 3. p. 425. n. 22.*  
*Habitat in Gallia.*
- tripuncta-194. *C. viridi-flava*, elytris punctis tribus nigris  
 ta. fufcis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 426. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*
- geogra-195. *C. viridis*, elytris maculis plurimis fufcis  
 phica. *Geoffr. inf. par. 3. p. 427. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- ſqualida. 196. *C. fusca* elytris nebulofis: nervis albidis.  
*zool. dan. prodr. p. 102. n. 1152. Geoffr. inf. par. 3. p. 422. n. 14.*  
*Habitat in Europa.*



- quadrino- 197. *C. nigricans*, thorace bipunctato, elytristotis coriaceis:  
tata. fascia duplici interrupta alba. Müll. *zool. dan. prodr.* p.  
102. n. 1149.  
*Habitat in Dania.*
- pallescens. 198. *C. elytris abbreviatis firiatis fusco maculatis*, alis albis;  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 102. n. 1150.  
*Habitat in Dania.*
- fusca. 199. *C. flavescens*, elytris fuscis nervosis, oculis nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 102. n. 1151.  
*Habitat in Dania.*
- pufilla. 200. *C. pallida*, alis membranaceis albis: punctis raris nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1163.  
*Habitat in Dania, adeo exilis, ut saliens tantum oculis  
percipiatur.*
- diaphana. 201. *C. luteo-alba*, oculis cinereis. Müll. *zool. dan. prodr.*  
p. 103. n. 1169.  
*Habitat in Dania.*
- arvensis. 202. *C. lutea*, fronte, abdomine subtus, lateribusque nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1170.  
*Habitat in Daniæ arvis.*
- neuroptera. 203. *C. flavescens*, alis hyalinis nervosis; maculis subfulvis.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1171.  
*Habitat in Dania.*
- cancellata. 204. *C. lutea*, scutello tripunctato apice fusco, alis albis  
reticulatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1172.  
*Habitat in Dania.*
- glabra. 205. *C. fusca*, thorace nigro, elytris politis fulvis. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1173.  
*Habitat in Dania.*
- amphibia. 206. *C. antennis crassis elevatis*, alis nullis, pedibus poste-  
rioribus natatoriis. *Pontopp. Naturg. Daennem.* p. 214.  
n. 13. t. 16. a. b. *atl. dan.* I. t. 29.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103.  
*Habitat in Dania, magnitudine pulicis, seminæ abdomine  
enifero; an hujus generis?*



224. NOTONECTA. *Rostrum inflexum.*

*Antennæ thorace breviores.*  
*Alæ quatuor cruciatio-com-*  
*plicatæ, antèrius co-*  
*riacæ.*

*Pedes posteriores pilosi,*  
*natatorii.*

\* *labio elongato.*

glauc. 1. N. elytris griseis margine fusco punctatis apice bifidis. *Farsuec.* 903. \* *Scop. ent. carn.* 348. *Fuesli inf. helv.* p. 24. n. 468. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 331. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 275. n. 1.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 476. n. 1. t. 9. f. 6. Notonecta capite luteo, &c.

*Degeer inf.* 3. p. 382. n. 5. t. 18. f. 16. 17. Nepa notonecta.

*Petiv. gazoph.* t. 72. f. 6. Notonecta vulgaris nigro pallidoque mixta.

*Raj. inf.* 58. Cicada aquatica Mouffeti,

*Bradl. nat.* t. 26. f. 2. E.

*Hufn. inf.* t. 12. f. 19.

*Frisch inf.* 6. p. 28. t. 13.

*Roef. inf.* 3. app. 1. p. 165. t. 27.

*Pod. inf.* t. 1. f. 5.

*Sulz. inf.* t. 10. f. 67.

*Schaeff. elem.* t. 90.

icon. t. 33. f. 5. 6.

*Stoll cunic.* 2. t. 12 f. IX. X.

*Habitat in Europæ aquis, piscibus molesta.*

ameri- 4. N. grisea, postèrius nigra, scutello atro, utrinque puncto  
 cana. baseos flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 331. n. 2. *mant. inf.*

2. p. 275. n. 2.

*Habitat in Americæ aquis.*

---

Notonecta & Nepa sub aquis degunt, animalculis aquaticis visitantes; larva & puppa hexapus, agilis, natans imagini simillima, hæc cum alarum rudimentis illa aptera.

- nivea. 5. *N. elytris albis immaculatis apicæ rotundatis.* *Fabr. sp. inf.*  
2. p. 332. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 275. n. 3.  
*Habitat in India.*
- minutif-  
sima. 3. *N. grisea, capite fusco elytris truncatis.* *Fabr. sp. inf.*  
2. p. 332. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 275. n. 4.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 713. n. 3. *Fn. suec.* 905. *Notonecta*  
- *elytris cinereis maculis fuscis longitudinalibus.*  
*Fn. suec.* I. n. 690. *Notonecta arenulæ agnitudinis.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 477. n. 2. *Notonecta cinerea anelytra.*  
*Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 470.  
*Habitat in Europæ aquis.*
- minuta. 6. *N. capite flavo, thorace elytrisq. viridibus: lineis trans-*  
*versis fuscis.* *Sulz. hist. inf.* p. 91. t. 10. f. 1.  
*Habitat in Europæ aquis.*
- novebo-  
racensis. 7. *N. flavescens, elytris concoloribus: maculis tribus nebulosis*  
*fuscis longitudinalibus.* *Forst. nov. inf. spec.* I. p. 70. n. 70.  
*Habitat in Noveboraco.*
- octopunc-  
tata. 8. *N. capite flavo, thorace subfusco, scutello nigro: punctis*  
*quinque albis, elytris fuscis: margine albo; punctis*  
*quatuor atris.*  
*Schæff. ic. t.* 97. f. 1.  
*Habitat in Germania, magnitudine striatæ.*
- indica. 9. *N. glauca, elytris apice nigris.* *Mant.* 2. p. 534.  
*Habitat in India.*
- atomaria. 10. *N. alba, supra elytrisq. pallide griseis, alis lacteolis.*  
*Pall. it.* I. app. n. 55.  
*Habitat in fluento Russiæ Volchova ad Novogorodium,*  
*pediculi magnitudine.*
- lutea. 11. *N. elytris albidis: striga marginali nigra.* *Müll.* 1001.  
*dan. prodr.* p. 103. n. 1175.  
*Habitat in Daniæ aquis.*
- marginata. 12. *N. elytris nigris: margine futuraque luteis.* *Müll.* 1001.  
*dan. prodr.* p. 104. n. 1176.  
*Habitat in Dania. De his 6-12 dubium, utrum huic, an*  
*sequenti tribui accensendæ.*

\* *labio nullo*, Sigaræ Fabricii.

lineata. 13. N. elytris fuscis: lineis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 276. n. 1.*

*Habitat in Cayenna, statura striatæ, at paulo major.*

striata. 2. N. elytris fuscis: lineolis transversis undulatis numerosissimis fuscis. *Fn. suec. 904.\* Scop. ent. carn. 349. Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 1. mant. inf. 2. p. 276. n. 2.*

*Petiv. garoph. t. 72. f. 7. Notonecta vulgaris compressa fusca.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 478. n. 1. t. 9. f. 7. Corixa.*

*Degeer inf. 3. p. 389. n. 6. t. 20. f. 1. 2. Nepa striata.*

*Joblot microsc. 1. p. 1. t. 7. f. 2. 3.*

*Roes. inf. 3. app. 1. p. 177. t. 29.*

*Schæff. elem. t. 50.*

*icon. t. 97. f. 2.*

*Stoll cimic. 2. t. 15. f. XIII. B.*

*Habitat in Europæ aquis frequens, magnitudine varians.*

coleoptrata. 14. N. elytris totis coriaceis fuscis: margine exteriori flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 2. mant. inf. 2. p. 276. n. 3.*

*Habitat in Kilonii aquis.*

## 225. NEPA. Rostrum inflexum.

*Antennæ breves.*

*Alæ quatuor cruciato-complicatæ; antèrius coriaceæ.*

*Pedes anteriores cheliformes; reliqui quatuor ambulatorii.*

\* *antennis palmato-divisis, labio nullo.*

grandis. 1. N. ecaudata testacea flavo maculata. *Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 1. mant. inf. 2. p. 276. n. 1.*

*Syll. nat. XII. 2. p. 713. n. 1. Mus. Lud. Ulr. 164.\* Gronz. zooph. 685. Nepa testacea scutello lævi, alis albis maculis venisque flavis.*

*Degeer inf. 3. p. 379. n. 4. Nepa surinamensis.*

*Marcgr. bras. 250. f. 259. Insectum magnitudine brucei.*

*Merian. inf. surin. t. 56.*

*Roes. inf. 3. app. 1. t. 26.*

*Habitat in Americæ aquis.*

- rubra. 2. *N. fusca*, abdomine supra alarumque nervis rubris.  
*Mus. Lud. Ulr.* 165.\*  
*Fabr. mant. inf.* 2. p. 277. n. 6. *Nepa* cauda bifeta corpore ovato, cauda corpore longiore.  
*Stoll cimic.* 2. t. 7. f. V. *Scorpio aquaticus*.  
*Habitat* Tranquebariæ.
- annulata. 8. *N. ecaudata* subrotunda, pallide fusca, tibiis anterioribus pallidis fusco annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 2. *mant. inf.* 2. p. 276. n. 2.  
*Habitat* in Coromandel, congeneribus latior, magis rotundata.
- rustica. 9. *N. ecaudata* fusca, thoracis elytrorumque margine anteriore albido. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 276. n. 3.  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 2. *Nepa plana*.  
*Stoll cimic.* 2. t. 7. f. VI.
- fusca. 3. *N. fusca*, cauda bifeta, scutello rugoso, alis niveis.  
*Mus. Lud. Ulr.* 166.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 277. n. 4.  
*Stoll cimic.* 2. t. I. f. I.  
*Habitat* in Indiæ aquis, cauda corporis longitudine.
- grossa. 10. *N. cauda bifeta*, corporis ovati longitudine. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 277. n. 5.  
*Habitat* in Sina, rubra major, cinerea, abdomine supra rubro, medio nigro, ano cinereo.
- atra. 4. *N. atra* thorace inæquali, corpore oblongo.  
*Habitat* in Africa, cinereæ simillima, at duplo major & duplo longior.
- cinerea. 5. *N. cinerea*, thorace inæquali, corpore oblongo ovato.  
*Fn. suec.* 906. *Scop. ent. carn.* 350. *Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 471.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 277. n. 6.  
*Nepa* cauda bifeta, corpore ovato.  
*Fn. suec.* 1. n. 691. *Nepa* abdominis margine integro.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 481. n. 2. *Nepa* corpore ovato.  
*Degeer inf.* 3. p. 361. n. 1. t. 18. f. 1. *Nepa Scorpio aquaticus*.  
*Mouss. inf.* 321. *Scorpio palustris*.  
*Raj. inf.* 58. *Scorpio palustris* ad cimices referenda.  
*Jonst. inf.* t. 25. f. 1. 2. *Scorpiones aquatici*.

*Pet. gazoph. t. 74. f. 4. Scorpio vulgaris aquaticus.*

*Bauh. ballon. 212. f. 2. Araneus aquaticus.*

*Swammerd. bibl. 1. t. 3. f. 4.*

*Bradl. natur. t. 26. f. 2. C.*

*Frisch inf. 7. t. 15.*

*Hufn. inf. t. 11. f. 2.*

*Roef. inf. 3. app. 1. p. 136. t. 22. f. 6-8.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 68.*

*Schaeff. elem. t. 69.*

*icon. t. 33. f. 7. 9.*

*Stoll cimic. t. 1. f. 11. a.*

*Habitat in Europæ aquis, abdomine supra rubro, antennis palmato-bifidis.*

*maculata.* II. *N. nigra*, thorace scutelloque ferrugineo maculatis, alis nigris, cauda bifeta. *Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 6. mant. inf. 2. p. 227. n. 8.*  
*Habitat in Indiæ aquis.*

*linearis.* 7. *N. linearis*, manibus spina laterali pollicatis. *Fn. suec. 908. Gron. zooph. 683.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 7. mant. inf. 2. p. 277. n. 9.* *Nepa cauda bifeta corpore lineari.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 480. t. 10. f. 1.* *Nepa corpore lineari.*  
*Degeer inf. 3. p. 369. n. 2. t. 19. f. 1. 2.* *Fuesli inf. helv. p. 25. n. 473.* *Nepa linearis.*  
*Raj. inf. 59.* *Locusta aquatica Mouffeti.*  
*Swammerd. bibl. nat. 1. p. 233. t. 3. f. 9.*  
*Frisch inf. 7. p. 24. t. 16.*  
*Roef. inf. 3. app. 1. p. 141. t. 23.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 4.*  
*Schaeff. ic. t. 5. f. 5. 6.*  
*Habitat in Europæ & Indiæ aquis.*

\*\* labio porrecto rotundato, *Naucorides Fabricii.*

*cimicoides.* 6. *N. abdominis margine serrato.* *Fn. suec. 907. Gron. zooph. 686.* *Geoffr. inf. par. 1. p. 474. n. 1. t. 9. f. 5.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 1. mant. inf. 2. g. 277. n. 1.* *Fuesli inf. helv. p. 24. n. 472.*  
*Degeer inf. 3. p. 375. n. 3. t. 19. f. 8. 9.* *Nepa Naucoris.*  
*Frisch inf. 6. p. 31. t. 14.* *Cimex aquaticus latior.*  
*Roef. inf. 3. app. 1. p. 176. t. 28.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 3.*  
*Schaeff. elem. t. 87.*

*Schaeff.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. *Acanthia*. (*Apterus*.) 2123

*Schaeff. icon. t. 33. f. 3. 4.*

*Stoll cimic. 2. t. 12. f. VIII. C. B.*

β) *Naucoris futura integra. Mus. Lesk. p. 117. n. 62.*

*Habitat in Europæ aquis.*

antiguen- 12. N. abdominis margine integro.

sis.

*Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 2. mant. inf. 2. p. 277. n. 2.*

*Naucoris nepæformis.*

*Habitat in insula Antigua.*

226: CIMEX. *Rostrum inflexum.*

*Antennæ thorace longiores.*

*Alæ quatuor cruciato-complicatæ i  
superioribus antèrius coriaceis.*

*Dorsum planum: thorace marginato.*

*Pedes cursorii.*

\* *antennis antè oculos insertis.*

† *labio nullo; Acanthiæ Fabricii.*

‡ *apteri.*

læcula- 1. C. apteris. *Fn. suec. 909. Scop. ent. carn. 354. Geoffr.  
rins. inf. par. 1. p. 434. n. 1. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 474.  
Degeer inf. 3. t. 17. f. 9. Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 1.  
mant. inf. 2. p. 278. n. 1.*

*Mouff. inf. 269. f. superiores. Cimex domesticus:*

*Bonann. microsc. t. 65.*

*Aldr. inf. 534.*

*Jonst. inf. 89.*

*Raj. inf. 7.*

*Ledermüll. microsc. t. 52. 63.*

*Sonthall tr. of Bugs Lond. 1730. o. 7.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 69.*

*Stoll cimic. 2. t. 19. f. 131.*

*Habitat in Europæ domibus, exoticus, antè epocham salutæ  
rem jam in Europa, vix antè 1670. in Anglia, noctur-  
nus, færens; sanguisugus, rarius, aliquando tamen;  
testibus Scopio & Hermanuo, alatus, vivus facile oc-  
cidendus, nidore carbonum, terebinthinæ oleo accenso, men-  
tha arvensi, lepidio ruderali, myrica, geranio robertiano,*

X x x x x



2124 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. *Acanthia*. (*Coleoptratus*.)

*agarico muscario, cimicifuga, cannabis seminibus herbaeque, opuli baccis, ledi palustri, tabaci oleo, capsici fumo, plumbaginis europaeae infuso, acoro palustri, melontheo oleo infuso, medusa, cimice personato, formicis rubris pellendus.*

TT elytris fere totis corlaceis, coleoptrati.

Zosteræ. 122. *C. niger*, elytris abdomine longioribus apice hyalino striatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 2. mant. inf. 2. p. 378. n. 2.*

*Fabr. it. norw. Acanthia pellucens.*

*Habitat ad littora maris, velocissime supra fucos zosteramque decurrens, Kilonii frequens.*

ater. 123. *C. ater nitidus*, elytris apice pallescentibus. *Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 3.*

*Habitat Kilonii, c. zosteræ duplo minor.*

grylloides. 123. *C. apterus niger*, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus. *Fn. succ. 910. \**

*Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 3. mant. inf. 2. p. 378. n. 4.*

*Acanthia (coriacea) aptera, elytris coriaceis nigro-griseis. Habitat in Europa, thorace gryllum referens.*

clavipes. 124. *C. apterus niger*, pedibus piceis: femoribus anterioribus incrassatis dentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 5.*

*Habitat Tranquebariæ, magnitudine c. zosteræ.*

pedemontanus. 125. *C. apterus*, elytris connatis abbreviatis cinereis, anagato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 4. mant. inf. 2. p. 278. n. 6.*

*Habitat in agro Pedemontano, parvus, totus cinereus.*

littoralis. 14. *C. elytris sordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. Fn. succ. 914. 915. \* Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 7. mant. inf. 2. p. 279. n. 12.*

*Degeer inf. 3. p. 278. n. 21. t. 14. f. 17. 18. Cimex ovatus nigricans.*

*Habitat in Europæ littoribus.*

---

*Cimices plurimi sœtent, omnes, reduvis exceptis, plantarum, omnes animalum, præsertim insectorum molliorum succo visitant, quem, volatilium more, rostro sugunt; larva & puppa hexapus, agilis, obambulat, imagini simillima, illa aptior, hæc alarum rudimentis instructa.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. *Acanthia*. (*Coleopterus*.) 2125

rugosus. 15. C. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus crassissimis. *Fn. suec.* 916. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 336. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 13.

*Habitat in Europa boreali.*

lunatus. 126. C. thorace lunato: margine prominente, abdomine serrato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 14.

*Stoll cimic.* 2. t. 13. f. 84.

*Habitat in America australi & India.*

clavicornis. 16. C. elytris nervoso-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis. *Fn. suec.* 911. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 336. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 278. n. 7. *Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 480. *Reaum. inf.* 3. t. 34. f. 1-4.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 461. n. 56.

*Habitat in Europæ hortis.*

ferratulæ. 127. C. niger, elytris pallescentibus, alis apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 336. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 278. n. 9.

*Habitat in Angliæ ferratulis.*

lavateræ. 128. C. niger, elytris abdomineque basi rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 278. n. 8.

*Habitat in Barbariæ lavateris, parvus in hac tribu.*

fasciatus. 129. C. ater, elytris pallescentibus: fasciis duabus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 278. n. 10.

*Habitat Kilonii, parvus, nitidus.*

Mülleri. 130. C. niger, pedil. & fulvis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 105. n. 1188.

*Habitat in Dania.*

maculatus. 131. C. fuscus, thorace albo trimaculato, abdomine subtus albo: margine nigro punctato. *Fabr. mant. inf.* 2. n. 279. n. 11.

*Habitat Tranquebariæ, parvus.*

TTT membranacei & valde depressi:

corticalis. 17. C. abdominis margine imbricatim secto, corpore nigro, *Fn. suec.* 917. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 15.

*Schaeff. ic.* t. 51. f. 6. 7.

*Habitat in Europæ arboribus silvaticis:*

XXXXXX

2126 INSECTA HEMIPTERA. *Cimex. Acanthia. (Membranaceus.*

paradoxus. 132. *C. thorace abdomineque lobatis ciliato-spinosis. Sparrrn. act. Stockh. 1777. p. 234. t. 6. f. A. B. C. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 510. mant. inf. 2. p. 279. n. 16.*

*Habitat ad Cypri bonæ Spei, statura corticalis, folia decidua emortua amulans.*

lævis. 133. *C. niger, abdomine lævi brunneo, alis pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 11. mant. inf. 2. p. 279. n. 17.*  
*Habitat in Anglia.*

betulæ. 18. *C. thorace denticulato, capite muricato, elytris anterioribus dilatatis. Fn. suec. 918. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 12. mant. inf. 2. p. 279. n. 18.*

*Degeer inf. 3. p. 305. n. 36. t. 15. f. 16. 17. Cimex depressus betulæ.*

*Habitat in Europæ borealis betula alba.*

crassipes. 134. *C. abdomine incrassato fusco: apice flavescente, tibiis anterioribus incrassatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 13. mant. inf. 2. p. 279. 19.*

*Habitat Dresdæ.*

erosus. 19. *C. abdomine flavo: fascia nigra, thoracis margine sinuato, tibiis anterioribus incrassatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 14. mant. inf. 2. p. 279. n. 20.*

*Degeer inf. 3. p. 350. n. 25. t. 35. f. 13. 14. Cimex Scorpio.*  
*Habitat in America meridionali.*

niger. 585. *C. niger, thorace ferrugineo marginato conico: apice truncato, elytris abdomine dimidio brevioribus margine externo ferrugineis, abdomine supra albo maculato: lobis utrinque sex ferrugineis, totidemque subtrus paribus guttarum albarum. Mus. Lesk. p. 117. n. 66. b.*  
*Habitat extra Europam*

umbra- 135. *C. ferrugineus, thorace marginato: anterioribus scutelloque apice albis. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 15. mant. inf. 2. p. 279. n. 21.*  
*Habitat Hafniæ.*

leucopte- 136. *C. thoracis margine serrato, corpore griseo, alis albis rus. fusco maculatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 338. n. 16. mant. inf. 2. p. 279. n. 22.*  
*Habitat*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. *Acanthia*. (*Membranaceus*.) 2127

filicis. 20. *C. elytrorum* apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. suec.* 919.\*  
*Habitat in filicibus.*

cardui. 21. *C. scutello* lineis tribus elevatis, antennis apice nigris.  
*Fn. suec.* 920.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 24.

*Degeer inf.* 3. p. 309. n. 38. t. 6. f. 1. *Cimex depressus* ovatus griseus nigro maculatus.

*Habitat in Europæ borealis cardui capitulis.*

pyri. 137. *C. thorace* trialato : scutello foliato, elytris reticulatis basi gibbis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 18. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 25.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 461. n. 57.

*Habitat in pyri communis foliorum pagina inferiori, quam maculat.*

rhombeus. 22. *C. thorace* acutangulo, abdomine dilatato rhombeo posterius sexdentato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 19.  
*mant. inf.* 2. p. 280. n. 26.

*Habitat in Africæ arboribus.*

sylvestris. III. *C. ater*, elytris albis : arcu apicis nigro. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 279. n. 23.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 731. n. III. *Fn. suec.* 965. *Cimex oblongus* niger, alis elytrisque albo fuscoque cæruleis, pedibus rufis.

*Habitat in Europæ silvis, parvus.*

corticatus. 138. *C. thoracis* denticulati corporis pedumque cortice nigricante viridi, antennis clavatis.

*Sulz. hist. inf. t.* 10. f. 7.

*Drury inf.* 2. p. 76. t. 40. f. 2.

*Habitat in Brasilia.*

†† labio elongato, subulato, annulato.

† scutello longitudine abdominis, Scutellati.

Stockerus. 2. *C. corpore* viridi : maculis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 167.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 1.

*Cimex scutellaris* ovatus, corpore viridi, maculis nigris abdomine ferrugineo.

*Pet. gazoph.* 34. t. 21. f. 12. *Stockerus benghalensis* viridis nigro maculatus.

*Stoll cimic. 2. t. 3. f. C.*

*Habitat in Sina, nobili affinis, subtus ferrugineus: lateribus cyaneis.*

nobilis. 3. *C. viridi-auratus nigro maculatus. Amn. acad. 6. p. 409. n. 46.\**

*Fabr. sp. inf. 2. p. 338. n. 2. mant. inf. 2. p. 280. n. 2. Cimex scutellaris oblongus cæruleo-auratus nigro maculatus.*

*Sulz. hist. inf. t. II. f. C.*

*Schroet. Abh. I. t. I. f. 9.*

*Stoll cimic. 1. t. I. f. I.*

*Habitat in Asia, subtus rufus, fasciis lateralibus cæruleo auroque nitentibus.*

regalis. 139. *C. thorace scutelloque aureis, thorace punctis duobus, scutello maculis duabus cærulescentibus. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 3. mant. inf. 2. p. 280. n. 3.*

*Habitat in nova Hollandia.*

imperialis. 140. *C. thorace scutelloque rufis, abdomine cyaneo: margine sanguineo. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 4. mant. inf. 2. p. 280. n. 4.*

*Habitat in nova Hollandia.*

nigellæ. 141. *C. niger obscurus, thorace antèrius, abdominis margine pedibusque albis. Fabr. mant. inf. 2. p. 280. n. 5. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 5. Cimex (rusticus) scutellaris niger obscurus, abdominis margine ferrugineo, pedibus pallidis.*

*Habitat in Barbariæ nigella, elytris intus sanguineis.*

cerinthes. 142. *C. niger obscurus immaculatus. Fabr. mant. inf. 2. p. 280. n. 6.*

*Habitat in Africæ nigella sativa, statura & magnitudine c. nigellæ.*

annulus. 143. *C. virescens, maculis annularibus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 6. mant. inf. 2. p. 281. n. 7.*

*Drury inf. 3. t. 46. f. 9. Cimex Argus.*

*Habitat ad fluvium Senegal, alis apice nigris, interdum obscure pallidis.*

sexgutta- 144. *C. supra testaceus, thorace punctis duobus, scutello tus, quatuor cyaneo-nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 7. mant. inf. 2. p. 281. n. 8.*



INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Scutellatus*.) 2129

*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis, antennis nigris.*

- Druræi. 145. *C. sanguineus*, punctis maculisque nigris, subtus atro-cærulescens. *Mant. p. 534.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 8. mant. inf. 2. p. 281. n. 9.* Cimex scutellaris supra rufus, maculis difformibus nigris:  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 5.*  
*Drury inf. 1. t. 42. f. 1. 5.*  
*Habitat in America meridionali.*
- Fabricii. 146. *C. purpureus*: punctis sanguineis, subtus atro-cærulescens. *Mant. p. 534.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 9. mant. inf. 2. p. 281. n. 10.* Cimex scutellaris subpurpurascens fulvo punctatus.  
*Habitat in Cayenna, altero sexu supra rufescente, altero obscure cærulescente.*
- Argus. 147. *C. niger*: punctis ocellaribus fulvis numerosis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 281. n. 11.*  
*Stoll cimic. 2. t. 7. f. 50.*  
*Habitat in Surinamo, statura & magnitudine c. Fabricii, subtus flavus nigro varius.*
- Schulzii. 148. *C. atro-æneus*, scutello utrinque macula-basæos coccinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 10. mant. inf. 2. p. 281. n. 12.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine scarabæoidis, præcedentibus minor.*
- Paganus. 149. *C. cyaneus*, scutello abdomineque rufis cyaneo maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 11. mant. inf. 2. p. 281. n. 13.*  
*Habitat in nova Hollandia, thorace interdum macula rufa, abdomine medio punctis 4 cyaneis insignito.*
- illustris. 150. *C. glaucus*, thorace scutelloque punctis duobus fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 12. mant. inf. 2. p. 281. n. 14.*  
*Stoll cimic. 2. t. 24. f. 166.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnus.*
- lineola. 151. *C. supra cyaneus*, capite thoraceque linea dorsali, scutelloque punctis duobus rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 13. mant. inf. 2. p. 281. n. 15.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis, antennis nigris.*



2130 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Scutellatus*.)

trilineatus. 152. *C. niger*, lineis tribus flavescen-  
tibus. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 340. n. 14. *mant. inf.* 2. p. 281. n. 16.  
Habitat in America meridionali, lineato minor, subius ni-  
ger, viridi irroratus, abdomine utrinque linea puncto-  
rum rubrorum insignito.

scarabæoides. 4. *C. corpore atro-æneo*. *Fn. suec.* 912.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 25. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 29. *Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 475.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 435. n. 2. *Cimex hemisphæricus nigro-æneus*, &c.  
*Sulz. inf.* p. 26. t. 11. f. 70.  
Habitat in Europa, frequentius in ranunculi floribus.

pallipes. 153. *C. nigro-æneus*, scutelli abdominisque margine pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 343. n. 26. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 30.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 2. p. 29. *Cimex (acaroides) scutellatus ater*, thorace scutello abdomineque albo marginatis.  
Habitat in Africa æquinoctiali, flavipedi affinis, at paulo major.

flavipes. 154. *C. nigro-æneus*, margine omni pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 343. n. 27. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 31.  
Habitat in nova Hollandia.

Vahlîi. 155. *C. ater nitidus*, capite lituris duabus, thorace scutelli-  
que margine pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 283. n. 32.  
Habitat in India, mediæ magnitudinis.

maurus. 5. *C. corpore griseo*. *Fn. suec.* 913.\* *Scop. ent. carn.* 352.  
*Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 476.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 29. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 23.  
*Cimex scutellaris cinereus*, scutello basi punctis duobus albis.  
*Sulz. hist. inf.* t. 4. f. d.  
*Schæff. ic.* t. 43. f. 3. 4. 15. 16.  
Habitat in Oriente, Calabria, in Europa quadruplo minor.

costatus. 156. *C. griseus*, alarum costa basi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 282. n. 22.  
Habitat in insula Rotterdam oceani australis, mauro pro-  
ximè affinis.

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Scutellatus*.) 213

totten-  
toita.

157. *C. ferrugineus immaculatus*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 21. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 24.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 435. n. 3? *Cimex fuscus*, &c.  
*Habitat in Arabia.*

leuco-  
grammes.

158. *C. griseus albo striatus*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 22. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 25.  
*Habitat in Italia, minor.*

ruficus.

159. *C. fuscus*, capite thoracisque anteriore ferrugineis, sub-  
tus albo fuscoque varius. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 282. n. 26.  
*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis, antennis*  
*ferrugineis apice fuscis.*

irroratus.

160. *C. virescens fusco irroratus*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 23. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 27.  
*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.*

lanatus.

161. *C. æneo-niger griseo-hirtus*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 342. n. 24. *mant. inf.* 2. p. 282. n. 28.  
*Pall. it.* 2. app. p. 729. n. 82.  
*Stoll cimic.* 2. t. 9. f. 61.  
*Habitat in Sibiria, oblongus, chrysomelæ majoris magni-*  
*tudine, frequens ad spicas elymi canini.*

lineatus.

6. *C. niger*, thorace lineis quinque, scutello tribus auran-  
tiis, abdomine flavo punctis nigris. *Scop. ent. carn.* 351.  
*Gron. zooph.* 689. *Euesli inf. helv.* t. 20. f. 6.  
*Mouff. inf.* 174. f. 5.  
*Poda inf.* 55. n. 2.  
*Buchholz de hepatomphal.* *Arg.* 1768. t. 2. f. 3.

nigro-  
lineatus.

- β) *C. ruber*, thorace lineis quinque, scutello tribus nigris,  
abdomine flavo: punctis nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 341. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 281. n. 17.  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 6.  
*Schaeff. elem.* t. 44. f. 1.  
*icon.* t. 2. f. 3.  
*Stoll cimic.* 2. t. 11. f. 9.  
*Habitat in Europæ magis australis potissimum montosis,*  
*in floribus mali et sambuci.*

semipunc-  
tatus.

162. *C. supra rufus*, thorace punctis decem, scutello lineis  
quatuor nigris. *Fab. sp. inf.* 2. p. 341. n. 16. *mant.*  
*inf.* 2. p. 281. n. 18.

*Stoll cimic. 2. t. 11. f. 8.*

*Habitat in America, Europa australi.*

- anchora- 163. *C. cyaneus*, scutello basi apiceque flavescente, abdominis margine flavo nigro punctato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 341. n. 17. mant. inf. 2. p. 281. n. 19.*  
*Habitat in America boreali, ubi mas rufus, ibi femina flavas.*
- grammi- 7. *C. corpore flavescente : supra lituris longitudinalibus*  
 cus. *nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 341. n. 18. mant. inf. 2. p. 281. n. 20.*  
*Habitat in Africa, mediæ magnitudinis.*
- Allioni. 164. *C. fuscus*, atomis numerosissimis albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342. n. 19. mant. inf. 2. p. 281. n. 21.*  
*Habitat in agro Pedemontano, grammico paulo minor.*
- fuligino- 8. *C. scutello fuliginoso : lituris quinque nigris ; posteriore*  
 fus. *alba bifida. Fn. suec. 914.\* Fuesli inf. helv. p. 25. n. 473.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 28. mant. inf. 2. p. 283. n. 33.*  
*Schaeff. ic. t. 11. f. 10-12.*  
*Habitat in Europa & Oriente.*
- litura. 165. *C. niger*, scutello lituris tribus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 29. mant. inf. 2. p. 283. n. 34.*  
*Habitat in Arabia.*
- tubercu- 166. *C. obscurus*, scutello scabro ante apicem tuberculato  
 latus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 30. mant. inf. 2. p. 283. n. 35.*  
*Habitat in Italia, litura paulo minor.*
- innatus. 167. *C. ater*, scutello basi pedibusque griseis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 31. mant. inf. 2. p. 283. n. 36.*  
*Habitat in Angliæ nemoribus.*
- arabs. 9. *C. thoracæ spinoso, corpore ovato livido, ano bidentato.*  
*Mus. Lud. Ulr. 168.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 32. mant. inf. 2. p. 383. n. 37.*  
*Sloane jam. 2. t. 237. f. 15. 16. Cimex filvestris sætens*  
*viridis triangularis.*  
*Habitat in America meridionali.*
- ferratus. 10. *C. thoracæ spinoso, corpore livido, abdominis marginibus ferratis. Mus. Lud. Ulr. 169.\**  
*Habitat in Arabia.*

- stolidus*. 11. *C. thorace subangulato, corpore supra viridi subtus flavo, ano bidentato. Mus. Lud. Ulr. 170.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 33. mant. inf. 2. p. 283. n. 38. Degeer inf. 3. t. 34. f. 3. Habitat in America australi & India.*
- Histrio*. 12. *C. thorace scabro depresso griseo pallidoque vario. Habitat in America australi, India, Sibiria.*
- filphoides*. 168. *C. niger, thorace posterius, scutello anterius margine linea media maculisque duabus albis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 29. Stoll cimic. p. 19. t. 4. f. 21. Habitat ad Caput bonæ spei, glaber, ovatus, magnitudine c. baccarum, facie filphæ.*
- diophthalmus*. 169. *C. ruber, thorace punctis duobus nigris, pedibus cyaneis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 30. f. 45. Habitat ad Caput bonæ spei, ovatus, glaber, magnitudine fere scarabæi stercorarii.*
- multi-punctatus*. 170. *C. ruber, thorace scutelloque punctis minutissimis plurimis nigris. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 30. Stoll cimic. p. 40. t. 9. f. 60. Habitat ad Caput bonæ spei, ovatus, glaber, subtus griseus, magnitudine grisei.*
- grandis*. 171. *C. rufus, maculis thoracis tribus scutellique quinque nigris. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 31. f. 46. Habitat in India, oblongus, convexus, glaber, subtus violaceus, magnitudine fere scarabæi stercorarii.*
- liligerus*. 172. *C. ferrugineus, scutello punctis nigris duobus fasciaque undulata albida. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 32. Stoll cimic. p. 40. t. 9. f. 59. Habitat in interioribus regionibus ad Caput bonæ spei, ovatus, convexus, glaber, magnitudine stockeri.*
- cinigerus*. 173. *C. cinereus, scutello basi punctis duobus albis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 32. f. 47. Habitat in Japonia, scarabæoide vix major.*
- ocellatus*. 174. *C. supra purpureus, thorace spinoso, scutello ocellis senis. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 60. f. 72.*

An huc quoque referendi a Seba *mus. vol. 4. delineati cimices, nigro punctulatus t. 95. f. 26. & nigro dense punctatus t. 95. f. 27?*

2134 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Scutellatus*.)

*Habitat in Japonia & Sina, oblongus, convexus, rufipedis magnitudine.*

*furina-* 175. *C. niger*, scutelli appendice rubra, elytris rubellis  
*menfis.* posterius nigricantibus. *Schroet. Abh. zur Naturg. P.*  
338. t. 2. f. 4.  
*Habitat in Surinamo.*

*exanthe-* 176. *C. nigricans*: supra punctis confertis albis. *Scop. ent.*  
*maticus.* carn. p. 121. n. 353.  
*Habitat prope Tergellum.*

*torridus.* 177. *C. fuscus*: punctis miniatis. *Scop. ann. histor. nat.* p. 110. n. 109.  
*Habitat in America torrida.*

*Frischii.* 178. *C. nigricans excavato-punctatus*, elytris coriaceis con-  
natis, alis nigris.  
*Frisc. inf.* 13. p. 26. n. 28. t. 24.  
*Habitat in Germania, rostro rufescente, antennarum ar-  
ticulis 4.*

*Schran-* 179. *C. obscure ferrugineus subtus flavus*, scutello carinato:  
*ckii.* carina & ad basin utrinque macula flavis. *Schrank*  
*Beytr. zur Naturg.* p. 78. f. 32.  
*Habitat in Austria.*

*variega-* 180. *C. fuscus*, abdominis limbo pedibusque luteo fuscoque  
*tus.* variis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 467. n. 65.  
*Habitat in Gallia.*

*fuscus.* 191. *C. nigro-ferrugineus*, scutello ad anum usque producto.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 467. n. 66.  
*Habitat in Gallia.*

*cuculla-* 182. *C. ater punctatus*, scutello ad anum usque producto.  
*tus.* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 468. n. 67.  
*Habitat in Gallia.*

*sagittifer.* 183. *C. supra ater, infra exalbidus nigro punctulatus*, scu-  
tello atro albo-punctato posterius sagittato.  
*Schaeff. ic. t.* 41. f. 1-3.  
*Habitat in Germania.*

*carneus.* 184. *C. thorace croceo, elytris incarnatis.*  
*Schaeff. ic. t.* 57. f. 3.  
*Habitat in Germania.*



flavo-viridis. 185. *C. flavo-virescens*, scutelli apice nitide albo.  
*Schaeff. ic. t. 109. f. 8. 9.*  
*Habitat in Germania.*

carunculatus. 186. *C. flavo viridique varius*, abdomine atro : margine flavo, ano tuberculis sex sanguineis.  
*Schaeff. ic. t. 244. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*

†† thorace utrinque spina armato, spinosi.

Taurus. 187. *C. griseus*, thoracis spinis porrectis compressis truncatis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 34. mant. inf. 2. p. 283. n. 39.*  
*Habitat in Coromandel, magnus.*

Cervus. 188. *C. viridis*, elytris fuscis : margine albo, thoracis spinis obtusis subbididis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 283. n. 40.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*

bidens. 23. *C. ovatus griseus*, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Fn. suec. 921.\* Fuesli inf. helv. p. 25. n. 482. Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 35. mant. inf. 2. p. 283. n. 41.*  
*Degeer inf. 3. p. 259. n. 6. t. 13. f. 9. Cimex ovatus fuscus, &c.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 72.*  
*Habitat in Europa.*

sanguinipes. 189. *C. fuscus*, thoracis spinis obtusis, scutello apice albido, abdominis margine maculato, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 36. mant. inf. 2. p. 283. n. 42.*  
*Habitat in Italia, statura grisei.*

rufipes. 24. *C. ovatus griseus*, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris.  
*Fn. suec. 922.\* Fuesli inf. helv. p. 25. n. 483. Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 37. mant. inf. 2. p. 283. n. 43.*  
*Degeer inf. 3. p. 253. n. 2.*  
*Raj. inf. p. 54. n. 2.*  
*Schaeff. icon. t. 57. f. 6. 7.*  
*Habitat in Europa frequens.*

lentiginosus. 186. *C. ovatus griseus*, thorace obtuse spinoso, elytrorum punctis antennisque fuscis ; articulis 2. 3. 4. lividis, membrana maculis lentiginosis adspersa, *Mus. Lesk. p. 118. n. 78. b.*  
*Habitat in Europa.*



2136 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Spinofus*.)

- multicolor. 587. *C. ovatus fuscus*, thorace elytrisque rufo-griseis, antennis albo annulatis, femoribus nigris basi albis, tibiis albis: apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p. 118. n. 78. c.*  
*Habitat in Europa.*
- luridus. 190. *C. thorace obtuse spinoso subvirescente, elytris griseis, macula fusca, clypeo emarginato. Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 38. mant. inf. 2. p. 283. n. 44.*  
*Habitat in Angliæ nemoribus.*
- nigricornis. 191. *C. subfetrugineus, thorace obtuse spinoso, spinis antennisque nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 39. mant. inf. 2. p. 284. n. 45.*  
*Habitat in Saxonia.*
- nigrispinus. 192. *C. supra griseus, thorace obtuse spinoso, capite spinisque nigris, antennis annulo albo. Fabr. mant. inf. 2. p. 284. n. 46.*  
*Habitat in Sina, staturâ & magnitudine nigricornis.*
- ictericus. 25. *C. ovatus incarnatus subtus flavus, thorace acute spinoso. Amæn. acad. 6. p. 399. n. 41.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 40. mant. inf. 2. p. 284. n. 47.* Cimex thorace spinoso, oblongus supra rufescens subtus flavus.  
*Habitat in America & Calabria.*
- floridanus. 26. *C. ovatus niger rubro varius, scutello maculis tribus rubris. Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 49. mant. inf. 2. p. 284. n. 52.*  
*Habitat in America; mediæ magnitudinis.*
- armatus. 193. *C. thorace acute spinoso, scutello nigro: punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris. Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 45. mant. inf. 2. p. 284. n. 53.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- hæmorrhous. 27. *C. oblongus niger, abdomine rufo, elytris punctis linearibus quinque nigris. Amæn. acad. 6. p. 400. n. 45.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 46. mant. inf. 2. p. 284. n. 54.*  
*Habitat in America.*

*An huc etiam referendæ species a Seba vol. mus. 4. delineatæ flavo testulatus t. 95. f. 25. spinosus t. 95. f. 31. 32. quadrispinosus t. 95. f. 33. 34. hispidus t. 97. f. 35.*

- marginatus. 128. *C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acuto, antennis rufis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 70. mant. inf. 2. p. 287. n. 82.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 719. n. 28. Fn. suec. 923.\* Scop. ent. carn. 363. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 484.* Cimex oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.  
*Fn. suec. 1. n. 662.* Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.  
*Degeer inf. 3. p. 272. n. 17.* Cimex auricularis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 446. n. 20.*  
*Schæff. ic. t. 41 f. 415.*  
*Stoll cimic. 2. t. 5. f. 37.*  
*Habitat in Europæ plantis.*
- spiniger. 194. *C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadrispinoso.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 71. mant. inf. 2. p. 287. n. 83.*  
*Habitat in Italia, statura marginati, at duplo minor.*
- pugnator. 195. *C. oblongus supra fuscus subtus flavescens, thorace acute spinoso, antennis rufis apice nigris.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 84.*  
*Habitat Tranquebariæ, statura & magnitudine spinigeri.*
- fasciculatus. 196. *C. cinereus, thorace subspinoso, alis fuscis, pedibus fasciculato-tuberculatis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 72. mant. inf. 2. p. 287. n. 85.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, marginato duplo minor.*
- insidiator. 197. *C. supra rufus subtus flavescens, thorace acute spinoso.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 86.*  
*Habitat in Barbaria, quadrato minor, alis albidis.*
- quadratus. 198. *C. supra fuscus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, abdomine quadrato.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 73. mant. inf. 2. p. 287. n. 87.*  
*Stoll cimic. 2. t. 5. f. 36.*  
*Habitat in Germania.*
- laetatus. 199. *C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris: striga posteriore alba.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 88.*  
*Habitat Tranquebariæ, statura quadrati, at minor.*

2138 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Spinofus*.)

- velox. 200. C. thorace acute spinoso bipunctato, elytris puncto  
baseos strigaeque flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 74*  
*mant. inf. 2. p. 287. n. 88.*  
*Habitat in America.*
- Merianæ. 201. C. thorace subspinoso, elytris fuscis albo reticulatis;  
abdominis basi spinosa. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 75*  
*mant. inf. 2. p. 287. n. 89.*  
*Merian. inf. surin. t. 51.*  
*Habitat in Surinamo.*
- bipustula- 29. C. oblongiusculus niger, punctis verticis duobus coc-  
tus, cineis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 47. mant. inf. 2. p. 284. n. 55.*  
Cimex thorace spinoso niger, elytris lividis, capite  
punctis duobus coccineis.  
*Degeer inf. 3. p. 334. n. 8. t. 34. f. 10.* Cimex balteatus  
*Habitat in America meridionali.*
- scaber. 30. C. oblongiusculus testaceus, thorace angulato-spinoso,  
alis nigris, femoribus denticulatis. *Amæn. acad. 6. p.*  
*400. n. 43.\**  
*Habitat in Java.*
- punicus. 31. C. ovatus niger, scutello lunula apiceque rubris. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 346. n. 48. mant. inf. 2. p. 284. n. 56.*  
*Habitat in Africa, magnitudine c. baccarum.*
- Ypsilon. 32. C. ovatus lividus, scutello ypsilon flavo inscripto. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 346. n. 49. mant. inf. 2. p. 284. n. 57.*  
*Degeer inf. 3. p. 332. n. 6. t. 34. f. 7. 8.* Cimex ypsilon  
æneus.  
*Habitat in America meridionali.*
- clypeatus. 33. C. ovatus viridis, fascia flavicante, capite clypeato. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 346. n. 50. mant. inf. 2. p. 284. n. 58.*  
*Gron. zooph. 691.* Cimex ovatus, thorace utrinque ac-  
leato fascia transversali flavicante, scutello gibboso,  
capite clypeato, ano ferrato.  
*Habitat in Sina.*
- albicollis. 202. C. supra viridis, thorace dentato, capite thoracifera  
antere scutellique basi flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 34*  
*n. 51. mant. inf. 2. p. 284. n. 59.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 4.* Cimex flavicollis.  
*Habitat in Jamaica, subius flavescens.*

- punctatus. 34. *C. ovatus punctatus*, tibiis annulo albo. *Fn. succ.* 924.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 345. n. 41. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 48. Cimex thorace subspinoso fuscus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.  
*Degeer inf.* 3. p. 269. n. 14.  
*Habitat in America boreali, subtus griseus; antennis nigris.*
- varius. 203. *C. supra*, rufus subrus flavescens, thorace obtuse spinoso, scutello nigro basi apiceque albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 284. n. 49.  
*Habitat in Hispania, statura & magnitudine albipedis, capite antennisque nigris; pedibus rufis.*
- albipes. 204. *supra nigricans*, thoracis subspinosi margine scutellique apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 345. n. 42. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 50.  
*Habitat in Italiâ, subtus pallidus, staturâ punctati;*
- dentatus. 205. *C. thorace acute spinoso ferrulato, corpore cinereo nigroque vario.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 346. n. 43. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 51.  
*Habitat in India.*
- hæmorrhoidalis. 35. *C. ovato-oblongus griseus*, thorace acute spinoso; antennis nigris, sterno porrecto. *Fn. succ.* 925.\* *Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 485.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 52. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 60. Cimex thorace obtuse spinoso subvirescens, antennis nigris, sterno porrecto.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 465. n. 63.  
*Degeer inf.* 3. p. 254. n. 3. t. 35. f. 7.  
*Sulz. hist. inf.* t. 11. f. 72.  
*Schaeff. ic.* t. 57. f. 8?  
*Habitat in Europæ graminosis.*
- spinidens. 206. *C. fuscus*, thorace acute spinoso, scutello apice elytris margine albis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 285. n. 61.  
*Habitat Tranquebariæ, magnus, spinis unidentatis.*
- oculatus. 207. *C. griseus*, scutello punctis duobus flavis, tarsis anterioribus apice compresso membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 53. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 62.  
*Habitat in Sina.*
- annulatus. 208. *C. griseus*, tibiis albo annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 54. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 63.  
*Habitat in Virginia.*

- quadri- 209. *C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloque punctis*  
*pallulatus. duobus rufis. Fabr. sp. inf. 2. p. 347. n. 55. mant. inf.*  
*2. p. 285. n. 64.*  
*Habitat in America.*
- maculatus. 210. *C. virescens, thorace obtuse spinoso : maculis qua-*  
*tuor, scutello elytrisque apice fuscis. Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 347. n. 56. mant. inf. 2. p. 285. n. 65.*  
*Habitat in America, elytrorum apice rarius concolore.*
- pugnax. 211. *C. oblongus virescens, thorace acute spinoso, anten-*  
*nis rufis. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 57. mant. inf. 2.*  
*p. 285. n. 66.*  
*Habitat in America.*
- emeritus. 212. *C. virescens, thorace acute spinoso, abdomine lineis*  
*duabus albis. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 58. mant. inf.*  
*2. p. 285. n. 67.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- gladiator. 213. *C. thorace acute spinoso scutelloque flavescentibus*  
*nigro punctatis elytris punctis albis scabris. Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 348. n. 59. mant. inf. 2. p. 285. n. 68.*  
*Stoll cimic. 2. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in America & ad Caput bonæ spei.*
- furcatus. 214. *C. fuscus thorace acute spinoso ferrato, clypeo acumi-*  
*nato bifido. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 60. mant. inf.*  
*2. p. 285. n. 69.*  
*Habitat in Patagonia, nonnunquam totus griseus.*
- pugilla- 215. *C. fuscus, subtus fulvus nigro punctatus : margine*  
*tor. flavo thorace acute spinoso. Fabr. sp. inf. 2. p. 348.*  
*n. 61. mant. inf. 2. p. 285. n. 70.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnus.*
- violor. 216. *C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice rufo,*  
*pedibus pallidis nigro punctatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 348.*  
*n. 62. mant. inf. 2. p. 285. n. 71.*  
*Habitat in Brasilia, & insulis Americæ oppositis.*
- liliatus. 217. *C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro : margine fasci-*  
*que posteriore flavis, femoribus posterioribus ferratis.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 63. mant. inf. 2. p. 286. n. 74.*  
*Habitat in America.*



INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Spinosus*.) 214

- bellator. 218. *C. supra fuscus subtus flavescens, antennis atris albo annulatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 73.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- armiger. 219. *C. griseus, thorace acute spinoso, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 64. mant. inf. 2. p. 286. n. 74.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali.*
- scorbuticus. 220. *C. fuscus, thorace obtuse spinoso, pedibus pallidis nigro punctatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 65. mant. inf. 2. p. 286. n. 75.*  
*Habitat in America.*
- delirator. 221. *C. flavescens nigro punctatus, thorace acute spinoso posterius elytrisque fuscis. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 76.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*
- melacanthus. 222. *C. obscure ferrugineus, thoracis spinis acutis atris, abdomine atro: vittis flavescens. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 66. mant. inf. 2. p. 286. n. 77.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus.*
- aggressor. 223. *C. corpore flavescente, thoracis spinis acutis subconcoloribus, ano quadridentato. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 67. mant. inf. 2. p. 286. n. 78.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- vittatus. 224. *C. virescens, thorace subspinoso, elytris vitta submarginali flava. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 68. mant. inf. 2. p. 286. n. 79.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, antennis ferrugineis, alis albidis.*
- hamatus. 225. *C. viridis, thorace acute spinoso, abdomine ferrato: denticulis nigris. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 80.*  
*Habitat in India, magnus, antennis nigris.*
- defensor. 226. *C. corpore viridi, thoracis spinis acutis nigris, ano quadridentato. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 69. mant. inf. 2. p. 287. n. 81.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- valgus. 36. *C. oblongus niger, thorace ferrato, femoribus posterioribus incurvis tibiisque posterioribus unidentatis. Musc. Lud. Ulr. 171.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 76. mant. inf. 2. p. 288. n. 91.*



2142 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Spinofus*.)

*Habitat ad Caput bonæ spei, basi abdominis nunc inermi, nunc quadridentata.*

tragus. 227. *C. thoracis spinis compresso-lunatis ferratis, tibiis posterioribus membranaceo-ferratis. Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 92.*

*Habitat in Sina, statura & magnitudine valgi.*

tenebrosus. 228. *C. thorace ferrulato, femoribus posterioribus incurvis clavatis, abdomine basi trispinoso. Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 93.*

*Habitat in India, statura & magnitudine valgi.*

fulvicornis. 229. *C. fuscus, thorace ferrato, femoribus bidentatis: posterioribus multidentatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 94.*

*Habitat in India, magnus, antennis ferrugineis.*

femoratus. 230. *C. thorace ferrulato, femoribus posterioribus incurvis dentatis, tibiisque posterioribus compressis. Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 77. mant. inf. 2. p. 288. n. 95.*

*Habitat in India.*

curvipes. 231. *C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posterioribus incurvis. Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 78. mant. inf. 2. p. 288. n. 96.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, statura femorati.*

magnipes. 232. *C. obscurus, thorace ferrato, femoribus multispinosis: posterioribus incrassatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 97.*

*Habitat in Sina, femorato triplo minor.*

membranaceus. 233. *C. thorace acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 79. mant. inf. 2. p. 288. n. 98.*

*Habitat in insula S. Jago promontorii viridis.*

quadrispinosus. 37. *C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso. Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 91. mant. inf. 2. p. 290. n. 115. Degeer inf. 3. p. 347. n. 22. t. 35. f. 7.*

*Habitat in America meridionali, antennis longissimis capillaribus.*

phyllopus. 113. *C. nigricans, thorace immaculato, elytris fascia albicante, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 80. mant. inf. 2. p. 289. n. 99. Stoll cimic. 2. t. 8. f. 54.*

*Habitat in America australi, mediæ magnitudinis.*

- auctus. 235. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fulvis, elytris fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 81. mant. inf. 2. p. 289. n. 100.*  
*Habitat in Cayenna, phyllopodi proxime affinis.*
- Gonagra. 236. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: puncto cinereo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 82. mant. inf. 2. p. 289. n. 101.*  
*Habitat in insula S. Thomæ, in oceano americano.*
- kermesinus. 237. C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posterioribus multidentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 83. mant. inf. 2. p. 289. n. 102.*  
*Degger inf. 3. p. 337. n. 11: t. 34. f. 15. Cimex rubro balreatus.*  
*Habitat in Surinamo, antennis fuscis.*
- australis. 238. C. oblongus niger, thorace subspinoso: fascia anteriore rubra, tibiis posterioribus basi membranaceis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 84. mant. inf. 2. p. 289. n. 103.*  
*Habitat in insula Tahiti maris australis.*
- cruciger. 239. C. oblongus supra niger, thorace acute spinoso lineis, elytris cruce ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 85. mant. inf. 2. p. 289. n. 104.*  
*Habitat in Brasilia.*
- sancus. 240. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso, elytris nigris: cruce ferruginea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 86. mant. inf. 2. p. 289. n. 105.*  
*Habitat in Brasilia.*
- latus. 241. C. viridis, capite, fascia elytrorum abdominisque femoribusque flavis, elytris atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 289. n. 106.*  
*Habitat in Cayenna, magnus, oblongus.*
- lunatus. 242. C. niger, thorace arcu anteriore, elytris fascia, corpore maculis albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 289. n. 107.*  
*Habitat in Cayenna, statura latti.*
- elatus. 243. C. thorace acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis ferrugineis, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 108.*  
*Habitat in Cayenna, lunato minor.*

2144 INSECTA HEMIPTERA. *Cimex*. (*Spinofus*.)

- balteatus. 243. *C. oblongus ferrugineus*, elytris linea transversa flavâ, femoribus posterioribus multidentatis. *Mant. p. 534. Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 87. mant. inf. 2. p. 290. n. 109. Drury inf. 1. t. 43. f. 3. Habitat in America meridionali.*
- sinuatus. 244. *C. lividus*, thorace acute spinoso, tibiis posterioribus compressis sinuatis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 110. Habitat in Cayenna, statura ferripedis, at major.*
- ferripes. 245. *C. oblongus rufus*, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 88. mant. inf. 2. p. 290. n. 111. Habitat in nova Hollandia.*
- dentipes. 246. *C. elongatus*, femoribus posterioribus elongatis ferratis, corpore fusco subtus lateribus albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 112. Habitat in Sierra Leon Africæ, lineari proxime affinis.*
- linearis. 247. *C. elongatus fuscus*, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus elongatis denticulatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 89. mant. inf. 2. p. 290. n. 113. Habitat in Sina.*
- crenula-  
tus. 248. *C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus posterioribus dentatis, corpore atro. Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 90. mant. inf. 2. p. 290. n. 114. Drury inf. 1. t. 45 f. 1. Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis, capite nigro, rubro lineato.*
- spinifex. 249. *C. linearis cinereus*, scutello bispinoso. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 33. f. 48. Habitat - - - facie & magnitudine tipularii.*
- fetofus. 250. *C. oblongus griseus*, thorace capite pedibusque hispidis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 33. Habitat in America australi & India, annulati magnitudine, at duplo angustior.*
- acutus. 251. *C. linearis cinereus*, thoracis margine albo, abdomine punctis sex nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 34. Habitat - - - magnitudine & facie clavati.*

clavatus. 252. *C. lineari-oblongus ferrugineus, femoribus posterioribus incrassatis, scutello immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 34. f. 49.*

*Habitat in Japonia, annulati magnitudine, sed paulo angustior.*

jaculus. 253. *C. linearis fuscus, femoribus posterioribus incrassatis spinosis, scutello linea alba. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 34. f. 50.*

*Habitat. — — — magnitudine & facie pilosi.*

pilosus. 254. *C. linearis ferrugineus, linea capitis pectorisque laterali albida. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*

*Habitat — — — clavato paulo minor, subtus pallidus.*

villosus. 255. *C. spinoso-tuberculatus totus piceus villosus. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*

*Stoll cimic. t. 13. f. 90.*

*Habitat — — — annulato major.*

crux. 256. *C. niger, thorace flavo: cruce nigra. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*

*Stoll cimic. t. 9. f. 65.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, personati magnitudine.*

pungens. 257. *C. oblongus supra fuscus subtus albidus, pectore abdominisque lateribus nigro punctatis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 36.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, annulati magnitudine, glaber.*

notatus. 258. *C. oblongus supra ferrugineus subtus cinereus, abdomine sextuplici serie punctorum nigrorum. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 37.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, glaber, vix annulati magnitudine.*

trigonus. 259. *C. testaceus, elytris scutelloque puncto albo. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 37.*

*Stoll cimic. t. 11. f. 78. 79.*

*Habitat in Japonia & Surinamo, glaber, c. abietis magnitudine.*

murica- 260. *C. oblongus cinereus muricatus, tibiis posterioribus tus. basi dilatatis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 38. f. 51.*

*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine c. lyoscyami, femorato similis.*

2146 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Spinosus*.)

- unipunctatus. 261. *C. oblongus testaceus*, elytris puncto nigro. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 38. f. 52.*  
*Habitat in Japonia, glaber, trigono plus quam duplo major.*
- thoracicus. 262. *C. oblongus viridi-aureus*, thoracis margine luteo.  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 39.*  
*Stoll cimic. t. 8, f. 55. A.*  
*Habitat in India & Surinamo, annulati magnitudine, sed longior.*
- analis. 263. *C. oblongus viridis*, abdomine rubro, ano nigro. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 39.*  
*Stoll cimic. t. 10. f. 72. B.*  
*Habitat in India & Surinamo, thoracici magnitudine, sed paulo latior.*
- transversus. 264. *C. rotundatus viridis*, capite thoraceque anterieus flavis.  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 40. f. 53.*  
*Habitat in Africa, juniperini magnitudine, glaber.*
- humeralis. 265. *C. ovatus viridis*, elytris basi luteis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 40. f. 54.*  
*Habitat - - - juniperino quadruplo major, punctis impressis.*
- subulatus. 266. *C. ovatus virefcens*, scutelli linea elevata subulata.  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 41. f. 55.*  
*Habitat - - - humeralis magnitudine & facie, subius albidus.*
- Comma. 267. *C. rotundatus cinereus*, scutello linea flava. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 41. f. 56.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine c. baccarum.*
- reticulatus. 268. *C. cinereus nigro varius*, thorace ferrato. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 42.*  
*Stoll cimic. t. 16. f. 111.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glaber, magnitudine c. baccarum.*
- Fullo. 269. *C. ovatus niger*, albo irroratus, capite thoraceque linea alba. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 42. f. 57.*  
*Habitat in Japoniæ insula Dezima, rufipede major, scarabæo fulloni similis.*
- tibialis. 270. *C. ovatus brunneus albo fuscoque lineatus*, scutello maculis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 43. f. 58.*  
*Habitat - - - magnitudine c. baccarum, glaber.*



fulcatus. 271. *C. ovatus cinereus fusco-nebulosus, abdomine fulcato.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 43.*

*Stoll. cimic. t. 6. f. 47.*

*Habitat in India, c. baccarum paulo major.*

fuscus. 272. *C. oblongus ferrugineo-fuscus, antennis pedibusque*  
*hirsutis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 44.*

*Habitat - - - valgi fere magnitudine.*

sordidus. 273. *C. cinereus, thorace denticulato, antennis pedibusque*  
*piloso-hispidis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 44.*

*Habitat in Japonia, marginati magnitudine.*

senegalen-274. *C. thorace acute spinoso flavo: maculis nigricantibus;*  
 fis. *scutello viridi-striato posterius flavo, elytris dimidiato*  
*nigricantibus: striis obliquis viridibus, posterius fuscis:*  
*striis longitudinalibus nigris, corpore rubro: margine*  
*nigro maculato.*

*Drury inf. 2. p. 70. t. 38. f. 4. Cimex variegatus.*

*Habitat ad fluvium Senegal, ano denticulato, alis cine-*  
*rascentibus nigro-reticulatis.*

bidentatus. 275. *C. longus fuscus, rostro arcuato, thorace subtus an-*  
*terius bidentato. Geoffr. inf. par. 1. p. 438. n. 6.*

*Habitat in Gallia.*

Leviathan. 276. *C. planus fuscus, thorace elytrisque alatis, capite*  
*anterius cornuto, antennis brevibus crassus. Geoffr. inf.*  
*par. 1. p. 439. n. 9.*

*Habitat in Gallia.*

rostratus. 277. *C. oblongus fuscus immaculatus, thorace utrinque*  
*obtuse angulato, capite inter antennas bidentato.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 446. n. 21.*

*Habitat in Gallia.*

acutangu-278. *C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque*  
 lus. *angulato: margine lævi. Geoffr. inf. par. 1. p. 447. n. 22.*  
*Habitat in Gallia.*

immacula-279. *C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque*  
 tus. *acute angulato: margine spinoso. Geoffr. inf. par. 1.*  
*p. 447. n. 23.*

*Habitat in Gallia.*

porphyrop-280. *C. ovatus flavo-viridis, thorace angulato, elytris*  
 terus. *pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roseis.*  
*Degeer inf. 3. p. 258. n. 5. t. 13. f. 152.*



2148 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (Spinosus.)

*Habitat in Europæ arboribus herbisque, mediæ magnitudinis ; an hujus tribus ?*

pustulatus. 281. C. ovatus rufus : maculis flavescentibus sparsis, thorace angulato, scutello elongato. *Degeer inf. 3. p. 329. n. 2. t. 34. f. 2.*

*Habitat in India, varioloso paulo minor, an hujus tribus ?*

leucostictus. 282. C. ovatus flavo-griseus, thorace acute spinoso scutelloque punctis excavatis nigris, elytris punctis elevatis albis. *Degeer inf. 3. p. 331. n. 5. t. 34. f. 6.*

*Habitat in Surinamo, satis magnus.*

peninsula-nicus. 283. C. subrotundus totus viridis, thorace angulato. *Degeer inf. 3. p. 330. n. 4. t. 34. f. 5.*

*Habitat in Pennsylvania ; an hujus tribus ?*

litteratus. 284. C. oblongo-ovatus griseus, scutello ypsilon flavo imbricato, antennis pedibusque testaceis.

*Degeer inf. 3. p. 333. n. 7. t. 34. f. 9. Cimex Ypsilon griseus. Habitat in Surinamo, ypsilon affinis.*

tigripes. 285. C. oblongus supra fuscus subtus griseus, femoribus dentatis nigro maculatis. *Degeer inf. 3. p. 335. n. 10. t. 34. f. 12.*

*Habitat in Surinamo, muscæ domesticæ magnitudine.*

austriacus. 286. C. ovatus ferrugineus, scutello interstinato : fasciâ nigra. *Schranck Beytr. 2. Naturg. 9. 33. p. 78. t. 3. f. 16.*

*Habitat prope Mauer Austriæ inferioris.*

chalybeus. 588. C. nigro-æneus immaculatus. *Mus. Lesh. p. 118. n. 78. d.*

*Habitat in Europâ.*

beryllinus. 589. C. thorace obtuse spinoso utrinque dentato, spinarum apicibus clypeoque bifido ex cæruleo virescentibus.

*Mus. Lesh. p. 118. n. 79.*

*Habitat in Europa, antennarum articulo quarto posterioris dimidio albo.*

adultus. 590. C. thorace acute spinoso, capite, spinarum apice, scutelli medio, elytris utrinque ad basin scutelli membranarumque marginibus externis nigris. *Mus. Lesh. p. 118. n. 80.*

*Habitat in Europa.*

- bidens. 591. C. thorace obtuse spinoso, elytrorum margine interno & posteriore anoque bidentato sanguineis, elytris pallidis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 81.*  
*Habitat in Europa.*
- bilobus. 592. C. thorace obtuse dentato, elytris griseis punctis aut rufescentibus, ano bilobo. *Mus. Lesk. p. 118. n. 82.*  
*Habitat in Europa.*
- distinctus. 593. C. oblongus, thorace obtuse spinoso subtus luteo, supra antennisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 119. n. 83.*  
*Habitat in Europa.*
- rubricornis. 594. C. thorace hispido obtuse spinoso, antennis hispidis coccineis: articulo ultimo nigro. *Mus. Lesk. p. 119. n. 84.*  
*Habitat in Europa.*
- aculeatus. 595. C. griseus, thorace spinoso: spinis antennisque articulis secundo tertioque nigris. *Mus. Lesk. p. 119. n. 85.*  
*Habitat in Europa.*
- conspersus. 596. C. thorace obtuse spinoso: antennis punctis duobus impressis, abdomine subtus utrinque nigro punctato, gutta ad anum nigra. *Mus. Lesk. p. 119. n. 86.*  
*Habitat in Europa.*

††† thorace mutico.  
† rotundati f. ovati.

- aurantius. 287. C. aurantius, capite, thoracis margine anteriori, abdominis maculis marginalibus pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 116. Sulz. hist. inf. t. 10. f. 10.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 5. Cimex incarnatus.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 46.*  
*Stoll cimic. 2. t. 6. f. 39. & t. 2. f. 10. A.*  
*Habitat in Java, Zeilona, India, magnus.*
- punctum. 288. C. supra nigricans, thorace posterius aurantio, elytris albis: puncto nigro. *Fabr. mant. inf. 2. p. 291. n. 117.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 9. Cimex nigripes.*  
*Stoll cimic. 2. t. 6. f. 40.*  
*Habitat in Java, magnus.*
- melanopus. 289. C. supra sanguineus, scutello maculis duabus, elytris unica nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 92. mant. inf. 2. p. 291. n. 118.*

2150 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.)

*Drury inf. 2. t. 36. f. 5. Cimex incarnatus.*

*Stoll cimic. 2. t. 2. f. 10.*

*Habitat in India, scutelli maculis interdum nullis.*

torquatus. 290. *C. viridis, capite thoraceque anterieus flavescens.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 93. mant. inf. 2. p. 291. n. 119.*  
*Habitat in India, Italia.*

rutilans. 291. *C. viridi-æneus, thorace fascia anteriore sanguinea, scutello elytrisq. anterieus flavescens.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 94. mant. inf. 2. p. 291. n. 120.*  
*Stoll cimic. 2. t. 18. f. 122. A.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnus, antennis nigris.*

guttatus. 292. *C. viridi-æneus albido punctatus, tibiis anterioribus membranaceis dilatatis.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 291. n. 121.*  
*Habitat in Siam, magnus.*

viridulus. 39. *C. supra flavus: punctis viridibus, subtus viridis.* *Mus. Lud. Ulr. 172. \* Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 95. mant. inf. 2. p. 291. n. 122.*  
*Habitat in America australi & India.*

peregrinator. 40. *C. suborbicularis depressus griseo pallidoque variis, thorace scabro.* *Mus. Lud. Ulr. 173. \**  
*Habitat in America australi & India.*

bipunctatus. 41. *C. pallide griseus: puncto albo utrinque ad basem scutelli.* *Mus. Lud. Ulr. 174.*  
*Habitat in Syria.*

sempunctatus. 42. *C. rotundatus luteo nigroque variis, thorace luteo: punctis sex nigris.* *Mus. Lud. Ulr. 175. \* Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 105. mant. inf. 2. p. 293. n. 136.*  
*Habitat in America australi, India, Sibiria.*

signatus. 293. *C. griseus, scutello vitta nigra.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 106. mant. inf. 2. p. 293. n. 137.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*

gravis. 294. *C. fuscus, scutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 107. mant. inf. 2. p. 293. n. 138.*  
*Habitat in nova Seelandia, mediæ magnitudinis.*

Porsk. lili. 295. *C. viridis, thoracis abdominisque marginibus sanguineis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 356. n. 108. mant. inf. 2. p. 29. n. 139.*  
*Habitat in Oriente.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.) 2151

Hylneri. 296. *C. virescens*, thorace fascia sanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 293. n. 140.

*Habitat* Tranquebariæ, *statura & magnitudine cinâi*, *subtus flavescens*.

cruentus. 297. *C. viridis*, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 109. *mant. inf.* 2. p. 293. n. 141.

*Habitat in* Surinamo.

geniculatus. 298. *C. obscurus*, thoracis abdominisque margine flavescente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 293. n. 142.

*Habitat in* Cayenna, *magnus*, *capite nigro*.

mixtus. 299. *C. punctatus* griseus nigro maculatus, abdominis margine nigro : punctis flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 294. n. 143.

*Habitat in* Cayenna, *magnus*, *antennis fuscis*.

tripterus. 300. *C. flavo rufoque varius*, antennis nigris : ultimo articulo apice albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 294. n. 144.

*Habitat in* Cayenna, *statura mixti*, *at paulo minor*.

griseus. 43. *C. griseus*, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 926.\*

*Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 110. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 145. *Cimex ovatus* griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, ventre antice spinoso.

*Degeer inf.* 3. p. 261. n. 8. t. 14. f. 9. *Cimex betulæ*.

*Habitat in* Europa, *antennis nigris flavo annulatis*.

interstinctus. 44. *C. griseus*, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 927.\*

*Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 111. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 146.

*Cimex ovatus* griseus, abdominis margine nigro maculato.

*Habitat in* Europæ *cultis*.

papillo-lus. 301. *C. fuscus*, antennis nigris, sterno gibbo compresso. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 112. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 147.

*Stoll cimic.* 2. t. 1. f. 2.

*Drury inf.* 1. t. 43. f. 2.

*Habitat in* Sierra Leon Africa.

funebri. 302. *C. ater*, antennis, pedibus alisque concoloribus. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 113. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 148.

*Habitat in* Sierra Leon Africa.

2132 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.)

ruficor- 303. *C. ater*, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 356. n. 114.  
nis. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 149.  
*Habitat in India.*

baccarum. 45. *C. subfulvus*, abdominis margine fusco maculato. *Fa.  
suec.* 928. *Scop. ent. carn.* 360. *Fabr. sp. inf.* 2. p.  
356. n. 115. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 150. *Fuesli inf.*  
*helv.* p. 25. n. 486.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 466. n. 64. *Cimex fuscus*, antennis  
abdominisque margine nigro croceoque variegatis.

*Degeer inf.* 3. p. 257. n. 4. t. 14. f. 5. *Cimex verbasci.*  
*Raj. inf.* p. 54. n. 2. *Cimex* scapulis magnis exstantibus,  
macula e flavo rubente in centro crucis dorsalis.

*List. log.* 396. *mut. t.* 31. f. 19. *Cimex* ex luteo virescenti  
infuscatus ad alvi margines nigris maculis.

*Jonst. inf. t.* 17. f. 9.

*Schaeff. icon. t.* 57. f. 1. 2.

*Habitat in Europæ baccis frequens.*

Cribrum. 304. *C. fuscus*, thorace scutelloque punctatis, abdominis  
punctis genubusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 357.  
n. 116. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 151.

*Habitat in America, magnus, antennis nigris.*

brevicor- 305. *C. obscure cupreus*, antennis brevibus compressis, fer-  
nis. moribus anterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p.  
294. n. 152.

*Habitat ad Sina, statura c. baccarum.*

glaucus. 306. *C. glaucus*, elytris apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2.  
p. 357. n. 117. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 153.

*Habitat in nova Hollandia.*

Janus. 307. *C. rotundatus* supra sanguineus, capite scutelli basi  
alisque atris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 357. n. 118. *mant.*  
*inf.* 2. p. 295. n. 154.

*Drury inf.* 3. t. 46. f. 7. *Cimex afer.*

*Stoll cimic.* 2. t. 6. f. 41.

*Schroet. Abh.* 1. t. 2. f. 4.

*Habitat in America.*

dumosus. 46. *C. subrotundus* griseus, margine undique sanguineo.  
*Fa. suec.* 929.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 355. n. 101. *mant.*  
*inf.* 2. p. 293. n. 131.

*Habitat in Europa.*



INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.) 2153

- tripunctatus. 308. *C. rotundatus flavescens*, capite lineis, scutello punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 102. mant. inf. 2. p. 293. n. 132.*  
*Habitat in America.*
- atomarius. 309. *C. griseo fuscoque varius*, alis albis fusco punctatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 103. mant. inf. 2. p. 293. n. 133.*  
*Habitat in insula Terræ novæ.*
- nubilus. 310. *C. griseo nigroque varius*, alis albis nigro striatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 104. mant. inf. 2. p. 293. n. 134.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei.*
- tristriatus. 311. *C. flavescens*, elytris apice puncto ocellari atro, abdomine lineis tribus albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 293. n. 135.*  
*Habitat in agro Pedemontano, statura parva nubili.*
- variolosus. 47. *C. flavus*, thorace subspinoso punctis fuscis excavatis varioloso, scutello basi gibbo.  
*Habitat in America majusculus, annon ad præcedentem tribum relegandus?*
- juniperinus. 48. *C. subrotundus viridis*, margine undique scutelloque apice flavo. *Fn. suec. 930.\* Scop. ent. carn. 359. Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 98. mant. inf. 2. p. 292. n. 125. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 487. Geoffr. inf. par. 1. p. 464. n. 61. Cimex subrotundus viridis.*  
*Raj. inf. p. 53. n. 1. Cimex filvestris viridis.*  
*Degeer inf. 3. p. 231. t. 13. f. 1. 2.*  
*Habitat in Europæ juniperetis.*
- smaragdulus. 312. *C. viridis*, scutello punctis tribus baseos flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 99. mant. inf. 2. p. 292. n. 126.*  
*Habitat in insula Madera.*
- beryllus. 313. *C. pallidus*, thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 292. n. 127.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*
- calidus. 314. *C. supra fuscus*, subtus testaceus, antennis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 292. n. 128.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, mediæ magnitudinis.*



2154 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (Rotundatius.)

- cælebs. 315. *C. fusco-griseus*, scutello punctis tribus apiceque  
flavescentibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 100. mant.*  
*inf. 2. p. 292. n. 129.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- iratus. 316. *C. viridi-fuscus*, thorace fascia flava. *Fabr. mant.*  
*inf. 2. p. 292. n. 130.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, antennis nigris.*
- prafinus. 49. *C. subrotundus totus viridis*, scutello concolore. *Fn.*  
*succ. 931. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 488.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 96. mant. inf. 2. p. 292.*  
*n. 123. Cimex ovatus viridis immaculatus, antennis*  
*apice albo fuscoque annulatis.*  
*Degeer inf. 3. p. 266. n. 9. Cimex viridis totus.*  
*Stoll cimic. 2. t. 19. f. 127.*  
*Habitat in silvis Europæ & ad Caput bonæ spei.*
- diffimilis. 317. *C. supra viridi subtus ferrugineus.* *Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 354. n. 97. mant. inf. 2. p. 292. n. 124.*  
*Habitat in Germania, prafino proxime affinis.*
- cæruleus. 50. *C. cæruleus immaculatus.* *Fn. succ. 933.\* Fuesli*  
*inf. helv. p. 25. n. 489. Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n.*  
*129. mant. inf. 2. p. 296. n. 169.*  
*Degeer inf. 3. p. 268. n. 11.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 75.*  
*Schæff. ic. t. 51. f. 4.*  
*Stoll cimic. t. 31. f. 221.*  
*Habitat in Europæ thesio.*
- Morio. 51. *C. ater, plantis rufis.* *Fn. succ. 932.\* Fuesli inf.*  
*helv. p. 25. n. 491. Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n. 130.*  
*mant. inf. 2. p. 296. n. 170.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 77.*  
*Schæff. icon. t. 57. f. 11. & t. 82. f. 6.*  
*Stoll cimic. 1. 32. f. 223.*  
*Habitat in Europæ oleraceis.*
- tristis. 318. *C. ater, clypeo orbiculato, thorace retuso.* *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 360. n. 131. mant. inf. 2. p. 296. n. 171.*  
*Degeer inf. 3. p. 269. n. 13. Cimex niger spinipes.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 470. n. 70.*  
*Habitat in Europæ plantis.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.) 2159

- spinipes*. 319. *C. ater*, pedibus piceis, tibiis spinosissimis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 360. n. 132. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 172.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, nitidus, magnitudine & statura morionis.*
- Æthiops*. 320. *C. ater*, thorace striga media impressa, tibiis spinosissimis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 296. n. 173.  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine oleracei.*
- lugens*. 321. *C. fuscus*, thoracis lineola, scutello abdominisque margine albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 360. n. 133. *mant. inf.* 2. p. 297. n. 174.  
*Habitat in America.*
- melanocephalus*. 322. *C. subrotundus griseus*, capite scutellique basi nigro-æneis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 360. n. 134. *mant. inf.* 2. p. 297. n. 175.  
*Habitat in Angliâ & Italia.*
- lineola*. 323. *C. thorace lævi antèr atro, postèr livido distincto punctis excavatis.*  
*Habitat in America, magnitudine fere tabani, capite atro, abdomine flavo, elytris incarnatis pallidisque.*
- oleraceus*. 33. *C. cæruleo-æneus*, thorace lineola, scutello apice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. suec.* 934. *Fuesli inf. helv.* p. 25. n. 492. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 359. n. 126. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 165.  
*Raj. inf.* p. 54. n. 6. *Cimex silvestris cærulescens.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 471. n. 74.  
*Degeer inf.* 3. p. 266. n. 10. t. 15. f. 22.  
*Schæff. icon.* t. 46. f. 4. 5.  
*Stoll cimic.* 2. t. 5. f. 32. 33.  
*Habitat in Europæ tetradynamis, quas 1760 in Sueciâ devastavit.*
- pictus*. 323. *C. subrotundus supra ater, thorace lineis tribus, scutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 359. n. 127. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 166.  
*Habitat in India.*
- versicolor*. 324. *C. varius*, capite abdomineque atris albo lineatis.  
*Fabr. mant. inf.* 2. p. 296. n. 167.  
*Habitat Tranquebariæ, statura & magnitudine picti.*

- biguttatus. 54. *C. niger*, margine undique albo, elytris puncto albo.  
*Fn. suec.* 935.\* *Scop. ent. carn.* 356. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 359. n. 128. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 168. *Fuefsli inf. helv.* p. 25. n. 493.  
*Habitat in Europæ plantis.*
- bicolor. 55. *C. elytris nigro alboque variis*, alis albis. *Fn. suec.* 936.\* *Scop. ent. carn.* 357. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 125. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 164. *Fuefsli inf. helv.* p. 126. n. 494.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 470. n. 73. *Cimex ovatus niger*, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis.  
*Degeer inf.* 3. p. 268. n. 12. *Cimex ovatus niger nitidus*, thorace elytris tibisque spinosis albo maculatis.  
*Raj. inf.* p. 54. n. 5. *Cimex colore nigro splendente*, maculis albis picto.  
*Lift. scar. p.* 396. n. 38. *Cimex niger*, maculis candidis notatus.  
*Fetiv. gazoph. t.* 14. f. 7. *Cimex niger albo maculatus*.  
*Schaeff. icon. t.* 41. f. 8. 9.  
*Stoll cimic. t.* 32. f. 224.  
*Habitat in Europæ hortis.*
- ornatus. 56. *C. nigro rubroque varius*, capite alisque nigris. *Fn. suec.* 937.\* *Scop. ent. carn.* 361. *Fuefsli inf. helv.* p. 26. n. 495. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 357. n. 119. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 155.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 469. n. 69.  
*Sulz. inf. t.* 11. f. 73.  
*Schaeff. icon. t.* 60. f. 10.  
*Stoll cimic. 2. t.* 2. f. 11.  
*Habitat in Europa & Oriente.*
- festivus. 57. *C. nigro rubroque varius*, thorace punctis sex nigris, alis fuscis: margine albido. *Fuefsli inf. helv.* p. 26. n. 490. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 120. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 156.  
*Scop. ent. carn.* 362. *Cimex dominulus*.  
*Habitat in America boreali*, Carniola, Calabria, *statura bicoloris*, sed magis oblongus.
- rutilus. 325. *C. thorace abdomineque rufis*, thorace maculis quatuor, abdomine fasciis nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 121. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 157.  
*Habitat in nova Hollandia.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.) 2157

- cruciatus. 326. *C. nigro pallidoque varius, scutello nigro : cruce alba.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 358. n. 122. mant. inf. 2. p. 295. n. 158.*  
*Habitat in India.*
- discoideus. 327. *C. flavescens, capite disco communi pedibusque nigris.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 295. n. 159.*  
*Habitat in Cayenna, statura & magnitudine ornati.*
- bioculatus. 328. *C. rotundatus supra niger, thorace rufo : punctis duobus nigris, scutello margine rufo.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 358. n. 123. mant. inf. 2. p. 295. n. 160.*  
*Habitat in America.*
- gramineus. 329. *C. rotundatus viridis immaculatus.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 295. n. 161.*  
*Habitat Tranquebariæ, parvus.*
- fimbriatus. 330. *C. rotundatus viridis, elytris griseis : macula fusca margineque viridi.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 295. n. 162.*  
*Habitat in Sina, parvus.*
- italicus. 331. *C. obscure rufus, scutello punctis duobus apiceque albis, abdominis margine nigro punctato.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 358. n. 124. mant. inf. 2. p. 296. n. 162.*  
*Habitat in Italia, magnitudine oleracei.*
- ruber. 338. *C. ruber, alis fuscis, elytris lineola transversa alba.* *Fn. suec. 938.\**  
*Habitat in Europæ urticis aliisque plantis.*
- acuminatus. 59. *C. ovalis antè attenuatus cinereo-exalbidus, antennis incarnatis.* *Fn. suec. 939.\* Fuesli inf. helv. p. 26. n. 498.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 135. mant. inf. 2. p. 297. n. 176.*  
*Cimex ovalis antice attenuatus exalbidus fusco striatus, antennis apice rufis.*  
*Degeer inf. 3. p. 271. n. 16. t. 14. f. 12. 13. Cimex rostratus.*  
*Raj. inf. p. 56. n. 6. Musca cemiciformis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 77.*  
*List. mut. t. 31. f. 20.*  
*Schaeff. icon. t. 42. f. 11.*  
*Habitat in Europæ plantis.*
- minutus. 61. *C. elytris lividis apice fuscis.* *Fn. suec. 941.\**  
*Habitat in Europa.*

- 2158 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.)
- collaris. 63. *C. rostrato arcuato, corpore nigro, thorace posterius elytris-  
que antèrius ferrugineis, elytris posterius alisque nigris.*  
*Habitat in Guinea, oblongus, magnitudine & statura per-  
sonati, an forte ejusdem cum eo tribus?*
- javanicus. 332. *C. luteus ano obtuso, antennis pedibusque ferrugi-  
neis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45.*  
*Stoll. cimic. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Java, glaber, inter maximos hujus generis.*
- finensis. 333. *C. flavescens, ano quadridentato, sterno porrecto.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45. f. 59.*  
*Habitat in Japonia & Sina, glaber, inter maximos hujus  
generis.*
- brunneus. 334. *C. supra brunneus subtus fuscus, antennis pilosis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45.*  
*Habitat in India, rufipede paulo major, glaber.*
- Anchora. 335. *C. rotundatus thorace elytrisque maculis sex nigris,  
scutello anchora alba. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 47. f. 60.*  
*Habitat in Japonia & Sina, grisei magnitudine, cruciatio  
affinis.*
- capensis. 336. *C. rotundatus niger, thoracis elytrorumque marginibus  
rubris. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 47. f. 61.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, oleraceo paulo major, gla-  
berrimus.*
- Thunber- 337. *C. rotundatus nigro cinereoque variis scutello punctis  
gii. duobus flavis, capite thoraceque albo lineatis. Thunb.  
nov. inf. sp. 2. p. 48. f. 62.*  
*Habitat - - - - grisei magnitudine, punctatissimus.*
- venosus. 338. *C. rotundatus ruber fusco pictus, abdomine serie sex-  
tuplici punctorum nigrorum. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 49.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, oleracei magnitudine.*
- costatus. 339. *C. cinereus, linea elytrorum nigra. Thunb. nov. inf.  
sp. p. 50. f. 63.*  
*Habitat in regionibus interioribus Capitis bonæ spei, oler-  
raceo paulo major, glaber.*
- cornutus. 340. *C. depressus cinereus, thorace lineis tribus elevatis  
antennis fusiformibus. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 50.*  
*Habitat in Japonia, facie & magnitudine c. cardui, an  
hujus tribus?*

- melaleucos. 341. *C. ater*, elytris albis : maculis duabus nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 50.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine scarabæoidis, nitidus.*
- hirtus. 342. *C. ater*, totus hirtus. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 51.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine oleracei, opacus.*
- niger. 343. *C. ater*, thorace tibiisque ciliatis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 51.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, in America australi, Indiâ, oleracei magnitudine, aterrimus.*
- aterrimus. 344. *C. ater*, elytris dimidiato hyalinis. *Forster nov. inf. sp. 1. p. 71. n. 71.*  
*Habitat in Hispania, circa fretum Gaditanum, magnitudine ornati.*
- flavatus. 345. *C. niger*, scutello elytrisque apice lateribusque flavis, thoracis margine lineaque media flavis. *Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 79. §. 34.*  
*Habitat Vindobonæ.*
- viennensis. 346. *C. cæruleo-æneus*, elytris margine albo. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 80. §. 35.*  
*Habitat Vindobonæ.*
- venustissimus. 347. *C. argenteus*, capite thoracis scutellique basi violaceo-æneis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 80. §. 36.*  
*Habitat in Austria superiore.*
- dubius. 348. *C. atro-cæruleus punctatus nitens*, thoracis elytrorumque margine exteriori albo. *Scop. ent. carn. p. 121. n. 355.*  
*Habitat in Carniola.*
- æneus. 349. *C. pallide æneus* : punctis impressis nigris, scutello abdomen subæquante : basi punctis duobus albis. *Scop. ent. carn. p. 122. n. 358.*  
*Habitat prope Idriam Carniolæ.*
- danicus. 350. *C. niger*, elytris fasciis duabus luteis. *Müll. Fn. Friedrichs. p. 29. n. 274. xool. dan. prodr. p. 106. n. 1202.*  
*Habitat in Dania.*
- roseus. 351. *C. fuscus*, abdomine incarnato, pedibus pallidis : femoribus puncto nigro. *Müll. xool. dan. prodr. p. 105. n. 1197.*  
*Habitat in Dania.*



2160 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus.*)

alatus. 352. *C. rufus*, elytris alas mentientibus, antennis clavatis.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 106. n. 1204.*  
*Habitat in Dania.*

rufescens. 353. *C. thorace obtuse angulato*, corpore e viridi rubroque  
 nebuloso. *Geoffr. inf. par. 1. p. 465. n. 62.*  
*Habitat in Gallia.*

pullus. 354. *C. ex fusco niger*, alis pallidis. *Geoffr. inf. par. 1. p.*  
*470. n. 71.*  
*Habitat in Gallia.*

leucomelas. 355. *C. niger*, elytrorum limbo exteriori albo. *Geoffr. inf.*  
*par. 1. p. 470. n. 72.*  
*Habitat in Gallia.*

arbores. 356. *C. supra fusco-viridis*, subtus flavescens, thorace  
 linea transversa flava, elytris rubro marginatis, ano  
 bidentato rubro. *Degeer inf. 3. p. 260. n. 7.*  
*Habitat in Europæ arboribus, 5 lineas longus.*

pusillus. 357. *C. griseus albo marginatus nigro punctatus*, abdomine  
 aeneo nigro. *Degeer inf. 3. p. 270. n. 15.*  
*Habitat in Europa.*

parnassæ. 358. *C. thorace rubro*, alis fuscis, corpore nigro. *Mayer*  
*Abh. boehm. Ges. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiæ floribus parnassæ palustris, minimus,*  
*lente incedens, volatu agilis.*

fulvus. 359. *C. fulvus*, alis posterius ex fusco violaceis, abdomine  
 subtus pallido: apice quadridentato. *Mus. Lesk. p. 119.*  
*n. 88.*  
*Habitat extra Europam.*

varius. 359. *C. rotundatus ater*, scutelli abdominisque marginibus,  
 elytris thoraceque rubris: hoc antè lineam atram  
 membranis fuscis, alis luteis apice fuscis. *Mus. Lesk.*  
*p. 119. n. 89.*  
*Habitat extra Europam.*

tricolor. 359. *C. subrotundus virescens*, margine undique flavo, an-  
 tennis rufis. *Mus. Lesk. p. 119. n. 91.*  
*Habitat in Europa.*

- albidus. 600. *C. subrotundus albidus*, antennis nigris : geniculis albis, elytris livido rufoque variis, scutelli apice albo. *Mus. Lesk. p. 119. n. 93.*  
*Habitat in Europa.*
- undatus. 601. *C. ovalis pallidus*, capite acuminato : lineis quatuor, scutelli thoracisque punctis, antennis elytrorumque ragis transversis undatis nigris. *Mus. Lesk. p. 119. n. 97.*  
*Habitat extra Europam.*
- pallefcens. 602. *C. pallidus nigro punctatus thoracis scutellique apice elytrorumque marginibus externis albidis.* *Mus. Lesk. p. 119. n. 98.*  
*Habitat in Europa.*
- nigerri- 603. *C. niger immaculatus.* *Mus. Lesk. p. 119. n. 103.*  
 mus. *Habitat in Europa.*
- melano- 604. *C. ovarus niger*, thorace elytrorumque margine exte-  
 leucos. riore albo. *Mus. Lesk. p. 119. n. 104.*  
*Habitat in Europa.*
- ciliatus. 605. *C. niger*, capite, thorace elytris & pedibus nigris. *Mus. Lesk. p. 120. n. 105.*  
*Habitat in Europa.*
- excisus. 606. *C. grifeus*, elytrorum membrana extus excisa, abdomine nigro. *Mus. Lesk. p. 120. n. 106.*  
*Habitat in Europa.*

### †† Oblongi.

‡ *antennis apice capillaribus.*

- trifasciatus. 67. *C. corpore nigro rubroque vario.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 202. mant. inf. 2. p. 305. n. 267.* Cimex oblongus niger, antennis apice capillaribus, elytris fasciis tribus rufis.  
*Schaeff. icon. t. 13. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- olivaceus. 358. *C. elytris fusco-ferrugineis basi coccineis : puncto atro.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 203. mant. inf. 2. p. 305. n. 268.*  
*Schaeff. icon. t. 13. f. 2.*  
*Habitat in Germania.*

feticornis. 359. *C. ater*, elytris fuscis basi pallidis apiceque puncto coccineo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 372. n. 204. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 269.

*Habitat* Lipsiæ, capite rarius rufo.

capillaris. 360. *C. flavescens*, elytris apice coccineis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 372. n. 205. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 270.

*Habitat* in Lipsiæ hortis.

femiflavus. 68. Corpore nigro, thorace pedibusque testaceis.

*Habitat* in Suecia, statura atri, capite antennarumque basi pilis hirta testaceis.

erythropus. 69. *C. rostrum* arcuato, thorace posterius emarginato, pedibus rubris.

*Habitat* in Barbaria, nigro rubroque varius, antennis fuscis, elytris rufis, abdomine nigro: margine albo nigroque vario; an forte ad ultimam cimicum tribum referendus?

ater. 72. *C. corpore* atro. *Fn. suec.* 944. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 371. n. 197. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 261.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 460. n. 54. Cimex oblongus ater, antennis seta terminatis.

*Habitat* in Europa boreali, etiam Calabria.

tyrannus. 361. *C. ater*, rostrum femoribusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 371. n. 198. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 262.

*Habitat* in Italia, atro proxime affinis.

Schach. 362. *C. ater*, capite scutello maculisque duabus elytrorum coccineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 371. n. 199. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 263.

*Habitat* in Italia, statura tyranni.

gothicus. 73. *C. niger*, scutello elytrorumque apicibus coccineis. *Fn. suec.* 966. \* *Scop. ent. carn.* 381. *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 501. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 372. n. 206. *mant. inf.* 2. p. 305. n. 271.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 445. n. 19. Cimex oblongus niger, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennarum pedibusque flavo variegatis.

*Schaeff. icon.* t. 13. f. 5.

*Habitat* in Europa, frequens.

tricolor. 363. *C. ater*, elytris apice macula coccinea. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 306. n. 272.

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.) 2163

*Habitat in Hispaniæ urtica, gothico proxime affinis, alis nigris, macula marginali transversa pallida.*

umbrati-  
lis. 90. *C. niger*, elytris albo maculatis. *Fn. suec.* 951.\*  
*Fabr. mant. inf. 2. p. 305. n. 265.* Cimex oblongus niger,  
elytris flavo lineatis apice fascia alba, antennis apice  
capillaribus.

*Habitat in Suecia, mediæ magnitudinis, pedibus piceis.*

flavicollis. 364. *C. niger*, capite thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 371. n. 201. mant. inf. 2. p. 305. n. 266.*

*Habitat in Anglia.*

inclava-  
tus. 97. *C. niger*, elytris fuscis : fasciis duabus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 200? mant. inf. 2. p. 305. n. 264?*  
Cimex (bifasciatus) oblongus fuscus, elytris fasciis dua-  
bus albis, antennis apice capillaribus.

*Habitat Lipsiæ.*

cimbricus. 365. *C. thorace elytrisque rubellis : apicemaculata coccinea, nigra duplicique alba. Müll. prodr. 1001. dan. p. 106. n. 1212.*

*Habitat in Dania; an varietas gothici?*

trilinea-  
tus. 366. *C. niger*, thorace pedibusque cinereis, elytris fuscis : li-  
neolis transversis tribus candidis. *Müll. 1001. dan. prodr.*  
*p. 106. n. 1213.*

*Habitat in Dania.*

spissicor-  
nis. 367. *C. niger*, pedibus flavis, antennis incrassatis. *Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 372. n. 207. mant. inf. 2. p. 306. n. 273.*

*Habitat Haniburgi.*

planicor-  
nis. 368. *C. niger*, alis lactescentibus, pedibus ex griseo lutescen-  
tibus, antennarum articulo medio compresso maximo.  
*Pell. spic. 1001. 9. p. 23. t. 1. f. 13.*

*Habitat in Belgio, parvus.*

hasticor-  
nis. 369. *C. rufus*, pectore abdomineque fasciis albis nigrisque,  
antennarum articulo penultimo compresso rotundato.  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 53. f. 64.*

*Habitat in Aittonia capensi, ad Caput bonæ spei, Decembri frequens, glaber, personati magnitudine.*

punctipes. 607. *C. flavesens*, femoribus fusco punctatis. *Mus. Lesk. p.*  
*121. n. 137.*

*Habitat in Europa.*

2164 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

quadrimaculatus. 608. *C. flavescens*, thorace maculis quatuor fuscis. *Musf.*  
*Lesk. p. 121. n. 138.*  
*Habitat in Europa.*

fuliginosus. 609. *C. niger*, capite thorace elytrisque rufescentibus, thorace posterius fusco, scutello flavescente, elytrorum apice inflexo coccineo. *Musf. Lesk. p. 121. n. 139.*  
*Habitat in Europa.*

erythrochlorus. 610. *C. oblongus rufescens*, thorace scutelloque flavis. *Musf.*  
*Lesk. p. 121. n. 140.*  
*Habitat in Europa.*

chrysocephalus. 611. *C. niger*, capite flavo: linea longitudinali nigra, elytris ex fusco rufis: apice inflexo coccineo. *Musf. Lesk. p. 121. n. 141.*  
*Habitat in Europa.*

stramineus. 612. *C. niger*, elytris pallidis: apice inflexo coccineo. *Musf.*  
*Lesk. p. 121. n. 142.*  
*Habitat in Europa.*

concolor. 613. *C. fuscus*, capite thoraceque rufis, antennis scutelloque flavis, pedibus pallidis. *Musf. Lesk. p. 121. n. 143.*  
*Habitat in Europa.*

tomentosus. 614. *C. capite thoraceque fuscis fulvo tomentosus*, abdomine rufo, elytris fusco-pallidis: apice inflexo flavo, puncto extremo nigro. *Musf. Lesk. p. 122. n. 144.*  
*Habitat in Europa.*

melanochrysos. 615. *C. niger*, scutello posterius, elytris apice inflexo flavis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 145.*  
*Habitat in Europa.*

bivenis. 616. *C. niger*, elytris e flavo fuscis: apice inflexo flavo venisque duabus rubris. *Musf. Lesk. p. 122. n. 146.*  
*Habitat in Europa.*

leucozonias. 617. *C. angustus niger*, antennis basi rubris, thorace posterius scutelloque flavis, elytris rufis: fascia obliqua apice inflexo albis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 147.*  
*Habitat in Europa.*

tricolor. 618. *C. niger*, elytris flavis: fascia transversa apice fuscis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 148.*  
*Habitat in Europa.*

- ochrome- 619. *C. niger*, antennarum elytrorumque basi, horum  
las. apice inflexo pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 122.*  
n. 149.  
*Habitat in Europa.*
- exoletus. 620. *C. niger*, thorace posterius tibiis elytrisque pallidis,  
horum apice inflexo rufo marginato. *Mus. Lesk. p.*  
122. n. 150.  
*Habitat in Europa.*
- phoenicop- 621. *C. fuscus*, capite thorace elytrisque rufescentibus,  
terus. antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 151.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscocu- 622. *C. flavus*, oculis fuscis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 152.*  
lus. *Habitat in Europa.*
- leucogram- 623. *C. supra rufescens*, capite dorsali, abdomine subtus  
mus. utrinque linea alba, thoracis tribus, elytris medio &  
margine externo albis: apice inflexo flavo. *Mus. Lesk.*  
p. 122. n. 153.  
*Habitat in Europa.*
- expalles- 624. *C. fuscus*, capite, ventre elytrisque pallidis, his fusco  
cens. subnebulosis, thorace subconico: lineolis tribus fuscis.  
*Mus. Lesk. p. 122. n. 154.*  
*Habitat in Europa.*
- flaves- 625. *C. pallide flavus*. *Mus. Lesk. p. 122. n. 155.*  
cens. β) *Cimex flavescens*, capite utrinque, scutello basi  
elytrisque apice inflexo fuscis. *Mus. Lesk. p. 122.*  
n. 156.  
*Habitat in Europa.*
- palles- 626. *C. pallidus rufo adspersus*. *Mus. Lesk. p. 122. n. 158.*  
cens. β) *Cimex pallidus rufescens*, scutello flavo. *Mus. Lesk. p.*  
122. n. 159.  
*Habitat in Europa.*
- leucoder- 627. *C. ovatus pallidus*: membrana elytrorum alba. *Mus.*  
mis. *Lesk. p. 122. n. 162.*  
*Habitat in Europa.*
- discolor. 628. *C. niger*, elytris griseis: apice membranarumque,  
apice albis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- imperia- 629. *C. niger*, elytrorum margine externo, basi & apice  
lis. inflexo flavis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 161.*  
*Habitat in Europa.*



2166 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

melano- 630. *C. antennis*, thoracis margine, scutelli apice, <sup>per-</sup>  
rhous. <sup>antennarum</sup> *dibus & abdomine flavis*, hujus apice nigro. *Musf.*  
*Lesk. p. 122. n. 163.*

*Habitat in Europa.*

vittatus. 631. *C. niger*, thorace antèrius posteriusque scutelloque  
flavis, antennarum basi elytrisque rufis: vitta apice-  
que inflexo albis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 164.*

*Habitat in Europa.*

melanogaf- 632. *C. ovatus rufescens abdomine medio subtus atro.* *Musf.*  
ter. *Lesk. p. 123. n. 166.*

*Habitat in Europa.*

fordens. 633. *C. ovatus niger*, thorace pedibusque rufis, his fusco  
variis. *Musf. Lesk. p. 123. n. 167.*

*Habitat in Europa.*

vitelli- 634. *C. ovatus flavus*, elytris apicem versus rufescentibus.  
nus. *Musf. Lesk. p. 123. n. 168.*

*Habitat in Europa.*

hæmatoce- 635. *C. ovatus niger*, elytris rufo-fuscis: apice capiteque  
phalus. rufis. *Musf. Lesk. p. 123. n. 169.*

*Habitat in Europa.*

leoninus. 636. *C. ovatus flavo-rufus*, thorace antèrius maculis dua-  
bus nigris, elytris pallidis: apice inflexo fusco.  
*Musf. Lesk. p. 123. n. 170.*

*Habitat in Europa.*

carbona- 637. *C. ovatus totus niger.* *Musf. Lesk. p. 123. n. 171.*  
rius. *Habitat in Europa.*

notatus. 638. *C. ovatus pallidus*, elytrorum apice inflexo: singulis  
angulo puncto fusco. *Musf. Lesk. p. 123. n. 172.*

*Habitat in Europa.*

discors. 639. *C. ovatus supra pallidus subtus flavus.* *Musf. Lesk.*  
*p. 123. n. 173.*

*Habitat in Europa.*

fusces- 640. *C. ovatus niger*, capite elytrisque pallidis: margine  
cens. externo apiceque inflexo fuscescentibus. *Musf. Lesk.*  
*p. 123. n. 174.*

*Habitat in Europa.*

- melanopter. 641. *C. ovatus fuscus*, elytris nigris : basi, medio marginis antici apiceque inflexo, capite & thorace anterieus flavis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 175.*  
*Habitat in Europa.*
- leucoce- 642. *C. fuscus*, antennis, elytris pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 176.*  
*Habitat in Europa.*
- ochropterus. 643. *C. ater*, thorace, elytris pedibusque flavescentibus. *Mus. Lesk. p. 123. n. 177.*  
*Habitat in Europa.*
- melano- 644. *C. ovatus niger*, capite, thoracis dorso, elytrorumque leucos. fascia media & apice inflexo albis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 178.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 645. *C. ovatus*, thorace anterieus nigro capite elytrisque pal- gaster. lidis : punctis apiceque inflexo fuscis, abdomine rufescente. *Mus. Lesk. p. 123. n. 179.*  
*Habitat in Europa.*
- fliticus. 646. *C. ovatus niger*, capite elytrisque pallidis, femoribus nigro punctatis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 180.*  
*Habitat in Europa.*
- nubilus. 647. *C. ovatus niger*, elytris albis fusco nebulosis, pedibus rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 123. n. 181.*  
*Habitat in Europa.*
- leucopus. 648. *C. fuscus*, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 182.*  
*Habitat in Europa.*
- conspersus. 649. *C. ovatus rufescens*, elytris albis rufo adpersis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 183.*  
*Habitat in Europa.*
- chloropterus. 650. *C. pallidus*, thorace, elytris abdomineque virescentibus. *Mus. Lesk. p. 123. n. 184.*  
*Habitat in Europa.*
- albicans. 651. *C. ovatus pallidus*, alis albis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 185.*  
*Habitat in Europa.*
- albidus. 652. *C. ovatus rufescens*, elytris antennis pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 186.*  
*Habitat in Europa.*

2168 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

brunneus. 653. *C. ovatus brunneus*, alis albis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 187*  
*Habitat in Europa.*

chryfopus. 654. *C. ovatus niger*, capite elytrorum margine externo  
 pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 188.*  
*Habitat in Europa.*

11 *antennis clavatis.*

Branderi. 66. *C. rostro arcuato*, thorace subfexspinoso, elytris punctis  
 ribus albis.  
*Habitat in Barbaria, mediæ magnitudinis, griseus, subius*  
*testaceus; antennis rufis, statura personati.*

crassicornis. 92. *C. subgriseus rubro punctatus.* *Fn. suec. 952. \* Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 369. n. 188. mant. inf. 2. p. 303. n. 139.*  
*Schaeff. icon. t. 13. f. 10.*  
*Habitat in Europa.*

Colon. 370. *C. rubro nigroque varius*, membranis elytrorum al-  
 bis: puncto nigro. *Thunb. nov. inf. spec. 3. p. 57.*  
*Habitat in Japonia, campestris magnitudine.*

deustus. 371. *C. rufo-fuscus*, scutelli apice, thoracis abdominisque  
 marginibus rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 58.*  
 β) *Stoll cimic. t. 13. f. 87.*  
*Habitat - - - magnitudine c. hyoscyami.*

tuberculosus. 372. *C. abdomine supra rufo*, antennarum nodis binis:  
 extremo longiore. *Scop. ent. carn. p. 128. n. 372.*  
*Habitat prope Idriam Carniolæ.*

Oculus cancri. 373. *C. ex livido flavus: maculis sanguineis*, oculis capi-  
 tulo cylindrico infidentibus. *Degeer inf. 3. p. 343. n.*  
*18. t. 34. f. 24.*  
*Habitat in Surinamo.*

mæstus. 374. *C. fuscus*, subtus rufo-lividus, thoracis margine livido.  
*Degeer inf. 3. p. 340. n. 14. t. 34. f. 20.*  
*Habitat in Pennsylvania.*

subrufus. 677. *C. pallide rufus*, elytrorum fenestatorum apice  
 clava, scutelloque rufis, hujus apice pallido. *Mus.*  
*Lesk. p. 120. n. 149.*  
*Habitat in Europa.*

*strictopterus*. 678. *C. niger*, elytris griseis punctatis : apice maculis tribus fuscis, membrana alba truncata, antennis pallidis : clava nigra. *Mus. Lesk. p. 120. n. 120. b.*  
*Habitat in Europa.*

*istericus*. 679. *C. fuscus*, capite thoraceque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 121. n. 130.*  
*Habitat in Europa.*

┐ ┐ ┐ *antennis filiformibus.*  
└─ *pedibus muticis.*

*leucocephalus*. 60. *C. niger*, capite pedibusque fulvis. *Fn. suec. 940.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 192. mant. inf. 2. p. 304. n. 255. Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 76. Degeer inf. 3. p. 290. n. 28.*  
*Habitat in Europa.*

*transversalis*. 375. *C. viridis*, thorace lineola interrupta, elytris macula fuscis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 304. n. 256.*  
*Habitat Kilonii, statura leucocephali, at duplo minor.*

*hæmatodes*. 376. *C. fanguineus*, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 193. mant. inf. 2. p. 304. n. 257.*  
*Habitat in Germania.*

*tripustulatus*. 377. *C. niger*, scutello maculisque elytrorum tribus coccineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 194. mant. inf. 2. p. 304. n. 258.*  
*Habitat in urticæ dioicæ racemis, Hafniæ frequens, parvus.*

*ludus*. 74. *C. abdomine rubro bidentato*, elytris fuscis pallide striatis. *Mus. Lud. Ulr. 176.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 140. mant. inf. 2. p. 297. n. 183.*  
*Habitat in America australi & India.*

*militaris*. 378. *C. rufus nigro maculatus*, alis exalbidis : striga baseos atra. *Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 141. mant. inf. 2. p. 297. n. 184.*  
*Habitat in Oriente.*

*lanarius*. 75. *C. rufus*, elytris apice fanguineis, thorace nigricante, abdomine flavo.  
*Habitat in Suecia, mediæ magnitudinis.*

*hyoscyami*. 76. *C. rubro nigroque varius*, alis fuscis immaculatis. *Fn. suec. 945.\* It. oel. 155.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 144.*

*mant. inf.* 2. p. 298. n. 189. *Fuesli inf. helv.* p. 26. n. 502.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 441. n. 12. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro.

*Degeer inf.* 3. p. 274. n. 18. t. 14. f. 14. 15. Cimex oblongus ruber nigro maculatus, &c.

*List. scar. angl.* p. 397. n. 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus.

*Raj. inf.* p. 55. Cimex silvestris minor, corpore oblongo angusto.

*Petiv. gazoph.* t. 62. f. 2.

*Merian. inf. eur.* t. 51. f. 1.

*Sulz. inf.* t. 11. f. 75.

*Schaeff. icon.* t. 13. f. 1.

familiaris. 379. C. rubro nigroque varius, alis fuscis: puncto baseos albo.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 145. *mant. inf.* 2. p. 298. n. 190.  
*Habitat in Europæ & Indiæ plantis, statura & magnitudine c. hyoscyani.*

rostratus. 380. C. rufus, scutello vitta marginali flava. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 146. *mant. inf.* 2. p. 298. n. 191.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

malabari- 381. C. fuscescens, thorace scutelloque punctis duobus nigris  
cus. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 147. *mant. inf.* 2. p. 298. n. 192.  
*Habitat ad littora Malabarica.*

aulicus. 382. C. rubro nigroque varius, elytris fasciâ atra, alis atris:  
lineola basis alba. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 148. *mant. inf.* 2. p. 298. n. 193.

β) Cimex irroratus. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. p. 55. f. 65.  
*Habitat in insulis Americæ meridionali oppositis, β) ad*  
*Caput bonæ spei.*

Huc inter oblongos scilicet cimices referas plures a Seba mus. vol. 4. delineatas species, productiorem t. 95. f. 28. pallide virescente-flavum t. 95. f. 29. spinoso-collarem t. 95. f. 30. setaceum t. 95. f. 35-37. luteo-fuscum t. 97. f. 31. nigro-rufum t. 97. f. 5. apterum ferratum t. 97. f. 12. informem t. 97. f. 21. 22. nigricantem t. 97. f. 23. brunneo-aurum t. 97. f. 24. 25. setipedem t. 97. f. 28. 29. sordidum t. 97. f. 30. 31. fusco-discolorem t. 97. f. 32. nigro-cilicem t. 97. f. 33. 34. ovatis contra accensas foliaceum t. 95. f. 28. pilosum t. 96. f. 29. rubripedem t. 97. f. 2. & plures a Schaeffero in iconibus depictos t. 46. f. 6. t. 46. f. 7. 8. t. 57. f. 4. t. 57. f. 5. t. 57. f. 10. t. 57. f. 11. t. 79. f. 4. t. 170. f. 4. 5. t. 210. f. 3. a. b. t. 219. f. 3. a. b. c. & 250. f. 5. 6. t. 272. f. 3. 4. t. 272. f. 5. 6. quorum descriptio ab Hanero expressa est. 383. C.

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.) 2171

- varicor- 383. *C. variegatus*, capite pedibusque rufis, thoracis margi-  
nis. nibus pallidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 298. n. 194.*  
*Habitat in India, magnus.*
- pallens. 384. *C. pallescens*, thorace elytrisque fuscis: margine pal-  
lido. *Fabr. sp. inf. 2. p. 363. n. 149. mant. inf. 2. p. 299.*  
*n. 195.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*
- cingula- 385. *C. thorace testaceo antèr nigro: margine albo, elytris*  
tus. puncto nigro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 150. mant. inf.*  
*2. p. 299. n. 196.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- supersti- 386. *C. rufus*, antennis, thoracis basi, fascia elytrorum alis-  
tiosus. que nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 151. mant. inf. 2.*  
*p. 299. n. 197.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 55. f. 66. Cimex oblongus rufus,*  
*thorace fascia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro.*  
*Habitat in America & ad Caput bonæ spei, equestris*  
*magnitudine.*
- erythro- 387. *C. rufus*, elytris nigris: fascia alba. *Fabr. sp. inf. 2.*  
melas. *p. 364. n. 152. mant. inf. 2. p. 299. n. 198.*  
*Degeer. inf. 3. p. 335. n. 9. t. 34. f. 11. Cimex albo fasciatus.*  
*Habitat in Surinamo, thoracis elytrorumque margine albido.*
- ruficollis. 388. *C. glaucus*, capite atro, thorace antèr rufo. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 364. n. 153. mant. inf. 2. p. 299. n. 199.*  
*Habitat in Brasilia.*
- scabrosus. 389. *C. niger*, thoracis margine elytrorumque fasciis duabus  
rufescentibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 154. mant. inf.*  
*2. p. 299. n. 200.*  
*Habitat in America.*
- leprofus. 390. *C. thorace nigro, basi margine punctisque duobus ru-*  
bris, elytris atris immaculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364.*  
*n. 155. mant. inf. 2. p. 299. n. 201.*  
*Habitat in America.*
- leucurus. 391. *C. niger*, capite elytrisque rubris, alis atris basi apice-  
que albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 299. n. 202.*  
*Habitat in Insula oceani australis Amsterdani, magnitu-*  
*dine c. Koenigii.*



- Koenigii. 382. *C. testaceus*, elytris puncto nigro; alis atris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 364. n. 156. *mant. inf.* 2. p. 299. n. 203.  
*Stoll cimic.* 2. t. 1. f. 5.  
*Habitat* Tranquebariæ.
- Slanbuf- 393. *C. sanguineus*, thorace fascia abbreviata, scutello, ely-  
 chii. tris puncto alisque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 299. n. 204.  
*Habitat in Sina, statura et magnitudine c. Koenigii.*
- equestris. 77. *C. rubro nigroque maculatus*, thorace anterieus poste-  
 riusque atro, alis atris albo maculatis. *Fabr. mant.* 2.  
 p. 298. n. 185.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 726. n. 777. *Fn. suec.* 946.\* *It. oel.* 155.  
*Mus. Lud. Ulr.* 177. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 362. n. 142.  
*Cimex oblongus rubro nigroque varius*, alis fuscis albo  
 maculatis.  
*Scop. ent. carn.* 369. *Cimex speciosus*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 442. n. 14.  
*Degeer inf.* 3. p. 276. n. 19.  
*Schaeff. elem. t.* 44. f. 2.  
*icon. t.* 48. f. 8.  
*Habitat in Europæ potissimum vincetoxico & c. hyoscyami*  
*duplo major.*
- civilis. 394. *C. rubro nigroque varius*, thorace lunulis duabus nigris,  
 alis fuscis albo maculatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 298.  
 n. 186.  
*Habitat* Tranquebariæ, *equestri affinis.*
- crudelis. 395. *C. rubro nigroque varius*, alis exalbidis, antennis pedi-  
 busque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 362. n. 143. *mant.*  
*inf.* 2. p. 298. n. 187.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura equestris.*
- apterus. 78. *C. rubro nigroque varius*, elytris rubris: punctis duobus  
 nigris, alis nullis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 366. n. 169. *mant.*  
*inf.* 2. p. 301. n. 222. *Scop. ent. carn.* 370. *Fuessli inf.*  
*helv.* p. 26. n. 504.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 440. n. 11. t. 9. f. 4.  
*Degeer inf.* 3. p. 276. n. 20.  
*Raj. inf. p.* 55. n. 3.  
*Sulz. hist. inf. t.* 10. f. 14.  
*Stoll cimic.* 2. t. 15. f. 103.  
*Habitat gregarius in Europa, rarius in malva silvestri,*  
*interdum alatus.*

- striatulus*. 396. *C. flavescens*, scutello elytrisque fuscis, elytris apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 366. n. 170. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 224.  
*Habitat in Brasilia.*
- inflax*. 397. *C. fuscus*, abdominis margine maculato, tibiis anterioribus femoribusque posterioribus basi pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 366. n. 171. *mant. inf.* 2. p. 302. n. 223.  
*Habitat in Italia, mediæ magnitudinis.*
- ægyptius*. 398. *C. rubro nigroque varius*, elytris rubris: puncto nigro. *Mus. Lud. Ulr.* 178. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 364. n. 157. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 205.  
*Habitat in Ægypto.*
- mendicus*. 399. *C. rubro fuscoque varius*, alis atris: apice lineolaque baseos albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 158. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 200.  
*Habitat in Malabarica.*
- fervus*. 400. *C. rubro nigroque varius*, elytris apice albis, alis nigris apice albidis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 300. n. 207.  
*Habitat in Sina, parvus, statura mendici.*
- amelicus*. 401. *C. supra ater*, thorace elytrisque punctis duobus flavescens: tibus, alis lineola baseos alba. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 159. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 208.  
*Stoll cimic.* 2. t. 8. f. 56?  
*Habitat ad Caput bonæ spei, mediæ magnitudinis.*
- quadriguttatus*. 402. *C. elytris rufis: fascia nigra*, alis punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 160. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 209.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- discolor*. 403. *C. niger*, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 161. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 210.  
*Habitat in Italia, parvus.*
- australis*. 404. *C. elytris rufis: striga undata nigra*, alis nigris: puncto medio albo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 162. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 211.  
*Habitat in nova Hollandia.*

2174 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

- sanguino-** 404. *C. fanguineus*, antennis, elytris pedibusque fuscis. *Fabr.*  
**lentus.** *sp. inf.* 2. p. 365. n. 163. *mant. inf.* 2. p. 300. n. 212.  
*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.*
- hipani-** 405. *C. thorace elytrisque rufis: maculis duabus nigris.* *Fabr.*  
**cus.** *mant. inf.* 2. p. 300. n. 213.  
*Habitat in Hispania, magnitudine & statura sanguinolenti.*
- eruenta-** 406. *C. rufus*, thoracis maculis duabus, antennis, alis pedi-  
**tus.** busque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 301. n. 214.  
*Habitat in India, sanguinolento proxime affinis.*
- suturalis.** 407. *C. rufus*, antennis alisque nigris: suturis omnibus albis.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 164. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 215.  
*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.*
- rubigi-** 408. *C. supra rufus*, alis albidis: macula magna fusca. *Fabr.*  
**nosus.** *mant. inf.* 2. p. 301. n. 216.  
*Habitat in Caput bonæ spei, suturali major.*
- excavatus.** 409. *C. rufus*, antennis, pectore, ano pedibusque atris,  
scutello canaliculato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 365. n. 165.  
*mant. inf.* 2. p. 301. n. 217.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, magnus.*
- fuscatus.** 410. *C. fanguineus*, thoracis lineis, scutello, alis, ano pedi-  
busque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 301. n. 218.  
*Habitat in Guinea, magnus.*
- Carnifex.** 411. *C. rufus*, antennis tibiisque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. p.  
366. n. 166. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 219. *Thunb.*  
*nov. inf. sp.* 2. p. 51.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, potissimum in tanaceto*  
*crithmifolio, magnitudine c. Rolandri.*
- Augur.** 412. *C. rufus*, antennis, alis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.*  
2. p. 366. n. 167. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 220. *Thunb.*  
*nov. inf. sp.* 3. p. 57.  
*Stoll cimic.* 2. t. 18. f. 124.  
β) *Stoll cimic.* 2. t. 13. f. 89.  
*Habitat ad Caput bonæ spei, India, Sina, carnifici*  
*affinis, equestri major.*
- macians.** 413. *C. supra rufus*, thorace scutelloque punctis duobus nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 366. n. 168. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 221.  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.) 2175

- Andreae. 80. *C. sanguineus*, antennis tibiis rostro alisque nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 179.\*  
*Sloane jam.* 2. p. 237. f. 29. 30. *Cimex silvestris oblongus* e cinereo & nigro variegatus, supina parte cruce S. Andreae notatus.
- β) *Cimex ruficollis*. *Mus. Lud. Ulr.* 180.
- γ) *Cimex thorace nigro*. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. p. 56.  
*Habitat in America. γ) in Japonia.*
- faxatilis. 81. *C. niger*, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. ent. carn.* 371. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 298. n. 188.  
*Habitat in Europa magis australi, subtus rubro nigroque varius, capitis macula rubra anterieus bifida.*
- succinctus. 82. *C. thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque basi rufis*. *Amæn. acad.* 6. p. 400. n. 44. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 369. n. 185. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 241.  
*Degeer inf.* 3. p. 339. n. 13. t. 34. f. 19. *Cimex rubro-cinctus*.  
*Habitat in Americæ borealis plantis.*
- tunicatus. 414. *C. supra ferrugineo-fuscus*, corpore elytrorumque margine flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 369. n. 186. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 242.  
*Habitat in Germania, antennis rufis: articulorum apice nigro.*
- pubicor-nis. 415. *C. rufus*, antennis, pectore, elytris tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 369. n. 187. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 243.  
*Habitat in America.*
- Kalmii. 83. *C. viridis*, scutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fn. succ.* 948.\*  
*Habitat in Europa.*
- supercilio-fus. 84. *C. niger*, palpebra elytrorumque margine albis.  
*Habitat in Suecia, mediæ magnitudinis. Modeer.*
- pratensis. 86. *C. flavescens*, elytris viridibus. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 370. n. 190. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 247.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 728. n. 86. *Fn. succ.* 949.\* *Scop. ent. carn.* 386. *Cimex oblongus griseus*, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 451. n. 33.  
*Habitat in Europæ pratis frequens.*
- floralis. 416. *C. supra obscure griseus*, elytris apice puncto rubro, femoribus posterioribus elongatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 303. n. 248.

2176 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

*Habitat in Hafniæ floribus, statura pratensis, antennis pallidis.*

norwegi- 417. *C. viridis, thorace bipunctato, elytris pallidioribus :  
cus. puncto apicis flavo. Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 191.  
mant. inf. 2. p. 304. n. 249.  
Habitat in Norwegiæ plantis.*

inquina- 418. *C. flavescens, elytris nigris albo variis. Fabr. mant.  
rus. inf. 2. p. 304. n. 250.  
Habitat Kilonii, mediæ magnitudinis.*

nassarius. 419. *C. viridis, antennis pedibusque flavescens. Fabr.  
mant. inf. 2. p. 304. n. 251.  
Habitat Hafniæ in tiliæ, parvus, immaculatus.*

tiliæ. 420. *C. virescens, fasciis tribus fuscis; media angulata. Fabr.  
sp. inf. 2. p. 374. n. 218. mant. inf. 2. p. 304. n. 252.  
Habitat Kilonii.*

campestris. 87. *C. flavescens, elytris macula ferruginea. Fabr. sp. inf.  
2. p. 370. n. 189. mant. inf. 2. p. 303. n. 246.  
Syst. nat. XII. 2. p. 728. n. 87. Fn. succ. 950.\* Cimex  
oblongus viridis, scutello macula cordata viridi, ely-  
tris macula ferruginea.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 452. n. 34.  
Habitat in Europæ campis.*

nemora- 421. *C. niger, thorace elytrisque flavescens, scutello  
lis. macula disci nigra. Fabr. mant. inf. 2. p. 303. n. 245.  
Habitat in Barbaria, statura & magnitudine campestris.*

melanoc- 88. *C. niger, thorace, elytris antennis pedibusque pallidis.  
phalus. Habitat in Suecia, parvus. Solander.*

histrioni- 89. *C. niger, scutello flavo: elytris pedibusque testaceis.  
cus. Habitat in Europa, magnitudine culicis.*

nemorum. 91. *C. niger, elytris alisque fusco alboque variis, pedibus  
testaceis. Fn. succ. 953.\*  
Habitat in Europa.*

saltatorius. 93. *C. niger, elytris striatis, alis posterius flavo macula-  
tis. Fn. succ. 954.\* It. cel. 121. Fabr. sp. inf. 2. p. 371.  
n. 196. mant. inf. 2. p. 305. n. 260.  
Raj. inf. p. 57. n. 2. Cimex brevis & fere rotundus  
nigricans.  
Habitat in Europa ad littora.*



- trigutta- 94. *C. niger*, elytris alisque apice puncto nigro. *Fabr. sp.*  
 tus. *inf. 2. p. 371. n. 195. mant. inf. 2. p. 305. n. 259.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 729. n. 94. Cimex oblongus niger*,  
 elytris testaceis: punctis tribus niveis; interiore minore.  
*Habitat in Europa, pediculi magnitudine.*
- arenarius. 95. *C. niger*, elytris cinereis, alis albis. *Fn. succ. 955.\**  
*It. ocl. 121. Fabr. sp. inf. 2. p. 369. n. 184. mant.*  
*inf. 2. p. 303. n. 240.*  
*Habitat in Europa boreali frequens.*
- pini. 96. *C. ater*, elytris fuscis: macula rhombea atra. *Fn. succ.*  
 956. *Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 173. mant. inf. 2. p.*  
 302. *n. 227.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 449. n. 28.*  
*Degeer inf. 3. p. 279. n. 22. t. 14. f. 22.*  
*Schaeff. icon. t. 42. f. 12.*  
*Habitat frequens in Europæ borealis pinetis.*
- silvaticus. 422. *C. ater*, elytris fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 174.*  
*mant. inf. 2. p. 302. n. 228.*  
*Habitat in Europæ borealis nemoribus.*
- Rolandri. 97. *C. ater*, alis macula rhombea flava. *Fn. succ. 957.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 175. mant. inf. 2. p. 302.*  
*n. 229. Fuesli inf. helv. p. 26. n. 511.*  
*Degeer inf. 3. p. 294. n. 33. Cimex fulvo maculatus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 459. n. 51.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 76.*  
*Schaeff. icon. t. 87. f. 7.*  
 β) *Cimex bimaculatus. Syst. nat. X. 1. p. 449. n. 76.*  
*Habitat in Europæ pinetis.*
- Forsteri. 423. *C. ater*, scutelli apice, thoracis elytrorumque mar-  
 gine sanguineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 176. mant.*  
*inf. 2. p. 302. n. 230.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine c.*  
*Rolandri.*
- fqualidus. 424. *C. niger*, thorace posterius, elytris pedibusque griseis.  
*Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 231.*  
*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis.*
- fexpustu- 425. *C. niger*, thorace elytrisque maculis duabus rufis. *Fabr.*  
 latus. *sp. inf. 2. p. 368. n. 177. mant. inf. 2. p. 302. n. 232.*  
*Habitat in Jamaica.*



2178 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

- lynceus. 426. *C. niger*, elytris griseis apice macula nigra; puncto albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 178. mant. inf. 2. p. 302. n. 233.*  
*Habitat in Angliæ & Calabriæ plantis.*
- urticæ. 427. *C. niger*, elytris griseis, alis albis: puncto nigro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 179. mant. inf. 2. p. 302. n. 234.*  
*Habitat in Angliæ urtica.*
- Lundii. 428. *C. niger*, elytris fuscis apice nigro punctatis, alis nigris puncto baseos apicisque albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 180. mant. inf. 2. p. 302. n. 235.*  
*Habitat Hafniæ, parvus, statura lyncei.*
- lunaris. 429. *C. niger*, thorace maculato, elytris lunula marginali flava. *Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 237.*  
*Habitat in Cayenna, statura lyncei.*
- ferrugineus. 99. *C. ferrugineus*, capite, thorace scutelloque nigris.  
*Habitat in Suecia, c. Rolandri similis.*
- populi. 109. *C. albo fuscoque nebulosus.* *Fn. suec. 963. Fabr. sp. inf. 2. p. 374. n. 219. mant. inf. 2. p. 304. n. 253.*  
*Habitat in Europæ populo tremula.*
- coryli. 121. *C. niger*, pedibus antennisque flavis. *Fn. suec. 974.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 369. n. 188. mant. inf. 2. p. 303. n. 244.*  
*Habitat in Europæ borealis corylo.*
- S. Crucis. 430. *C. supra obscure griseus, scutello linea dorsali albida.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 226.*  
*Habitat in insula S. Crucis oceani Americani, parvus.*
- agilis. 431. *C. thorace atro: margine posteriore flavo, elytris fuscis, basi apiceque pallidis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 374. n. 220. mant. inf. 2. p. 306. n. 274.*  
*Degeer inf. 3. p. 295. n. 34. Cimex flavo quadrimaculatus. Habitat in Germania, statura & magnitudine c. populi.*
- Daldorfii. 432. *C. flavescens*, capite scutellique margine atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 306. n. 275.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- multicolor. 433. *C. supra sanguineus, thorace elytris scutelloque albo marginatis.* *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 52.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, magnitudine pratensis, sub- tus cinereus vel lividus, glaber, capite rufescente.*

- adspersus. 434. *C. supra ferrugineus: margine fusco, subtus cinereus nigro punctatus. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 53.*  
*Habitat — — magnitudine equestris, glaber.*
- hexophthalmus. 435. *C. supra cinereus, subtus albus pectore fasciis tribus sanguineis. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 54.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, annulati magnitudine, capite rubro medio nigro, antennis pedibusque nigris.*
- albidus. 436. *C. rubro nigroque varius, membrana elytrorum nivea. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 56.*  
*Stoll cimic. t. 2. f. 80.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, & in Surinamo, punctis lineisque rubris nigrisque varius, equestris magnitudine, antennis, rostro, scutello pedibusque nigris.*
- purpureus. 437. *C. sanguineus, capite, membrana elytrorum pedibusque nigris. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 57. f. 67.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, glaberrimus, statura annulati, at multo angustior, immaculatus, capite antennisque nigris.*
- nebulosus. 438. *C. flavescens, thorace lineis quatuor, elytris fasciis tribus fuscis. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59.*  
*Habitat ad Caput bonæ spei, statura & magnitudine campestris, glaber.*
- cafer. 439. *C. niger, thorace fascia alba, elytris ferrugineis: maculis quatuor albis. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59. f. 70.*  
*Habitat in Caput bonæ spei, glaber, statura & magnitudine arenarii.*
- Candelabrum. 440. *C. niger, rubro viridique notatus, thoracis basi rubra candelabrum referente: candela supra caput porrecta. Drury inf. 1. p. 107. t. 45. f. 1.*  
*Habitat in insula Antigua.*
- claviger. 441. *C. niger, elytris maculatis, abdominis incisuris rubris, thorace incarnata: striis obliquis nigris, maculaque claviformi cinerea. Drury inf. 1. p. 109. t. 45. f. 5.*  
*Habitat in Antigua insula.*
- triops. 442. *C. griseus, elytris punctis tribus nigris in longitudinem dispositis. Müll. zool. dan. prodr. p. 107. n. 1216.*  
*Habitat in Dania.*

inauratus. 443. *C. flavescens*, thorace linea interrupta nigra, elytris duobus obliquis luteis. Müll. 700l. dan. prodr. p. 107. n. 1221.  
Habitat in Dania.

hirtus. 444. *C. niger*, elytris litura longitudinali pallida. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1234.  
Habitat in Dania.

canthari- 445. *C. niger*, thorace unidentato : circulo albo, elytris  
nus. cinereis : maculis quatuor scutelloque luteis. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1235.  
Habitat in Dania.

sexmacu- 446. *C. ater*, elytris maculis sex pedibusque flavis. Müll.  
latus. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1238.  
Habitat in Dania.

defes. 447. *C. niger*, thorace lineis tribus scutello margineque elytrorum flavis. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1239.  
Habitat in Dania.

rubellus. 448. *C. sanguineus*, elytris membranaceis albis, antennis pedibusque pallidis. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1241.  
Habitat in Dania.

ochrome- 449. *C. lutens*, thorace punctis quatuor elytrisque striis sex  
las. nigris. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1242.  
Habitat in Dania.

leucostic- 450. *C. sanguineus*, thorace linea transversa nigra, elytris  
tos. apicem versus puncto albo. Müll. 700l. dan. prodr. p. 108. n. 1243.  
Habitat in Dania.

gallorum. 451. *C. niger*, antennis brevioribus, elytris fuscis : macula flavescente alboque. Degeer inf. 3. p. 279. n. 23.  
Habitat in plantarum partibus ab aphidibus devastatis & relictis, pediculi magnitudine.

fulvus. 452. *C. flavo-fulvus*, elytris fuscis : vasis fulvis, pedibus nigro maculatis. Degeer inf. 3. p. 341. n. 16. t. 34. f. 22.  
Habitat in Surinamo.

erythro- 453. *C. fuscus*, thorace anterieus flavo, elytrorum basi rubra :  
chlorus. macula media flava. Degeer inf. 3. p. 342. n. 17. t. 34. f. 23.  
Habitat in Surinamo, muscæ domesticæ magnitudine.

- nanus. 454. *C. flavo-testaceus*, oculis nigris prominentibus, thorace maculis quatuor, elytrisque fasciis nigris. *Degeer inf.* 3. p. 343. n. 19. t. 34. f. 25.  
*Habitat in Surinamo.*
- arcuatus. 455. *C. niger*, rostro arcuato, elytris albidis: macula alba arcuque nigro, femoribus quatuor clavatis rubris. *Degeer inf.* 3. p. 346. n. 21. t. 35. f. 4.  
*Habitat in Surinamo, muscæ domesticæ magnitudine; an hujus tribus?*
- erythrozo-nias. 456. *C. nigro-fuscus*, rostro arcuato, thoracis abdominisque margine fasciisque transversis rubris. *Degeer inf.* 3. p. 349. n. 24. t. 35. f. 12.  
*Habitat in India, magnus.*
- bifurcatus. 457. *C. nigricans*, abdomine luteo bifurcato. *Schaeff. icon.* t. 11. f. 15. 16.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- triangularis. 458. *C. luteo-nigricans*, thorace nigro triangulari: macula media lutea, elytrorum apice maculis binis coccineis. *Schaeff. ic.* t. 13. f. 2.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis tribus.*
- hæmatostictos. 459. *C. luteus*, elytris maculis duabus sanguineis. *Schaeff. ic.* t. 13. f. 3.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- digrammus. 460. *C. flavicans*: maculis rubentibus, elytrorum apice lineolis duabus albidis. *Schaeff. icon.* t. 13. f. 9.  
*Habitat in Germania.*
- quinque-punctatus. 461. *C. fusco-nigricans*: dorso punctis quinque albis. *Schaeff. icon.* t. 13. f. 12.  
*Habitat in Germania.*
- Rubecula. 462. *C. collo thoraceque rubicundo*, pedibus rubris. *Schaeff. ic.* t. 112. f. 7.  
*Habitat in Germania.*
- rolatus. 463. *C. læte sanguineus*, elytris striis duabus nigris longitudinalibus. *Schaeff. icon.* t. 119. f. 3.  
*Habitat in Germania.*

182 INSECTA HEMIPTERA: Cimex: (Oblongus.)

textstriatus. 464. C. fulvo-nigricans, elytrorum margine striis tribus  
nigris.

Schaeff. icon. t. 185. f. 4. 5. a. b.

Habitat in Germania.

M flavum. 465. C. nigricans, thorace elytrorumque marginibus M  
flavum referentibus.

Schaeff. ic. t. 199. f. 4. 5.

Habitat in Germania.

V flavum. 466. C. flavo luteoque varius, thoracis margine V flavum  
referente.

Schaeff. ic. t. 199. f. 6. 7.

Habitat in Germania.

Circulus. 467. C. nigricans, elytris maculis quatuor albis, thorace  
sphaerico: margine albo punctato.

Schaeff. ic. t. 248. f. 3. 4.

Habitat in Germania.

insignitus. 468. C. aterrimus, elytris litura rubra.

Schaeff. icon. t. 266. f. 4. a. b.

Habitat in Germania.

celer. 469. C. æneo-fuscus, impresso-punctatus, abdomine supra  
rubro apice emarginato. Scop. ent. carn. p. 126. n. 366.

Habitat in littoribus austriacis maris Adriatici.

rugosus. 470. C. capite utrinque dentato abdomine rubello, dorso  
plicis quatuor longitudinalibus. Scop. ent. carn. p. 126.  
n. 367.

Habitat in Carniola superiore.

Pandurus. 471. C. rubro nigroque varius, thorace rubro nigro lineato,  
elytris rubris: macula media nigra, apiceque punctis  
tribus albis. Scop. ent. carn. p. 126. n. 368.

Habitat in Carniola.

trinervis. 472. C. elytris membranaceis: nervis fusco punctatis punc-  
toque ferrugineo trigono marginali. Scop. ent. carn.  
p. 129. n. 373.

Habitat Idriæ circa fossorum & rusticorum ædes.

maritimus. 473. C. nigricans, elytris testaceis fusco punctatis: ma-  
cula cordata nigra, antennis pedibusque ferrugineis.

Scop. ent. carn. p. 129. n. 374.

Habitat circa littora maris Adriatici.

- alpinus. 474. *C. nigricans*, elytrorum corio ferrugineo punctato, membrana fusco lineata, pedibus ferrugineis. *Scop. ent. carn. p. 129. n. 375.*  
*Habitat in Alpibus Vachinensibus.*
- idriacus. 475. *C. nigricans*, elytris pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p. 130. n. 377.*  
*Habitat Idriæ.*
- hybridus. 476. *C. niger*, rostro arcuato, abdomine elytrisque corio rubro: maculis duabus atris, membrana fuscescente: macula ad basin nigra. *Scop. ent. carn. p. 131. n. 380.*  
*Habitat in Carniolæ collibus.*
- meriopte- 477. *C. rostro pedibusque citrinis*, antennarum articulo  
rus, secundo compresso villoso articulis binis setaceis pal-  
lidis terminato. *Scop. ent. carn. p. 131. n. 382.*  
*Habitat in Carniola, in origani vulgaris & eupatorii can-  
nabini floribus; an hujus tribus?*
- æquinoc- 478. *C. elytris totis coriaceis villosis albidis: nervis fusco punc-*  
tialis, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn. p. 132. n. 383.*  
*Habitat in Carniolæ floribus, præsertim cynoglossæ ompha-  
lode, circa æquinoctium vernalis frequens.*
- umbella- 479. *C. ferrugineus*, abdomine apicisque femorum fasciis  
tarum, fuscis. *Scop. ent. carn. p. 133. n. 385.*  
*Habitat in Carniolæ umbellatis.*
- evonymi. 480. *C. niger*, thoracis macula media oblonga, scutelli lineis  
duabus, elytrorum striis elevatis flavis: unica ramosa.  
*Scop. ent. carn. p. 133. n. 387.*  
*Habitat in evonymo.*
- avellanæ. 481. *C. niger*, elytrorum corio fusco: basi apiceque albis,  
pedibus fulvis. *Scop. ent. carn. p. 134. n. 388.*  
*Habitat in corylo avellana.*
- genistæ. 482. *C. fuscus subvillosus*, alis hyalinis. *Scop. ent. carn. p. 134. n. 390.*  
*Habitat in genista tinctoria.*
- hortensis. 483. *C. niger*, antennis trinodiis, rostro pedibusque flavis.  
*Scop. ent. carn. p. 134. n. 390.*  
*Habitat in Carniolæ hortis.*



- pellucidus. 484. *C. fusco-niger*, pedibus pallidis, elytris pellucidis: apice fusco. *Geoffr. inf. par. 1. p. 438. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- marmoratus. 485. *C. luteo nigroque varius*, oculis crassissimis. *Geoffr. inf. par. 2. p. 438. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- trigonus. 486. *C. niger*, thorace elytrisque rubris, elytris apice macula triangulari nigra. *Geoffr. inf. par. 1. p. 439. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- leucopterus. 487. *C. rubro nigroque varius*, alis basi albis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 442. n. 13. Raj. inf. p. 55. n. 2.*  
*Habitat in Gallia.*
- maculosus. 488. *C. rubro nigroque varius*, elytris puncto nigro, alis fuscis: maculis albis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 443. n. 15.*  
*Habitat in Gallia.*
- tessellatus. 489. *C. thorace nigro: lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque tessellatis: limbis nigris.* *Geoffr. inf. par. 1. p. 443. n. 16.*  
*Habitat in Gallia.*
- croceus. 490. *C. croceus*, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato. *Geoffr. inf. par. 1. p. 444. n. 17.*  
 β) *Cimex niger*, pedibus rufis.  
 γ) *Cimex niger*, capite, thorace pedibusque rufis.  
*Habitat in Gallia, an hujus tribus?*
- subfuscus. 491. *C. viridi-fuscus*, elytrorum nervis punctatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 448. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*
- melanochros. 492. *C. fuscus*, antennis, pedibus abdominisque marginibus nigro luteoque variis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 449. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- naevius. 493. *C. cinereo nigroque varius*, alis glaucis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 449. n. 27.*  
*Habitat in Gallia.*
- cinereus. 494. *C. niger*, thorace posteriorius cinereo, elytris fuscis: apice albo. *Geoffr. inf. par. 1. p. 450. n. 29.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridescens. 495. *C. pallide viridescens*, femoribus nigro punctatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 450. n. 30.*  
*Habitat in Gallia.*

- erythrop- 496. *C. niger*, elytris anterieus rufis, alis albo maculatis.  
terus. *Geoffr. inf. par. I. p. 451. n. 31.*  
*Habitat in Gallia.*
- punctula- 497. *C. atro-fuscus punctatus*, alis venosis. *Geoffr. inf.*  
tus. *par. I. p. 451. n. 32.*  
*Habitat in Gallia.*
- cordiger. 498. *C. spadiceus*, scutello macula cordata lutea, elytris  
apice luteis. *Geoffr. inf. par. I. p. 453. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- reticor- 499. *C. flavesceus*, thorace fasciis duabus nigris, scutello  
nis. maculis flavis, antennis apice pectatis. *Geoffr. inf.*  
*par. I. p. 453. n. 36.*  
*Habitat in Gallia.*
- termacu- 500. *C. niger*, thorace fasciis tribus flavis, scutello ely-  
latus. trorumque apice maculis luteis. *Geoffr. inf. par. I.*  
*p. 454. n. 37.*  
*Habitat in Gallia.*
- Chloris. 501. *C. viridi-flavus*, capite thoraceque nigro maculatis,  
elytris viridibus. *Geoffr. inf. par. I. p. 455. n. 39.*  
*Habitat in Gallia.*
- obfusca- 502. *C. viridis*, elytris macula fusca. *Geoffr. inf. par.*  
tus. *I. p. 455. n. 40.*  
*Habitat in Gallia.*
- lineolatus. 503. *C. viridis*, elytrorum apice albidis, scutello lineola  
fusca. *Geoffr. inf. par. I. p. 455. n. 41.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridinf- 504. *C. viridis*, thorace scutelloque lineis quatuor nigris,  
culus. elytris interius fuscis. *Geoffr. inf. par. I. p. 456.*  
*n. 42.*  
*Habitat in Gallia.*
- conicus. 505. *C. fusco-cinereus*, oculis prominulis, elytris nervosis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 458. n. 49.*  
*Habitat in Gallia.*
- adustus. 506. *C. niger*, capite, elytrorum apice genibusque ferru-  
gineo-rubris. *Geoffr. inf. par. I. p. 459. n. 50.*  
*Habitat in Gallia.*
- chlorome- 507. *C. niger*, pedibus viridi nigroque variis. *Geoffr. inf.*  
lac. *par. I. p. 459. n. 52.*  
*Habitat in Gallia.*

2186 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus.*)

atratus. 508. C. totus ater, alis atris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 460.*  
n. 53.

*Habitat in Gallia.*

brachyp- 655. C. pallidus, corpore lineari, elytris abdomine tercia  
terus. parte brevioribus. *Mus. Lesk. p. 124. n. 189.*

*Habitat in Europa.*

lutescens. 656. C. flavescens, abdomine lutescente. *Mus. Lesk.*  
p. 124. n. 190.

*Habitat in Europa.*

grami- 657. C. pallidus, thorace utrinque linea fusca, elytris  
neus. virescentibus, abdomine lutescente. *Mus. Lesk. p.*  
124. n. 191.

*Habitat in Europa.*

herbaceus. 658. C. virescens, capite antennisque rufescentibus. *Mus.*  
*Lesk. p. 124. n. 194.*

*Habitat in Europa.*

pictus. 659. C. pallidus, thorace lineis tribus fuscis, abdomine  
nigro : margine dilatato rubro flavove subtus fusco  
medio pallido. *Mus. Lesk. p. 124. n. 195.*

*Habitat in Europa.*

rubellus. 660. C. rufescens. *Mus. Lesk. p. 124. n. 196.*

*Habitat in Europa.*

albipes. 661. C. niger, thoracis lateribus elytris pedibusque albidis.  
*Mus. Lesk. p. 124. n. 197.*

*Habitat in Europa.*

squama- 662. C. niger, pedibus pallidis, elytrorum loco squamis  
tus. albis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 198.*

*Habitat in Europa.*

purus. 663. C. ater immaculatus. *Mus. Lesk. p. 120. n. 113.*

*Habitat in Europa.*

annulatus. 664. niger, elytris antierius, thorace posterius griseis,  
pedibus fusco annulatis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 114.*

*Habitat in Europa.*

macropus. 665. C. niger; elytris griseis ad membranam nigro macu-  
latis, femoribus anticis crassissimis, tibiis rufescenti-  
bus. *Mus. Lesk. p. 120. n. 115.*

*Habitat in Europa.*

666. C.

- fenestra- 666. *C. pallidus*, coleoptris fenestratis: nervis pallide rufis.  
tus. *Mus. Lesk. p. 120. n. 118.*  
*Habitat in Europa.*
- melano- 667. *C. fuscus*, elytris griseis apice fuscis, femoribus nigris  
pus. basi griseis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 121.*  
*Habitat in Europa.*
- denigra- 668. *C. niger*, elytris griseo-fuscis: membrana basi macula-  
tus. que apicis alba. *Mus. Lesk. p. 120. n. 122.*  
*Habitat in Europa.*
- bigutta- 669. *C. fuscus*, elytris maculis albis disco fuscis: membrana alba:  
tus. venis maculisque duabus fuscis, pedibus pallidis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 123.*  
*Habitat in Europa.*
- leuco- 670. *C. niger*, elytris brunneis: membrana venis albis.  
phlebs. *Mus. Lesk. p. 120. n. 124.*  
*Habitat in Europa.*
- unipunc- 671. *C. niger*, elytris fusco-luteis: puncto albo, membrana  
tatus. utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 125.*  
*Habitat in Europa.*
- erythru- 672. *C. rufescens*, pedibus elytrisque pallidis, his apice  
rus. rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 121. n. 126.*  
*Habitat in Europa.*
- ochro- 673. *C. fuscus*, ano luteo, elytris luteo-pellucidis: disco  
rhous. puncto gemino apiceque solitario fusco. *Mus. Lesk. p. 121. n. 128.*  
*Habitat in Europa.*
- platy- 674. *C. rufescens*, antennis compressis latis rufis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 129.*  
cerus. *Habitat in Europa.*
- quadri- 675. *C. griseus*, thorace lineis quatuor longitudinalibus ele-  
striatus. vatis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 131.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscicau- 676. *C. capite*, thorace elytrorumque griseorum apice fuscis,  
dis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 132.*  
*Habitat in Europa.*

— — — — — *pedibus dentatis aut spinosis.*

Phasianus. 509. *C. fuscus*, femoribus arcuato-clavatis unidendatis, abdominis basi subtus gibba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 136. n. 225. mant. inf. 2. p. 197. n. 177.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, magnus.*

bellicosus. 510. *C. fuscus*, femoribus posterioribus arcuatis dentatis, abdomine quadriipinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 137. mant. inf. 2. p. 297. n. 178.*

*Habitat in Africa æquinoctiali, statura valgi, at duplo minor.*

Melea- 511. *C. fuscus*, antennarum articulo ultimo tibiisque anterioribus flavis, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 297. n. 179.*

*Habitat in Sina, magnus.*

Gallus. 512. *C. elytris fuscis flavo striatis*, abdominis disco rubro, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 138. mant. inf. 2. p. 279. n. 180.*

*Habitat in Surinamo, statura & magnitudine indi.*

Faber. 513. *C. niger*, abdomine fusco : margine flavo, femoribus anterioribus apice bidentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 297. n. 181.*

*Habitat in Pulicandor, magnus.*

Harpator. 514. *C. niger*, subtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 139. mant. inf. 2. p. 297. n. 180.*

*Habitat in America.*

calcaria- 114. *C. fuscus*, abdomine supra sanguineo, femoribus posterioribus sexdentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 172. mant. inf. 2. p. 302. n. 225.*

*Syst. net. XII. 2. p. 732. n. 114. Fn. suec. 968. \* Cimex oblongus niger*, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis.

*Degeer inf. 3. p. 280. n. 24. t. 14. f. 23. 24.*

*Schaeff. icon. t. 123. f. 2. 3.*

*Habitat in Europa.*

denticula- 515. *C. thoracis* margine laterali denticulato, abdomine bidentato, femoribus posterioribus spinosis. *Scop. ent. carn. p. 125. n. 365.*

*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 16.*

*Habitat Tergesti.*

INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*). 2189

collum. 516. *C. niger*, elytris nucis colore: puncto nigro, femoribus anterioribus denticulo notatis. *Scop. ent. carn. p. 130. n. 376.*

*Habitat in Carniolæ collibus.*

armatus. 680. *C. niger*, elytris fuscis: margine externo striis, posteriore punctis griseis, femoribus anticis crassissimis dente armatis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 116.*

*Habitat in Europa.*

lacteolus. 681. *C. niger*, femoribus anterioribus crassis dente armatis, elytris basi griseis, membrana basi gutta lactea. *Mus. Lesk. p. 120. n. 117.*

*Habitat in Europa.*

serotus. 682. *C. fuscus*, femoribus & elytris rufescentibus, his apice fractis, tibiis albis seroso spinosis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 126.*

*Habitat in Europa.*

↑ ↑ ↑ ↑ *antennis setaceis.*

↯ *pedibus dentatis.*

abietis. 115. *C. maculato-fulvus*, pedibus rufis: femoribus crassis. *Fn. suec. 969.\* Scop. ent. carn. 364. Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 222. mant. inf. 2. p. 307. n. 290.*

*Degeer inf. 3. p. 308. n. 37. t. 15. f. 20. 21. Cimex grossipes.*

*Habitat in Europæ boreali abiete.*

↯ ↯ *pedibus inermibus.*

pabulinus. 83. *C. viridis immaculatus*, alis hyalinis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 210. mant. inf. 2. p. 306. n. 279.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 727. n. 83. Fn. suec. 947.\* Scop. ent. carn. 132. Cimex oblongiusculus flavescenti-viridis torus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 456. n. 53.*

*Degeer inf. 3. p. 293. n. 31.*

*Habitat in Europæ pratis.*

lavigatus. 101. *C. exalbidus*, lateribus albis. *Fn. suec. 958.\* Fuesli inf. helv. p. 26. n. 512. Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 203. mant. inf. 2. p. 306. n. 276.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 452. n. 26.*

*Degeer inf. 3. p. 292. n. 30.*

*Habitat in Europæ pratis, frequens.*



2190 INSECTA HEMIPTERA. *Cimex*. (*Oblongus*.)

- lateralis. 517. *C. niger*, lateribus albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 372.  
n. 209. *mant. inf.* 2. p. 306. n. 277.  
*Habitat in Kilonii.*
- holfatus. 518. *C. exalbidus*, thorace lineis duabus, elytris interius  
fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 306. n. 278.  
*Habitat Kilonii, statura lævigati.*
- virens. 102. *C. viridis*, plantis antennarumque apicibus rufis. *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 373. n. 211. *mant. inf.* 2. p. 306. n. 280.  
*Habitat in Europa, pabulino duplo major.*
- pallidus. 519. *C. pallidus*, capite corporeque atris. *Fabr. mant. inf.*  
2. p. 306. n. 281.  
*Habitat in Suecia, parvus.*
- dolabra- 103. *C. elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris,*  
tus. *linea thoracis alba. Fn. suec. 959. Fabr. sp. inf.* 2.  
p. 373. n. 212. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 282.  
*Habitat in Europæ festuca nutante.*
- calens. 104. *C. capite, thorace elytrisque nigris, scutello fulvo.*  
*Gron. zooph. 712. Fabr. sp. inf.* 2. p. 373. n. 213. *mant.*  
*inf.* 2. p. 307. n. 283.  
*Habitat in India.*
- striatus. 105. *C. niger, elytris flavo fuscoque striatis, apice pedibus-*  
*que rufis. Fn. suec. 960.\* Fabr. sp. inf.* 2. p. 374.  
n. 217. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 289.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 454. n. 38.*  
*Degeer inf. 3. p. 290. n. 29. t. 15. f. 14. 15.*  
*Petiv. gazoph. t. 26. f. 1.*  
*Schaeff. ic. t. 13. f. 4.*  
*Habitat in ulmi campestris foliis.*
- Gronovii. 106. *C. thorace elytrisque atris, linea flava fasciam elytro-*  
*rum formante. Fabr. sp. inf.* 2. p. 373. n. 214. *mant.*  
*inf.* 2. p. 307. n. 284. *Gronov. zooph. 711.\**  
*Habitat in India.*
- erraticus. 107. *C. nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo*  
*articulo nigro. Fn. suec. 961.\**  
*Habitat in Europa.*

ferus. 108. *C. griseus immaculatus*. *Fn. suec.* 962. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 374. n. 215. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 285.  
*Habitat in Europæ silvis.*

vagans. 519. *C. griseus*, capite thoraceque linea nigra, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 307. n. 286.  
*Habitat in Suecia, statura feri.*

orientalis. 520. *C. fuscus*, capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 307. n. 287.  
*Habitat in India, marginello proxime affinis.*

marginellus. 521. *C. niger*, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccineo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 374. n. 216. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 288.  
*Habitat in Italia, statura feri.*

ulmi. 110. *C. supra rubiginosus*, elytris striis sanguineis, alis albo fuscoque variis. *Fn. suec.* 964. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 223. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 291.  
*Habitat in ulmo campestri.*

mutabilis. 112. *C. niger*, alis cæruleis, antennis pedibusque flavis. *Fn. suec.* 967. \*  
*Habitat in Suecia.*

fauciatus. 522. *C. viridis*, elytris maculis sex roseis, pedibus rubro tinctis. *Degeer inf.* 3. p. 293. n. 32.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 457. n. 4.*  
*Habitat in Europa.*

subapterus. 523. *C. griseus*, alis brevissimis, abdomine nigro punctato. *Degeer inf.* 3. p. 287. n. 27. t. 15 f. 10.  
*Habitat in Europa.*

† † † lineares, corpore angusto elongato.

‡ antennis setaceis.

pedes. 524. *C. fusco flavoque varius*, femoribus posterioribus elongatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 224. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 292.  
*Habitat in India.*

filiformis. 525. *C. pallide virescens*, antennis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 225. *mant. inf.* 2. p. 308. n. 293.  
*Habitat in insulis, Americæ meridionali oppositis.*

♂♂ *antennis filiformibus.*

angustatus. 526. *C. niger*, capite thoraceque elongato. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59. f. 71.*

*Habitat* — — — *tipularii magnitudine, glaber.*

squalidus. 683. *C. fuscus*, elytris griseo fuscoque variegatis, pedibus linearibus antennisque griseo fuscoque alternatim annulatis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 201.*

*Habitat in Europa.*

foffarum. 527. *C. supra fuscus*, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 226. mant. inf. 2. p. 308. n. 294.*

*Habitat in India.*

lacustris. 117. *C. supra niger depressus*, pedibus anterioribus brevissimis. *Fn. suec. 970. it. wgoth. 182. Geoffr. inf. par. 1. p. 463. n. 59. Scop. ent. carn. 394. Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 227. mant. inf. 2. p. 308. n. 295.*

*Degeer inf. 3. p. 311. n. 39. t. 16. f. 7. Cimex Naïas.*

*Raj. inf. p. 57. n. 1. Cimex aquaticus figuræ longioris.*

*Bauh. Ballon. 213. f. 1. Insectum Tipula dictum.*

*List. mut. t. 5. f. 4.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 2. d.*

*Frisch inf. 7. t. 20.*

*Sulz. inf. t. 11. f. 78.*

*Soll. cimic. 2. t. 9. f. 63.*

*Habitat in Europæ aquis pacatis.*

stagnorum. 118. *C. teretiusculus niger*, thorace medio punctis duobus globosis. *Fn. suec. 9715. Scop. ent. carn. 395. Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 228. mant. inf. 2. p. 308. n. 296.*

*Degeer inf. 3. p. 322. n. 40. t. 15. f. 24. Cimex Acus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 463. n. 60.*

*Petiv. gazoph. t. 9. f. 12.*

*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 17.*

*Habitat in Angliæ lacubus frequens.*

rivulorum. 528. *C. niger*, albo punctatus, abdomine fulvo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 229. mant. inf. 2. p. 308. n. 297.*

*Habitat in Alsatix rivulis montosis, lacustri quadruplo minor.*

- pallipes. 529. *C. niger*, pedibus pallidis, pectore bispinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 230. mant. inf. 2. p. 308. n. 298.*  
*Habitat in Italia, statura lacustris.*
- culiciformis. 530. *C. griseus*, thorace multispinoso, elytris lituris nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 231. mant. inf. 2. p. 308. n. 299.*  
*Habitat in Americæ aquis.*
- angustus. 531. *C. supra griseus subtus flavescens*, antennis pedibusque subtestaceis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 308. n. 300.*  
*Habitat in Sina, statura culiciformis.*
- Filum. 532. *C. fuscus*, alis abbreviatis, pedibus longissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 232. mant. inf. 2. p. 308. n. 301.*  
*Degeer inf. 3. p. 352. n. 26. t. 35. f. 16? Cimex longipes.*  
*Habitat in India.*
- macropus. 533. *C. ater*, thoracis margine elytrorumque fascia sanguinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 233. mant. inf. 2. p. 308. n. 302.*  
*Habitat in America.*
- cursitans. 534. *C. supra fuscus subtus cinerascens*, pedibus longissimis, ano bidentato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 234. mant. inf. 2. p. 308. n. 303.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- vagabundus. 119. *C. griseus*, pedibus pallidis: anterioribus brevissimis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 236. mant. inf. 2. p. 308. n. 305.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 732. n. 119. Fn. suec. 972.\* Cimex linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis.*  
*Fn. suec. 1. n. 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longissimis albo fuscoque variis.*  
*Degeer inf. 3. p. 323. n. 41. t. 17. f. 1. 2. Cimex culiciformis.*  
*Friseh inf. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus, alarum signatura alba.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 462. n. 58.*  
*Habitat in Europæ muscis.*
- linearis. 535. *C. viridis*, antennis antrorsum porrectis. *Fuessli inf. helv. p. 26. n. 519.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 458. n. 47.*  
*Habitat in Valesia.*

denigra- 536. *C. albidus*, oculis fuscis, scutello macula nigra. *Geoffr.*  
tus. *inf. par. 1. p. 458. n. 48.*  
*Habitat in Gallia.*

horto- 537. *C. viridis*, oculis fuscis, antennarum articulo secundo  
rum. basi albo, tibiis pallidis. *Müll. Zool. dan. prodr. p. 109.*  
*n. 1248.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 456. n. 43.*  
*Degeer inf. 3. p. 293. n. 31.*  
*Habitat in Europæ hortis; an forsan ad præcedentem tri-*  
*bum relegendus ob antennis?*

tipuloi- 538. *C. griseus*, antennis rubro maculatis, femoribus apice  
des. rubris, pedibus omnibus subæqualibus. *Degeer inf. 3.*  
*p. 354. n. 27. t. 35. f. 18.*  
*Habitat in Surinamo.*

meridio- 539. *C. nigro-fuscus*, pedibus testaceis, femoribus crassis, ely-  
nalis. tris abdomine brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 355. n. 29.*  
*t. 35. f. 21.*  
*Habitat in Surinamo.*

tetragram- 540. *C. nigricans*, abdomine atro: lineis quatuor albis obliquis.  
mos. *Schæff. icon t. 43. f. 7. 8.*  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*

araneoi- 541. *C. luteus*, pedibus longissimis.  
des. *Schæff. icon. t. 169. f. 7.*  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*

└└└ antennis clavatis.

crispino- 542. *C. griseo-fuscus*, antennis longis, spinis dorsalibus tri-  
fus. bus erectis. *Degeer inf. 3. p. 354. n. 28. t. 35. f. 19.*  
*Habitat in Surinamo.*

└└└└ antennis biclavatis.

suecicus. 543. *C. cinereus*, femoribus clavatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377.*  
*n. 237. mant. inf. 2. p. 308. n. 306.*  
*Habitat in Suecia.*

└└└└└ antennis bicaudatis.

tipula- 540. *C. exalbidus*, pedibus omnibus longissimis, femoribus  
rius. clavatis. *Fn. suec. 973.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 234.*  
*mant. inf. 2. p. 308. n. 304.*

*Frisch inf. 7. p. 28. f. 2. Cimex arboreus culiciformis.*  
*Habitat in Europæ borealis nuscis.*

\* \* *antennis supra oculos insertis, rostro arcuato. Reduvi.*

Gigas. 544. *C. niger*, thoracis margine elytrorumque fascia obsolete flexuosa rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 1. mant. inf. 2. p. 309. n. 1.*  
*Habitat in India.*

Acantharis. 38. *C. thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 29. mant. inf. 2. p. 314. n. 45.*  
*Brown jam. p. 434. t. 44. f. 11. Acantharis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 8.*  
*Habitat in Jamaica.*

Guttula. 545. *C. ater nitidus*, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 314. n. 46.*  
*Habitat in Germania, mediæ magnitudinis.*

elongatus. 546. *C. elongatus rufus*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 383. n. 30. mant. inf. 2. p. 314. n. 47.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, reliquis hujus tribus angustior.*

cristatus. 62. *C. corpore fusco-ferrugineo, scutello cristato. Amæn. acad. 6. p. 399. n. 42.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 23? mant. inf. 2. p. 313. n. 36?*  
*Reduvius (ferratus) niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque flavis, scutello cristato ferrato.*  
*Forster nov. inf. sp. 1. p. 72. n. 72.? Cimex carinatus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 12.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 6.*  
*Stoll cimic. 2. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in America meridionali.*

leucopus. 547. *C. fuscus*, antennarum annulis, tibiis abdominisque punctis lateralibus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 24.*  
*mant. inf. 2. p. 313. n. 37.*  
*Habitat in Europa media, statura ægyptiaci, at paulo major.*

tesculatus. 548. *C. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdomine atro: margine albo vario. Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 38.*  
*Habitat Monspelii, statura albipedis.*



ægyptia- 549. *C. corpore villoso griseo, abdominis margine nigro*  
cus. variegato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 25. mant. inf. 2. p. 313. n. 39.*  
*Habitat in Ægypto.*

Diadema. 550. *C. niger, capite thoraceque spinosis. Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 26. mant. inf. 2. p. 313. n. 40.*  
*Habitat in America boreali.*

quinque- 551. *C. thorace nigro, posterius spinis quatuor flavis,*  
spinofus. scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 27. mant. inf. 2. p. 313. n. 41.*  
*Habitat in India, capite posterius attenuato, antennis rostroque pallidis.*

scutatus. 552. *C. niger, elytris apice alisque medio puncto albo,*  
scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 42.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*

zonalis. 553. *C. capite thoraceque nigris, elytris flavescentibus: fasciis*  
alis apice nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 43.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, magis elongatus.*

maurita- 554. *C. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, tho-*  
nicus. race anterieus subspinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 28. mant. inf. 2. p. 314. n. 44.*  
*Habitat in Mauritania.*

persona- 64. *C. antennis apice capillaribus, corpore subvilloso fusco,*  
tus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 2. mant. inf. 2. p. 309. n. 2. Fuesli inf. helv. p. 26. n. 499.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 724. n. 64. Fn. suec. 942. Scop. ent. carn. 379. Geoffr. inf. par. 1. p. 397. n. 38. Cimex*  
*rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo subvilloso fusco.*  
*Degeer inf. 3. p. 281. n. 25. t. 15. f. 7. Cimex quisquilius.*  
*List. scar. angl. p. 397. n. 38. Cimex maximus pullus, alis nudis ex toto membranaceis.*  
*Frisch inf. 10. t. 19. Cimex stercorarius major oblongus.*  
*Raj. inf. 56. Musca cimiciformis graviter volans.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 74?*  
*Scharff. ic. t. 13. f. 6. 7. et t. 57. f. 9.*  
*Habitat in Europæ quisquiliis.*  
*Larva horrida consumit lectularium,*

- barbicornis. 555. *C. niger*, thorace abdominisque basi olivaceis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 3. mant. inf. 2. p. 309. n. 3. Drury inf. 3. t. 45. f. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ, thorace rarius nigro; antennis alterius sexus barbatis?*
- ater. 556. *C. rufus*, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 4. mant. inf. 2. p. 309. n. 4.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, annulato minor.*
- stridulus. 557. *C. glaber niger*, elytris fuscis nigro maculatis: margine rufo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 5.*  
*Habitat Monspeli, parvus, primo vere agilis, antennis continuo motitans, thoracis attritu stridens.*
- nitidulus. 558. *C. ater*, thorace olivaceo, femoribus anterioribus rufis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 5. mant. inf. 2. p. 309. n. 6.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, nitidus, barbicorni affinis.*
- pilipes. 559. *C. ater*, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pedibus hirtis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, capite posterius attenuato, alis albis.*
- longipes. 65. *C. ruber*, elytris nigris basi fasciæque rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 6. mant. inf. 2. p. 309. n. 8. Gron. zooph. 709.*  
*Habitat in insula S. Thomæ oceani americani, magnitudine personati.*
- Bankii. 560. *C. supra rufus*, alis nigris, abdomine atro: margine rufo.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 7. mant. inf. 2. p. 309. n. 9.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*
- erythropus. 561. *C. ater*, elytris griseis nigro venosis, abdominis margine pedibusque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 10.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- binotatus. 562. *C. supra niger*, elytris puncto apicis rufo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 8. mant. inf. 2. p. 310. n. 11.*  
*Habitat in Surinamo, statura annulati.*
- lacer. 563. *C. flavescens*, thoracis cruce impressa, elytris abdominisque medio nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 310. n. 12.*  
*Habitat in India, mediæ magnitudinis.*

guineen- 670. *C. niger*, thorace scutelloque acute spinosis, elytris  
 fis. puncto albo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 381. n. 22. *mant. inf.*

2. p. 313. n. 35.

*Stoll cimic.* 2. t. 11. f. 64.

*Habitat in Guinea, magnitudine valgi.*

annula- 71. *C. antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus*  
 tus, sanguineo maculato. *Fn. suec.* 943. \* *Geoffr. inf. par.* 1.  
 p. 437. n. 5. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 379. n. 9. *mant. inf.*  
 2. p. 310. n. 13. *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 500.  
*Degeer inf.* 3. p. 286. n. 26. *Cimex niger rufipes.*  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 13.  
*Schaeff. icon.* t. 5. f. 9-11.  
*Habitat in Europæ corylo.*

monspe- 564. *C. rufus*, capite, pectore abdominisque striis maculari-  
 lienfis. bus rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 310. n. 14.  
*Schaeff. icon.* 1. t. 5. f. 9. 10.  
*Habitat Monspelii, statura & magnitudine annulati.*

præcinc- 565. *C. rufescens*, antennis pedibusque flavo nigroque  
 tus. annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 379. n. 10. *mant. inf.*  
 2. p. 310. n. 15.  
*Habitat in America boreali.*

obscurus. 566. *C. ater*, thorace posterius, elytris abdominisque mar-  
 gine obscure pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 379. n. 11.  
*mant. inf.* 2. p. 310. n. 16.  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus.*

cayennen- 567. *C. obscure fuscus*, antennarum apice elytrorumque  
 fis. litura media albis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 310. n. 17.  
*Habitat in Cayenna, parvus.*

attelaboi- 568. *C. testaceo nigroque varius*, thorace anterieus testa-  
 des. ceo, dentibus duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 379.  
 n. 12. *mant. inf.* 2. p. 311. n. 18.  
*Habitat in nova Hollandia.*

pilicornis. 569. *C. ater*, thorace posterius, scutello, elytrorum margine,  
 abdomine femoribusque basi rufis. *Fabr. mant. inf.* 2.  
 p. 311. n. 19  
*Habitat Tranquebariæ, mediæ magnitudinis, antennis hirtis.*

- quadri- 570. C. fuscus, capite, abdominis margine pedibusque olivaceis, thorace anterieus quadridentato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 13. mant. inf. 2. p. 311. n. 20.*  
dentatus. *Habitat in Africa æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*
- nigripes. 100. C. elytrorum basi, antennis pedibusque rubris, tibiis anterioribus hirsutissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 14. mant. inf. 2. p. 311. n. 21.*  
*Degeer inf. 3. p. 344. n. 20. t. 35. f. 1. Cimex hirtipes.*  
*Habitat in America meridionali.*
- unicolor. 571. C. ater, immaculatus, thorace subspinoso, tibiis cylindricis hirsutissimis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 22.*  
*Habitat in Cayenna, statura nigripedis.*
- barbari- 572. C. niger, thorace elytrisque obscure ferrugineis, scutello lineola media alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 23.*  
cus. *Habitat in Barbaria, statura nigripedis.*
- Rohrii. 573. C. ater, thorace subspinoso, elytris lineola, abdominis margine femorumque articulatione sanguineis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 24.*  
*Habitat in Cayenna, statura nigripedis.*
- carbona- 574. C. arer, elytris posterius albis, capite posterius attenuato cylindrico. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 15. mant. inf. 2. p. 312. n. 25.*  
rius. *Habitat in India, statura attelaboidis.*
- pacificus. 575. C. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 16. mant. inf. 2. p. 312. n. 26.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Edleri. 576. C. niger, thorace subspinoso, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 17. mant. inf. 2. p. 312. n. 27.*  
*Habitat in India.*
- octoma- 577. C. thorace posterius testaceo, elytris alisque atris: maculis quatuor late flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 18. mant. inf. 2. p. 312. n. 28.*  
culatus. *Habitat in India, reliquis hujus tribus minor.*
- sigma. 578. C. thorace testaceo, elytris alisque nigris: macula media flava. *Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 19. mant. inf. 2. p. 312. n. 29.*  
*Habitat in India, octomaculato proxime affinis.*

- curtipes. 579. *C. niger*, elytris pallidis: puncto atro, abdomine rufo:  
ano atro. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 30.*  
*Habitat in India, parvus, pedibus anterioribus brevioribus.*
- uncina- 580. *C. niger*, elytris basi pallidis, alis macula communi rufa,  
rus. pectore spinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 20. mant.*  
*inf. 2. p. 312. n. 31.*  
*Habitat in America meridionali, mediæ magnitudinis.*
- iracun- 581. *C. niger*, thorace abdominisque marginibus rubro ma-  
dus. culatis, elytris rufis. *Scop. ent. carn. 378. Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 381. n. 21. mant. inf. 2. p. 312. n. 32.*  
*Schranck Beytr. p. 81. n. 37. t. 3. f. 17. Cimex sanguineus.*  
*Poda mus. p. 58. n. 17.*  
*Habitat in Germania superiori.*
- fuscipes. 582. *C. rufus*, thoracis fascia, elytrorum margine interiori  
pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 33.*  
*Habitat in India, statura iracundi, at paulo minor.*
- bifidus. 583. *C. ater*, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice  
bifida. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 34.*  
*Habitat in Sina, magnus.*
- membra- 684. *C. niger*, abdominis apice membranisque duabus  
naceus. ovatis rufis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 202.*  
*Habitat extra Europam.*
- superbus. 685. *C. niger*, abdomine rufo basi nigro, elytris in medio ad  
marginem anticum puncto coccineo notatis, femoribus  
apice tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 203.*  
*Habitat extra Europam.*
- nævius. 686. *C. griseus*, abdomine elytris dimidio longiore: dorso  
nigro, margine elevato rufo fuscoque vario. *Mus.*  
*Lesk. p. 124. n. 207.*  
*Habitat in Europa.*
- quinquema- 687. *C. niger*, elytris abbreviatis, abdominis margine  
culatus. elevato: maculis quinque albis inverse conicis, pedibus  
griseis fusco annulatis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 208.*  
*Habitat in Europa.*
- staphyli- 688. *C. apterus niger*, elytris abbreviatis pedibusque rubris:  
nus. femoribus quatuor anticis compressis. *Mus. Lesk. p.*  
*125. n. 209.*  
*Habitat in Europa, staphylinis affinis.*

**MACROCEPHALUS.** *Rostrum* inflexum : vagina univalvi triarticulata fetis tribus , maxillis palpis labioque nullis.  
*Antennæ* porrectæ, brevissimæ, submoniliformes, clavatæ.  
*Caput* oblongum , supra cylindricum.  
*Scutellum* longitudine abdominis , depresso , membranaceum.

cimicoi-  
des. 1. M. griseo-ferrugineus , scutello cinerascens : macula colcoptrata flava, alis purpurascens-violaceis, tibiis anterioribus incrassatis. *Svederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. t. 8. f. 1.  
*Habitat in Georgia Americæ, cimice eroso paulo minor.*

227. **APHIS.** *Rostrum* inflexum, vagina articulorum quinque : seta unica.  
*Antennæ* setaceæ, thorace longiores.  
*Alæ* quatuor erectæ aut nullæ.  
*Pedes* ambulatorii.  
*Abdomen* sæpius posterius bicornè.

longirof-  
tris. 34. Aph. cinerea, rostro corpore triplo longiore. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 314. n. 1.  
*Habitat Dresdæ, sub arborum corticibus, formicarum larvis viclitans, mediæ magnitudinis.*

ribis. 1. Aph. Ribis rubri. *Fn. suec.* 975. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 7  
*Leeuwenh. arc. epist.* 90. p. 545. t. 548.  
*Blank. inf.* 164. t. 14. f. D. E.  
*Frisch inf.* 11. p. 9. t. 14.



*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 7-10.*

*Habitat sub ribis rubri foliis monstrosis pustulatis frequēss.*

arundinis. 35. Aph. arundinis epigeios. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 7.*  
*mant. inf. 2. p. 315. n. 8.*

*Habitat in arundinis epigeios foliis.*

ulmi. 2. Aph. ulmi campestris. *Fn. suec. 976.\* It. scan. 203. Fabr. sp. inf. 2. p. 387. n. 32. mant. inf. 2. p. 316. n. 37.*  
*Degeer inf. 3. p. 81. n. 13. t. 5. f. 7-18.* Aphis (foliorum ulmi) nigricans tuberculata foliorum convolutorum ulmi.  
*Reaum. inf. 3. t. 25. f. 4-7.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 494. n. 1. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in ulmo campestri.*

papaveris. 36. Aph. papaveris somniferi. *Fabr. sp. inf. 2. p. 388. n. 33.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 38.*  
*Habitat in Holfatiæ papavere somnifero.*

pastinacæ. 3. Aph. pastinacæ sativæ. *Fn. suec. 977.\* Fabr. mant. inf. 2. p. 315. n. 13.*  
*Habitat in pastinaca sativa.*

pruni. 37. Aph. pruni domesticæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 12.*  
*mant. inf. 2. p. 315. n. 14.*  
*Degeer inf. 3. p. 49. n. 5. t. 2. f. 1-8.* Aphis dilute viridis albo farinosa, corniculis brevibus, pruni.  
*Reamur inf. 3. t. 23. f. 9. 10.*  
*Habitat in pruni domesticæ foliis.*

sambuci. 4. Aph. sambuci nigræ. *Fn. suec. 978. Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 3. mant. inf. 2. p. 315. n. 4.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 495. n. 3.* Aphis sambuci tota cærulea arta.  
*Lyf. angl. p. 397. n. 40.* Cimex exiguus, nunc niger, nunc viridis, cui alæ ex toto membranaceæ, prægrandis.  
*Frisch. inf. 11. p. 14. t. 18.*  
*Reaum. inf. 3. t. 8. f. 5-15.*  
*Habitat in Sambuci nigræ ramis.*

solidaginis. 38. Aph. solidaginis virgaureæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 4. mant. inf. 2. p. 315. n. 5.*  
*Habitat in Norwegiæ solidaginis virgaureæ caulibus. mar- jufcula, junior testacea, alias fusca, antierius angustata, fronte emarginata, pedibus pallidis: geniculis nigris, corniculis elongatis setaceis, stylo duplo longioribus.*  
 39. C.

- cerasi. 39. *Aph. pruni cerasi*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 5. mant. inf. 2. p. 315. n. 6.*  
*Müll. zool. dun. prodr. p. 110. n. 1256.*  
*Habitat in pruni cerasi foliis.*
- rumicis. 5. *Aph. rumicis lapathi*. *Fn. suec. 979. \* Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 11. mant. inf. 2. p. 315. n. 12.*  
*Habitat in rumice acuto.*
- acetosæ. 6. *Aph. rumicis acetosæ*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 43. mant. inf. 2. p. 317. n. 48.*  
*Geoffr. inf. par 1. p. 496. n. 9. Aphis (acetosæ) atra, fascia transversa viridi.*  
*Reaum. inf. 3. p. 286.*  
*Habitat in rumice acetosa, acetosella.*
- ligustici. 40. *Aph. ligustici scotici*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 44. mant. inf. 2. p. 317. n. 49.*  
*Habitat in Norwegiæ ligustico scotico, nigra, antennis tiliarumque basi pallida.*
- lychnidis. 7. *Aph. lychnidis divicæ*. *Fn. suec. 980. \* Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 1. mant. inf. 2. p. 315. n. 2.*  
*Fn. suec. 719. Aphis cucubali.*  
*Habitat frequens in lychnidis divicæ caulibus.*
- capreæ. 41. *Aph. salicis capreæ*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 2. mant. inf. 2. p. 315. n. 3.*  
*Habitat in Europæ salice.*
- padi. 8. *Aph. pruni padi*. *Fn. suec. 981. Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 45. mant. inf. 2. p. 317. n. 50.*  
*Reaum. inf. 3. t. 23. p. 9. 10.*  
*Habitat in pruno pado.*

---

*Aphides a vere in serum autumnum vivos pariunt sætus, autumnus post copulam ova; post quartam demum metamorphosin pariunt, alisque instruuntur; a copula parentum nascuntur filia, neptes, proneptes, abneptes; alia aptera; alia alata, absque sexus discrimine in eadem specie; plurimæ cornibus duobus posterioribus abdominis excernunt rorem melleum, qui formicas allicit; ab ichneumonis specie quadam infestata. Species difficile distinguuntur, difficiliter definiuntur, nec semper in diversis plantis diversæ species, adeoque pauciores aphides, quam plantæ aphidifera.*

rosæ.

9. Aph. rosæ. *Fn. suec.* 982.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387.  
*n.* 25. *mant. inf.* 2. p. 316. *n.* 30.  
*Degeer inf.* 3. p. 65. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 10. Aphis viridis,  
 corniculis longissimis, rosæ.  
*Reaum. inf.* 3. *t.* 21. *f.* 1-4.  
*Lederm. microgr.* 53. *t.* 25.  
*Sulz. inf.* *t.* 12. *f.* 79.  
*Habitat in rosæ pedunculis.*

hortensis.

42. Aph. atriplicis hortensis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. *n.* 26.  
*mant. inf.* 2. p. 316. *n.* 31.  
*Habitat in atriplicis hortensis summitatibus.*

picridis.

43. Aph. picridis hieracioidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. *n.* 27.  
*mant. inf.* 2. p. 316. *n.* 32.  
*Habitat in picridis hieracioidis caulibus.*

ægopo-  
dii.

44. Aph. ægopodii podagrariæ. *Scop. ent. carn.* 399. *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 387. *n.* 28. *mant. inf.* 2. p. 316. *n.* 33.  
*Habitat in ægopodii podagrariæ foliis.*

dauci.

45. Aph. dauci carotæ. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. *n.* 29. *mant.*  
*inf.* 2. p. 316. *n.* 34.  
*Habitat in dauci carotæ umbella.*

urticata.

46. Aph. urticæ dioicæ. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. *n.* 30. *mant.*  
*inf.* 2. p. 316. *n.* 35.  
*Habitat in urticæ dioicæ caulibus, foliis.*

nymphææ.

10. Aph. plantarum aquaticarum. *Fn. suec.* 983. *Fabr.*  
*mant. inf.* 2. p. 315. *n.* 17.  
*Habitat in nymphæis, potamogetonibus.*

corni.

47. Aph. corni fanguineæ. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. *n.* 15.  
*mant. inf.* 2. p. 315. *n.* 18.  
*Habitat in corni fanguineæ foliis.*

tiliæ.

11. Aph. tiliæ europææ. *Fn. suec.* 984. *Fabr. sp. inf.* 2. p.  
 388. *n.* 34. *mant. inf.* 2. p. 316. *n.* 39.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 495. *n.* 6. Aphis alis antennis pedi-  
 bulque nigro punctatis.  
*Degeer inf.* 3. p. 77. *n.* 12. *t.* 5. *f.* 1-5. Aphis (tiliæ  
 nigropunctata) flavo-viridis lineis punctisque nigris,  
 nigro maculatis, corniculis brevioribus.  
*Frisch inf.* 11. p. 1. *n.* 3. *t.* 17. Pediculus arboreus tiliæ.

*Reaum. inf. 3. t. 23. f. 1-8.*  
*Habitat in Europæ tilia.*

juniperi. 48. Aph. juniperi communis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 388. n. 35.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 40.*  
*Degeer inf. 3. p. 56. n. 7. t. 4. f. 7. 8.* Aphis obscure fusca  
 cinereo maculata, corniculis brevioribus grossis, juniperi.  
*Habitat in juniperi communis foliis.*

brassicæ. 12. Aph. brassicæ oleraceæ. *Fn. succ. 985. Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 388. n. 36. mant. inf. 2. p. 316. n. 41.*  
*Frisch inf. II. p. 10. t. 3. f. 15.* Pediculus brassicæ.  
*Habitat in brassicæ oleraceæ foliorum pagina inversa,*  
*unde tabescunt.*

craccæ. 13. Aph. vicicæ craccæ. *Fn. succ. 986. Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*390. n. 46. mant. inf. 2. p. 317. n. 51.*  
*Degeer inf. 3. p. 58. n. 8. t. 2. f. 14. 15.* Aphis nigra  
 carulescens albo farinosa, corniculis brevioribus, vicicæ  
 craccæ.  
*Habitat in vicicæ craccæ foliis.*

lactucæ. 14. Aph. lactucæ oleraceæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 47.*  
*mant. inf. 2. p. 317. n. 52.*  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 3-5.*  
*Habitat in lactuca oleracea.*

sonchi. 15. Aph. sonchi oleracei. *Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 49.*  
*mant. inf. 2. p. 317. n. 53.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 497. n. 13.*  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 3-5.*  
*Habitat in soncho oleraceo.*

cirsii. 16. Aph. ferratulæ arvensis. *Fn. succ. 987.\* It. wgot. 307.*  
*Habitat in ferratula arvensi.*

cardui. 17. Aph. cardui. *Fn. succ. 983.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 385.*  
*n. 13. mant. inf. 2. p. 315. n. 15.*  
*Habitat in carduorum caulibus.*

achilleæ. 49. Aph. flavesceus, abdomine viridi, antennis pedibusque  
 albidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 14. mant. inf. 2.*  
*p. 315. n. 16.*  
*Habitat frequens Kilonii in achillea millefolio.*

tanacetii. 18. Aph. tanacetii vulgaris. *Fn. succ. 989.\* Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 387. n. 31. mant. inf. 2. p. 316. n. 36.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 496. n. 8.* Aphis tanaceti fusca,  
abdomine nigro cæruleo, antice viridi.  
*Habitat in tanaceti vulgaris caulibus.*

absinthii. 19. Aph. artemisiæ absinthii. *Fn. succ. 990.\* Fabr. mant. inf. 2. p. 315. n. 19.*  
*Habitat in artemisia absinthio.*

millefolii. 50. Aph. fusca, abdomine virescente, antennis pedilus  
corniculisque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 16.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 20.*  
*Degeer inf. 3. p. 60. n. 9. t. 4. f. 1-5.* Aphis millefolii.  
*Habitat in achillea millefolio.*

evonymi. 51. Aph. evonymi europæi. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 17.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 21.*  
*Habitat in evonymi europæi foliis.*

avenæ. 52. Aph. avenæ sativæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 18. mant. inf. 2. p. 316. n. 22.*  
*Habitat in Europæ avena sativa.*

fraxini. 53. Aph. fraxini excelsioris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 19.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 494. n. 2.* Aphis fraxini nigro  
viridique variegata.  
*Habitat in fraxini excelsioris ramis.*

jaceæ. 20. Aph. centaureæ jaceæ. *Fn. succ. 991.\**  
*Habitat in centaurea jacea.*

betulæ. 21. Aph. betulæ albæ. *Fn. succ. 992.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 20. mant. inf. 2. p. 316. n. 25.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 496. n. 7.* Aphis marginibus  
incisurarum abdominis punctis nigris.  
*Degeer inf. 3. p. 48. n. 3.* Aphis nigro punctata corni-  
culata viridis, dorso tuberculis nigris, betulæ.  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 2.*  
*Habitat in betulæ albæ foliis.*

alni. 54. Aph. betulæ alni. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 21. mant. inf. 2. p. 316. n. 26.*  
*Degeer inf. 3. p. 47. n. 4. t. 3. f. 15-17.* Aphis flavesc-  
centi-alba tuberculata, alni.  
*Habitat in betulæ alni foliis.*

- roboris. 22. *Aph. nigra*, corniculis obsoletis : tris medii abdominis.  
*Fn. suec.* 993. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 388. n. 37. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 42.  
*Habitat in Quercu robore.*
- fagi. 23. *Aph. fagi silvaticæ lanata.* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 316. n. 24.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 497. n. 2.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 1.  
*Habitat in fago silvatica.*
- quercus. 24. *Aph. quercus roboris proboscide longissima.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 388. n. 38. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 43.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 498. n. 14. *Aphis fusca* proboscide corpore triplo longiore.  
*Reaum. inf.* 3. t. 28 f. 5-14.  
*Habitat in Galliæ potissimum quercu, atra, inter maximas, alis hyalinis : margine exterius atro, antennarum pedumque articulis basi ferrugineis, abdomine natico.*
- pini. 25. *Aph. pini silvestris ramulorum.* *Fn. suec.* 994. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 389. n. 39. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 44.  
*Degeer inf.* 3. p. 27. n. 1. t. 6. f. 9-16. *Aphis (nuda pini) fusca tuberculata, pedibus nudis, pini.*  
*Habitat in pini silvestris ramis junioribus.*
- pineti. 55. *Aph. pini silvestris foliorum.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 389. n. 40. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 45.  
*Degeer inf.* 3. p. 39. n. 2. t. 6 f. 19. 33. *Aphis (tomentosa pini) nigra albo farinosa tuberculata, pedibus villosa-tomentosis.*  
*Habitat in pini silvestris foliis, pedibus posterioribus elongatis ciliatis.*
- falicis. 26. *Aph. falicis.* *Fn. suec.* 995.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 389. n. 41. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 46.  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 2.  
*Habitat in falicibus variis.*
- vitis. 56. *Aph. vitis viniferæ.* *Scop. ent. carn.* 398. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 390. n. 49. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 54.  
*Habitat in Europæ magis australis vite vinifera.*
- populi. 27. *Aph. populi tremulæ foliorum.* *Fn. suec.* 996\*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 386. n. 22. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 27.  
*Habitat sub populi tremulæ foliis convolutis fornicatis.*



- tremulæ. 28. Aph. populi tremulæ ramulorum. *Fn. suec.* 997.\*  
*Degeer inf.* 3. p. 94. n. 15. t. 7. f. 1-7. Aphis cærulea  
 nigro tomentosa, corniculis nullis, populi tremulæ  
 ramulorum.  
*Habitat in populi tremulæ ramulis, ubi foliis approxi-*  
*matis conteguntur.*
- viburni. 57. Aph. viburni opuli. *Scop. ent. carn.* 396. *Fabr. sp. inf.*  
 2. p. 386. n. 23. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 28.  
*Sulz. hist. inf.* t. II. f. 1. 2.  
*Habitat in viburni opuli foliis & caulibus.*
- mali. 58. Aph. piri mali. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 24. *mant.*  
*inf.* 2. p. 316. n. 29.  
*Degeer inf.* 3. p. 53. n. 6. t. 3. f. 20. Aphis pomi flavo-  
 viridis, corniculis longioribus pedibus antennisque  
 nigrescentibus.  
*Habitat sub piri mali foliis.*
- burfaria. 29. Aph. populi nigrae. *Fn. suec.* 998.\* *Fabr. sp. inf.* 2.  
 p. 385. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 9. *it. scan.* 311.  
*Geoff. inf. par.* 1. p. 497. n. 11. Aphis populi nigra lanata.  
*Hofm. altd. hort.* 51.  
*Seb. mus.* 1. t. 38. f. 8.  
*Jung verm.* 161. 162.  
*Rupp jenens.* 3. p. 333.  
*Swammerd. bibl.* 45. f. 22-25.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 7-11.  
*Hort. amb.* t. 96.  
*Merian. inf. europ.* 1. p. 15. t. 42.  
*Habitat in populi nigrae foliis faccatis, petiolorumque*  
*utriculis coloratis.*
- aparines. 49. Aph. galii aparines. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 9.  
*mant. inf.* 2. p. 315. n. 10.  
*Habitat in galio aparine.*
- urticæ. 30. Aph. urticæ alba lanata posterius truncata.  
*Frisch inf.* 8. p. 34. t. 17.  
*Habitat in Germaniæ urtica, inter maximas sui generis,*  
*setis, subtus lana obtecta.*
- aceris. 31. Aph. aceris platanoidis. *Fn. suec.* 999.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 315. n.  
 11. Aphis aceris campestris.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 495. n. 5. Aphis (aceris) viridis maculis nigris.*

*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 6-10.*

*Habitat in aceris campestris & platanoidis foliis.*

atriplicis. 32. *Aph. atriplicis. Fn. suec. 1000.*

*Habitat sub atriplicis, imprimis littoralis, foliis, intra cylindrum ex foliis revolutis confectum obambulans.*

pistaciæ. 33. *Aph. nigra, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso.*

*Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 42. mant. inf. 2. p. 317. n. 47.*

*Aphis pistaciæ lentisci.*

*Siml. vit. ges. 49.*

*Camer. epit. 51.*

*Lob. ic. 100.*

*Dodon. penipt. 780.*

*J. Bauh. hist. 1. p. 279.*

*Theodor. hist. 1439.*

*Habitat in pistacia vera, terebintho, lentisco, antennis moniliformibus, oculis nigricantibus, abdomine posterius mutico, lanugine alba globulis nuda tecto, alis interdum erectis, in folliculo, e foliorum basi enascente, ventricoso, utrinque attenuato, spithameo, pollice crassiore, primo viridi, post exitum aphidis incarnato.*

perficæ. 60. *Aph. amygdali perficæ.*

*Sulz. hist. inf. p. 105. t. II. f. 3.*

*Habitat in amygdalo perfica, inter majores, viridis; capite thorace tibiisque nigris, alis longissimis, antennis corpore longioribus, corpore brevi.*

polyanthis. 61. *Aph. polyanthis tuberosæ.*

*Sulz. hist. inf. p. 105. t. II. f. 4. 5.*

*Habitat in polyanthe tuberosa, fusca, globosa, antennis corpori æqualibus; mare minore, dorso griseo, ut plurimum alato.*

saligna. 62. *Aph. griseo-fusca, rostro longissimo, antennis brevioribus, corniculis nullis.*

*Sulz. hist. inf. t. II. f. 6.*

*Habitat in falice.*

plantaginis. 63. *Aph. plantaginis. Bonnet insectol. 1. p. 56.*

*Habitat in plantaginum caulibus.*

- archange- 64. Aph. angelicæ archangelicæ. *Scop. entom. carn. p. 137.*  
licæ. n. 400.  
*Habitat in angelica archangelica, nigra, rostro & abdo-*  
*mine virentibus.*
- leucan- 65. Aph. chrysanthemi leucanthemi. *Scop. ent. carn. p. 138.*  
themi. n. 404.  
*Habitat in chrysanthemo leucanthemo, nigra, abdomine*  
*rostroque virentibus, hoc apice fusco.*
- scabiosæ. 66. Aph. scabiosæ. *Scop. ent. carn. p. 138. n. 405.*  
*Habitat in scabiosis.*
- fabæ. 67. Aph. vicicæ fabæ. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 406.*  
*Habitat in vicia faba, quam sterilem reddit.*
- genistæ. 68. Aph. genistæ tinctoriæ. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 409.*  
*Habitat in genista tinctoria, nigra, alis puncto fusco.*
- coryli. 69. Aph. coryli avellanæ. *Goeze entom. Beytr. 2. p. 311.*  
*Habitat in coryli avellanæ foliorum pagina inferiori, al-*  
*bida, minor.*
- juglandis. 70. Aph. juglandis regiæ.  
*Frisch inf. 11. p. 12. n. 10. t. 16.*  
*Habitat in juglande regia, flavo-viridis, antennis bre-*  
*vioribus, corpore segmentis quinque supra nigris constante.*
- balsamitæ. 71. Aph. tanacetibalsamitæ. *Müll. zool. dan. prodr. p. 109.*  
n. 1252.  
*Habitat in tanaceto balsamita, nigra, abdomine viridi,*  
*oculis rubris.*
- gallarum. 72. Aph. gallarum ulmi. *Degeer inf. 3. p. 89. n. 14. t. 4. f. 15.*  
*Reaum. inf. 3. p. 299. t. 25. f. 4-7.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 494. n. 1. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in folliculis foliorum ulmi, nigricans, corniculis*  
*nullis.*
- farinosa. 73. Aph. salicis farinosa. *Degeer inf. 3. p. 76. n. 11.*  
*Habitat in salice, obscure viridis, tuberculis lanuginosis*  
*albis, corniculis longioribus.*
- xylostei. 74. Aph. loniceræ xylostei. *Degeer inf. 3. p. 96. n. 16.*  
t. 7. f. 8.  
*Habitat in lonicera xylosteo, tomentosa, corniculis nullis.*

Mayeri. 75. Aph. rubra, antennis thorace brevioribus, abdomine extenuato, tibiis brevioribus. *Mayer Abh. boehm. Ges.* 4. p. 183.

*Habitat in Bohemiæ foliis tanaceti vulgaris, aptera.*

228. CHERMES. *Rostrum* vagina pectorali: fetis tribus inflexis.

*Antennæ* cylindricæ, thorace longiores.

*Alae* quatuor deflexæ.

*Thorax* gibbus.

*Pedes* saltatorii.

graminis. 1. Ch. airæ flexuosæ. *Fn. suec.* 1001. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 390. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 1.

*Habitat in Europæ graminibus, imprimis aira flexuosa.*

ulmi. 2. Ch. ulmi campestris. *Fn. suec.* 1002. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 390. n. 2. *mant. inf.* p. 317. n. 2.

*Habitat intra ulmi campestris folia revoluta.*

cerastii. 3. Ch. cerastii viscosi. *Fn. suec.* 1003. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 390. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 4.

*Habitat in cerastii viscosi foliis, in capitulum conniventibus.*

piri. 4. Ch. piri communis. *Fn. suec.* 1004. \* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 390. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 3.

*Degeer inf.* 3. p. 141. n. 2. t. 9. f. 2. Chermes (piri) viridi-fusca maculis fasciisque obscuris, alis fusco maculatis.

*Habitat in pyri communis foliis.*

forbi. 5. Ch. forbi aucupariæ. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 391. n. 7. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 7.

*Habitat in sorbo aucuparia, supra lituris lineisque variis nigris varia, subtus virens, thorace flavescente, anterieus punctis duobus, posterius lineis quatuor nigris.*

---

Chermis larvæ pedatæ, sæpius villosæ; imagines saliant, plantis insident, ceterum aphidibus similes.

- perficæ. 18. Ch. amygdali perficæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 391. n. 8.*  
*mant. inf. 2. p. 318. n. 8.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 506. n. 4.* Chermes perficæ oblongus.  
*Reaum. inf. 4. t. 1. f. 1. 2.*  
*Habitat in amygdali perficæ ramis.*
- calthæ. 6. Ch. calthæ palustris. *Fn. suec. 1005.\* Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 391. n. 9. mant. inf. 2. p. 318. n. 9.*  
*Habitat in calthæ palustris floribus.*
- buxi. 7. Ch. buxi semper virentis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 391. n. 5.*  
*mant. inf. 2. p. 317. n. 5.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 485. n. 2.* Pfylla viridis, antennis  
 setaceis, alis fusco-flavescentibus.  
*Reaum. inf. 3. t. 19. f. 1-14.*  
*Habitat intra Europæ magis australis buxi folia summa*  
*conniventia, Maio interdum Argentorati frequentis-*  
*sima, excrementa dulcia, cito tamen acescentia, &*  
*postea fetida excernens.*
- urticæ. 8. Ch. urticæ dioicæ. *Fn. suec. 1006.\* Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*391. n. 10. mant. inf. 2. p. 318. n. 10.*  
*Degeer inf. 3. p. 134. n. 1. t. 9. f. 17-19.* Chermes  
 (urticæ) fusca s. virefcens, abdominis lateribus albo  
 maculatis.  
*Habitat in urticæ dioicæ foliis.*
- betulæ. 9. Ch. betulæ albæ. *Fn. suec. 1007.\* Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*391. n. 11. mant. inf. 2. p. 318. n. 11.*  
*Habitat in betulæ albæ ramis.*
- alni. 10. Ch. betulæ alni. *Fn. suec. 1008.\* Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*391. n. 12. mant. inf. p. 318. n. 12.*  
*Degeer inf. 3. p. 148. n. 3. t. 10. f. 8.* Chermes alni  
 lanata viridis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 486. n. 3.* Pfylla viridis, antennis  
 setaceis, alis aqueis.  
*Frisch inf. 8. p. 48. t. 13.* Vermis fuctorius alni.  
*Sulz. inf. t. 12. f. 80.*  
*Schæff. elem. t. 39.*  
*Habitant in betulæ alni ramulis larvæ, caudis plumosis*  
*testæ.*
- quercus. 11. Ch. quercus roboris. *Fn. suec. 1009.\**  
*Habitat in quercus foliis, ex flavo albicans ad marginem*  
*alarum interiorem litura, ad exteriorem quatuor fuscis,*

- fagi. 12. *Ch. fagi filvaticæ*. *Fn. suec.* 1010. *it. scan.* 65. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 391. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 6. *Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 1-6.  
*Habitat in fagi filvaticæ foliis.*
- abietis. 13. *Ch. pini abietis*. *Fn. suec.* 1011.\* *fl. lappon.* 218. p. 347. *E. it. gotl.* 180. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 13. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 13.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 487. n. 5. *Psylla pallide flavescens*, oculis fuscis, alis aqueis.  
*Degeer inf.* 3. p. 99. n. 17. t. 8. f. 1-3. *Aphis* (gallarum abietis) tomentosa, corniculis nullis.  
*Frisch inf.* 12. p. 10. t. 2. f. 3. *Insectum tuberculi muricati arboris taxi.*  
*Clus. pannon.* 20. 21. *Picea pumila.*  
*Habitat frequens in turionum abietis gallis strobiliformibus, squamatis, imbricatis.*
- salicis. 14. *Ch. salicis*. *Fn. suec.* 1012. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 14. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 14.  
*Habitat in Europæ salicibus.*
- fraxini. 15. *Ch. fraxini excelsioris*. *Fn. suec.* 1013. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 15.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 486. n. 4. *Psylla nigro luteoque variegata*, alarum ore in apicibus fuscis.  
*Habitat in fraxino.*
- aceris. 16. *Ch. aceris platanoidis*. *Fn. suec.* 1014. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 16. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 16.  
*Habitat in aceris platanoidis racemis.*
- ficus. 17. *Ch. ficus caricæ*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 17.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 484. n. 1. *Psylla fusca*, antennis crassius pilosis, alarum nervis fuscis.  
*Reaum. inf.* 3. t. 29. f. 17-24.  
*Habitat in Europæ magis australis ficu carica.*
- pini. 19. *Ch. pini lanata*. *Fn. suec.* 1. n. 699.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 488. n. 6.  
*Habitat in pinu; an eadem cum ch. abietis?*



- lichenis. 20. *Ch. fusca nigropunctata*, antennis corpore longioribus  
 alis nervosis fusco maculatis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 88. n. 7.*  
*Habitat in Lichenibus.*
- castanea. 21. *Ch. fusca*, antennis setaceis lævibus, alis nervosis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 489. n. 8.*  
*Habitat in variis plantis.*
- rubra. 22. *Ch. rubra*, alis nervosis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 489. n. 9.*  
*Habitat in variis plantis.*
- pruni. 23. *Ch. pruni domesticæ*. *Scop. ent. carn. p. 140. n. 414.*  
*Habitat in pruno domestica, abdomine rubro: punctis*  
*fuscisque lateralibus fuscis.*
- cratægi. 24. *Ch. cratægi oxyacanthæ*. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 412.*  
*Habitat in cratægo oxyacantha; larva ex plumbeo-vi-*  
*rente: plica abdominis longitudinali media.*
- evonymi. 25. *Ch. evonymi europæi*. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 411.*  
*Habitat in evonymo europæo, nigra, pedibus pallidis.*
- senecionis. 26. *Ch. senecionis vulgaris*. *Scop. ent. carn. p. 140. n. 413.*  
*Habitat in senecione vulgari, ex flavo virens, anten-*  
*narum articulo ultimo crassiore, duobus pilis terminato.*

229. COCCUS. *Rostrum* vagina setisque pectoralibus.

*Antennæ* filiformes.

*Abdomen* posterius fetosum.

*Alæ* duæ erectæ masculis; *feminæ* apteræ.

hesperidum. 1. *C. hibernaculorum*. *Fn. suec.* 1015.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 1. *Modeer ađ.* Gothenb. 1. p. 19. §. 8.

*Fn. suec.* 722. *Coccus hesperidum*.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 505. n. 2. *Chermes hesperidum*.

*Ađ. Paris.* 1692. p. 14. t. 14.

*Reaum. inf.* 4. t. 1.

*Frish inf.* 12. p. 12.

*Sulz. inf. t.* 12. f. 81.

*Schæff. elem.* t. 48.

*Habitat in hibernaculorum arboribus semper virentibus, frequentissimus, e. g. citro, lauro, calia, spadiceus, ovato-oblongus.*

Aonidum. 2. *C. indarum arborum*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 2. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 2. *Modeer ađ.* Gothenb. 1. p. 30. §. 26.

*Habitat in Asiæ arboribus semper virentibus, Canellia, &c. cocco hesperidum minor, apterus, flavesceus, oblongus, vel suborbicularis, antennis longitudine fere thoracis, testa orbiculata, planiuscula, atro-purpurascens: centro s. vertice tuberculato, rotundo, rubro, in senescentibus aperto.*

Capensis. 3. *C. ovalis subtomentosus conico-gibbus: apice operculato.* *Amœn. acad.* 6. p. 451. n. 47.\* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 318. n. 3. *Modeer ađ.* Gothenb. 1. p. 31. §. 28.

*Habitat ad Caput bonæ spei in gnaphalio muticato.*

Adonidum. 4. *C. rufus farinaceus pilosus.* *F. br. sp. inf.* 2. p. 393. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 4. *Modeer ađ.* Gothenb. 1. p. 48. §. 34.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 511. n. 1. *Coccus adonidum*, corpore roseo farinaceo, alis setisque niveis.

*Fn. suec.* 1. n. 1169. *Pediculus adonidum.*

β) *Lederm. microsc.* 1762. t. 9. *Pediculus coffeæ.*

*Habitat in America, Africae, nunc in Europæ calidioris arboribus, corpore ovato oblongiusculo albo, antennis pedibusque fuscis; linea dorsali longitudinali elevata, cum puncto elevato in singulis segmentis, laterum marginibus acutis, cum incisuris punctisque prominentibus 14, area inter lineam dorsalem & marginem totidem punctis secundum longitudinem dispositis conspersa, cauda bifida: senior folliculum struit, se sexies majorem, in quo se suaque ova flava condit.*

quercus. 5. *C. quercus roboris. Fn. succ.* 1016. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 5. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 508. n. 13. *Chermes quercus reniformis.*

*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 1-4.

*Habitat in Quercu Robore.*

ilicis. 6. *C. quercus coccifera. Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 6. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 24. §. 19. *Garid. aixens.* 250. t. 53. *Reaum. inf.* 4. t. 5.

*Geoffr. mat. med.* 2. p. 782.

*Lederm. microsc.* 72. t. 36.

*Habitat in Galloprovinciæ quercu coccifera, nitens fuscus albo villosus, aceto immersus & supra lintea exsiccatus tinctorius.*

betulæ. 7. *C. betulæ albæ. Fn. succ.* 1017. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 10. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 23. §. 16.

*Habitat in Europæ betula alba, teres, spadiceus.*

carpini. 8. *C. carpini betuli. Fn. succ.* 1018. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 11. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 29. §. 24.

Cocci, hibernaculorum pestis, juniores in ramis foliisque arborum decurrunt, volandoque saliant, aliquas subeunt metamorphoses, ut tamen *Adonidum*, *polonicus*, *spurius*, *caeli phalaridis*, *pilosellæ*, *uvæ ursi* & *alni* faciem vix mutant; adultiores, feminae præsertim maribus multoties majores, oculis nigris antennis pedibusque minimis instructæ, fertilissimæ, ut singulæ per rīnam caudalem fecundatæ ad 1000 ova contineant, tardæ, adhærent plantis, sæpe ramis, alii radicibus, fere immobiles.

*Habitat in carpino betulo, subphæricus, pallide rubescens, stria ad latus elevata.*

ulmi.

9. *C. ulmi campestris*. *Fn. suec.* 1019. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 8. *Modeer aël.* *Gothenb.* 1. p. 27. §. 21.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 8. *Chermes ulmi rotundus*. *Degeer inf.* 6. p. 436. n. 1. t. 28. f. 7. *Coccus ovatus albus fusco transverse striatus, ulmi.*

*Habitat in ulmo campestri, brunneus; fasciis transversis fuscis.*

coryli.

10. *C. coryli avellanæ*. *Fn. suec.* 1020. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 7. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 9. *Modeer aël.* *Gothenb.* 1. p. 29. §. 23.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 10. *Chermes coryli hemisphæricus.*

*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 4-10.

*Habitat in corylo avellana, citreus, rubro maculatus.*

tiliæ.

11. *C. tiliæ europææ*. *Fn. suec.* 1021. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 12. *Modeer aël.* *Gothenb.* 1. p. 30. §. 25.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 9. *Chermes tiliæ hemisphæricus.*

*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 1-3.

*Habitat in tiliæ europææ.*

rusci.

12. *C. rusci*, testa octo clypeolis cincta. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394: n. 11. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 13. *Modeer aël.* *Gothenb.* 1. p. 31. §. 29.

*Column. purp.* 16. t. 17. *Lepas nova f. myrti morbus*. *Ginann. adr.* 1. p. 60. t. 3. f. 27. *Balanus terrestris compositus e multis testis.*

*Klein ostr.* 116. *Lepas tessellata.*

*Becc. mus. t.* 107. f. XXIII. h. h.

*Habitat in Apuliæ myrto, rusco; testa truncata, octogona, perforata, clypeolis, præter duos laterales oppositos, in medio granulo notatis.*

myricæ.

13. *C. myricæ quercifoliæ*. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 319. n. 14. *Modeer aël.* *Gothenb.* 1. p. 31. §. 27.

*Habitat ad Caput bonæ spei, in myrica quercifolia, pisi minoris magnitudine, seniovarius, pallide incarnatus,*

*vertice obtuse acuminato cum poro tenuissimo; poro alio posterius supra marginem cartilagineum crassiores, album, utrinque septem circiter torulis protuberantem.*

- capreæ. 14. *C. falicis cinereæ. Fabr. sp. inf. 2. p. 394. n. 12. mant. inf. 2. p. 319. n. 15. Modeer act. Gothenb. I. p. 22. §. 15. Degeer inf. 6. p. 440. n. 2. t. 28. f. 13. Coccus subrotundus fuscus, linea dorsali nigra, falicis. Habitat in Europæ falicibus, quibus folia hirsuta, pisi majoris magnitudine, semiamplexicaulis, ovatus, anterius obtusus & bifidus, colore seminis staphyleæ, linea media nigra, nitens, glaber.*
- falicis. 15. *C. falicis hermaphroditæ. Fn. suec. 1022.\* Modeer act. Gothenb. I. p. 21. §. 12. Habitat in falicis hermaphroditæ cortice, minimus, depressusculus, cinereus.*
- vitis. 16. *C. vitis viniferæ. Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 18. mant. inf. 2. p. 319. n. 25. Modeer act. Gothenb. I. p. 20. §. 9. Geoffr. inf. par. 1. p. 506. n. 6. Chermes vitis oblongus. Act. bonon. 2. p. 279. t. 284. Reaum. inf. 4. t. 6. f. 5-7. Habitat in vitis viniferæ ramis, cinnamomeus.*
- figus. 23. *C. figus religiosæ & indicæ. Fabr. mant. inf. 2. p. 319. n. 7. Kerr act. angl. 1781. p. 374. f. a. b. Coccus Lacca. Habitat in Indiæ figu religiosa & indica, gummilaccam producens, ruber, antennis ramosis, cauda bifida. Swagermann.*
- polonicus. 17. *C. radicis scleranthi perennis. Fn. suec. 1023. Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 20. mant. inf. 2. p. 319. n. 23. Modeer act. Gothenb. I. p. 34. §. 31. Fn. suec. 720. Coccus radicum purpureus. Geoffr. inf. par. 1. p. 504. n. 1. Chermes radicum purpureus. Breyn act. phys. med. 6. 3. app. 5. t. 1. Coccus tinctorius radicum. Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum. Bauh. pin. 281. Rupp. jen. 86. Raj. hist. 186. Bauh. hist. 3. p. 378.*

*Frisch inf.* 5. p. 6. t. 2.

*Aët. upf.* 1742. t. 1.

*Reaum. inf.* 4. p. 1.

*Habitat in scleranthi perennis radicibus, oblongo-ovatus, purpureus aut spadiceus olim, Cofaceis adhuc tinctorius.*

fragariæ. 24. *C. fragariæ vesicæ. S. G. Gmelin it.* 1. p. 205. 3. p. 312.  
*Aët. angl.* 1765. p. 91. t. 10.

*Mayer aët. soc. priv. boh.* 4. p. 152. 184. *Coccus potentillæ.*

*Habitat in Europa & Sibiria ad fragariæ vesicæ, potentillæ vernæ, reptantis, albæ radices, rusticis Russis ad tingenda colore kermesino lintea usitatus, rostro nigro, thorace trirugi, ano pilis nigrescentibus cincto.*

hyperico-25. *C. hypericonis perforati. Pallas it.* 1. p. 21.  
nis. *Habitat in Russiæ hypericone perforato.*

pilosellæ. 18. *C. radicis hieracii pilosellæ. Fn. suec.* 1024. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 13. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 16. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 49. §. 36.  
*Sim. Paul. quadr.* 113.  
*Aët. upsal.* 1742. p. 54. t. 2.  
*Habitat in hieracii pilosellæ radicibus.*

uvæ ursi. 19. *C. radicis arbuti uvæ ursi. Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 14.  
*mant. inf.* 2. p. 319. n. 17. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 49. §. 37.  
*Habitat sub muscis ad radices arbuti uvæ ursi, tinctorius, spadiceus.*

phalaridis. 20. *C. radicum phalaridis. Fn. suec.* 1026. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 18. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 48. §. 35.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 512. n. 2. t. 10. f. 5. *Coccus graminis, corpore roseo.*

*Habitat ad graminum, præsertim phalaridis canariensis, radices, oblongo-ovatus, albidus vel pallide rubescens.*

oxyacan-21. *C. cratægi oxyacanthæ. Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 16.  
thæ. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 19. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 20. §. 10.

*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 11. 12.

*Habitat in cratægo oxyacantha, oblongus, spadiceus;*



- ferratulæ. 26. *C. ferratulæ arvensis*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 17  
*mant. inf.* 2. p. 319. n. 20.  
*Habitat in Angliæ ferratula arvensi.*
- zosteræ. 27. *C. zosteræ marinæ*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 19. *mant.*  
*inf.* 2. p. 319. n. 22.  
*Habitat in maris balthici zosteræ marina.*
- casti. 22. *C. casti coccinelliferi*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 21.  
*mant. inf.* 2. p. 319. n. 24. *Modeer act.* Gothenb. 1.  
p. 44. §. 33.  
*Brown jam.* 435. *Coccinella alis destituta, corpore rugoso.*  
*Degeer inf.* 6. p. 447. n. 1. t. 80. f. 12-14. *Coccus casti*  
*coccinelliferi.*  
*Act. angl.* 1762.  
*Hernand. mex.* 78.  
*Sloan. jam.* 2. p. 153. *præf.* t. 9.  
*Pet. gazoph.* 3. t. 1. f. 5.  
*Reaum. inf.* 4. t. 7. f. 11. 12.  
*Rausch hist. nat. de la cochenille.* t. 1. f. 1-5.  
*Habitat in Americæ castis opuntiis, depressus, tomento-*  
*sus, transverse rugosus, dorsi margine laterali utrinque*  
*duplici: superiore brevior, abdomine purpurascens,*  
*pedibus brevibus nigris, antennis subulatis, corpore*  
*tertia parte brevioribus, eximie tinctorius.*
- liriodendri. 28. *C. liriodendri tulipiferæ*. *Hamburg. Magaz.* 12. p. 1-24.  
*Habitat in liriodendro tulipifera.*
- arinofus. 29. *C. ovatus tomentosus pallide fuscus albo-farinofus.*  
*Degeer inf.* 6. p. 442. n. 3. t. 38. f. 16. 17. *Modeer*  
*act.* Gothenb. 1. p. 50. §. 38.  
*Habitat in betula albo, depressiusculus.*
- clematidis. 30. *C. clematidis oblongus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 506. n. 1.  
*Habitat in clematidibus.*
- persicæ. 31. *C. persicæ rotundus.* *Modeer act.* Gothenb. 1. p. 28. §. 22.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 506. n. 5.  
*Reaum. inf.* 4. t. 2. f. 4. 5.  
*Habitat in amygdala persica, nitens, rubicundus, spæ-*  
*diceus aut niger.*

- abietis. 32. *C. abietis rotundus*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 27.  
§. 20. Geoffr. inf. par. I. p. 507. n. 7.  
*Habitat in pinu abiete ; badius.*
- fuscus. 33. *C. quercus fuscus*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 24. §. 18.  
Geoffr. inf. par. I. p. 507. n. 11.  
Reaum. inf. 4. t. 5. f. 2.  
*Habitat in quercu robore , albo tomento obductus.*
- variegatus. 34. *C. quercus rotundus ex albo , flavescente nigroque varius.*  
Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 12.  
Reaum. inf. 4. t. 5. f. 3. a.  
*Habitat in quercu robore.*
- lanatus. 35. *C. quercus oblongus : serico albo.*  
Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 14.  
*Habitat in quercu robore ; nonne mera varietas fusci ?*
- mespili. 36. *C. mespili : serico albo.*  
Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 16.  
*Habitat in mespilis.*
- conchiformis. 37. *C. arborum linearis*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 22. §. 14.  
Geoffr. inf. par. I. p. 509. n. 17.  
Reaum. inf. 4. t. 5-7.  
*Habitat in ulmo , angustus , fuscus.*
- aceris. 38. *C. aceris ovatus*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 21. §. 13.  
Geoffr. inf. par. I. p. 509. n. 18.  
*Habitat in acere , ovato-depressus , striis ad latera longitudinalibus albis aut cinereis.*
- laniger. 39. *C. fuscus : serico albo.*  
Geoffr. inf. par. I. p. 512. n. 3.  
Reaum. inf. 4. t. 7. f. 1. 2. 6. 9.  
*Habitat in ulmo campestri.*
- diosmatis. 40. *C. diosmatis crenatæ*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 21. §. 11.  
*Habitat in Capitis bonæ spei diosmate crenato & pulchello , ovato-oblongus.*
- alni. 41. *C. betulæ alni*. Modeer a $\overline{c}$ t. Gothenb. I. p. 23. §. 17.  
*Habitat in betulæ alni dichotomia ramorum , oblongo-ovatus , rubescens.*

Uva. 42. *C. testa fusca sphærico-gibba, subflavescente. Modcer act. Gothenb. 1. p. 32. §. 30.*  
*Habitat in Suecia sub lapidibus.*

Spurius. 43. *C. ovatus hinc inde pilosus spadiceus subtus pallide flavus. Modcer act. Gothenb. 1. p. 43. §. 32.*  
*Habitat in ulmi ramorum dichotomia.*

230. THRIPS. *Rostrum* obsoletum, intra os absconditum.

*Antennæ* filiformes longitudine thoracis.

*Corpus* lineare; *abdomen* sursum reflexile.

*Alæ* quatuor rectæ, dorso incumbentes, longitudinales, angustæ, subcruciatae.

paradoxa. 1. *Thr. fusca, alis abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus. Amæn. acad. 6. p. 401. n. 48.\**  
*Habitat in Sina, an hujus generis?*

phylapus. 2. *Thr. elytris glaucis, corpore atro. Fn. suec. 1027.\**  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 485. n. 2. Scop. ent. carn. 418.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 396. n. 1. mant. inf. 2. p. 320. n. 1.*  
*Degeer inf. 3. p. 6. n. 1. t. 1. f. 1. Thrips atra, alis albis, antennis sexnodiis.*  
*Degeer act. Stockh. 1744. p. 3. t. 4. f. 4. Phylapus ater, alis albis.*  
*Schaeff. elem. t. 127.*  
*Habitat frequens in Europæ floribus compositis, loti corniculatae flores clausos tumidosque reddens, secalis spicas exinaniens.*

minutissima. 3. *Thr. elytris corporeque glauco, oculis fuscis. Fn. suec. 1028.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 396. n. 4. mant. inf. 2. p. 320. n. 4.*  
*Habitat in Europæ floribus.*

- juniperina. 4. Thr. elytris niveis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1029.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 396. n. 2. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 2.  
*Degeer inf.* 3. p. 10. n. 2. t. 1. f. 5. Thrips griseo-fusca, oculis nigris, alis albescentibus.  
*Degeer act. Stockh.* 1744. p. 6. t. 1. f. 2. Physapus fuscus, alis albicantibus.  
*Habitat in juniperi gallis.*
- ulmi. 6. Thr. nigra, alis niveis ciliatis, ano acuminato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 306. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 384. n. 1. t. 7. f. 6. Thrips elytris albidis, corpore nigra abdominali feta.  
*Degeer inf.* 3. p. 11. n. 3. t. 1. f. 8-13. Thrips (corticis) nigra, alis hyalinis niveis, barbis longissimis, antennis octonodiis.  
*Habitat gregaria in ulmi cortice.*
- urticæ. 7. Thr. flava, elytris albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 397. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 5.  
*Schranck Beytr. zur Naturg.* 31. t. 1. f. 25. 26.  
*Habitat in urticæ, vitis, coryli aliorumque foliorum pagina inferiori, solitaria.*
- fasciata. 5. Thr. elytris albo nigroque fasciatis, corpore fusco. *Fn. suec.* 1030.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 385. n. 3. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 397. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 6.  
*Degeer inf.* 3. p. 18. n. 4. Thrips atra, alis fasciis transversis tribus albis, antennis annulo albo.  
*Sulz. inf. t.* 7. f. 48. b.  
*Habitat in Europæ floribus compositis.*
- fusca. 8. Thr. nigricans, elytris glaucis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 96. n. 1083.  
*Habitat in Dania, an forsan femina fasciata?*
- obscura. 9. Thr. flavescens, elytris pallidis, oculis abdominisque annulis nigris. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 96. n. 1084.  
*Habitat in Dania.*

---

Thripes in floribus frequentes agilissimæ fere subsiliunt, abdomine sæpius sursum flexo, tarsi vesiculosi; larvæ æque agiles currunt, sæpius rubræ.

- rufa. 10. Thr. rufa. v. Gleichen *Neuestes im Reich der Pflanz.*  
t. 16. f. 6. 7.  
*Habitat in tritici spicis, an forsan larva minutissima.*
- variegata. 11. Thr. variegata. v. Gleichen *Neuestes im Reich der*  
*Pflanz.* p. 22. t. 21. f. 6. 7.  
*Habitat in linaria.*
-













